

Mer Lagrange

$$\mathbb{R}^n \quad A = \{ \vec{x} \in \mathbb{R}^n : g(\vec{x}) = b \}, \quad g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}.$$


$$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad (\text{deriverbar}).$$

Find maks/min for f på A .

$$\nabla g(\vec{x}).$$


$$\nabla f(\vec{x}) \quad \text{los} \quad \nabla f = \lambda \cdot \nabla g(\vec{x}).$$

$$\lambda \in \mathbb{R}.$$

Eks:

Bygge rektangulært telt med volum 500 m^3 .

Minimer total lengde på teltstenger.



$$\text{minimer } 4x + 2y + 2z$$

$$\text{under betingelsen } xyz = 500.$$

$$\text{Sett } f(x, y, z) = 4x + 2y + 2z.$$

$$g(x, y, z) = xyz, \quad b = 500.$$

Obs:

- f kan ikke ha et maks på A .
- f må ha et min.

$$\nabla f(x, y, z) = (4, 2, 2)$$

$$\nabla g(x, y, z) = (yz, xz, xy)$$

$$\text{los } \nabla f(x, y, z) = \lambda \nabla g(x, y, z).$$

$$(4, 2, 2) = \lambda \cdot (yz, xz, xy)$$

$$\left. \begin{array}{l} 4 = \lambda yz \\ 2 = \lambda xz \\ 2 = \lambda xy \end{array} \right\} \begin{array}{l} y = 2x \\ y = z \end{array} \quad \text{må ha } (x, y, z) = (x, 2x, 2x)$$

$$\text{Fra biletet: } g(x, y, z) = 500$$

$$\Rightarrow 4x^3 = 500 \Rightarrow x^3 = 125 \Rightarrow x = 5.$$

Flere betingelser

Teorem (Lagrange)


Anta at U er en åpen delmengde av \mathbb{R}^n og at $f, g_1, \dots, g_m : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ er funksjoner med kontinuerlige partiellderiverte. Dersom $b_1, \dots, b_m \in \mathbb{R}$ og $\vec{x}_0 \in U$ er et lokalt maks- eller min-punkt for f på mengden

$$A = \{ \vec{x} \in U : g_1(\vec{x}) = b_1, \dots, g_m(\vec{x}) = b_m \},$$

så er enten $\nabla g_1(\vec{x}_0), \dots, \nabla g_m(\vec{x}_0)$ lineært uavhengige, eller

$$\nabla f(\vec{x}_0) = \lambda_1 \cdot \nabla g_1(\vec{x}_0) + \lambda_2 \cdot \nabla g_2(\vec{x}_0) + \dots + \lambda_m \cdot \nabla g_m(\vec{x}_0).$$

"Bevis": $g_1(x, y, z) = x^2 + y^2$ $b_1 = 1$
 $g_2(x, y, z) = 2x + 3y - z$ $b_2 = 0$.
 f vilkårlig.




Eksempel: Som: "kulis"

$$g_1(x, y, z) = x^2 + y^2, \quad b_1 = 1$$

$$g_2(x, y, z) = 2x + 3y - z, \quad b_2 = 0$$

$$f(x, y, z) = z,$$



Se at gradientene til g_1
og g_2 er lineært uavh.

$$\nabla f(x, y, z) = (0, 0, 1)$$

$$\nabla g_1(x, y, z) = (2x, 2y, 0)$$

$$\nabla g_2(x, y, z) = (2, 3, -1),$$

Vi løse $\nabla f(x, y, z) = \lambda_1 \nabla g_1(x, y, z) + \lambda_2 \nabla g_2(x, y, z).$

$$(0, 0, 1) = \lambda_1 \cdot (2x, 2y, 0) + \lambda_2 \cdot (2, 3, -1)$$

$$\left. \begin{aligned} 0 &= \lambda_1 \cdot 2x + 2\lambda_2 = \lambda_1 \cdot 2x - 2 \\ 0 &= \lambda_1 \cdot 2y + 3\lambda_2 = \lambda_1 \cdot 2y - 3 \\ 1 &= -\lambda_2 \leadsto \lambda_2 = -1 \end{aligned} \right\}$$

$$\begin{aligned} 2\lambda_1 \cdot x &= 2 & x &= \frac{1}{\lambda_1} \\ 2\lambda_1 \cdot y &= 3 & y &= \frac{3}{2\lambda_1} \end{aligned}$$

Fra kule: $x^2 + y^2 = 1 \quad \left(\frac{1}{\lambda_1}\right)^2 + \left(\frac{3}{2\lambda_1}\right)^2 = 1$

$$1 + \frac{9}{4} = \lambda_1^2$$

$$\frac{13}{4} = \lambda_1^2$$

$$\lambda_1 = \pm \sqrt{\frac{13}{4}}$$

Nå er det rett frem å finne
 x, y, z ,

Gradientmetoden

Vil fremdeles finne maks/min-punkter for funksjon $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ med kont. partiellderiverte.

Anta at vi er gitt f . Anta at $\vec{a}_0 \in \mathbb{R}^n$ er et min-punkt for f .



← Nivåkurver for f nær \vec{a}_0 .

Gitt et min-punkt \vec{x}_0 ,

$$r(t) = \vec{x}_0 - t \cdot \nabla f(\vec{x}_0)$$

se på $f(r(t))$: ønsker nå

å finne min-punkt for denne.

Deriver $f(r(t))$ m.h.p. t og løs $= 0$.

$$\frac{d}{dt} f(r(t)) = \nabla f(r(t)) \cdot r'(t)$$

$$= -\nabla f(\vec{x}_0 - t \cdot \nabla f(\vec{x}_0)) \cdot \nabla f(\vec{x}_0)$$

$$\text{løs } \nabla f(\vec{x}_0 - t \cdot \nabla f(\vec{x}_0)) \cdot \nabla f(\vec{x}_0) = 0$$

Finne første nullpunkt t_0 .

$$\text{Set } \vec{x}_1 := \vec{x}_0 - t_0 \cdot \nabla f(\vec{x}_0)$$

.... Fortsett .

MATLAB: Kan lage script som utfører disse operasjonene.