
EXPLORATORY, POST HOC: walking rate vs κ̂ with S estimated from the UNCENTERED arm (right: centered-arm κ from kappa.md for reference)
S_ret: AUC 0.83, ΔAIC robot 29.6 FAIL (a no, b no, c no)
S_v100: AUC 0.83, ΔAIC robot 27.9 FAIL (a no, b no, c no)
κ (S_cen): AUC 0.93, ΔAIC robot 6.8
uncentered walking rate (k/n, Wilson 95%)
Go1 γ0.99 c=0 pilot 3/3
Go1 γ0.999 c=0 19/20
G1 γ0.99 c=0 pilot 3/3
G1 γ0.999 c=0 pilot 2/3
Go1 γ0.999 c=0.1 12/20
Go1 γ0.999 c=0.3 2/20
G1 γ0.99 c=1 0/20
Go1 γ0.999 c=1 0/20
κ̂ = L / S_ret (uncentered return std, it 0-50)
κ̂ = L / S_v100 (uncentered v_std, it 50-100)
κ = L / S (centered-arm v_std, it 100-300; kappa.md)
Go1 (claim, n=20)
G1 (claim)
hollow = pilot (n=3), not in the fit
S_rew (per-step reward std x 1/sqrt(1-g^2)) is not shown: the logged `rew_std` is 1.0 in every row (reward_scale = none); candidate dropped, none substituted.