


1. 直角三角形の個数

正多角形の頂点を結んで三角形を作るとき、「どんな三角形ができるか」を分類する問題は入試の頻出テーマです。まずは直角三角形から考えます。

直角三角形の成立条件

円周上の 3 点を結んで直角三角形ができるのは、
1 辺が円の直径になるとき
に限ります。(直径に対する円周角は 90°)

- ステップ 1：直径を 1 本選んで固定する。
- ステップ 2：残りの頂点から、もう 1 点を選ぶ。



例題 1. 直角三角形の個数

正十二角形の頂点のうち 3 点を結んでできる三角形について、直角三角形は何個あるか。


Memo / Answer

2. 鈍角三角形・鋭角三角形

直角以外の三角形の分類には、円の中心との位置関係を使います。

三角形の形状判定

- 直角：斜辺が中心を通る (直径)。
- 鈍角：中心が三角形の外にある。
⇔ 3 点が半円の弧の上に収まる。
- 鋭角：中心が三角形の内にある。



解法テクニック：
頂点を 1 つ固定し、
半周未満の範囲から
残り 2 点を選ぶ！

例題 2. 鈍角・鋭角三角形の個数

正十二角形の頂点のうち 3 点を結んでできる三角形について、次の個数を求めよ。

- (1) 鈍角三角形
- (2) 鋭角三角形

ヒント：鋭角三角形を直接数えるのは難しい。

$(全体) - (直角) - (鈍角)$

で求めよう。


Memo / Answer

3. 二等辺三角形

正多角形の二等辺三角形を数えるときは、対称軸（頂点を通る直径）を利用します。ある頂点を「頂角」と定めて、底辺が対称になるようにペアを探します。

二等辺三角形の数え上げ

- (1) 1 つの頂点を頂角として固定する。
- (2) その頂点を通る直径に対して、左右対称になる 2 点のペアを探す。
- (3) 正三角形も二等辺三角形の一種なので含まれるが、重複して数えてしまうため最後に調整が必要な場合がある（または、正三角形だけ別枠で考える）。



例題 3. 二等辺三角形の個数

正十二角形の頂点 3 つを結んでできる三角形のうち、二等辺三角形は何個あるか。また、正三角形は何個あるか。

Memo / Answer

Lecture Note：正三角形の重複

正十二角形の場合、頂点 A_1 を頂角とする二等辺三角形の中に、正三角形 (A_1, A_5, A_9) が含まれます。しかし、頂点 A_5 を頂角としたときも、同じ正三角形 (A_5, A_9, A_1) をカウントしてしまいます。

- 二等辺三角形（正三角形含む）： A_1 を頂角とするものが 5 個 $\times 12$ 頂点 = 60 個？
- 間違いです！ 正三角形だけ 3 回重複カウントされています。

安全な数え方：

- (1) 正三角形以外の二等辺三角形を数える。
- (2) 正三角形を別に数えて足す。

または、

$(\text{単純計算の総和}) - 2 \times (\text{正三角形の個数})$

(3 回数えたものを 1 回にするため、2 回分引く)

Challenge：直角二等辺三角形

正八角形について、直角二等辺三角形は何個あるか。

確認テスト A（基本）

練習 1：直角三角形

正十角形の頂点 3 つを結んでできる直角三角形の個数を求めよ.

練習 2：鈍角三角形

正八角形の頂点 3 つを結んでできる鈍角三角形の個数を求めよ.

Memo / Answer

確認テスト B（標準・応用）

練習 3：三角形の形状分類

正十二角形の頂点 3 つを結んでできる三角形について,

- (1) 全部の三角形の個数.
- (2) 直角三角形の個数.
- (3) 鈍角三角形の個数.
- (4) 鋭角三角形の個数.

練習 4：二等辺三角形

正十角形の頂点 3 つを結んでできる二等辺三角形（正三角形も含む）は何個あるか.

Memo / Answer

【解答】確認テスト A

Memo / Answer

1
正十角形の頂点は 10 個なので、直径は $10 \div 2 = 5$ 本引ける。直径 1 本につき、残りの $10 - 2 = 8$ 個の頂点と結べば直角三角形ができる。よって、
 $5 \times 8 = 40$ (個)

2
鈍角三角形 → 3 点が半円周上に収まる。頂点 1 つを固定する (仮に P_1)。 P_1 を最も左端 (反時計回りの始点) としたとき、半円周上 (直径の対岸を含まない) にある頂点は、 $8 \div 2 - 1 = 3$ 個。この 3 個から残り 2 点を選べば、すべて P_1 を鈍角の頂点とするわけではないが、必ず鈍角三角形になる。(※正確には「 P_1 を始点とする半円」に含まれる 3 点を選ぶと 1 個の鈍角三角形が決まる) 正八角形の頂点それぞれを始点として考えられるので、
 $8 \times {}_3C_2 = 8 \times 3 = 24$ (個)

【解答】確認テスト B

Memo / Answer

3
(1) ${}_{12}C_3 = \frac{12 \times 11 \times 10}{3 \times 2 \times 1} = 220$ (個)
(2) 直径は $12 \div 2 = 6$ 本。 $6 \times (12 - 2) = 6 \times 10 = 60$ (個)
(3) 1 つの頂点を始点として固定。半円周上 (端点除く) にある点は $12 \div 2 - 1 = 5$ 個。この 5 個から 2 個選べばよい。 $12 \times {}_5C_2 = 12 \times 10 = 120$ (個)
(4) (全体) - (直角) - (鈍角) $220 - 60 - 120 = 40$ (個)

4
正十角形は 10 が 3 の倍数ではないので、正三角形は作れない。よって重複を気にする必要はない。頂点 P_1 を頂角とする二等辺三角形を考える。対称軸に対して左右対称なペアは、 $(P_2, P_{10}), (P_3, P_9), (P_4, P_8), (P_5, P_7)$ の 4 組。(P_6 は対岸なので三角形にならない) よって、1 つの頂点につき 4 個できる。
 $10 \times 4 = 40$ (個)