


♣ 学びの全体像




♣ いつまでたっても辿り着けない!?

全体課題

あなたは「壁」に向かって歩いている. ただし, 「壁までの距離の半分進んだら一度止まる」という操作を繰り返している.

- 1 回目 残りの半分を進む.
- 2 回目 またその半分を進む.
- 3 回目 さらにその半分進む.

この操作を「とてつもなくたくさん」繰り返したとき, あなたは「壁」に辿り着けるといえるか.



Memo / Answer

pre: 今の自分の考え (予想)

- 結論: 【 辿り着ける / 辿り着けない 】
- 理由:

post: 授業を通しての考え (変容)

- 結論: 【 辿り着ける / 辿り着けない 】
- 理由・必要な考え方:

♣ エキスパート A 「いつまでたっても有理数」

目標 A

$\sqrt{2}$ のような無理数を，分数の入れ子構造（連分数）で近似する操作を通して，有限回の計算の限界を感じ取る．また，誤差を 0 とみなす方法としての極限概念を大雑把に説明できる．

説明：構造を見抜け

$\sqrt{2}$ は無理数なので，整数の比（分数）で表すことはできない．しかし，「無理やり分数の中に分数を入れ込む」ことで近づくことはできそう．

$$\text{基本変形： } \sqrt{2} = 1 + (\sqrt{2} - 1) = 1 + \frac{(\sqrt{2} - 1)(\sqrt{2} + 1)}{\sqrt{2} + 1} = 1 + \frac{1}{\sqrt{2} + 1} = 1 + \frac{1}{2 + (\sqrt{2} - 1)}$$

この「 $\sqrt{2} - 1$ 」の部分，再び上の式を使って置き換えていく．

$$\begin{aligned} \sqrt{2} &= 1 + (\sqrt{2} - 1) \\ &= 1 + \frac{1}{2 + (\sqrt{2} - 1)} \\ &= 1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2 + (\sqrt{2} - 1)}} \\ &= \dots \end{aligned}$$

末尾の $\sqrt{2} - 1$ を切り捨てれば，

$$\begin{aligned} x_1 &= 1 \quad (\text{第 1 近似}) \\ x_2 &= 1 + \frac{1}{2} = 1.5 \quad (\text{第 2 近似}) \\ x_3 &= 1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2}} = 1.4 \quad (\text{第 3 近似}) \end{aligned}$$

この操作を繰り返すことで，次々と新しい近似値 x_n が生まれる．

課題 1：計算せよ

もう一層連分数展開を進め， x_4 を求めよ（小数第 4 位まで）． → $x_4 =$ _____．

$$\sqrt{2} = 1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2 + (\sqrt{2} - 1)}} \rightarrow$$

まとめまで終わり時間が余ったら!!

さらにもう一層連分数展開を進め， x_5 を求めよ（小数第 5 位まで） → $x_5 =$ _____．

課題 2：構造を見直せ

この連分数展開を「100 万回」繰り返して $x_{1000000}$ を作ったとする．

(1) その数は $\sqrt{2}$ と完全に一致するか？

【 一致する / 一致しない 】

(2) その数は有理数か，無理数か？

【 有理数 / 無理数 】

→ 有理数 \neq 無理数であるから，どこまで行っても誤差はなくなる。

【おまけ】

n	小数近似値 x_n
5	1.41379...
6	1.41428...
7	1.41420...
8	1.41421...

課題 3: 諦めるな．ルールを作れ

そこで，新しいルールを作成する．

【前提】 $\sqrt{2}$ の小数第 6 位までの値 1.414213 は既知のものとする．

【ルール】 x_n と $\sqrt{2}$ の誤差が $\varepsilon = 0.01^{*1}$ を下回ったら「 x_n と $\sqrt{2}$ は一致したとみなす」ことにする．

このルールのもとで，

(1) x_3 は $\sqrt{2}$ と【 一致する / 一致しない 】 $\xrightarrow{\text{誤差}}$

(2) x_4 は $\sqrt{2}$ と【 一致する / 一致しない 】 $\xrightarrow{\text{誤差}}$

課題 4：あまいルールで満足するな

上のルールをどんどん厳しくしていく．

(1) $\varepsilon = 0.001$ と設定しても，階数 n を十分大きくすれば， $\sqrt{2}$ と x_n は

【 一致する / なんとも言えない 】

(2) $\varepsilon = 0.00000001$ と設定しても，階数 n を十分大きくすれば， $\sqrt{2}$ と x_n は

【 一致する / なんとも言えない 】

まとめ

- どんなに n を大きくしても，有限回の操作では $\sqrt{2}$ にはなれない → $x_n \neq \sqrt{2}$ ．
- しかし，その誤差に閾値（しきいち） ε を設けることで一致したとみなすことにすれば，この誤差がどんなに小さな値だとしても， n を十分大きくすれば， x_n と $\sqrt{2}$ は一致したとみなすことができる．
- この事実を，

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sqrt{2}$$

という記号を使い，「無限回操作したその行き着く先」として $\sqrt{2}$ を定義しなおす．これが極限概念である．

^{*1} ε とは誤差 (error) の頭文字 e のギリシャ文字のこと．

♣ エキスパート B 「曲がった図形の面積」

目標 B

面積を決定する方法としての長方形近似を理解し、長方形近似を用いて曲線 $y = x^2$ のグラフと座標軸等が囲う場所の面積を求めることができる。またその導出過程を説明できる。

導入：予想せよ

関数 $y = x^2$ のグラフと $x = 1$ と x 軸で囲われた面積 T により近いと思うものと次から選び、選んだ理由を自由に説明せよ。【 1 / $\frac{1}{2}$ / $\frac{1}{3}$ / $\frac{1}{4}$ 】

選んだ理由

課題 1：長方形近似


曲がった図形の面積を求める代わりに、図形を覆い尽くす長方形の面積 S (過剰和) と図形に覆い尽くされる長方形の面積 s (不足和) を求める。 $x = 0$ から $x = 1$ までは 4 等分した場合 (S_4 と s_4) を考える。

(1) 過剰和 S_4 は

$$S_4 = \underbrace{\frac{1}{4}}_{\text{横幅}} \left(\left(\frac{1}{4} \right)^2 + \left(\frac{2}{4} \right)^2 + \left(\frac{3}{4} \right)^2 + \left(\frac{4}{4} \right)^2 \right)$$

$$= \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4^2} \sum_{k=1}^4 k^2 = \underline{\hspace{2cm}}.$$


(ヒント: $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$)



(2) 不足和 s_4 は、

$$s_4 = \frac{1}{4} \left(\left(\frac{0}{4} \right)^2 + \left(\frac{1}{4} \right)^2 + \left(\frac{2}{4} \right)^2 + \left(\frac{3}{4} \right)^2 \right)$$

$$= \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4^2} \sum_{k=1}^3 k^2 = \underline{\hspace{2cm}}.$$



(3) (1), (2) から判断できる、面積 T のとりうる値の範囲は $\underline{\hspace{2cm}} < T < \underline{\hspace{2cm}}$.

課題 2：さらに細かく刻む

$n = 10$ (幅 0.1) と $n = 100$ (幅 0.01) の場合を計算した結果を用意した。以下の表を見て問いに答えよ。

分割数	幅	不足和 s_n (内側)	過剰和 S_n (外側)
$n = 4$	0.25	0.21875	0.46875
$n = 10$	0.1	0.28500	0.38500
$n = 100$	0.01	0.32835	0.33835

問い：

- (1) 分割数を増やしていくと、過剰和と不足和の差(ズレ)は【 広がる / 縮まる / 変わらない 】。
- (2) しかし、 n をどんなに大きな値にしても、誤差は 0 に【 なる / ならない 】。
- (3) 本当の面積 T はおよそいくつと予想できるだろうか? \rightarrow 【 0.300... / 0.333... / 0.385... 】

まとめ

分割数 n 大きくすると、過剰和 S_n と不足和 s_n は、どちらも $\frac{1}{3}(=0.333\cdots)$ に近づくが、有限回の操作では階段の「カクカク」した部分が消えずに、真の値との誤差が残る。

$$s_n < T < S_n.$$

不等号を等号に変えるためには、極限概念「 n を限りなく大きくする」という操作が必要になる。これを



$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{3}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \frac{1}{3}$$

と書き、これにより「誤差が限りなく 0 に近くなった」とみなし、面積は $T = \frac{1}{3}$ と確定することにする(挟み撃ちの原理)。

有限回では消すことができない「誤差」を消すために「極限」概念を用いて誤差をないものとみなすことにした。

課題 3：時間が余ったら取り組もう!!

$x = 0$ から $x = 1$ までは 8 等分した場合の過剰和 S と不足和 s を求めよ。



♣ エキスパート C 「接線が追い詰める解」

目標 C

方程式の解を、接線を用いて近似的に求める手法（ニュートン法）を通して、接線の有用性と、反復操作による極限への収束を理解し説明できる。

導入： $\sqrt{2}$ を捕まえよ！

【前提】私たちは $\sqrt{2}$ について、「2 乗したら 2 になる数のうち正の数」ということしか知らない（近似値は知らない.）.

【目標】グラフを用いて、曲線 $y = x^2 - 2$ と x 軸 ($y = 0$) の交点として $\sqrt{2}$ の値を特定する.

【方針】曲線のままだと計算が難しいので、曲線を「部分的に直線（接線）」とみなして計算する.

ルール：ちょっと先取り

本来、接線の傾きを求めるには「微分」という計算が必要*2だが、今日は以下の事実を使ってよい.

【特別ルール】


関数 $y = x^2 - 2$ 上の $x = a$ の点における接線の傾きは、 $2a$ で求められる.

- 例： $x = 3$ の点なら、接線の傾きは $2 \times 3 = 6$ 、 $x = 4$ の点なら、接線の傾きは $2 \times 4 = 8$.

課題 1：直角三角形で解く

【ステップ 1】初期値として $x_0 = 2$ を設定する. ここから接線に沿って滑り降り、より正解 ($\sqrt{2}$) に近い値 x_1 を求めよう (直角三角形に注目!!).

- (1) $x = 2$ における曲線 $y = x^2 - 2$ 上の点 A の座標 $\rightarrow (2, \quad)$.
- (2) 点 A における「接線の傾き」(特別ルールを使用)
 \rightarrow 傾き = \quad
- (3) ヨコ = タテ \div 傾き = \quad
- (4) $x_1 = 2 - (\text{ヨコの長さ}) = \quad$




*2 微分による傾きの定義は次回以降登場する.

課題 2：繰り返す

【ステップ 2】求まった x_1 を新しいスタート地点として、小さな直角三角形に注目して、もう一度同じ計算を行う. (電卓使用可)

- (1) 点 A' の座標 $\rightarrow (\quad, \quad)$.
- (2) 点 A' における傾き $\rightarrow \quad$
- (3) ヨコ = タテ \div 傾き = \quad
(小数第 4 位まで)
- (4) $x_2 = x_1 - \text{ヨコ} = \quad$
(小数第 4 位まで)



課題 3：誤差の行方

たった 2 回の操作で、 $2.0 \rightarrow 1.5 \rightarrow 1.4166\cdots$ と、真の値 $\sqrt{2} = 1.4142\cdots$ に劇的に近づいた.

- (1) この操作を繰り返せば、値は真の値に近づくか? \rightarrow 【 近づく / 遠ざかる 】
- (2) 有限回の操作で、完全に誤差 0 ($x_n = \sqrt{2}$) になるか? \rightarrow 【 なる / ならない 】

課題 4：諦めるな. ルールを作れ!!

そこで、新しいルールを作成する.

【ルール】 x_n と $\sqrt{2}$ の誤差が 0.00000001 を下回ったら「 x_n と $\sqrt{2}$ は一致したとみなす」ことにする.

このルールのもとで、

- (1) x_2 は $\sqrt{2}$ と【 一致する / 一致しない 】
- (2) n を十分大きくしていけば、いつかは、 x_n と $\sqrt{2}$ は【 一致する / 一致しない 】

\rightarrow ルールをどんどん厳しくしていけば、最終的には真の値 $\sqrt{2}$ に到達したと言えそう.

まとめ

- 接線を利用して解に迫るこの方法をニュートン法という.
- 非常に効率よく解に近づくが、有限回の操作では絶対に誤差はなくなる ($x_n \neq \sqrt{2}$).
- そこで、誤差に関するルールを定めて、そのルールを満足すれば、 x_n と $\sqrt{2}$ は一致したとみなすことにする.
- 操作の回数 n を限りなく大きくしていけば、どんなに厳しいルールでもクリアでき、「 $\sqrt{2}$ に到達した」と言えそう.
- この様子を

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sqrt{2}$$

と書くことにする. これが極限概念である.