

1. 崩壊の連鎖 (部分分数分解)

次の和を計算せよと言われたら、どうするだろうか.

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)}$$

通分して計算するのは現実的ではない. ここで重要なのは、分数を「足す」のではなく「引き算に分解する」ことである.

部分分数分解

分母が積の形になっている分数は、差の形に変形できる.

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$$

実際に右辺を通分してみると、 $\frac{(k+1)-k}{k(k+1)} = \frac{1}{k(k+1)}$ となり元に戻る. この変形を行うと、驚くべきことが起こる.

$$S = \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2}\right) + \cancel{\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right)} + \cancel{\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right)} + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right)$$

中間がすべて消滅する！

$$S = 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1}$$

2. 係数が必要な場合

分母の差が 1 でない場合は、係数による調整が必要になる.

$$\frac{1}{k(k+2)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+2} \right)$$

(右辺を通分すると分子が 2 になるため、 $\frac{1}{2}$ で割っておく)

例題 1 (1 つ飛ばしの消去)

次の和を求めよ.

$$S = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+2)}$$

Memo / Answer

3. 姿を変えた打ち消し合い (√)

分母にルートがある場合も、有理化することで「差の形」を作れる。

$$\frac{1}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k}} = \frac{\sqrt{k+1} - \sqrt{k}}{(k+1) - k} = \sqrt{k+1} - \sqrt{k}$$

これなら $\sum(\sqrt{k+1} - \sqrt{k})$ となり、隣同士が打ち消し合う。

例題 2 (無理数の数列の和)

次の和を求めよ。

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k}}$$

Memo / Answer

4. 混ざり合った数列 (等差 × 等比)

次は打ち消し合わないが、計算テクニックで解けるパターン。

$$S = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 2^2 + 3 \cdot 2^3 + \cdots + n \cdot 2^n$$

左側は等差数列 $(1, 2, 3, \dots)$ 、右側は等比数列 $(2, 2^2, 2^3, \dots)$ である。

解法: 等比数列の和の公式の導出と同じく、「公比を掛けてズラして引く」。

$$\begin{aligned} S_n &= 1 \cdot 2 + 2 \cdot 2^2 + 3 \cdot 2^3 + \cdots + n \cdot 2^n \\ 2S_n &= 1 \cdot 2^2 + 2 \cdot 2^3 + \cdots + (n-1)2^n + n \cdot 2^{n+1} \quad (-) \\ \hline -S_n &= 2 - \boxed{1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^3 + \cdots + 1 \cdot 2^n} - n \cdot 2^{n+1} \\ &\quad \text{ここが等比数列の和になる!} \end{aligned}$$

例題 3 (等差 × 等比)

上の数列の和 S を求めよ。

Memo / Answer

確認テスト (A: 基本)

練習 A1 (部分分数分解)

次の和を求めよ.

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}$$

Memo / Answer

練習 A2 (等差 × 等比の導入)

次の和 S を $S - 3S$ を計算することで求めよ.

$$S = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 3^2 + \cdots + n \cdot 3^{n-1}$$

Memo / Answer

確認テスト (B: 標準)

練習 B1 (2 つ飛ばし)

次の和を求めよ.

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+2)}$$

Memo / Answer

練習 B2 (等差 × 等比)

次の和を求めよ.

$$S = 1 \cdot 2^1 + 3 \cdot 2^2 + 5 \cdot 2^3 + \cdots + (2n-1) \cdot 2^n$$

Memo / Answer

解答 (例題)

例題 1 解答

部分分数分解を行うと

$$\frac{1}{k(k+2)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+2} \right)$$

これを書き並べると $S = \frac{1}{2} \left\{ \left(1 - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}\right) + \dots \right.$

$\left. \dots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1}\right) + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2}\right) \right\}$

差が 2 なので「1 つ飛ばし」で消え合い、残るのは最初の 2 つと最後の 2 つである。

$$S = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right)$$

※通分して整理すると $\frac{n(3n+5)}{4(n+1)(n+2)}$ となる。

例題 2 解答

$\sum_{k=1}^n (\sqrt{k+1} - \sqrt{k})$ と変形できる。

$$\begin{aligned} S &= (\sqrt{2} - 1) + (\sqrt{3} - \sqrt{2}) + \dots + (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \\ &= -1 + \sqrt{n+1} \end{aligned}$$

例題 3 解答

$S - 2S$ を計算すると：

$$-S = 2 + (2^2 + 2^3 + \dots + 2^n) - n \cdot 2^{n+1}$$

カッコ内は初項 4、公比 2、項数 $n-1$ の等比数列の和だが、最初の 2 を含めて「初項 2、公比 2、項数 n 」と見たほうが早い。

$$\begin{aligned} -S &= \frac{2(2^n - 1)}{2 - 1} - n \cdot 2^{n+1} \\ &= 2^{n+1} - 2 - n \cdot 2^{n+1} = (1 - n)2^{n+1} - 2 \end{aligned}$$

よって $S = (n-1)2^{n+1} + 2$ 。

解答 (A: 基本)

練習 A1 解答

$$\sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \dots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1}.$$

練習 A2 解答

$$\begin{aligned} S &= 1 \cdot 1 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 3^2 + \dots + n \cdot 3^{n-1} \\ 3S &= \quad 1 \cdot 3 + 2 \cdot 3^2 + \dots + (n-1)3^{n-1} + n \cdot 3^n \end{aligned}$$

引くと：

$$-2S = 1 + 3 + 3^2 + \dots + 3^{n-1} - n \cdot 3^n$$

等比数列の部分は $\frac{1(3^n-1)}{3-1} = \frac{3^n-1}{2}$ 。

$$-2S = \frac{3^n - 1}{2} - n \cdot 3^n = \frac{3^n - 1 - 2n \cdot 3^n}{2} = \frac{(1 - 2n)3^n - 1}{2}$$

よって $S = \frac{(2n-1)3^n + 1}{4}$ 。

解答 (B: 標準)

練習 B1 解答

$\sum \frac{1}{2} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+2} \right) = \frac{1}{2} \left\{ \left(1 - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}\right) + \dots \dots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1}\right) + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2}\right) \right\}$ 。
残るのは $1, \frac{1}{2}$ と $-\frac{1}{n+1}, -\frac{1}{n+2}$ 。

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \left(\frac{3}{2} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{3(n+1)(n+2) - 2(n+2) - 2(n+1)}{2(n+1)(n+2)} = \frac{n(3n+5)}{4(n+1)(n+2)}. \end{aligned}$$

(展開前の式でも正解となることが多い)

練習 B2 解答

公比 $r = 2$ を掛けて引く。

$$\begin{aligned} S &= 1 \cdot 2 + 3 \cdot 2^2 + \dots + (2n-1)2^n \\ 2S &= \quad 1 \cdot 2^2 + \dots + (2n-3)2^n + (2n-1)2^{n+1} \end{aligned}$$

引くと（係数の差が 2 になることに注意）：

$$-S = 2 + (2 \cdot 2^2 + 2 \cdot 2^3 + \dots + 2 \cdot 2^n) - (2n-1)2^{n+1}$$

カッコ内は $2(2^2 + \dots + 2^n) = 2 \cdot \frac{4(2^{n-1}-1)}{2-1} = 8(2^{n-1} - 1) = 2^{n+2} - 8$ 。

$$-S = 2 + (2^{n+2} - 8) - (2n-1)2^{n+1}$$

$$-S = 2 \cdot 2^{n+1} - 6 - (2n-1)2^{n+1} = (3-2n)2^{n+1} - 6$$

よって $S = (2n-3)2^{n+1} + 6$ 。