

1. 準備①：塊（カタマリ）の微分・積分

通常、数学 II では $(x - 1)^2$ などを積分する場合、一度展開してから計算する。しかし、以下の性質を知っていると計算が劇的に楽になる。

法則の発見

次の関数を展開してから微分し、結果を因数分解せよ。

(1) $y = (x - 1)^2 \rightarrow y' = 2(x - 1)$

(2) $y = (x - 2)^3 \rightarrow y' = 3(x - 2)^2$

【結論】 展開しなくても、肩の数字が降りてくる！

$\{(x - \alpha)^n\}' = n(x - \alpha)^{n-1}$

塊（カタマリ）の積分公式

微分と逆の操作をすることで、以下の積分公式が成り立つ。（証明はみなさんにお任せします。）

$\int (x - \alpha)^n dx = \frac{1}{n + 1}(x - \alpha)^{n+1} + C$

例題

(1) $\int (x - 2)^2 dx$

(2) $\int_1^3 (x - 1)^2 dx$

Memo / Answer

2. 準備②：因数定理と交点

因数定理の確認


方程式 $f(x) = 0$ が解 $x = \alpha$ をもつ $\iff f(x)$ は $(x - \alpha)$ を因数にもつ

「差の関数」の正体

放物線 $y = f(x)$ と直線 $y = g(x)$ が、2 点 $x = \alpha, \beta$ で交わっているとする。このとき、2 つの関数の差 $f(x) - g(x)$ はどのような形になるだろうか？

- 交点では「高さが同じ」なので、
 $f(\alpha) - g(\alpha) = 0, \quad f(\beta) - g(\beta) = 0$
つまり、差の関数 $f(x) - g(x)$ は $x = \alpha, \beta$ を解にもつ。
- すなわち
 $f(x) - g(x)$ は $(x - \alpha)$ と $(x - \beta)$ を因数にもつ。
- 結論 $f(x)$ の x^2 の係数を a とすると
 $f(x) - g(x) = a(x - \alpha)(x - \beta)$

- と因数分解できる！
- 図形的な意味は以下の通りである。



3. 魔法の公式「 $\frac{1}{6}$ 公式」

積分の特別公式

放物線と直線で囲まれた部分の面積を、「交点の座標」だけで一発で求める公式がある。

定理：1/6 公式

$\alpha < \beta$ とするとき、以下の定積分計算が成り立つ。


$$\int_{\alpha}^{\beta} (x - \alpha)(x - \beta) dx = -\frac{1}{6}(\beta - \alpha)^3$$

特に、放物線 $y = ax^2 + bx + c$ と直線が 2 点 $x = \alpha, \beta$ で交わるとき、これらで囲まれた部分の面積 S は、

$$S = \frac{|a|}{6}(\beta - \alpha)^3$$

で求められる。

ラフの様子は以下の通りである。



例題 1：威力を体感せよ

放物線 $y = x^2 - 3$ と直線 $y = 2x$ で囲まれた部分の面積 S を求めよ。

解答

- (1) 交点を求める： $x^2 - 3 = 2x \iff x^2 - 2x - 3 = 0$
 $(x + 1)(x - 3) = 0$ より交点は $x = -1, 3$.
- (2) 公式を使う： $\alpha = -1, \beta = 3$, 放物線の係数 $a = 1$ なので、

$$\begin{aligned} S &= \frac{|1|}{6} \{3 - (-1)\}^3 \\ &= \frac{1}{6} \cdot 4^3 = \frac{64}{6} = \frac{32}{3} \end{aligned}$$

普通に $\int_{-1}^3 \{2x - (x^2 - 3)\} dx$ を計算するより圧倒的に速い！

4. なぜ使えるのか？（証明）

この公式の証明には、鮮やかな式変形のテクニックが使われている。丸暗記ではなく、この「導出の流れ（エッセンス）」を理解しよう。

Step 1：因数分解

放物線 $y = ax^2 + bx + c$ と直線 $y = mx + n$ の交点が α, β であるとき、差の式は必ず因数分解できる。

$$(\text{直線}) - (\text{放物線}) = -a(x - \alpha)(x - \beta)$$

よって、面積 S は次の定積分で表される ($a > 0$ とする)。

$$S = \int_{\alpha}^{\beta} -a(x - \alpha)(x - \beta) dx$$

係数 $-a$ を外に出すと、目標の形が見えてくる。

$$S = -a \int_{\alpha}^{\beta} (x - \alpha)(x - \beta) dx$$

Step 2：式変形の工夫（最重要！）

普通に展開して $\int (x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta) dx$ を計算するのは大変である。そこで、次のような「無理やり $x - \alpha$ を作る」変形を行う。

$$x - \beta = (x - \alpha) - (\beta - \alpha)$$

これを用いて、被積分関数を変形する。

$$\begin{aligned} (x - \alpha)(x - \beta) &= (x - \alpha)\{(x - \alpha) - (\beta - \alpha)\} \\ &= (x - \alpha)^2 - (\beta - \alpha)(x - \alpha) \end{aligned}$$

Point： 定数 $(\beta - \alpha)$ を塊として扱う！

Step 3：積分計算

変形した式を積分する． $\int (x-\alpha)^n dx = \frac{1}{n+1}(x-\alpha)^{n+1}$ を利用すると楽．

$$\begin{aligned}
 I &= \int_{\alpha}^{\beta} \{(x-\alpha)^2 - (\beta-\alpha)(x-\alpha)\} dx \\
 &= \left[\frac{(x-\alpha)^3}{3} - (\beta-\alpha)\frac{(x-\alpha)^2}{2} \right]_{\alpha}^{\beta}
 \end{aligned}$$

- 代入（上端 β ）：

$$\frac{(\beta-\alpha)^3}{3} - (\beta-\alpha)\frac{(\beta-\alpha)^2}{2} = \frac{1}{3}(\beta-\alpha)^3 - \frac{1}{2}(\beta-\alpha)^3$$

- 代入（下端 α ）： $(\alpha-\alpha) = 0$ なので，すべて 0 になる！（これが狙い）

Step 4：結論

係数をまとめて計算する．

$$\frac{1}{3} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{6}$$

より，定積分部分の値は

$$I = -\frac{1}{6}(\beta-\alpha)^3$$

となる．

最後に，最初に外に出しておいた $-a$ を掛ければ，面積公式の完成である．

$$S = -a \times \left\{ -\frac{1}{6}(\beta-\alpha)^3 \right\} = \frac{a}{6}(\beta-\alpha)^3$$

まとめ

この証明の流れ（特に $x-\alpha$ の塊を作る変形）は，2 つの放物線や，接線と囲む面積（ $\frac{1}{12}$ 公式や $\frac{1}{3}$ 公式）の証明でも全く同じように使える．「結果」だけでなく「過程」を知っておくと，応用が利くようになる．

次回予告：この最強の武器を使って，入試頻出の面積問題を次々と攻略する（計算演習回）．

Proof