

TP1 : Caractérisation du bruit de mesure du radiotélescope Rameau

TP Traitement du Signal

Présenté par :
Elise Peris
Louis Blanchard
Sulwen de la Croix

Encadrant Cours Magistral

M. Pascal Bordé
Laboratoire de Physique des 2 infinis (LP2i)
Bordeaux
Professeur d'Astrophysique

Encadrant Travaux Pratiques

Pierre Gratier
Laboratoire d'Astrophysique de Bordeaux (LAB)
Astronome Adjoint

1 Exercice 1 : Signaux délivrés par un radio télescope

On ouvre le fichier *rameau1.txt*, on peut constater qu'il y a un nombre $N_{mesures} = 20000$ mesures, avec un pas de temps de mesure $\tau = 200$ ms. Les tensions mesurées sont comprises entre 1.4 V et 2.5 V. Le fichier *rameau2.txt* contient lui aussi un nombre $N_{mesures} = 20000$ mesures, avec un pas de temps de mesure identique de $\tau = 200$ ms. Cependant les tensions minimales mesurées sont plus faibles, autour de 0.1 V tandis que les tensions maximales mesurées sont autour de 2.3 V. Il y a seulement deux colonnes dans chacun des fichiers, sans en-tête. Cela est confirmé par la commande *shape* qui donne un tableau à 2 colonnes et 20 000 lignes. On affiche la tension mesurée par Rameau 1 et Rameau 2 en fonction du temps en secondes, puis en minutes en divisant le temps par 60, en figure 1




FIGURE 1 – Évolution de la tension en fonction du temps pour les deux rameaux.

On procède ensuite au tri des mesures en utilisant la méthode *numpy.sort* et on trace les mesures triées en fonction du numéro de la mesure en figure 2




FIGURE 2 – Tensions triées pour Rameau 1 et Rameau 2

Les mesures sont discrètes, en effet, elles sont quantifiées par le système de détection qui est limité par sa mémoire. Si on utilise la fonction `numpy.unique` pour déterminer le nombre de valeurs uniques de tension et on obtient 187 ce qui laisserait penser que le système est codé sur 256 bits. En zoomant sur le graphique, on voit une discontinuité entre chaque valeur de tension, et si une valeur apparaît plusieurs fois, elle s'ajoute à la suite de la valeur précédente (Voir figure 3)




FIGURE 3 – Zoom sur les tensions triées pour Rameau 1 et Rameau 2

L'histogramme des mesures est représenté en figure . La difficulté consiste à choisir le bon nombre de bins. Si on choisit un nombre de bins trop faible, on aura bien tous les points, mais la résolution en tension sera très faible. Si on prend un très grand nombre de bins, il y aura des intervalles vides entre certaines valeurs de tension et cela crée une grande incertitude sur la

fréquence des valeurs de tension, de plus, le bruit aura plus d'impact sur la tendance globale. On choisit de prendre 25 bins.




FIGURE 4 – Histogramme des valeurs de tensions pour Rameau 1 et Rameau 2 (25 bins)

La tendance de l'histogramme de Rameau 1 ressemble à une loi normale, on choisit donc d'utiliser la moyenne pour déterminer la valeur et l'écart-type pour déterminer l'incertitude sur la valeur de tension. On obtient $\mu_1 = 1.75 \text{ V}$ et $\sigma_1 = 0.26 \text{ V}$, donc la valeur de la tension obtenue par Rameau 1 est $U_1 = 1.75 \pm 0.26 \text{ V}$. La mesure de Rameau 2 ne ressemble pas à une loi normale ce qui complique l'obtention de sa valeur. Les fonctions python de numpy nous permette d'obtenir le mode, la moyenne et la médiane. Cependant le mode dépend du nombre de bins et n'est donc pas fiable, la pertinence de la moyenne est discutable sur ce type de courbe. Nous choisissons donc d'utiliser la médiane : $\mu_2 = 0.82 \text{ V}$. Pour l'incertitude, nous utilisons l'écart-type même si ce n'est pas vraiment approprié pour ce type de courbe : $\sigma_2 = 0.52 \text{ V}$. Ce qui nous donne une valeur de tension pour Rameau 2 de $U_2 = 0.8 \pm 0.52 \text{ V}$.

Nous obtenons une meilleure précision avec Rameau 1 et une courbe gaussienne, ce qui justifie l'utilisation de la détection synchrone.

2 Exercice 2

On souhaite déterminer expérimentalement la densité de probabilité de la distribution directe de l'erreur ϵ associée à une unique mesure, notée $f_1(\epsilon|I)$ pour le mode 1 et $f_2(\epsilon|I)$ pour le mode 2. Par définition, la probabilité d'obtenir un événement dans l'intervalle $[a,b]$ est $P(a,b) = \int_a^b p(x)dx$, où $p(x)$ est la densité de probabilité. Or une probabilité est adimensionnelle et normalisée. Donc, qualitativement :

$$\begin{aligned} [p(x)][x] &= 1 \\ [p(x)] &= \frac{1}{[x]} \end{aligned}$$

Dans notre cas, l'abscisse est la tension, donc la densité de probabilité a pour dimension le V^{-1} . Et donc la densité de probabilité correspond à la probabilité d'avoir une valeur de tension divisée par la largeur de la barre de l'histogramme :

$$p(U) = \frac{P(U)}{\Delta x}$$

. La densité de probabilité cherchée peut donc être dérivée de l'histogramme des mesures en connaissant la largeur en tension de chaque bin. Pour que la densité de probabilité soit normalisée, il faut que l'intégrale sur toutes les valeurs possibles fasse 1 :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} p(x)dx = 1$$

Cela signifie que l'aire sous la courbe doit valoir 1. La largeur de chaque rectangle vaut l et sa hauteur vaut h_i . On doit donc avoir $\sum(h_i \times l) = 1$. Si on considère que la densité de probabilité est le comptage dans chacun des intervalles de l'histogramme, divisé par le nombre total des mesures que multiplie la largeur l des intervalles, alors : $h_i = \frac{c_i}{n \times l}$ On peut vérifier si cette expression vérifie la condition de normalisation :

$$\sum(h_i \times l) = \sum\left(\frac{c_i}{n \times l} \times l\right) = \sum P_i = 1$$

Ainsi cette expression de la densité de probabilité $p(U)$ vérifie la condition de normalisation. On trace la densité de probabilité d'obtenir chaque valeur de tension pour Rameau 1 en figure 5

Histogramme des densité de probabilité d'obtenir une valeur de tension sur Rameau 1




FIGURE 5 – Densité de probabilité d’obtenir une valeur de tension pour Rameau 1

On constate que cette densité de probabilité peut être supérieure à 1, ça ne pose pas de problème car elle est normalisée par la largeur de chaque barre d’histogramme qui peut être inférieure à 1.

3 Exercice 3 : Espérance et variance expérimentale

On calcule l’espérance expérimentale m pour chacun des modes en utilisant la méthode `numpy.mean` on obtient $m_1 = 1.75$ V et $m_2 = 0.91$ V. Afin de vérifier que cette méthode ne fait que calculer la moyenne arithmétique, on calcule la somme des valeurs de la tension sur le nombre de valeurs. On obtient exactement les mêmes valeurs pour m_1 et m_2 . La moyenne arithmétique utilise les valeurs des mesures obtenues sans effectuer aucune correction, le calcul ne pondère aucune des mesures et calcule une moyenne basique. Cela correspond donc à une moyenne utilisant les données expérimentales sans aucun ajustement statistique, donc à l’espérance expérimentale. On utilise la méthode `numpy.std` afin de calculer l’écart-type expérimental. On obtient $\sigma_1 = 0.26$ V et $\sigma_2 = 0.52$ V. La variance expérimentale est donnée par $s = \sigma * 2$, donc $s_1 = 0.07$ V² et $s_2 = 0.27$ V².

On vérifie que la méthode `numpy.std` calcule bien l’écart-type selon la formule $s = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - m)^2}$. On obtient bien les mêmes valeurs que la fonction `numpy.std`.


4 Exercice 4

On superpose à l’histogramme des mesures de Rameau 1 et Rameau 2 une distribution gaussienne selon l’équation :


$$P(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\bar{x}}} e^{-\frac{(x-\bar{x})^2}{2\sigma_x^2}}$$

On détermine l’asymétrie des deux distributions avec la fonction `scipy.skew` et on obtient -0.03 pour Rameau 1 et 0.78 pour Rameau 2. De même, on détermine l’aplatissement des courbes selon les deux modes, on obtient 0.17 pour Rameau 1 et 0.36 pour Rameau 2. On peut donc

considérer que le mode Rameau 1 suit une loi gaussienne et donc que l'on peut modéliser la distribution directe de l'erreur de mesure par une loi normale. Le mode Rameau 2 est cependant trop asymétrique et trop aplati pour utiliser cette distribution.




(a) Fit gaussien des mesures de Rameau 1 (densité de probabilité)




(b) Fit gaussien des mesures de Rameau 2 (densité de probabilité)

5 Exercice 5

On détermine la médiane des deux jeux de données, on obtient 1.75 V pour Rameau 1 et 0.82 V pour Rameau 2. On peut comparer ces valeurs aux moyennes calculées en Exercice 1 et on constate que la moyenne et la médiane sont égales pour Rameau 1 tandis qu'elles ont un écart de 0.09 V pour Rameau 2. On peut donc en conclure que la densité de probabilité s'écarte d'une forme de gaussienne lorsque la médiane et la moyenne diffèrent. On calcule les 1ers et 3èmes quartiles pour chacune des distributions, pour Rameau 1, $Q_1 = 1.58$ V et $Q_3 = 1.92$ V, et pour Rameau 2, $Q_1 = 0.52$ V et $Q_3 = 1.23$ V. Le deuxième quartile est égal à la médiane. On représente ensuite la densité de probabilité cumulative pour les deux modes en figures 7a et 7b.



(a) Densités de probabilités cumulatives des mesures de Rameau 1



(b) Densités de probabilités cumulatives des mesures de Rameau 2

6 Exercice 6

On effectue une unique mesure sur une nouvelle radiosource et on obtient $U_{mesure} = 3.14$ V. Le mode 1 est caractérisé par une loi normale, on peut donc utiliser l'écart-type pour représenter l'incertitude de 0.26 V. Le rapport signal sur bruit est alors défini par : $\frac{S}{B} = \frac{\mu_1}{\sigma_1} = \frac{3.14}{0.26} = 12.23 \approx 10$ pour le mode Rameau 1, et $\frac{S}{B} = \frac{3.14}{\sigma_{68}} = \frac{3.14}{1.09} = 2.88 \approx 3$

On détermine ensuite pour Rameau 2 une incertitude qui enclose 68% de probabilité. Pour cela on regarde les valeurs en tension correspondant au 16e et 84e percentiles. $Q_{16} = 0.39$ V et $Q_{84} = 1.45$ V. On peut ensuite comparer ces valeurs à la médiane pour obtenir l'erreur inférieure et supérieure et on obtient finalement : $U_2 = 3.14^{+0.63}_{-0.43}$ V

On peut ensuite effectuer la même démarche pour les intervalles à 90%, 95% et 99% :

A 90% : $U_1 = 3.14 \pm 0.43$ V et $U_2 = 3.14^{+1.09}_{-0.61}$ V

A 95% : $U_1 = 3.14 \pm 0.51$ V et $U_2 = 3.14^{+1.30}_{-0.66}$ V

A 99% : $U_1 = 3.14^{+0.67}_{-0.68}$ V et $U_2 = 3.14^{+1.71}_{-0.75}$ V

7 Exercice 7

Pour conclure, si je ne pouvais effectuer qu'une seule mesure sur une radiosource inconnue, j'utiliserais le mode Rameau 1 de détection synchrone car ce mode me permet d'avoir une incertitude inférieure à l'incertitude issue du mode Rameau 2. De plus, le rapport signal sur bruit est trois fois supérieur sur le mode Rameau 1 par rapport au mode Rameau 2.

8 TP 2 : Corrélation, autocorrélation et somme de variables

8.1 Exercice 2.1 Corrélation : radiotélescope Rameau

On représente le nuage de corrélation entre les tensions mesurées par les deux modes en figure

8





FIGURE 8 – Nuage de corrélation des tensions des deux modes Rameau

le nuage n'est pas incliné, ce qui indique que les grandeurs ne sont pas corrélées. On calcule maintenant le coefficient de corrélation expérimental de v_1 et v_2 et on obtient $c_{12} = -0.02$. C'est cohérent avec la forme du nuage de point qui n'est pas inclinée.


8.2 Exercice 2.2 : Corrélation : Image de Saturne

On importe l'image de Saturne dans python, ses dimensions sont de (480, 617, 4). On affiche ensuite séparément les composantes R,V et B en figure ??



(a) Intensité pour la composante rouge


(b) Intensité pour la composante verte



(c) Intensité pour la composante bleue


On représente ensuite les histogrammes des densité de probabilité pour les différentes composantes de couleurs en figure ??.

Histogramme des densité de probabilité d'obtenir une valeur de rouge




(a) Densité de probabilité pour la composante rouge

Histogramme des densité de probabilité d'obtenir une valeur de verte



(b) Densité de probabilité pour la composante verte

Histogramme des densité de probabilité d'obtenir une valeur de bleue



(c) Densité de probabilité pour la composante rouge

On peut voir que les trois couleurs possèdent un pic à 0, ce qui est cohérent avec l'image qui affiche beaucoup de noir pour le fond derrière Saturne. Il y a peu de bleu et plus de rouge ce qui est attendu car Saturne est légèrement rougeâtre.

On trace le nuage de corrélation entre les composantes rouges et bleues en figure [11](#)




FIGURE 11 – Nuage de corrélation entre la composante rouge et la composante bleue