$y = m_1x_1 + m_2x_2 + b$

$\hat{y} = mx + b$, $m = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$, $m_1 = -1$, $m_2 = 2$, $b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $X = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 10 \end{bmatrix}$, $x_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix}$, $x_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 10 \end{bmatrix}$,

$y = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix}$

x	y	$\hat{y}$	$\hat{y} - y$
$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 10 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 6 \\ 17 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 \\ 11 \end{bmatrix}$

Getting $\hat{y}$ (yhat)

$\hat{y} = mx + b$

$\hat{y} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 10 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

$\hat{y} = \begin{bmatrix} (-1 \times 1) + (2 \times 3) \\ (-1 \times 4) + (2 \times 10) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

$\hat{y} = \begin{bmatrix} 5 \\ 16 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

$\hat{y} = \begin{bmatrix} 6 \\ 17 \end{bmatrix}$

$\hat{y} - y = \begin{bmatrix} 6 \\ 17 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 11 \end{bmatrix}$

$\hat{y} - y = \begin{bmatrix} 1 \\ 11 \end{bmatrix}$

Calculating the ~~loss~~ MSE

$MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (\hat{y} - y)^2$, $n = 2$

$MSE = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 11 \end{bmatrix}^2 \rightarrow \frac{1}{2} \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 11 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 11 \end{bmatrix} \right)$

$MSE = \frac{1}{2} \left[(1 \times 1) + (11 \times 11) \right]$

$MSE = \frac{1}{2} \times 122$

$MSE = 61$

Calculating the loss function)

Let MSE be J

$\frac{dJ}{dm_1} = ?, \frac{dJ}{dm_2} = ?, \frac{dJ}{db} = ?$

From

$$J = \frac{1}{n}\sum^{n}_{i=1} (\hat{y} - y)^2$$

But

$$\hat{y} = m_1x_1 + m_2x_2 + b$$

So

$$J = \frac{1}{n}\sum^{n}_{i=1} ((m_1x_1 + m_2x_2 + b) - y)^2$$

let

$m_1x_1 + m_2x + b - y$ be e

$$J = \frac{1}{n}\sum^{n}_{i=1} e^2$$

Applying chain rule

$$\frac{dJ}{dm_1} = \frac{dJ}{de} \cdot \frac{de}{dm_1}$$

$$\frac{dJ}{de} = \frac{2}{n}\sum^{n}_{i=1} e$$

$e = m_1x_1 + m_2x_2 + b - y$

$\frac{de}{dm_1} f x_1 + \phi + b 1$

m_2, x_2, b, y behave as constants and go upon differentiation (become 0)

$\frac{de}{dm_1} = x_1 + 0 + 0 - 0$

$$\frac{de}{dm_1} = x_1$$

$$\frac{dJ}{dm_1} = \frac{2}{n}\sum^{n}_{i=1} e \cdot x_1$$

Since $e = (m_1x_1 + m_2x_2 + b - y)$

$\hat{y}$, y

$$\frac{dJ}{dm_1} = \frac{2}{n}\sum^{n}_{i=1} (\hat{y} - y)x_1 \quad \text{---(1)}$$

$\frac{dJ}{dm_2} = ?$

$$\boxed{\frac{dJ}{dm_2} = \frac{dJ}{de} \cdot \frac{de}{dm_2}} \rightarrow \text{Applying chain rule}$$

$$J = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} (\hat{y} - y)^2$$

But $\hat{y} = m_1 x_1 + m_2 x_2 \overset{+b}{\cancel{y}}$

let $e = \hat{y} - y$

$$e = m_1 x_1 + m_2 x_2 \overset{+b}{-} y$$

$$J = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} e^2$$

$$\boxed{\frac{dJ}{de} = \frac{2}{n}\sum_{i=1}^{n} e}$$

$$e = m_1 x_1 + m_2 x_2 \overset{+b}{-} y$$

$$\frac{de}{dm_2} = 0 + x_2 + 0 - 0$$

m_1, x_1, b, y are constants and become 0 upon differentiation

$$\boxed{\frac{de}{dm_2} = x_2}$$

$$\frac{dJ}{dm_2} = \frac{2}{n}\sum_{i=1}^{n} e \cdot x_2$$

$$\frac{dJ}{dm_2} = \frac{2}{n}\sum_{i=1}^{n} (\underbrace{m_1 x_1 + m_2 x_2 \overset{+b}{-} y}_{\hat{y}}) x_2$$

$$\boxed{\frac{dJ}{dm_2} = \frac{2}{n}\sum_{i=1}^{n} (\hat{y} - y) x_2} \quad \text{——— (11)}$$

$\frac{dJ}{db} = ?$

$J = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} e^2$, where

$e = m_1x_1 + m_2x_2 + b - y$

$e = \hat{y} - y$

$\frac{dJ}{db} = \frac{dJ}{de} \cdot \frac{de}{db}$ → Applying chain rule

$\frac{dJ}{de} = \frac{2}{n}\sum_{i=1}^{n} e$

$\frac{de}{db} = 0 + 0 + 1 - 0$

$\frac{de}{db} = 1$

$\frac{dJ}{db} = \frac{2}{n}\sum_{i=1}^{n} e \cdot 1$

where $e = \{m_1x_1 + m_2x_2 + b\} - y$, with $\{m_1x_1 + m_2x_2 + b\} = \hat{y}$

$\frac{dJ}{db} = \frac{2}{n}\sum_{i=1}^{n} (\hat{y} - y)$ — (iii)

Therefore

$\frac{dJ}{dm_1} = \frac{2}{n}\sum_{i=1}^{n} (\hat{y} - y)x_1$, $\frac{dJ}{dm_2} = \frac{2}{n}\sum_{i=1}^{n} (\hat{y} - y)x_2$, $\frac{dJ}{db} = \frac{2}{n}\sum_{i=1}^{n} (\hat{y} - y)$

$m = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$ $m_1 = -1, m_2 = 2$

$\hat{y} - y = \begin{bmatrix} 1 \\ 11 \end{bmatrix}$,

$x_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix}$, $x_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 10 \end{bmatrix}$

$n = 2$

$$m_1 new = m_1 old - \alpha \frac{dJ}{dm_1}$$

$$m_1 new = m_1 old - \alpha \left[\frac{+2}{n} \sum_{i=1}^{n} (\hat{y} - y) x_1 \right]$$

$$m_1 new = -1 - \alpha \left[\frac{+2}{2} \cancel{\sum_{i=1}^{n}} \begin{bmatrix} 1 \\ 11 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix} \right]$$

$$m_1 new = -1 - \alpha \left[+1 \; (1 \times 1) + (11 \times 4) \right]$$

$$m_1 new = -1 - \alpha \left[+45 \right]$$

$$\boxed{m_1 new = -1 - 45\alpha} \quad \text{—— (i)}$$

$$m_2 new = m_2 old - \alpha \left[\frac{2}{n} \sum_{i=1}^{n} (\hat{y} - y) x_2 \right]$$

$$m_2 new = 2 - \alpha \left[\frac{2}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 11 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 10 \end{bmatrix} \right]$$

$$m_2 new = 2 - \alpha \left[(1 \times 3) + (11 \times 10) \right]$$

$$m_2 new = 2 - \alpha \left[113 \right]$$

$$\boxed{m_2 new = 2 - 113\alpha} \quad \text{—— (ii)}$$

$$b_{new} = b_{old} - \alpha \frac{dJ}{db} \qquad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$b_{new} = b_{old} - \alpha \left[\frac{2}{n} \sum_{i=1}^{\hat{}} (\hat{y} - y) \right]$$

$$b_{new} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \alpha \left[\frac{2}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 11 \end{bmatrix} \right]$$

$$b_{new} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \alpha \begin{bmatrix} 1 \\ 11 \end{bmatrix} \quad \text{---} \ (iii)$$

$m_1 new = -1.45\alpha$, $m_2 new = 2 - 113\alpha$, ~~b new with 2 dd~~
$b_{new} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \alpha \begin{bmatrix} 1 \\ 11 \end{bmatrix}$

Let $\alpha = 0.01$

$m_1 new = -1.45\alpha$

$m_1 new = -1.45(0.01)$

$m_1 new = -1.45$

$m_2 new = 2 - 113\alpha$

$m_2 new = 2 - 113(0.01)$

$m_2 new = 0.87$

$$b_{new} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \alpha \begin{bmatrix} 1 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$$b_{new} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} - 0.01 \begin{bmatrix} 1 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$$b_{new} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0.01 \\ 0.11 \end{bmatrix}$$

$$b_{new} = \begin{bmatrix} 0.99 \\ 0.89 \end{bmatrix}$$

MSE when $m_1 new = -1.45$, $m_2 new = 0.87$, $b new = \begin{bmatrix} 0.99 \\ 0.89 \end{bmatrix}$

$\hat{y} = mx + b$ $\quad m = \begin{bmatrix} -1.45 \\ 0.87 \end{bmatrix}$

$$\hat{y} = \begin{bmatrix} -1.45 \\ 0.87 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 10 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.99 \\ 0.89 \end{bmatrix}$$

$$\hat{y} = \begin{bmatrix} (-1.45 \times 1) + (0.87 \times 3) \\ (-1.45 \times 4) + (0.87 \times 10) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.99 \\ 0.89 \end{bmatrix}$$

$$\hat{y} = \begin{bmatrix} 1.16 \\ 2.90 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.99 \\ 0.89 \end{bmatrix}$$

$$\hat{y} = \begin{bmatrix} 2.15 \\ 3.79 \end{bmatrix}$$

$$\hat{y} - y = \begin{bmatrix} 2.15 \\ 3.79 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2.85 \\ -2.21 \end{bmatrix}$$

$MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (\hat{y} - y)^2 \qquad n = 2$

$$MSE = \frac{1}{2} \left[\begin{bmatrix} -2.85 \\ -2.21 \end{bmatrix}^2 \right]$$

$$MSE = \frac{1}{2} \left((-2.85)^2 + (-2.21)^2 \right)$$

$$MSE = \frac{1}{2} \times 13.01$$

$$MSE = 6.51$$

∴ Therefore

$m_1 new = -1.45$

$m_2 new = 0.87$

$b new = \begin{bmatrix} 0.99 \\ 0.89 \end{bmatrix}$

$MSE update = 6.51$