


# 第三章 运输问题

*Transportation problem*



### 3.1 运输问题的典例和数学模型

#### 一、典例：


某食品公司经营糖果业务，公司下设三个工厂A1、A2、A3，四个销售门市部B1、B2、B3、B4。已知每天各自的生产量、销售量及调运时的单位运输费用情况。问：如何调运可使总费用最小？

生产量：A1——7吨， A2 —— 4吨， A3 —— 9吨

销售量：B1 —— 3吨， B2 —— 6吨， B3 —— 5吨， B4 —— 6吨

产地 \ 销地 单位运价	销地			
	B1	B2	B3	B4
A1	3	11	3	10
A2	1	9	2	8
A3	7	4	10	5

## 调运示意图



## 二、建立模型

设  $x_{ij}$ ——第*i*产地到第*j*销地之间的调运量，则有

$$\text{Min } z = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^4 c_{ij} \cdot x_{ij}$$

$$\begin{array}{l} \text{产量限制} \left\{ \begin{array}{l} x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} = 7 \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} = 4 \\ x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} = 9 \end{array} \right. \quad \text{销量限制} \left\{ \begin{array}{l} x_{11} + x_{21} + x_{31} = 3 \\ x_{12} + x_{22} + x_{32} = 6 \\ x_{13} + x_{23} + x_{33} = 5 \\ x_{14} + x_{24} + x_{34} = 6 \end{array} \right. \\ x_{ij} \geq 0, (i=1, 2, \dots, 3; j=1, 2, \dots, 4) \end{array}$$

## 一般模型表示:

设有个 $m$ 产地、 $n$ 个销地，其中第 $i$ 个产地的产量为 $a_i$ ，第 $j$ 个销地的销量为 $b_j$ ，且  $\sum a_i = \sum b_j$ 。若第 $i$ 个产地到第 $j$ 个销地每调运单位物资的运费为 $c_{ij}$ ，则使总费用最少的调运模型为：

$$\text{Min } z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} \cdot x_{ij}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i \quad (i = 1, 2, \dots, m) \\ \sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j \quad (j = 1, 2, \dots, n) \\ x_{ij} \geq 0 \quad (i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n) \end{array} \right.$$

### 三、模型的特点

1. 变量数:  $m \times n$  个

2. 约束方程数:  $m+n$  个

最大独立方程数:  $m+n-1$  기저 변수

3. 系数列向量结构:

$$P_{ij} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

第  $i$  个分量

第  $m+j$  个分量

$$\begin{array}{c}
 X_{11} \quad X_{12} \quad \cdots \quad X_{1n} \quad X_{21} \quad X_{22} \quad \cdots \quad X_{2n}, \cdots, X_{m1} \quad X_{m2} \quad \cdots \quad X_{mn} \\
 \begin{array}{l}
 i=1 \\
 i=2 \\
 \vdots \\
 i=m
 \end{array}
 \left( \begin{array}{cccccccccccccccc}
 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\
 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\
 \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 1 & 1 & \cdots & 1
 \end{array} \right. \\
 \hline
 \begin{array}{l}
 j=1 \\
 j=2 \\
 \vdots \\
 j=n
 \end{array}
 \left( \begin{array}{cccccccccccccccc}
 1 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 1 & 0 & \cdots & 0 \\
 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 1 & \cdots & 0 \\
 \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 1
 \end{array} \right)
 \end{array}$$

## 复习思考题

1. 运输模型按数学特点属于哪类模型？
2. 什么是产销平衡运输问题？ $\text{总产量} = \text{总销量}$
3. 产销平衡运输模型有哪些特点？
4. 产销平衡运输模型是否一定有最优解？一定。
5. 为什么产销平衡运输模型会有一个模型不独立？



## 3.2 运输问题的表上作业算法

表上作业法步骤： 初始方案→最优性检验→改进方案

### 一、初始方案的确定

1. 最小元素法

2. Vogel法

### 二、最优性检验

1. 闭回路法

2. 位势法

### 三、方案改进方法

在闭回路内改进。

관료 없는 거 = 가저

와서 = 바지

# 产销平衡表

# 单位运价表

产地 \ 销地	B1	B2	B3	B4	产量
A1	(1)	(2)	4	3	7
A2	3	(1)	1	(-1)	4
A3	(10)	6	(12)	3	9
销量	3	6	5	6	

产地 \ 销地	B1	B2	B3	B4
A1	3	11	3	10
A2	1	9	2	8
A3	7	4	10	5

初始方案要求:

6개

제약조건  $n+m=7$

- 1)  $m+n-1$  个数字格;
- 2) 不形成全部以数字格为顶点的闭回路

$$\Delta Z = C_{11} - C_{13} + C_{23} - C_{21} = 1 = \sigma_{11}$$

$$\Delta Z = C_{12} - C_{14} + C_{24} - C_{22} = 2 = \sigma_{12}$$

A2	3	(2)	(1)	1	4
A3	(9)	6	(12)	3	9
销量	3	6	5	6	

# 作业

LI81000503  
尹田炎英

表 3-35

销地 \ 产地	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	B <sub>3</sub>	B <sub>4</sub>	产量
A <sub>1</sub>	10	2	20	11	15
A <sub>2</sub>	12	7	9	20	25
A <sub>3</sub>	2	14	16	18	5
销量	5	15	15	10	

## 产销平衡表

	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	B <sub>3</sub>	B <sub>4</sub>	产量
A <sub>1</sub>	5		5	5	15
A <sub>2</sub>		15	10		25
A <sub>3</sub>				5	5
销量	5	15	15	10	45

105  
150

가장 작은 곳에 0을 주지.

선택 X.

	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	B <sub>3</sub>	B <sub>4</sub>
A <sub>1</sub>		15		
A <sub>2</sub>	0	0	15	10
A <sub>3</sub>	5			

	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	B <sub>3</sub>	B <sub>4</sub>	产量
A <sub>1</sub>	5	105	5	5	15
A <sub>2</sub>	(13)	15	10	(20)	25
A <sub>3</sub>	(-15)	(-11)	(-11)	5	5
销量	5	15	15	10	45

# Vogel法:

产销平衡表

产地 \ 销地	B1	B2	B3	B4	产量
销地					
A1			5	2	7
A2	3			1	4
A3		6		3	9
销量	3	6	5	6	

가장 작은 값 선택

产地 \ 销地	B1	B2	B3	B4	行两最小元素之差			
销地								
A1	3	11	3	10	0	0	0	7
A2	1	9	2	8	1	1	1	6
A3	7	4	10	5	1	2	-	-
列两最小元素之差	2	5	1	3				
	2	-	1	3				
	2	-	1	2				
	-	-	1	2				

C

		1	5	1	2	
		B1	B2	B3	B4	
产地	销地					
⑦0	A1	3	11	3	10	72
61	A2	1	9	2	8	41
2	A3	7	4	10	5	920
	销	30	60	50	80	

3x1+

	1	2	3	4
1			5	2
2	3			1
3		6		3

6	1	2	3	4
0	2	0	0	
0	2	1	0	
9	0	2	0	

110

2表

	3	9	3	10	$u_i$
1					$u_1 = 0$
	1	7	1	8	$u_2 = -2$
	-2	4	-2	5	$u_3 = -5$
$v_i$	$v_1 = 3$	$v_2 = 9$	$v_3 = 3$	$v_4 = 10$	

位势法:

位势表:

销地 产地	B1	B2	B3	B4	行位势
A1	(3)	(9)	3	10	1 $u_1$
A2	1	(7)	(1)	8	-1 $u_2$
A3	(-2)	4	(-2)	5	-4 $u_3$
列位势	2	8	2	9	
	$v_1$	$v_2$	$v_3$	$v_4$	

1. 数字格处上添上对应的运价;

2. 计算行位势和列位势;

令  $u_1=1$ , 则依  $c_{ij}=u_i+v_j$  计算各

$u_i$  和  $v_j$

$C_{ij}$  表  $c_{11}=3$

单位运价表

销地 产地	B1	B2	B3	B4
A1	3	11	3	10
A2	1	9	2	8
A3	7	4	10	5

3. 计算空格处位势;

$$\lambda_{ij}=u_i+v_j$$

4. 计算空格处检验数:

$$\sigma_{ij}=c_{ij}-\lambda_{ij}$$

## 检验数表

<div>产地 \ 销地</div>	B1	B2	B3	B4	产量
A1	(0)	(2)	5	2	7
A2	3	(2)	(1)	1	4
A3	(9)	6	(12)	3	9
销量	3	6	5	6	

## 例：表上作业法求解

<div>销地 产地</div>	B1	B2	B3	B4	产量
A1	3	7	6	4	5
A2	2	4	3	2	2
A3	4	3	8	5	3
销量	3	3	2	2	



特殊情况处理说明：

1. 确定初始方案过程中，填一个数字后行和列上产销量同时满足要求，则在该行或列可分配位置填0后，做直线覆盖该行和列的运价；

销地 产地	B1	B2	B3	B4	产量
A1	3	7	6	4	5
A2	2	4	3	2	2
A3	4	3	8	5	3
销量	3	3	2	2	

销地 产地	B1	B2	B3	B4	产量
A1	1	0	2	2	5
A2	2	(-2)	(-2)	(-1)	2
A3	(5)	3	(6)	(5)	3
销量	3	3	2	2	

特殊情况处理说明：  
2. 方案调整时，若可调整量为0，则做0量调整；

特殊情况处理说明：  
3. 方案调整时，回路中两个以上数字格变为0量，则选择其中任一位置为空格，其余填数字0；

销地 产地	B1	B2	B3	B4	产量
A1	3	7	6	4	5
A2	2	4	3	2	2
A3	4	3	8	5	3
销量	3	3	2	2	

销地 产地	B1	B2	B3	B4	产量
A1	1	0	2	2	5
A2	2	(-2)	(-2)	(-1)	2
A3	(5)	3	(6)	(5)	3
销量	3	3	2	2	

$4 - 7 + 3 - 2 = -2$

销地 产地	B1	B2	B3	B4	产量
A1	3	0	0	2	5
A2	(2)	(0)	2	(1)	2
A3	(5)	3	(6)	(5)	3
销量	3	3	2	2	

## ☆ 表上作业法说明:

1. 初始方案即为基本可行解

1) 有数字格顶点个数

2) 不形成全部以数字格为顶点闭回路

2. 检验数计算:  $\sigma_{ij} = c_{ij} - \underbrace{C_B B^{-1}}_{\text{单位运价表}} p_{ij}$   
 $\underbrace{\hspace{1.5cm}}_{\text{位势}}$

3. 改进方案

1) 基本要求


2) 入基变量  $\min \{ \sigma_{ij} \mid \sigma_{ij} < 0 \}$

3) 出基变量  $\min \{ \theta_{ij} \} = \left\{ \frac{x_{ij}^0}{p_{ij}} \mid p_{ij} > 0 \right\}$

定理：运输问题中，一组变量  $\{x_{ij}\}$  对应的列向量  $\{p_{ij}\}$  线性相关的充要条件是存在以  $\{x_{ij}\}$  为顶点的闭回路。

证：

1) 充分性：存在  $\{x_{ij}\}$  为顶点闭回路  $\Rightarrow \{p_{ij}\}$  线性相关



2) 必要性：  $\{p_{ij}\}$  线性相关  $\Rightarrow$  存在  $\{x_{ij}\}$  为顶点闭回路

## 复习思考题

1. 表上作业法使用的条件是什么？
2. 表上作业法中的调运方案应满足什么条件？
3. Vogel法比最小元素法有什么优点？
4. 表上作业法检验数的经济含义是什么？
5. 为什么说表上作业法的计算原理与单纯形法是一致的？


### 3.3 产销不平衡运输问题及其应用

#### 一、产销不平衡问题

##### 1. 产>销

$$\text{Min } z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} \cdot x_{ij}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{j=1}^n x_{ij} \leq a_i \quad (i=1,2,\dots,m) \\ \sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j \quad (j=1,2,\dots,n) \\ x_{ij} \geq 0 \quad (i=1,\dots,m; j=1,\dots,n) \end{array} \right.$$



$$\text{Min } z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} \cdot x_{ij} + \sum_{i=1}^m 0 \cdot x_{i, n+1}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{j=1}^{n+1} x_{ij} = a_i \quad (i=1,2,\dots,m) \\ \sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j \quad (j=1,2,\dots,n, n+1) \\ x_{ij} \geq 0 \quad (i=1,\dots,m; j=1,\dots,n, n+1) \end{array} \right.$$



## 产>销问题单位运价表


产地 \ 销地	B1	B2	----	Bn	B <sub>n+1</sub>	产量
A1	C <sub>11</sub>	C <sub>12</sub>	----	C <sub>1n</sub>	0	a <sub>1</sub>
A2	C <sub>21</sub>	C <sub>22</sub>	----	C <sub>2n</sub>	0	a <sub>2</sub>
⋮	⋮	⋮	----	⋮	⋮	⋮
A <sub>m</sub>	C <sub>m1</sub>	C <sub>m2</sub>	----	C <sub>mn</sub>	0	a <sub>m</sub>
销量	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	----	b <sub>n</sub>	$\sum a_i - \sum b_j$	

## 2.销>产

$$\text{Min } z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} \cdot x_{ij}$$

$$\text{Min } z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} \cdot x_{ij} + \sum_{j=1}^n 0 \cdot x_{m+1, j}$$

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i & (i = 1, 2, \dots, m) \\ \sum_{i=1}^m x_{ij} \leq b_j & (j = 1, 2, \dots, n) \\ x_{ij} \geq 0 & (i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n) \end{cases}$$



$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i & (i = 1, 2, \dots, m, m+1) \\ \sum_{i=1}^{m+1} x_{ij} = b_j & (j = 1, 2, \dots, n) \\ x_{ij} \geq 0 & (i = 1, \dots, m, m+1; j = 1, \dots, n) \end{cases}$$



销>产问题单位运价表

产地 \ 销地	B1	B2	----	Bn	产量
A1	$C_{11}$	$C_{12}$	----	$C_{1n}$	$a_1$
A2	$C_{21}$	$C_{22}$	----	$C_{2n}$	$a_2$
⋮	⋮	⋮	----	⋮	⋮
A <sub>m</sub>	$C_{m1}$	$C_{m2}$	----	$C_{mn}$	$a_m$
A <sub>m+1</sub>	0	0	----	0	$\sum b_j - \sum a_i$
销量	$b_1$	$b_2$	----	$b_n$	

## 二、应用模型

例一：某工厂按合同规定必须于当年的每个季度末分别提供10、15、25、20台同一规格的柴油机。已知该厂的生产能力及生产每台柴油机的成本如表示。又如果生产出来的柴油机当季不交货，每台每积压一个季度需要存储维护费用0.15万元。要求在完成合同的情况下，做出使全年生产费用最小的决策。

	1 10.8 $x_{11}$	2 $10.8+0.15$ $x_{12}$	3 $10.8+0.15+0.15$ $x_{13}$	4 $10.8+(0.15 \times 3)$ $x_{14}$	25
2	—	$x_{22}$	$x_{23}$	$x_{24}$	35
3	—	—	$x_{33}$	$x_{34}$	30
4	—	—	—	$x_{44}$	10
	10	15	25	20	
季度	生产能力 (台)				单位成本 (万元/台)
I	25				10.8
II	35				11.1
III	30				11.0
IV	10				11.3

模型:

设  $x_{ij}$ ——第*i*季度生产, 用于第*j*季度交货的数量。

$$\text{obj.} \quad \min \quad z = \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^4 c_{ij} x_{ij}$$

$$\begin{array}{l} \text{供应:} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{I} \quad x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} \leq 25 \\ \text{II} \quad x_{22} + x_{23} + x_{24} \leq 35 \\ \text{III} \quad x_{33} + x_{34} \leq 30 \\ \text{IV} \quad x_{44} \leq 10 \\ x_{ij} \geq 0, (i=1, \dots, 4; j=1, \dots, 4) \end{array} \right. \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{需求:} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{I} \quad x_{11} = 10 \\ \text{II} \quad x_{12} + x_{22} = 15 \\ \text{III} \quad x_{13} + x_{23} + x_{33} = 25 \\ \text{IV} \quad x_{14} + x_{24} + x_{34} + x_{44} = 20 \end{array} \right. \end{array}$$

# 单位费用表:

单位: 万元

供应 \ 需求	I	II	III	IV
I	10. 8	10. 95	11. 10	11. 25
II	M	11. 10	11. 25	11. 40
III	M	M	11. 00	11. 15
IV	M	M	M	11. 30

## 例二：

某餐馆承办宴会，每晚连续举行，共举行五次。宴会上需用特殊的餐巾，根据参加的人数，预计每晚的需要量为：第一天1000条，第二天700条，第三天800条，第四天1200条，第五天1500条，五天之后，所有的餐巾作废。宴会中用过的餐巾经过洗涤处理后可以重复使用，这样可以降低使用成本。已知每条新餐巾需要1元的费用，送洗时可选择两种方式：快洗仅需要一天时间，每条洗涤费用为0.2元，慢洗需要两天时间，每条洗涤费用0.1元。问：如何安排，可使总费用最低？

## 建立模型:

设  $x_j$ —第j天使用新毛巾的数量;  $y_{ij}$ —第i天送第j天使用快洗餐巾的数量;  $z_{ij}$ —第i天送第j天使用慢洗餐巾的数量;

$$\text{Min } z = \sum x_j + \sum \sum 0.2y_{ij} + \sum \sum 0.1z_{ij}$$

需求约束

第一天:  $x_1 = 1000$

第二天:  $x_2 + y_{12} = 700$

第三天:  $x_3 + z_{13} + y_{23} = 800$

第四天:  $x_4 + z_{14} + z_{24} + y_{34} = 1200$

第五天:  $x_5 + z_{15} + z_{25} + z_{35} + y_{45} = 1500$

供应约束

新购餐巾:  $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \leq 5200$

第一天送洗:  $y_{12} + z_{13} + z_{14} + z_{15} \leq 1000$

第二天送洗:  $y_{23} + z_{24} + z_{25} \leq 700$

第三天送洗:  $y_{34} + z_{35} \leq 800$

第四天送洗:  $y_{45} \leq 1200$

$$x_j \geq 0, y_{ij} \geq 0, z_{ij} \geq 0, \quad (i=1, \dots, 4; j=1, \dots, 5)$$

产销平衡表

供应 \ 需求	I	II	III	IV	V	VI	产量
新 购	1	1	1	1	1	0	5200
第一天	M	0.2	0.1	0.1	0.1	0	1000
第二天	M	M	0.2	0.1	0.1	0	700
第三天	M	M	M	0.2	0.1	0	800
第四天	M	M	M	M	0.2	0	1200
销 量	1000	700	800	1200	1500	3700	



### 例三：

有A、B、C三个化肥厂供应四个地区 I、II、III、IV的农用化肥，三个工厂每年各自的产量为A—50万吨，B—60万吨，C—50万吨。四个地区的需求量分别是 I 地区最高50万吨，最低30万吨，II地区为70万吨，III地区为30万吨以下，IV地区不低于10万吨。问：如何调运，可使总的调运费最小？单位调运费如下表所示。

设  $x_{ij}$ —第i工厂  
调至第j需求地区  
的化肥数量

单位运价表					单位：万元/万吨
产地 \ 销地	I	II	III	IV	产量
A	16	13	22	17	50
B	14	13	19	15	60
C	19	20	23	—	50
销量	30-50	70	0-30	10-60	

160



产销平衡表

需求 供应	I'	I''	II	III	IV'	IV''	产量
A	16	16	13	22	17	17	50
B	14	14	13	19	15	15	60
C	19	19	20	23	M	M	50
D	M	0	M	0	M	0	50
销 量	30	20	70	30	10	50	

### 三、扩大的运输问题

例：在前面的例题中，若既可以从 $A_i$ 运到 $B_j$ ，也可以经过中间站 $T_1$ 、 $T_2$ 、 $T_3$ 、 $T_4$ 或者 $A_i$ 、 $B_j$ 转运，称扩大的运输问题。

几点说明：

1. 所有的产地、销地、中间站均视作产地、销地；
2. 转运量可定位总的产量之和；
3. 不能出现循环倒运现象，允许自身往自身最多调运一次，运价为 $C_{ij}=0$ ；
4. 实际产地产量为转运量与该产地实际产量之和，实际销地销量为转运量与实际销量之和。

产销平衡表

产\销	A1	A2	A3	T1	T2	T3	T4	B1	B2	B3	B4	产量
A1	0	1	3	2	1	4	3	3	11	3	10	27
A2	1	0	—	3	5	—	2	1	9	2	8	24
A3	3	—	0	1	—	2	3	7	4	10	5	29
T1	2	3	1	0	1	3	2	2	8	4	6	20
T2	1	5	—	1	0	1	1	4	5	2	7	20
T3	4	—	2	3	1	0	2	1	8	2	4	20
T4	3	2	3	2	1	2	0	1	—	2	6	20
B1	3	1	7	2	4	1	1	0	1	4	2	20
B2	11	9	4	8	5	8	—	1	0	2	1	20
B3	3	2	10	4	2	2	2	4	2	0	3	20
B4	10	8	5	6	7	4	6	2	1	3	0	20
销量	20	20	20	20	20	20	20	23	26	25	26	

## 复习思考题

1. 产销不平衡运输问题的概念是什么？
2. 对于不平衡运输问题如何运用表上作业法求解？
3. 虚拟产地或销地的作用是什么？
4. 处理扩大的运输问题应遵循哪些原则？

## 本章知识点

1. 运输问题模型的结构特点
2. 表上作业法的原理与求解
3. 表上作业法应用于产销不平衡运输问题的求解
4. 产销不平衡模型的应用