
Independent t test


劉昱君


由數據分析結果可知，在 Blood sugar、BMI 和 Blood pressure 三項目中，糖尿病患者與正常人的 p value 都 < 0.05，表示三數據間皆存在顯著差異。從箱型圖呈現的結果也可發現，糖尿病患者在三個項目的表現都遠高於正常人。

	DM	Normal	p value
	Mean ± SD	Mean ± SD	
Blood sugar (mg/dL)	193.36 ± 12.044	95.45 ± 6.283	< 0.01*
BMI (kg/m^2)	30.682 ± 0.9898	23.336 ± 1.2452	< 0.01*
Blood pressure (mmHg)	152.64 ± 5.555	124.91 ± 5.486	< 0.01*

T test. *$p < 0.05$







- Exercise-2 (補充)

比較不同性別間的數據可知，對比 Blood sugar、BMI 和 Blood pressure 三個項目都不存在顯著差異（p value > 0.05）。但由箱型圖可發現，在三項目中的數值表現，男性基本上會略高於女性。

	Male	Female	p value
	Mean ± SD	Mean ± SD	
Blood sugar (mg/dL)	150.10 ± 55.238	139.67 ± 49.096	0.644
Blood pressure (mmHg)	142.10 ± 16.086	136.00 ± 14.479	0.361
BMI (kg/m^2)	27.590 ± 4.1095	26.525 ± 3.8598	0.538

