

ESPACES EUCLIDIENS

Feuille 2

Exercice 2.1. Donnez une équation des hyperplans suivants :

- (1) $W = \text{Vect}((3, 5)) \subset \mathbb{R}^2$;
- (2) $W = \text{Vect}((1, i, 1), (1 + 2i, 3, 0)) \subset \mathbb{C}^3$.

Exercice 2.2. Soit S le sous-espace de \mathbb{R}^4 engendré par les vecteurs $w = (1, 1, 1, 1)$, $x = (1, 3, 0, 4)$, $y = (-2, 4, -5, 7)$ et $z = (-4, 0, -6, 2)$. Trouvez une base de S° dans $(\mathbb{R}^4)^*$. Donnez un système d'équations linéaires homogène (avec un nombre minimal d'équations) dont S est l'espace des solutions. Répétez l'exercice avec T au lieu de S , où T est le sous-espace de \mathbb{R}^4 engendré par w et x .

Exercice 2.3. Considérons des applications K -linéaires $U \xrightarrow{f} V \xrightarrow{g} W$. Montrer que

$$(g \circ f)^* = f^* \circ g^* : W^* \rightarrow U^*.$$

Montrer par ailleurs que $(\text{id}_V)^* = \text{id}_{V^*}$, et que si f est un isomorphisme, alors f^* est aussi un isomorphisme et $(f^*)^{-1} = (f^{-1})^*$.

Exercice 2.4. Vérifiez les propriétés énoncées dans le cours au point 1.41.

Exercice 2.5. Soient $a < b$ des nombres réels, et soit $\mathcal{P}_2^{\mathbb{R}}$ le \mathbb{R} -espace vectoriel des polynômes nul ou de degré inférieur ou égal à 2. Montrez qu'il existe des nombres $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ tels que

$$\int_a^b P(t)dt = \alpha P(a) + \beta P\left(\frac{a+b}{2}\right) + \gamma P(b)$$

pour tout $P \in \mathcal{P}_2^{\mathbb{R}}$. Donnez une formule pour α, β et γ .

Exercice 2.6. Soient E et F deux espaces vectoriels sur \mathbb{K} . On suppose que E est de dimension finie. Montrer que $u \in \mathcal{L}(E, F) - \{0\}$ est de rang r si, et seulement si, il existe des formes linéaires $\varphi_1, \dots, \varphi_r$ linéairement indépendantes dans E^* et des vecteurs y_1, \dots, y_r linéairement indépendants dans F tels que

$$u(x) = \sum_{i=1}^r \varphi_i(x) y_i \quad \text{pour tout } x \in E.$$

Montrer que dans ce cas, on a

$$\text{Ker } u = \bigcap_{i=1}^r \text{Ker } \varphi_i$$

Trouvez une telle décomposition dans l'exemple de l'application

$$u : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad (x_1, x_2, x_3) \mapsto (x_1 + 2x_2, 2x_1 + 2x_2 - x_3, 3x_1 + 4x_2 - x_3).$$