

Gyakorló feladatok 1.

(Görbék)

Programtervező matematikus

szakos hallgatóknak az

Analízis 7.

nevű tárgyhoz

2006. őszi félév

1. Görbék megadásának módjai és szemléltetésük

F1. A paraméter kiküszöbölésével adja meg az alábbi síkgörbéket $F(x, y) = 0$ implicit alakban, majd ábrázolja mindegyiket:

- (a) $\varphi(t) := (\sin^2 t, \cos^2 t) \quad (t \in \mathbb{R});$
- (b) $\varphi(t) := (\cos t, \cos 2t) \quad (t \in \mathbb{R});$
- (c) $\varphi(t) := (t^2 - 2t, t + 1) \quad (t \in \mathbb{R});$
- (d) $\varphi(t) := (\ln t, \sqrt{t}) \quad (t \in \mathbb{R});$
- (e) $\varphi(t) := (\operatorname{ch} t, \operatorname{sh} t) \quad (t \in \mathbb{R}).$

F2. Vázolja az alábbi, polárkoordinátákban megadott görbékét:

- (a) $r(\varphi) := a\varphi \quad (\varphi \geq 0, a > 0)$ (az archimédeszi spirális);
- (b) $r(\varphi) := \frac{a}{\varphi} \quad (\varphi > 0, a > 0)$ (a hiperbolikus spirális);
- (c) $r(\varphi) := ae^{k\varphi} \quad (\varphi \geq 0, a > 0, k > 0)$ (a logaritmikus spirális);
- (d) $r(\varphi) := \cos \varphi \quad (\varphi \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]);$
- (e) $r(\varphi) := \cos 2\varphi \quad (\varphi \in [-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]);$
- (f) $r(\varphi) := |\cos 2\varphi| \quad (\varphi \in \mathbb{R});$
- (g) $r(\varphi) := a(1 + \cos \varphi) \quad (\varphi \in [0, 2\pi], a > 0)$ (a kardioid);
- (h) $r(\varphi) := a\sqrt{2 \cos 2\varphi} \quad (\varphi \in [-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}] \cup [\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}])$
(a Bernoulli-féle lemniszkáta).

F3. Szemléltesse az alábbi síkgörbéket:

- (a) $y^2 - 2x^3 = 0;$
- (b) $x^3 + y^3 = 3\alpha xy \quad (\alpha > 0)$ (a Descartes-féle levél);
- (c) $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = \alpha^{\frac{2}{3}} \quad (\alpha > 0)$ (az asztrois).

2. Görbék ívhossza, természetes paraméterezése

F4. Vázolja az alábbi térgörbéket és határozza meg az ívhosszukat:

- (a) $\varphi(t) := (a \cos t, a \sin t, bt) \quad (t \in [0, 2\pi], a > 0, b > 0),$
(az origó középpontú a sugarú hengerre írt csavarvonal, $2\pi b$ a menet magassága);
- (b) $\varphi(t) := (e^{4t} \cos t, e^{4t} \sin t, \sqrt{2}e^{4t}) \quad (t \in [0, 1]),$
(egy kúpra írt csavarvonal).

F5. Mutassa meg, hogy az

$$f(x) \quad (x \in [a, b]) \quad \text{explicit-},$$

illetve az

$$r(\varphi) \quad (\varphi \in [\varphi_1, \varphi_2]) \quad \text{polárkoordinátás}$$

alakban megadott egyszerű sima görbe rektifikálható és az ívhossza az

$$l = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx,$$

illetve az

$$l = \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \sqrt{r^2(\varphi) + [r'(\varphi)]^2} d\varphi$$

képlettel számítható ki.

F6. Számítsa ki az alábbi görbék ívhosszát:

- (a) $f(x) := \sqrt{x^3} \quad (x \in [0, 4]);$
- (b) az archimédeszi spirális első menete.

F7. Adja meg az alábbi görbék természetes (ív hossz szerinti) paraméterezését:

- (a) az $(1, 2)$ pontból a $(3, 4)$ pontba vezető szakasz;
- (b) az origó középpontú 4 sugarú kör;
- (c) $\varphi(t) := (a \cos t, a \sin t, bt) \quad (t \in \mathbb{R}, a > 0, b > 0).$

F8. Bizonyítsa be, hogy ha egy $\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}^3$ függvénnyel megadott térgörbe érintővektorainak hossza azonosan egy, akkor a t paraméter a görbe valamely pontjától mért ívhossz vagy attól csak egy additív állandóban különbözik.

3. Görbék érintője

F9. Írja fel a megadott pontokban az alábbi görbék érintőjének az egyenletét, és adja meg az egyenletrendszerét is:

- (a) $\varphi(t) := (\frac{t^2}{2}, \frac{2t^3}{3}, \frac{t^4}{2}) \quad (t \in \mathbb{R}); \quad t_0 := 1;$
- (b) $\varphi(t) := (\frac{t}{1+t}, 2 \ln(1+t), \frac{1}{\cos t}) \quad (t > -1); \quad t_0 := 0;$
- (c) $\varphi(t) := (e^t \cos t, e^t \sin t, e^t) \quad (t \in \mathbb{R}); \quad t_0 := 0.$

F10. Határozza meg az alábbi térgörbék megadott tulajdonságú érintőinek egyenletrendszerét és egyenletük paraméteres alakját, ha

- (a) $\varphi(t) := (\frac{t^4}{4}, \frac{t^3}{3}, \frac{t^2}{2})$ ($t \in \mathbb{R}$); az érintő párhuzamos az $x + 3y + 2z = 0$ egyenletű síkkal;
- (b) $\varphi(t) := (3t - t^3, 3t^2, 3t + t^3)$ ($t \in \mathbb{R}$); az érintő párhuzamos a $3x + y + z + 2 = 0$ egyenletű síkkal;
- (c) $\varphi(t) := (\sin t - t \cos t, t \sin t + \cos t, \sin t)$ ($t \in \mathbb{R}$); az érintő párhuzamos az yz -koordinátságú síkkal.

F11. Írja fel a

$$\varphi(t) := (a(t - \sin t), a(1 - \cos t)) \quad (t \in \mathbb{R}, a > 0)$$

egyenletű ciklois érintőjének az egyenletét a $t_0 := \frac{\pi}{3}$ pontban. Mely pontokban vízszintes az érintő, és melyekben függőleges? Számolja ki az egy cikloisív alatti területet.

F12. Tekintse a

$$\varphi(t) := (t^2, t^3 - 3t) \quad (t \in \mathbb{R})$$

egyenletű görbét.

- (a) Mutassa meg, hogy a görbének a $(3, 0)$ pontban két érintője van.
- (b) Keresse meg azokat a pontokat, amelyekben az érintő vízszintes, illetve függőleges.
- (c) Ábrázolja a görbét.

F13. Határozza meg az $r(\varphi) := 1 + \cos \varphi$ ($\varphi \in [0, 2\pi]$) kardiodid érintőjének az egyenletét a $\varphi_0 := \pi/3$ pontban. Keresse meg azokat a pontokat, amelyekben az érintő vízszintes, illetve függőleges.

F14. Legyen a Γ görbe polárkoordinátákban adott egyenlete $r = r(\varphi)$ ($\varphi \in I$). Tegyük fel, hogy az $r(\varphi)$ függvény deriválható és $0 \notin \mathcal{R}_{r'}$. Ekkor a Γ görbének tetszőleges $P_0 = (r(\varphi_0), \varphi_0)$ pontjában van érintője. Az érintőegyenest az OP_0 félegyenesnek az ω hajlásszögére a

$$\operatorname{tg} \omega = \frac{r(\varphi_0)}{r'(\varphi_0)}$$

képlet érvényes.

F15. Mutassa meg, hogy a logaritmikus spirális olyan görbe, amelyik a koordináta-rendszer O kezdőpontjából kiinduló minden félegyeneset azonos ω szög alatt metsz. Ez azt jelenti, hogy a görbe minden M pontjában az M -beli érintőnek és az OM félegyenesnek a szöge ugyanannyi (ω).

4. Görbület, simulósík, kísérő triéder, simulókör, torzió, Frenet-formulák

• A természetes paraméterezés alapvető tulajdonságai

F16. Tegyük fel, hogy $\Phi : [0, L] \rightarrow \mathbb{R}^3$ a $\Gamma \subset \mathbb{R}^3$ egyszerű sima görbe egy kétszer folytonosan deriválható természetes paraméterezése. Bizonyítsa be, hogy

- (a) $|\Phi'(s)| = 1$ minden $s \in [0, L]$ esetén;
- (b) a $\Phi'(s)$ és $\Phi''(s)$ vektorok *merőlegesek* egymásra, azaz

$$\langle \Phi'(s), \Phi''(s) \rangle = 0 \quad (s \in [0, L]).$$

• Görbület

D1. Legyen $\Gamma \subset \mathbb{R}^n$ egy egyszerű sima görbe. Tegyük fel, hogy $\Phi : [0, L] \rightarrow \Gamma$ ennek az ívhossz szerinti, kétszer folytonosan deriválható paraméterezése (L a Γ ívhossza.) Az $s \in [0, L]$ -ben (azaz a $\Phi(s)$ pontban) a Γ görbe görbületén a $\kappa(s) := |\Phi''(s)|$ számot értjük.

F17. Legyen $\Gamma \subset \mathbb{R}^3$ egy egyszerű sima (tér)görbe, és tegyük fel, hogy $\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow \Gamma$ ennek egy tetszőleges, kétszer folytonosan deriválható paraméterezése. Mutassa meg, hogy a görbének minden $t_0 \in (\alpha, \beta)$ paraméterű $\varphi(t_0) = P_0 \in \Gamma$ pontjában van görbülete és ez a

$$\kappa(t_0) = \frac{|\varphi'(t_0) \times \varphi''(t_0)|}{|\varphi'(t_0)|^3}$$

képlettel számítható ki. Mi a görbület szemléletes jelentése?

Útmutatás. Legyen $\Phi : [0, L] \rightarrow \Gamma$ a görbe természetes paraméterezése (L a Γ ívhossza). Jelölje $S(t) := L_{\Gamma_t}$ ($t \in [\alpha, \beta]$) a $\Gamma_t := \{\varphi(u) \mid \alpha \leq u \leq t\}$ görbe ívhosszát és T ennek a függvénynek az inverzét: $T := S^{-1}$. Ekkor $\Phi = \varphi \circ T$. A tett feltételekből következik, hogy $\Phi \in C^2$, ezért a görbének minden pontban van görbülete.

A $\Phi = \varphi \circ T$ függvényre az összetett függvény deriválási szabályát alkalmazzuk:

$$\begin{aligned} \Phi' &= \varphi' \circ T \cdot T' \\ \Phi'' &= \varphi'' \circ T \cdot [T']^2 + \varphi' \circ T \cdot T'' = [T']^2 \cdot \varphi'' \circ T + \frac{T''}{T'} \cdot \Phi'. \end{aligned} \tag{1}$$

(Φ'' tehát a $\varphi'' \circ T$ és a Φ' vektorok lineáris kombinációja.)

Legyen $s_0 := S(t_0)$, $T(s_0) = t_0$, $\varphi(t_0) = \varphi(T(s_0)) = \Phi(s_0)$.

A $\kappa(s_0) := |\Phi''(s_0)|$ görbület kiszámolásához felhasználjuk azt, hogy $\Phi'(s_0)$ egységvektor és $\Phi'(s_0) \perp \Phi''(s_0)$. Ez alapján (egy kis „cselt” is alkalmazva!!)

$$\kappa(s_0) = |\Phi''(s_0)| = |\Phi'(s_0) \times \Phi''(s_0)|.$$

Ebbe (1)-et behelyettesítve, és felhasználva a vektoriális szorzat tulajdonságait (linearitás; egy vektor önmagával vett vektoriális szorzata nulla) azt kapjuk, hogy

$$\begin{aligned}\kappa(t_0) &= \kappa(s_0) = |\Phi''(s_0)| = [T'(s_0)]^2 \cdot |\Phi'(s_0) \times \varphi''(T(s_0))| = \\ &= [T'(s_0)]^2 \cdot |\Phi'(s_0) \times \varphi''(t_0)| = [T'(s_0)]^3 \cdot |\varphi'(T(s_0)) \times \varphi''(t_0)| = \\ &= [T'(s_0)]^3 \cdot |\varphi'(t_0) \times \varphi''(t_0)|.\end{aligned}$$

Mivel

$$S(t) = \int_{\alpha}^t |\varphi'(u)| du \quad (t \in (\alpha, \beta)),$$

ezért

$$S'(t) = |\varphi'(t)| \quad (t \in (\alpha, \beta)),$$

és $T := S^{-1}$ miatt az inverz függvény deriválási szabálya alapján

$$\begin{aligned}T'(s) &= \frac{1}{S'(T(s))} = \frac{1}{|\varphi'(T(s))|} = \frac{1}{|\varphi'(t)|} \\ &\quad (s \in (0, L), \quad t \in (\alpha, \beta)),\end{aligned}$$

következésképpen fennáll a

$$\kappa(t_0) = \frac{|\varphi'(t_0) \times \varphi''(t_0)|}{|\varphi'(t_0)|^3} \quad (t_0 \in (\alpha, \beta))$$

egyenlőség.

A görbület szemléletes jelentése: Egy görbe P pontbeli görbületével az egyenestől való eltérését mérjük. Ezt a görbe érintőjének átlagos irányváltozási sebességével jellemezhetjük: Ha a görbe P, Q pontjaiban vett érintők hajlásszöge $\Delta\alpha$, Δs pedig a P és Q közötti ívhossz, akkor a görbület „természetes” értelmezése a $\Delta\alpha/\Delta s$ hányados határértéke, midőn a Q pont a görbén a P ponthoz tart. Ennek „alkalmas” átalakítása volt számunkra a görbület definíciójának a motivációja. ■

F18. Mutassa meg, hogy az $y = f(x)$ ($x \in [a, b]$) egyenlettel *explicit alakban* megadott síkbeli görbe görbülete az $(x_0, f(x_0))$ ($x_0 \in (a, b)$) pontban a

$$\kappa = \frac{|f''(x_0)|}{(1 + [f'(x)]^2)^{3/2}}$$

képlettel számítható ki, ha $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ legalább kétszer folytonosan deriválható.

F19. Számítsa ki az alábbi görbék görbületét a megadott pontokban:

(a) $\varphi(t) := (2 \sin t, 2 \cos t, 4t)$ ($t \in \mathbb{R}$); $t_0 := \frac{\pi}{4}$;

(b) $\varphi(t) := (e^{-2t}, 2t, 4)$ ($t \in \mathbb{R}$); $t_0 := 0$;

(c) $\varphi(t) := (2, \sin \pi t, \ln t)$ ($t > 0$); $t_0 := 1$;

(d) $\varphi(t) := (t, \sin(2t), 3t)$ ($t \in \mathbb{R}$); $t_0 := 0$;

(e) $\varphi(t) := (t, t^2 + t - 1, t)$ ($t \in \mathbb{R}$); $t_0 := 0$;

(f) $f(x) := x^3 - 1$ ($x \in \mathbb{R}$); $x_0 := 1$;

(g) $f(x) := \sin x$ ($x \in \mathbb{R}$); $x_0 := \frac{\pi}{2}$;

(h) $f(x) := e^{-3x}$ ($x \in \mathbb{R}$); $x_0 := 0$.

F20. Mi lesz $x \rightarrow +\infty$ esetén a görbület határértéke az alábbi egyenletekkel explicit alakban megadott görbéknél:

(a) $y = ax^2 + bx + c$ (a, b, c valós paraméterek);

(b) $y = e^{2x}$;

(c) $y = x^3$;

(d) $y = \sqrt{x}$?

F21. Határozza meg az alábbi, polárkoordinátás alakban megadott görbék görbületét a kijelölt pontokban:

(a) $r(\varphi) := |\sin 3\varphi|$ ($\varphi \in \mathbb{R}$), $\varphi_0 = 0, \frac{\pi}{6}$;

(b) $r(\varphi) := 3 + 2 \cos(3\varphi)$ ($\varphi \in \mathbb{R}$), $\varphi_0 = 0, \frac{\pi}{2}$;

(c) $r(\varphi) := 3e^{2\varphi}$ ($\varphi \in \mathbb{R}$), $\varphi_0 = 0, 1$.

F22. Keresse meg a következő görbék maximális és minimális görbületű pontjait:

(a) $\varphi(t) := (2 \cos t, 3 \sin t)$;

(b) $y = 4x^2 - 3$;

(c) $y = \sin x$.

F23. Számítsa ki az

$$F(x, y) = 0$$

implicit egyenlettel adott görbe görbületét.

Útmutatás.

$$\kappa = \frac{\left| \det \begin{bmatrix} F''_{xx} & F''_{xy} & F'_x \\ F''_{yx} & F''_{yy} & F'_y \\ F'_x & F'_y & 0 \end{bmatrix} \right|}{(F'^2_x + F'^2_y)^{3/2}}$$

■

• A kísérő triéder élei és síkjai

D2. Legyen $\Gamma \subset \mathbb{R}^3$ egy egyszerű sima görbe, $\Phi : [0, L] \rightarrow \Gamma$, $\Phi \in C^2$ a természetes paraméterezése, és tegyük fel, hogy $\Phi''(s) \neq 0$ (L a Γ ívhossza). Legyen $s \in [0, L]$ esetén

$$\begin{aligned} \mathbf{e}(s) &:= \Phi'(s) && \text{(ez az ún. érintő egységvektor),} \\ \mathbf{n}(s) &:= \frac{\Phi''(s)}{|\Phi''(s)|} && \text{(ez az ún. főnormális egységvektor),} \\ \mathbf{b}(s) &:= \mathbf{e}(s) \times \mathbf{n}(s) && \text{(ez az ún. binormális egységvektor).} \end{aligned}$$

A páronként egymásra merőleges $\mathbf{e}(s)$, $\mathbf{n}(s)$, $\mathbf{b}(s)$ egységvektorokból álló rendszert a **görbe kísérő triéderének** nevezzük.

Az $\mathbf{e}(s)$ és $\mathbf{n}(s)$ vektorok által kifeszített sík a **simulósík**,

az $\mathbf{n}(s)$ és $\mathbf{b}(s)$ vektorok által kifeszített sík a **normálsík**,

az $\mathbf{e}(s)$ és $\mathbf{b}(s)$ vektorok által kifeszített sík a **rektifikálósík**.

F24. Legyen $\Gamma \subset \mathbb{R}^3$ egy egyszerű sima (tér)görbe, és tegyük fel, hogy $\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow \Gamma$ ennek egy tetszőleges, kétszer folytonosan deriválható paraméterezése; $t_0 \in (\alpha, \beta)$ és $\varphi(t_0) = P_0 \in \Gamma$. A görbe P_0 pontjához tartozó kísérő triéder **éleire** vonatkozóan mutassa meg a következőket:

(a) Az **érintő** irányába mutató vektor

$$\varphi'(t_0).$$

(b) A **főnormális** irányába mutató vektor

$$(\varphi'(t_0) \times \varphi''(t_0)) \times \varphi'(t_0).$$

(c) A **binormális** irányába mutató vektor

$$\varphi'(t_0) \times \varphi''(t_0).$$

Útmutatás. Legyen $\Phi : [0, L] \rightarrow \Gamma$ a görbe természetes paraméterezése (L a Γ ívhossza). Az állítás *egyszerű* következménye a $\Phi = \varphi \circ T$ alapvető képletünk deriváltjaira vonatkozó

$$\begin{aligned} \Phi' &= \varphi' \circ T \cdot T' \\ \Phi'' &= \varphi'' \circ T \cdot [T']^2 + \varphi' \circ T \cdot T'' = [T']^2 \cdot \varphi'' \circ T + \frac{T''}{T'} \cdot \Phi'. \end{aligned} \tag{2}$$

összefüggéseknek.

(a) Görbe érintőjének irányvektora **definíció szerint** a $\varphi'(t_0)$ vektor. (A fentiek alapján a $\varphi'(t_0)$ és a $\Phi'(s_0)$ ($t_0 = T(s_0)$) vektorok párhuzamosak. Ezért neveztük *érintő egységvektor*nak a kísérő triéder $\mathbf{e}(s_0) := \Phi'(s_0)$ vektorát.)

(c) *igazolása*: Tekintsük a $\mathbf{b} := \mathbf{b}(s_0) = \mathbf{b}(t_0)$ binormális egységvektorral párhuzamos és egyirányú $\Phi'(s_0) \times \Phi''(s_0)$ vektort. (2) alapján

$$\Phi'(s_0) \times \Phi''(s_0) = \lambda \varphi'(t_0) \times \varphi''(t_0),$$

ahol λ egy alkalmas pozitív szám (miért?), ezért $\varphi'(t_0) \times \varphi''(t_0)$ valóban egy, a binormális irányába mutató vektor.

(b) *igazolása*: Az \mathbf{e}, \mathbf{n} és \mathbf{b} vektorok definíciójából következik (miért?), hogy

$$\mathbf{n} = \mathbf{b} \times \mathbf{e},$$

és ez a (b) állításunkat bizonyítja. ■

F25. Határozza meg az alábbi görbék t_0 paraméterű pontjában a kísérő triéder vektorait és az élegyeneseinek az egyenletét:

$$(a) \varphi(t) := (t^3 - 1, 2t^2 + 1, 3t - 2) \quad (t \in \mathbb{R}), \quad t_0 := 1;$$

$$(b) \varphi(t) := \left(1 + t^2, \frac{2}{1-t^2}, t - t^3\right) \quad (t \in \mathbb{R}), \quad t_0 := 1;$$

$$(c) \varphi(t) := (\sin^2 t, \cos(2t), -\frac{1}{\sin t}) \quad (t \in (0, \pi)), \quad t_0 := \frac{\pi}{4}.$$

Útmutatás. (a) A szóban forgó pont: $P_0 = \varphi(t_0) = \varphi(1) = (0, 3, 1)$.

A szükséges deriváltak és a helyettesítési értékek:

$$\varphi'(t) = (3t^2, 4t, 3),$$

$$\varphi'(1) = (3, 4, 3);$$

$$\varphi''(t) = (6t, 4, 0),$$

$$\varphi''(1) = (6, 4, 0).$$

A kísérő triédert kifeszítő **három egységvektor**:

Az *érintő egységvektor*:

$$\mathbf{e}(1) = \frac{\varphi'(1)}{|\varphi'(1)|} = \frac{3}{\sqrt{34}}\mathbf{i} + \frac{4}{\sqrt{34}}\mathbf{j} + \frac{3}{\sqrt{34}}\mathbf{k}.$$

Mivel

$$\varphi'(1) \times \varphi''(1) = \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 3 & 4 & 3 \\ 6 & 4 & 0 \end{bmatrix} = -12\mathbf{i} + 18\mathbf{j} - 12\mathbf{k},$$

ezért a *binormális egységvektor*:

$$\mathbf{b}(1) = \frac{\varphi'(1) \times \varphi''(1)}{|\varphi'(1) \times \varphi''(1)|} = -\frac{12}{\sqrt{612}}\mathbf{i} + \frac{18}{\sqrt{612}}\mathbf{j} - \frac{12}{\sqrt{612}}\mathbf{k}.$$

Végül a *főnormális egységvektor*:

$$\begin{aligned}\mathbf{n}(1) &= \mathbf{b}(1) \times \mathbf{e}(1) = \frac{6}{\sqrt{34}\sqrt{612}} \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -2 & 3 & -2 \\ 3 & 4 & 3 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{17\sqrt{2}}(17\mathbf{i} - 17\mathbf{k}) = \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i} - \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{k}.\end{aligned}$$

Az **érintő** egy irányvektora $\varphi'(1) = (3, 4, 3)$, ezért az *érintőegyenes* egyenleteinek különböző alakjai:

a *vektoregyenlete*

$$\mathbf{W}(t) = \varphi(1) + t\varphi'(1) = 3t\mathbf{i} + (3 + 4t)\mathbf{j} + (1 + 3t)\mathbf{k} \quad (t \in \mathbb{R}),$$

a *paraméteres egyenletrendszer*

$$\begin{aligned}x &= 3t \\ y &= 3 + 4t \\ z &= 1 + 3t\end{aligned} \quad (t \in \mathbb{R}),$$

az *egyenletrendszer*

$$\frac{x}{3} = \frac{y-3}{4} = \frac{z-1}{3}.$$

A **binormális** egyenes egy irányvektora $\varphi'(1) \times \varphi''(1)$, azaz

$$\varphi'(1) \times \varphi''(1) = \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 3 & 4 & 3 \\ 6 & 4 & 0 \end{bmatrix} = -12\mathbf{i} + 18\mathbf{j} - 12\mathbf{k},$$

ezért az irányvektor a $\mathbf{b}_1 = (2, -3, 2)$ vektor is lehet. A binormális egyenesnek (például) a vektoregyenlete:

$$\mathbf{W}(t) = \varphi(1) + t\mathbf{b}_1 = 2t\mathbf{i} + (3 - 3t)\mathbf{j} + (1 + 2t)\mathbf{k} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

A **főnormális** egyenes egy irányvektora $(\varphi'(1) \times \varphi''(1)) \times \varphi'(1)$. Esetünkben

$$(\varphi'(1) \times \varphi''(1)) \times \varphi'(1) = \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -12 & 18 & -12 \\ 3 & 4 & 3 \end{bmatrix} = 102\mathbf{i} - 102\mathbf{k},$$

ezért az irányvektor a $\mathbf{n}_1 = (1, 0, -1)$ vektor is lehet. A főnormális egyenesnek (például) a vektoregyenlete:

$$\mathbf{W}(t) = \varphi(1) + t\mathbf{n}_1 = t\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + (1 - t)\mathbf{k} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

■

F26. Legyen $\Gamma \subset \mathbb{R}^3$ egy egyszerű sima (tér)görbe, és tegyük fel, hogy $\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow \Gamma$ ennek egy tetszőleges, kétszer folytonosan deriválható paraméterezése; $t_0 \in (\alpha, \beta)$ és $\varphi(t_0) = P_0 \in \Gamma$. A görbe P_0 pontjához tartozó kísérő triéder **síkja**ira vonatkozóan mutassa meg a következőket:

(a) A **simulósík** egy normálvektora

$$\varphi'(t_0) \times \varphi''(t_0).$$

(b) A **normálsík** egy normálvektora

$$\varphi'(t_0).$$

(c) A **rektifikálósík** egy normálvektora

$$(\varphi'(t_0) \times \varphi''(t_0)) \times \varphi'(t_0).$$

Útmutatás. Az **F24.** feladatból rögtön következik. ■

F27. Határozza meg az alábbi görbék t_0 paraméterű pontjában a kísérő triéder síkjainak az egyenletét:

(a) $\varphi(t) := (t^3 - 1, 2t^2 + 1, 3t - 2) \ (t \in \mathbb{R}), \quad t_0 := 1;$

(b) $\varphi(t) := (1 + t^2, \frac{2}{1-t^2}, t - t^3) \ (t \in \mathbb{R}), \quad t_0 := 1;$

(c) $\varphi(t) := (\sin^2 t, \cos(2t), -\frac{1}{\sin t}) \ (t \in (0, \pi)), \quad t_0 := \frac{\pi}{4}.$

Útmutatás. (a) Az **F25.** feladat eredményeit használjuk.

A **simulósík** egy normálvektora a $\varphi'(1) \times \varphi''(1) = (-12, 18, -12)$ vektor, egy pontja $P_0 = \varphi(1) = (0, 3, 1)$, ezért az egyenlete

$$-12(x - 0) + 18(y - 3) - 12(z - 1) = 0,$$

illetve rendezés után

$$2x - 3y + 2z + 7 = 0.$$

A **normálsík** egy normálvektora a $\varphi'(1) = (3, 4, 3)$ vektor, egy pontja $P_0 = \varphi(1) = (0, 3, 1)$, ezért az egyenlete

$$3(x - 0) + 4(y - 3) + 3(z - 1) = 0,$$

illetve

$$3x + 4y + 3z - 15 = 0.$$

A **rektifikáló sík** egy normálvektora a $(\varphi'(t_0) \times \varphi''(t_0)) \times \varphi'(t_0)$ vektorral párhuzamos $\mathbf{n}_1 = (1, 0, -1)$ vektor, egy pontja $P_0 = \varphi(1) = (0, 3, 1)$, ezért az egyenlete

$$x - z + 1 = 0.$$

■

F28. Bizonyítsa be, hogy a

$$\varphi(t) := (e^t \cos t, e^t \sin t, e^t) \quad (t \in \mathbb{R})$$

térgörbe kísérő triéderének élei állandó szöget zárnak be a z -tengellyel.

Útmutatás. A $\varphi'(t) = (e^t(\cos t - \sin t), e^t(\sin t + \cos t), e^t)$ és a $\mathbf{k} = (0, 0, 1)$ vektor hajlásszöge minden $t \in \mathbb{R}$ pontban

$$\cos(\varphi'(t), \mathbf{k}) = \frac{e^t}{e^t \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3},$$

tehát állandó.

A $\varphi'(t) \times \varphi''(t) = (e^{2t}(\sin t - \cos t), -e^{2t}(\sin t + \cos t), 2e^{2t})$ és a $\mathbf{k} = (0, 0, 1)$ vektor hajlásszöge minden $t \in \mathbb{R}$ pontban

$$\cos(\varphi'(t) \times \varphi''(t), \mathbf{k}) = \frac{2e^{2t}}{e^{2t} \sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{3},$$

ez is állandó.

A $(\varphi'(t) \times \varphi''(t)) \times \varphi'(t) = (-3e^{3t}(\sin t + \cos t), -3e^{3t}(\sin t - \cos t), 0)$ és a $\mathbf{k} = (0, 0, 1)$ vektorok esetében pedig

$$(\varphi'(t) \times \varphi''(t)) \times \varphi'(t) \perp \mathbf{k}$$

teljesül minden $t \in \mathbb{R}$ számra. ■

• Simulósík, simulókör, görbületi sugár, görbületi középpont

T1. Legyen $\Gamma \subset \mathbb{R}^3$ egyszerű sima görbe. Tegyük fel, hogy ennek $\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow \Gamma$ egy kétszer folytonosan deriválható paraméterezése. Ha a görbe P_1, P_2 és P_3 pontja a

$$P_0 = \varphi(t_0) = (x_0, y_0, z_0) \quad (t_0 \in (\alpha, \beta))$$

ponthoz tart, és e pontban $\varphi'(t_0) \times \varphi''(t_0) \neq 0$ (azaz $\varphi'(t_0) \nparallel \varphi''(t_0)$), akkor a P_1, P_2 és P_3 pontokon átfektetett síkok *egy* olyan síkhoz tartanak, amelynek egy normálvektora a

$$\varphi'(t_0) \times \varphi''(t_0)$$

vektor. Ezt (a korábbi definíciókkal összhangban) a görbe P_0 pontbeli **simulósíkjának** nevezzük.

A *simulósík egyenlete*:

$$\begin{aligned} < \mathbf{r} - \varphi(t_0), \varphi'(t_0) \times \varphi''(t_0) > = \\ &= \det \begin{bmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ \varphi'_1(t_0) & \varphi'_2(t_0) & \varphi'_3(t_0) \\ \varphi''_1(t_0) & \varphi''_2(t_0) & \varphi''_3(t_0) \end{bmatrix} = 0. \end{aligned}$$

(Itt $\varphi = (\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3)$).

D3. Legyen $\Gamma \subset \mathbb{R}^3$ egy egyszerű sima görbe, $\Phi : [0, L] \rightarrow \Gamma$, $\Phi \in C^2$ a természetes paraméterezése, és tegyük fel, hogy $\Phi''(s) \neq 0$. A görbének a $\Phi(s)$ ($s \in [0, L]$) pontban a

(a) görbülete: $\kappa(s) := |\Phi''(s)|$,

(b) görbületi sugara: $\varrho(s) := \frac{1}{\kappa(s)}$,

(c) görbületi középpontja: $\Psi(s) := \Phi(s) + \frac{\Phi''(s)}{|\Phi''(s)|^2}$.

F29. Írja fel a *simulósík* egyenletét a megadott pontokban:

(a) $\varphi(t) := (t, 2t, t^2)$ ($t \in \mathbb{R}$), $t_0 := 0$, $t_0 := 1$;

(b) $\varphi(t) := (t^3 - 2, t + 1, \frac{t^3}{3})$ ($t \in \mathbb{R}$), $t_0 := 1$;

(c) $\varphi(t) := (4 \cos(\pi t), 4 \sin(\pi t), t)$ ($t \in \mathbb{R}$), $t_0 := 0$, $t_0 := 1$;

(d) $\varphi(t) := (3 \cos(2\pi t), t, \sin(2\pi t))$ ($t \in \mathbb{R}$), $t_0 := 0$, $t_0 := 1$.

F30. Írja fel a

$$\varphi(t) := (t, t^2, t^3) \quad (t \in \mathbb{R})$$

térgörbe $P(2, -\frac{1}{3}, -6)$ ponton átmenő simulósíkjának az egyenletét.

Útmutatás. A görbe nem tartalmazza a megadott P pontot. A t_0 paraméterű pontban a simulósík egyenlete:

$$3t_0^2 x - 3t_0 y + z - t_0^3 = 0.$$

Mivel ez a sík tartalmazza a P pontot, ezért a koordinátáinak behelyettesítése után

$$t_0^3 - 6t_0^2 - t_0 - 6 = (t_0 - 1)(t_0 - 6)(t_0 + 1) = 0$$

adódik. A keresett simulósíkok egyenletei rendre

$$3x - 3y + z - 1 = 0,$$

$$108x - 18y + z - 216 = 0,$$

$$3x + 3y + z + 1 = 0.$$

■

F31. Igazolja, hogy a

$$\varphi(t) := (t^2 - 2t, 3t - 5, -t^2 - 2) \quad (t \in \mathbb{R})$$

síkgörbe, és írja fel a görbe síkjának az egyenletét.

F32. Írja fel a *simulókör* egyenletét a megadott pontokban:

- (a) $\varphi(t) := (t, t^2) \ (t \in \mathbb{R}), \quad t_0 := 0;$
- (b) $\varphi(t) := (t^3 - 2t^2, 3t + 2, t^2 - 5) \ (t \in \mathbb{R}), \quad t_0 := 1;$
- (c) $\varphi(t) := (\cos(2t), \sin(2t)) \ (t \in \mathbb{R}), \quad t_0 := \frac{\pi}{4};$
- (d) $\varphi(t) := (2 \cos t, 3 \sin t) \ (t \in \mathbb{R}), \quad t_0 := \frac{\pi}{4}.$

F33. Határozza meg az alábbi térgörbék pontjaihoz tartozó simulókörök középpontjainak mértani helyét:

- (a) $\varphi(t) := (a \cos t, a \sin t, bt) \ (t \in \mathbb{R}, \ a > 0, b > 0);$
- (b) $\varphi(t) := (e^t, e^{-t}, \sqrt{2}t) \ (t \in \mathbb{R});$
- (c) $\varphi(t) := (\operatorname{ch} t, \operatorname{sh} t, t) \ (t \in \mathbb{R}).$

F34. Bizonyítsa be, hogy a $\varphi(t) := (\varphi_1(t), \varphi_2(t)) \ (t \in [\alpha, \beta])$ síkgörbe esetében a t_0 paraméterű ponthoz tartozó simulókör középpontjának ξ, η koordinátáira a következő képletek érvényesek:

$$\xi = \varphi_1(t_0) - \varphi_2'(t_0) \frac{[\varphi_1'(t_0)]^2 + [\varphi_2'(t_0)]^2}{\varphi_1'(t_0)\varphi_2''(t_0) - \varphi_1''(t_0)\varphi_2'(t_0)}$$

$$\eta = \varphi_2(t_0) + \varphi_1'(t_0) \frac{[\varphi_1'(t_0)]^2 + [\varphi_2'(t_0)]^2}{\varphi_1'(t_0)\varphi_2''(t_0) - \varphi_1''(t_0)\varphi_2'(t_0)},$$

ha $\varphi_1'(t_0)\varphi_2''(t_0) - \varphi_1''(t_0)\varphi_2'(t_0) \neq 0$.

F35. Mutassa meg, hogy az $y = f(x)$ egyenletű síkgörbe esetében a simulókörök középpontjának ξ, η koordinátáit a

$$\xi = x - \frac{y'(1 + (y')^2)}{y''},$$

$$\eta = y + \frac{1 + (y')^2}{y''}$$

képletekkel lehet kiszámolni, ha $y'' \neq 0$.

F36. Határozza meg a következő síkgörbék azon pontjait, amelyekben a simulókör sugara szélsőértéket vesz fel:

- (a) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1;$
- (b) $y = e^x;$
- (c) $y = \ln x;$
- (d) $x = a(t - \sin t), \ y = a(1 - \cos t) \ (a > 0).$

• **Torzió, Frenet-formulák**

D4. Legyen $\Gamma \subset \mathbb{R}^3$ egy egyszerű sima görbe, $\Phi : [0, L] \rightarrow \Gamma$, $\Phi \in C^3$ a természetes paraméterezése, és tegyük fel, hogy $\Phi''(s) \neq 0$ (L a Γ ívhossza). A Γ görbe $\Phi(s)$ ($s \in [0, L]$) pontbeli **torzióját** így értelmezzük:

$$\tau(s) := \langle \mathbf{n}'(s), \mathbf{b}(s) \rangle .$$

Megjegyzés. Emlékeztetünk arra, hogy egy görbe *görbülete* arról tájékoztat minket, hogy a görbe *mennyire tér el az egyenestől*. A görbe egy másik fontos tulajdonsága az, hogy *mennyire tér el egy síkgörbétől*. Ezt jellemzi a görbe **torziója**. Ha a görbe síkgörbe, akkor az a sík, amelyben a görbe elhelyezkedik, a görbe simulósíkja; ha a görbe nem síkgörbe, akkor a simulósíkja pontról pontra változhat, és ezt a csavarodást a simulósík normálvektorának, azaz a görbe binormálisának a változásával lehet mérni. *A torzió lényegében a binormális egységvektor ívhossz szerinti szögsebessége*. Részletesebben: ha a térgörbe P_0 és Q pontjában vett simulósíkok hajlásszöge $\Delta\beta$, és Δs a PQ ív hossza, akkor a változás sebességét nyilván a

$$\tau = \lim_{Q \rightarrow P_0} \frac{\Delta\beta}{\Delta s}$$

szám méri. Ezt „alkalmas” módon célszerű átalakítani; hasonlóan ahhoz, ahogy ezt a görbületnél megmutattuk. A részleteket itt nem ismertetjük, az érdeklők ezt megtalálják *Szőkefalvi-Nagy Gyula, ...* tankönyvének 26. oldalán. Itt csupán azt emeljük ki, hogy kiderül, ez a szám minden esetben nemnegatív. További érdekesség az, hogy τ -nak előjelet is célszerű tulajdonítani; és ennek érdekes geometriai jelentése is van. (A görbét – pl. egy csavar menetének az élét – *jobb-* vagy *balcsavarodásúnak* szokás nevezni aszerint, amint a torzió pozitív vagy negatív; sőt éppen ez a geometriai motivációja a torzió előjelezésének.) A számolások azt mutatnák, hogy

$$\kappa = \kappa(P_0) = \kappa(s_0) = -\langle \mathbf{b}'(s_0), \mathbf{n}(s_0) \rangle$$

(itt \mathbf{b} a binormális-, \mathbf{n} pedig a főnormális egységvektorok.)

Ezután a 2. és a 3. Frenet-formulából adódik az, hogy az fenti „természetes” módon megközelített torzió valóban az általunk *definiált* torzióval egyezik meg. ■

T2. Frenet-formulák: Legyen $\Gamma \subset \mathbb{R}^3$ egy egyszerű sima görbe, L az ívhossza, $\kappa(s)$ a görbülete és $\tau(s)$ a torziója ($s \in [0, L]$). Tegyük fel, hogy Γ -nak van háromszor folytonosan deriválható paraméterezése. Ekkor a kísérő triédert megadó $\mathbf{e}, \mathbf{n}, \mathbf{b} : [0, L] \rightarrow \mathbb{R}^3$ folytonosan deriválható függvények az alábbi lineáris differenciálegyenlet-rendszernek tesznek eleget:

$$\begin{aligned}\mathbf{e}'(s) &= \kappa(s) \cdot \mathbf{n}(s), \\ \mathbf{n}'(s) &= -\kappa(s) \cdot \mathbf{e}(s) + \tau(s) \cdot \mathbf{b}(s), \\ \mathbf{b}'(s) &= -\tau(s) \cdot \mathbf{n}(s).\end{aligned}$$

- F37.** Legyen $\Gamma \subset \mathbb{R}^3$ egy egyszerű sima (tér)görbe, és tegyük fel, hogy $\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow \Gamma$ ennek egy tetszőleges, kétszer folytonosan deriválható paraméterezése; $t_0 \in (\alpha, \beta)$ és $\varphi(t_0) = P_0 \in \Gamma$. Igazolja, hogy a görbe P_0 pontjában a torzióra a

$$\tau(P_0) = \frac{\varphi'(t_0) \varphi''(t_0) \varphi'''(t_0)}{|\varphi'(t_0) \times \varphi''(t_0)|^2}$$

képlet érvényes. (Itt a számlálóban a három vektor *vegyesszorzata* áll.)

Megjegyzés. Ennek az állításnak a bizonyítását – ami megtalálható *Szőkefalvi–Nagy Gyula*, ... tankönyvének 27. oldalán – nem kérjük, a megjegyzését azonban elvárjuk. ■

- F38.** Számítsa ki az alábbi görbék torzióját a megadott pontokban:

- (a) $\varphi(t) := (a \cos t, a \sin t, bt)$ ($t \in \mathbb{R}, a, b > 0$), $t_0 := 3$;
- (b) $\varphi(t) := (t^3 - 2t^2, 3t + 2, t^2 - 5)$ ($t \in \mathbb{R}$), $t_0 := 1$;
- (c) $\varphi(t) := (e^t, e^{-t}, \sqrt{2}t)$ ($t \in \mathbb{R}$), $t_0 := 1$;
- (d) $\varphi(t) := (2t - \sin(2t), \cos(2t), 4 \sin t)$ ($t \in \mathbb{R}$), $t_0 := \frac{\pi}{4}$;
- (e) $\varphi(t) := (2abt, a^2 \ln t, b^2 t^2)$ ($t > 0, a, b > 0$), $t_0 := 1$;
- (f) $\varphi(t) := (3t^2 - 2t, t^3, 1 - t)$ ($t \in \mathbb{R}$), $P_0 := (8, 8, -1)$;
- (g) $\varphi(t) := (3t^2, 2t + 3, 3t^3)$ ($t \in \mathbb{R}$), $P_0 := (3, 1, -3)$;
- (h) $\varphi(t) := (t, \frac{t^3}{3a^2}, \frac{a^2}{2t})$ ($t > 0, a > 0$), $P_0 := (1, \frac{1}{3a^2}, \frac{a^2}{2})$.

- F39.** Bizonyítsa be, hogy egy térgörbe akkor és csak akkor síkgörbe, ha a torziója minden pontban nulla.

Útmutatás. Ha a görbe síkgörbe, akkor bármely két pontjához tartozó simulósíkok hajlásszögére $\triangle\beta = 0$, ezért a görbe minden pontjában a torzió nulla.

Ha viszont a görbe minden pontjában a torzió nulla, akkor az $\mathbf{b}'(s) = -\tau(s)\mathbf{n}(s)$ 3. Frenet-formula miatt $\mathbf{b}' \equiv 0$, azaz $\mathbf{b}(s) \equiv \mathbf{b}_0$, ahol \mathbf{b}_0 egy állandó vektor. Ha a görbét ívhossz szerint paraméterezzük, akkor a görbeív minden \mathbf{r} pontjában

$$(\langle \mathbf{r}, \mathbf{b}_0 \rangle)' = \langle \mathbf{r}', \mathbf{b}_0 \rangle = \langle \mathbf{e}, \mathbf{b}_0 \rangle,$$

azaz $\langle \mathbf{r}, \mathbf{b}_0 \rangle = \langle \mathbf{r}_0, \mathbf{b}_0 \rangle$, ahol \mathbf{r}_0 szintén egy állandó vektor. Mivel $\langle \mathbf{r} - \mathbf{r}_0, \mathbf{b}_0 \rangle = 0$, ezért a görbeív minden pontja benne van a \mathbf{b}_0 normálvektorú, \mathbf{r}_0 helyvektorú P_0 ponton átmenő síkban. ■

- F40.** Igazolja, hogy az alábbi görbék mindegyike síkgörbe, és írja fel a görbe síkjának az egyenletét:

- (a) $\varphi(t) := (t^2 - 2t, 3t - 5, -t^2 - 2)$ ($t \in \mathbb{R}$);
- (b) $\varphi(t) := (5 \cos t, 5 \sin t, \cos t)$ ($t \in \mathbb{R}$);
- (c) $\varphi(t) := (e^t \cos t, e^t \sin t, e^t(\cos t + \sin t))$ ($t \in \mathbb{R}$);
- (d) $\varphi(t) := (\frac{1+t}{1-t}, \frac{1}{1-t^2}, \frac{t}{1+t})$ ($t \in (-1, 1)$).