





1. Considere, em cada alínea, a função $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, I um intervalo, representada graficamente por



Para cada alínea esboce, caso exista, o gráfico de uma função F , primitiva de f em I , sabendo que:

- (a) $I = [0, 5]$ (c) $I = [0, 4]$ e $F(0) = -2$
(b) $I = [-1, 1]$, $f(x) = 1 - x^2$ e $F(0) = 0$ (d) $I = [0, 4]$ e $F(0) = 1$
2. Seja $f : [0, 5] \rightarrow \mathbb{R}$ representada graficamente na figura ao lado. Considere uma função primitiva de f , $F : [0, 5] \rightarrow \mathbb{R}$.



- (a) Encontre os pontos críticos de F .
- (b) Classifique os pontos críticos de F .
3. Calcule os seguintes integrais indefinidos

(a) $\int (3x^2 - 2x^5) dx$	(g) $\int \frac{2x+1}{x^2+x+3} dx$	(m) $\int \frac{\sqrt{1+3\ln a}}{a} da$
(b) $\int (\sqrt{x}+2)^2 dx$	(h) $\int \frac{t}{3-t^2} dt$	(n) $\int z \operatorname{sen} z^2 dz$
(c) $\int (2\theta+10)^{20} d\theta$	(i) $\int \frac{1}{4-3x} dx$	(o) $\int \frac{1}{x(\ln^2 x + 1)} dx$
(d) $\int x^4(x^5+10)^9 dx$	(j) $\int \operatorname{th} x dx$	(p) $\int \left(\frac{2}{x}-3\right)^2 \frac{1}{x^2} dx$
(e) $\int y^2 e^{y^3} dy$	(k) $\int \frac{1}{e^{3x}} dx$	(q) $\int \operatorname{sen}(\pi - 2x) dx$
(f) $\int \sqrt{2x+1} dx$	(l) $\int \frac{-7}{\sqrt{1-5x}} dx$	

4. Usando primitivação por partes calcule:

(a) $\int \ln x dx$	(g) $\int x^2 \operatorname{sen} x dx$	(m) $\int \frac{\operatorname{arcsen} \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx$
(b) $\int x \operatorname{sen}(2x) dx$	(h) $\int x \operatorname{sen} x \cos x dx$	(n) $\int x \operatorname{arctg} x dx$
(c) $\int \operatorname{arctg} x dx$	(i) $\int \ln^2 x dx$	(o) $\int x^2 \ln x dx$
(d) $\int x \cos x dx$	(j) $\int e^x \cos x dx$	(p) $\int \operatorname{sen}(\ln x) dx$
(e) $\int \ln(1-x) dx$	(k) $\int \operatorname{arcsen} x dx$	(q) $\int \operatorname{ch} x \operatorname{sen}(3x) dx$
(f) $\int x \ln x dx$	(l) $\int e^{\operatorname{sen} x} \operatorname{sen} x \cos x dx$	(r) $\int x^3 e^{x^2} dx$

5. Encontre F , uma primitiva da função f , sabendo que $F(1) = 0$. A solução encontrada é única?

(a) $f(x) = \operatorname{sen} x \cos x$

(c) $f(x) = \operatorname{sen}^2 x$

(b) $f(x) = \operatorname{sen}(2x) \cos x$

(d) $f(x) = \frac{1}{x}, x > 0$

6. Sendo $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^2 \operatorname{sen} x$, encontre a primitiva de f cujo gráfico passa pelo ponto $(\frac{\pi}{2}, \pi)$.

7. Calcule os seguintes integrais indefinidos.

(a) $\int \frac{3x^2 - 4x - 1}{(x^2 - 1)(x - 2)} dx$

(c) $\int \frac{4x^2 + x + 1}{x^3 - x} dx$

(e) $\int \frac{x^4 - 8}{x^3 - 2x^2} dx$

(b) $\int \frac{2x^2 + x + 1}{(x - 1)(x + 1)^2} dx$

(d) $\int \frac{27}{x^4 - 3x^3} dx$

(f) $\int \frac{x + 3}{(x - 2)(x^2 - 2x + 5)} dx$

8. Calcule os seguintes integrais indefinidos usando a substituição indicada.

(a) $\int x\sqrt{x-1} dx, \quad x = t^2 + 1$

(c) $\int \frac{e^{2x}}{1 + e^x} dx, \quad x = \ln t$

(b) $\int \sqrt{1 - x^2} dx, \quad x = \operatorname{sen} t$

(d) $\int \sqrt{1 + x^2} dx, \quad x = \operatorname{sh} t$

9. Calcule os seguintes integrais indefinidos

(a) $\int \frac{x}{x^2 - 1} dx$

(h) $\int (\sqrt{2x-1} - \sqrt{1+3x}) dx$

(p) $\int \frac{x e^{\sqrt{1-x^2}}}{\sqrt{1-x^2}} dx$

(b) $\int \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}} dx$

(i) $\int \frac{1}{x} (1 + \ln^2 x) dx$

(q) $\int \frac{1}{\cos^2 x \operatorname{sen}^2 x} dx$

(c) $\int \frac{1}{x} \operatorname{sen}(\ln x) dx$

(j) $\int \frac{2 + \sqrt{\operatorname{arctg}(2x)}}{1 + 4x^2} dx$

(r) $\int \cos^2 x \operatorname{sen}^2 x dx$

(d) $\int \frac{-3}{x(\ln x)^3} dx$

(k) $\int \frac{e^{\operatorname{arctg} x}}{1 + x^2} dx$

(s) $\int \frac{1}{1 + e^x} dx$

(e) $\int \frac{e^x}{1 + e^{2x}} dx$

(l) $\int \frac{\operatorname{sen} x}{\sqrt{1 + \cos x}} dx$

(m) $\int \frac{1}{(2 + \sqrt{x})^7 \sqrt{x}} dx$

(f) $\int \frac{e^x}{1 - 2e^x} dx$

(n) $\int \operatorname{tg}^2 x dx$

(t) $\int \frac{1}{x\sqrt{x^2 - 1}} dx$

(g) $\int \frac{1}{\cos^2(7x)} dx$

(o) $\int \frac{x + [\operatorname{arcsen}(3x)]^4}{\sqrt{1 - 9x^2}} dx$

(u) $\int \frac{1}{x^2 \sqrt{4 - x^2}} dx.$

10. Em cada alínea, determine a única função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, duas vezes derivável, tal que:

(a) $f''(x) = 4x - 1, \quad x \in \mathbb{R}, \quad f(1) = 3 \quad \text{e} \quad f'(2) = -2;$

(b) $f''(x) = \operatorname{sen} x \cos x, \quad x \in \mathbb{R}, \quad f(0) = 0 \quad \text{e} \quad f'(0) = 1.$