

Factors Influencing Academic Stress and Resilience of Nursing Students on College Life Adaptation

Eunhee Kim & Injoo Kim

Abstract: The purpose of this study is a descriptive research study to identify predictors of college life adaptation through academic stress and resilience of nursing students. The subjects who participated in this study were 174 nursing college students enrolled in the nursing departments of universities in D and K cities as final research subjects. collected through Data were analyzed by means and standard deviation, t-test, ANOVA, Pearson correlation, and hierarchical regression analysis using IBM SPSS 20.0. As a result, academic stress showed a negative correlation with college life adaptation, and resilience showed a positive correlation with college life adaptation. In addition, the factors affecting the college life adjustment of nursing students were major satisfaction and resilience, and the explanatory power was 30.5%. In particular, in this study, resilience was confirmed as an important factor in predicting college life adaptation of nursing students. Therefore, based on the results of this study, it is suggested that the development of various non-curricular programs is required to strengthen resilience and improve major satisfaction in order to increase college life adaptation of nursing students.

Key Words: Nursing Student, Academic Stress, Resilience, College Life Adaptation, Major Satisfaction

간호대학생의 학업스트레스와 회복탄력성이 대학생활적응에 미치는 영향

김 은 희* · 김 인 주**

요약: 본 연구의 목적은 간호대학생의 학업스트레스와 회복탄력성을 통해 대학생활적응의 예측요인을 파악하기 위한 서술적 조사연구이다. 본 연구에 참여한 대상자는 D시와 K시 소재 대학의 간호학과에 재학 중인 간호대학생 174명을 최종연구대상자로 선정하였고, 자료수집은 2020년 11월 1일에서 12월 31일까지 구조화된 설문지를 통해 수집하였다. 자료는 IBM SPSS 20.0을 이용하여 평균과 표준편차, t-test, ANOVA, Pearson 상관관계, 위계적 회귀분석으로 분석하였다. 그 결과 학업스트레스는 대학생활적응에 부적상관관계를 나타내었고, 회복탄력성은 대학생활적응에 정적상관관계를 나타내었다. 또한 간호대학생의 대학생활적응에 영향을 미치는 요인은 전공만족도, 회복탄력성이었고, 설명력은 30.5%이었다. 특히 본 연구에서 회복탄력성은 간호대학생의 대학생활적응을 예측하는데 중요한 요인으로 확인되었다. 따라서 본 연구결과를 통해 간호대학생의 대학생활적응도를 높이기 위해 회복탄력성을 강화와 전공만족도를 향상시킬 수 있는 다양한 비교과프로그램 개발이 요구됨을 제언한다.

핵심어: 간호대학생, 학업스트레스, 회복탄력성, 대학생활적응, 전공만족도

□ 접수일: 2021년 7월 28일, 수정일: 2021년 8월 20일, 게재확정일: 2021년 8월 20일

* 주저자, 경남도립거창대학 간호학과 조교수

(First Author, Professor, Geochang Univ., Email: kkkeh35@hanmail.net)

** 교신저자, 경남도립거창대학 간호학과 초빙교수

(Corresponding Author, Professor, Geochang Univ., Email: kitty4861234@naver.com)

www.kci.go.kr

I. 서론

대학시절은 청소년 시기에서 성인기로 이행하는 과도기로 경제적·사회적 독립을 위해 준비하는 시기이면서, 불완전한 자아정체성과 불확실한 미래, 그리고 과도한 경쟁 등으로 많은 심리적·정신적 부담을 경험하게 되는 시기이다(김유정·유하나·박미정, 2016). 대학생은 입학과 동시에 그 시기에 성취해야 할 성장 발달과업에 도달하기 위해 반드시 대학생활적응을 위한 노력을 수행해야 한다(최효진·이은주, 2012). 대학생활적응은 학생들이 대학이라는 새로운 환경 속에서 직면하게 되는 다양한 요구에 적절히 대처하며 대학 내 인적·물적 환경과 자신의 특성 간의 상호작용을 통한 환경적응을 의미한다(차남현, 2016).

최근 심각한 취업난으로 개인의 적성과 흥미보다 취업의 안전성을 더 우선시 하는 경향이 높고 이로 인하여 타 전공에 비해 간호학과를 지원하는 학생 수가 급증하고 있다(박홍주·김남희, 2020). 대학 진학을 위한 전공선택에서 학생 개개인의 적성과 흥미에 대한 고려없이 취업률이 높은 학과를 우선시 하여 전공을 선택하게 되는 경우 결국 학생들이 대학생활을 하는 동안 대학과 학과 부적응 및 학업에 대한 흥미 결여로 인한 스트레스로 중도포기로 이어지는 경향이 두드러지게 나타나고 있다(강명희·이수연, 2013). 특히 간호학은 학문의 특성상 대학현장에서 배운 간호지식과 기술을 통합하여 적용하는 임상실습교과목을 이수하기 위하여 간호 대학생들은 새롭고 낯선 임상 환경 속에서 환자와 보호자 및 보건의료인과 상호관계를 통해 예비 간호사로서의 역할을 수행하고 익히는 과정 속에서 학생들은 많은 부담과 스트레스를 경험하게 된다(이지원·어용숙, 2013; 차선경·이은미, 2014).

학업스트레스란 학업으로 인해 유발되는 부정적 심리상태, 즉 학생들이 학업으로 인하여 긴장, 근심, 우울, 초조감 등의 심리를 경험하는 정도를 말한다(김정아·김인아, 2018). 특히, 간호대학생은 전공지식을 획득하기 위한 노력과 이를 근간으로 간호술기와 병원임상현장 실습을 단계별로 기초에서 심화·통합과정을 4년간 정해진 시수를 이수하고, 이후에는 국가고시를 통해 간호사 면허 시험을 합격해야 하는 엄격한 교육과정을 거친다. 이러한 교육과정의 엄격함은 타 학과에 비해 높은 학업스트레스를 경험하고 있음을 보고되고 있다(박홍주·김남희, 2020).

이처럼 간호대학생은 높은 학업스트레스로 인하여 신체적 건강문제와 더불어 우울, 불안, 좌절 등과 같은 정신적 문제를 경험하고 있다(이지원·어용숙, 2013; 차선경·이은미, 2014). 따라서 초기에 스트레스를 파악하고 적절하게 관리하는 것은 스트레스와 연관된 문제들을 감소시키고 대학생활적응 촉진의 중요한 자원이기도 하다(차남현, 2016). 그러므로 학업과

실습으로 인한 시간적 제약으로 적극 대응할 수 없는 간호대학생에게 학업스트레스 완화와 대학생활적응을 도모할 수 있는 대처방안이 매우 중요하다고 사료된다.

최근 스트레스에 대한 긍정적인 관점으로 회복탄력성에 대한 연구가 진행되고 있다(Connor & Davidson, 2003). 회복탄력성은 역경을 경험한 사람들이 역경을 극복하고 정신적으로 성장해 나가는 개념이다. 또한, 회복탄력성은 다양한 환경에서 융통성 있는 문제해결능력과 관계가 있다는 점에서 간호대학생이 경험하는 부정적 스트레스와도 밀접한 관계가 있다(Connor & Davidson, 2003). 회복탄력성은 개인과 환경의 역동적 상호작용을 통해 점진적으로 형성되는 것이고 교육이나 훈련으로 향상시킬 수 있는 능력이며, 특히 과중한 학업 스트레스와 임상실습 스트레스에 처해져 있는 간호대학생에게는 절실히 요구되는 요소이다(박흥주·김남희, 2020).

따라서 본 연구에서는 간호대학생의 학업스트레스와 회복탄력성이 대학생활적응에 미치는 영향을 규명하고, 그 결과를 통해 향후 간호대학생의 대학생활적응을 도모하는데 요구되는 비교과프로그램 개발의 기초자료로 활용하고자 한다.

II. 연구방법

1. 연구설계

본 연구는 간호대학생의 학업스트레스와 회복탄력성이 대학생활적응에 미치는 영향을 파악하기 위한 서술적 조사연구이다.

2. 연구대상

본 연구의 대상자는 D시와 K시 소재 대학에서 재학중인 간호학과 재학생으로 본 연구의 목적과 방법을 이해하고 연구에 참여하기를 스스로 동의한 자이다. 본 연구를 위해 필요한 표본수는 G*Power 3.1.9 프로그램을 이용하여 확인한 결과 다중회귀분석을 위해 필요한 효과크기 .15, 유의수준 .05, 검정력 .80, 예측변수의 수 10으로 분석하였을 때 180명이 요구되었으나, 대상자의 무응답율을 고려하여 190명을 표집하였다. 회수된 설문지 중 불성

실한 응답을 한 16부를 제외한 174부가 설문지 분석에 이용하였다.

3. 연구도구

1) 학업스트레스

본 연구에서 학업스트레스를 측정하기 위하여 사용된 도구는 박병기·박선미(2012)가 개발한 설문지로, 총 45개 문항으로 구성되어 있다. 측정방법은 6점 Likert척도로 ‘확실히 아니다.’ 1점에 ‘확실히 그렇다.’ 6점으로 점수가 높을수록 학업스트레스가 높은 것을 의미한다. 도구 개발당시 신뢰도는 Cronbach’s α 는 .73~.91이었고, 본 연구에서 Cronbach’s α 는 .85이었다.

2) 회복 탄력성

본 연구에서 회복탄력성을 측정하기 위하여 Connor & Davidson(2003)가 개발한 CD-RISC (Connor-Davidson resilience)를 활용하였다. 본 도구는 총 25문항으로 구성된, 5점 Likert척도인데, 점수가 높을수록 회복탄력성이 높은 것을 의미한다. 개발당시 도구의 신뢰도는 Cronbach’s α 는 .88이었고, 본 연구에서 Cronbach’s α 는 .91이었다.

3) 대학생활적응

본 연구에서 대학생활적응을 측정하기 위하여 박신영(2017)이 개발한 간호대학생 대학생 활적응 도구를 사용하였다. 도구의 구성은 총 34문항이고, 측정방법은 5점 Likert척도로 ‘전혀 그렇지 않다’ 1점에서 ‘매우그렇다’ 5점으로 점수가 높을수록 대학생활 적응도가 높음을 의미한다. 부정적인 문항인 전반적 대학생활적응의 11, 16, 17문항, 현장실습 적응의 1, 2, 3, 4, 5문항은 역환산 처리하였다. 개발당시 도구의 신뢰도는 Cronbach’s α 는 .92이었고, 본 연구에서 Cronbach’s α 는 .85이었다.

4. 자료 수집 방법

본 연구의 자료수집은 2020년 11월 1일부터 12월 31일까지 수행되었다. 자료수집방법은 연구진이 대상자에게 본 연구의 목적을 상세히 설명하였고, 본 연구에 동참할 의사가 있는

학생들에게 한하여 연구동의서를 받은 후 사전에 준비된 구조화된 설문지를 배부하였다. 취합된 설문지는 본 연구의 목적 이외에 다른 목적으로 활용되지 않을 것과 참여한 대상자에 대한 익명성은 철저히 보장됨 등에 대해 상세히 설명하고 설문지 시작 페이지에도 명시하였다. 참여한 대상자에게는 소액의 선물을 각각 배부하여 감사의 표시를 하였다.

설문지 응답시간은 10-15분 정도 소요되었다, 취합한 설문지는 190부이었고, 이 중 불성실하게 응답한 16부를 제외한 174부를 통계처리하였다.

5. 자료분석

본 연구는 IBM SPSS Statistics version 20.0 프로그램을 이용하여 자료를 분석하였다. 연구대상의 인구 사회학적 특성과 변수의 특성을 살펴본 후, 다음과 같이 분석을 하였다. 첫째, 연구대상자의 인구 사회적 특성은 실수와 백분율, 대상자의 학업스트레스, 회복탄력성, 대학생활적응 정도는 평균과 표준편차를 실시하였다. 둘째, 인구 사회학적 특성에 따른 대학생활적응 수준을 살펴보기 위해 t-test와 one-way ANOVA, 사후검증은 Scheffe test를 이용하였다. 셋째, 연구 대상자의 학업스트레스, 회복탄력성, 대학생활적응 간의 상관관계를 알아보기 위해 Pearson's correlation coefficient를 이용하였다. 넷째, 연구대상자의 대학생활적응에 영향을 미치는 요인을 살펴보기 위해 hierarchical regression을 실시하였다. 다섯째, 통계량의 유의 수준은 .05로 정하였다.

III. 연구결과

1. 인구 사회학적 특성

본 연구에 참여한 대상자의 인구사회학적 특성은 <표 1>과 같다. 먼저 성별은 73.6%가 여학생이고, 26.4%는 남학생이다. 나이는 19-22세가 86.2%를 차지하였다. 친한 친구 수에 대한 질문에서 4-5명 정도가 51.7%로 가장 높게 나타났다. 재학기간 동안 기거 유형은 기숙사에서 생활하는 간호대학생이 54.0%로 가장 많았고, 그 다음 자가에서 생활하는 학생이 26.4%를 차지하였다.

〈표 1〉 인구 사회학적 특성

변수	구분	n	%
성별	남자	46	26.4
	여자	128	73.6
연령	19-22	150	86.2
	23-28	22	12.6
	28세 이상	2	1.2
임상실습경험유무	없다	89	51.1
	있다	85	48.9
친한친구수	1-3명	41	23.6
	4-5명	90	51.7
	6명이상	43	24.7
재학기간동안 기거 여부	자택	46	26.4
	기숙사	94	54.0
	자취	34	19.5
간호학과 지원동기	자발적	40	23.0
	부모님, 선생님 권유	44	25.3
	성적에 맞추어	60	34.5
	취업을 위해	30	17.2
전공만족 여부	만족하지 않는다	4	2.3
	보통이다.	67	38.5
	만족한다.	103	59.2
학교성적	2.0-3.0	15	8.6
	3.0-4.0	136	78.2
	4.0이상	23	13.2
동아리 활동 유무	참여한다.	104	59.8
	참여하지 않는다.	70	40.2
동아리 활동 적극성	적극적이지 않다.	4	2.3
	보통이다.	43	24.7
	적극적이다.	23	13.2

간호학과에 지원하게 된 동기를 보면 성적에 맞추어서 지원한 학생이 34.5%, 선생님 혹은 부모님의 권유 25.3%, 자발적으로 23.0%, 높은 취업률은 17.2%이었다. 간호학에 대한 만족도에 대한 문항에서는 만족한다고 응답한 학생이 59.2%로 높게 나타났고, 동아리 활동 참여에 대한 질문에서는 59.8%가 참여하는 것으로 나타났다.

2. 학업스트레스, 회복탄력성, 대학생활적응 정도

대상자의 학업스트레스의 평균 점수는 187.4(± 1.05)점, 회복탄력성의 평균 점수는 75.3

(± 0.50), 대학생활적응의 평균 점수는 $61.8(\pm 0.43)$ 이었다.

〈표 2〉 간호 대학생의 학업스트레스, 회복탄력성, 대학생활적응 정도

변수	최저	최고	Mean $\pm$ SD
학업스트레스	40.0	261.0	187.4 ± 1.05
회복탄력성	50.0	97.0	75.3 ± 0.50
대학생활적응	21.0	96.0	61.8 ± 0.43

3. 대상자의 인구사회학적 특성에 따른 대학생활적응 수준

본 연구 대상자의 인구사회학적 특성에 따른 대학생활적응 수준을 확인한 결과, 통계적으로 유의한 결과를 나타낸 변수로는 임상실습경험이 없는 학년이 임상실습경험이 있는 학년 비해 대학생활적응이 더 높은 것으로 나타났으며($t=.578$, $p=.002$), 전공만족도가 높은 학생이 대학생활적응을 더 잘하는 것으로 나타났다($F=-2.947$, $p=.004$). 또한, 동아리 활동을 하는 학생들이 하지 않는 학생보다 대학생활적응이 더 높은 것으로 나타났다($t=1.084$, $p=.005$).

〈표 3〉 대학생의 일반적 특성에 따른 대학생활적응정도의 차이

변수	구분	Mean $\pm$ SD	t or F	p Scheffe
성별	남자	61.74 ± 16.20	-.605	.548
	여자	87.70 ± 15.19		
연령	19-22	70.74 ± 16.30	.034	.549
	23-28	41.74 ± 14.28		
	28세 이상	61.74 ± 16.30		
임상실습경험유무	없다	71.74 ± 15.30	.578	.002
	있다	61.74 ± 16.30		
친한친구수	1-3명	51.54 ± 14.30	.016	.899
	4-5명	75.83 ± 16.28		
	6명 이상	61.74 ± 15.39		
재학기간동안 기거 여부	자택	41.74 ± 14.24	.029	.368
	기숙사	52.57 ± 17.82		
	자취	31.74 ± 16.30		
간호학과 지원동기	자발적	41.44 ± 14.30	.074	.465
	부모님, 선생님 권유	56.54 ± 13.13		
	성적에 맞추어	59.74 ± 16.29		
	취업을 위해	32.61 ± 16.30		

전공만족 여부	만족하지 않는다 보통이다 만족한다	31.74±14.26 40.54±15.37 71.74±16.30	-2.947	.004
학교성적	2.0-3.0 3.0-4.0 4.0이상	41.74±15.29 51.65±16.31 61.04±14.31	.053	.475
동아리 활동 유무	참여한다 참여하지 않는다	81.74±14.39 61.54±15.41	1.084	.005
동아리 활동 적극성	적극적이지 않다 보통이다 적극적이다	31.74±15.27 65.74±16.29 51.74±15.30	.142	.175

4. 임상실습경험, 전공만족도, 동아리활동, 학업스트레스, 회복탄력성, 대학생활적응 간의 상관관계

본 연구대상자의 임상실습경험, 전공만족도, 동아리활동, 학업스트레스, 회복탄력성, 대학생활적응 간의 상관관계는 <표 4>와 같다. 대학생활적응과 학업스트레스는 통계적으로 유의한 부적 상관관계($r = -.200$, $p = .004$)를 나타냈고, 회복탄력성($r = .686$, $p = .001$), 전공만족도($r = .432$, $p = .004$)와는 통계적으로 유의한 양적 상관관계를 나타내었다.

<표 4> 변수의 상관관계 분석

	임상실습 경험 유무	전공 만족도	동아리활동 적극성	학업 스트레스	회복 탄력성	대학생활 적응
임상실습경험	1	.222 (.068)	.237 (.074)	.457 (.089)	.687 (.984)	.686 (.084)
전공만족도		1	.358 (.068)	.485 (.084)	.345 (.085)	.432 (.004)
동아리활동			1	.11 (.245)	-.17 (.078)	.32 (.003)
학업 스트레스				1	.017 (.826)	-.200 (.004)
회복탄력성					1	.686 (.001)
대학생활적응						1

5. 대학생활적응에 영향을 미치는 요인

본 연구대상자의 대학생활적응에 영향을 미치는 요인에 대한 분석은 <표 5>와 같다. 먼저 회귀분석의 가정을 검정한 결과 회귀식의 모든 조건이 충족되었다. 오차의 자기 상관성 검증에서는 Durbin-Watson통계량이 1.659으로 독립변수 간의 자기상관이 없었다. 변수에 대한 공차한계는(tolerance)는 .596~.964로 모두 0.1 이상이었고, 분산팽창 요인(variation inflation factor: VIF)값은 1.088로 기준인 10에 미치지 못하므로 다중공선성의 문제는 없었다.

간호대학생의 대학생활적응에 영향을 미치는 요인을 살펴보기 위해 위계적 회귀분석은 모두 세 가지의 단계를 이용하였다. Model 1에서는 대학생활적응에 일차적으로 영향을 미치는 동아리 활동, 임상실습경험, 전공만족여부를 투입시켰다. 현재 동아리 활동($\beta=.118$, $p<.05$)과 전공만족($\beta=.24$, $p<.05$)이 대학생활적응에 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다. Model 1의 설명력은 19.7%($F=5.210$, $p<.001$)로 나타났다. Model 2에서는 학업스트레스를 포함시키고 위계적 회귀분석을 실시한 결과 전공만족($\beta=.310$, $p<.05$)이 대학생활적응에 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다. Model 2의 설명력은 30.1%($F=5.319$, $p<.001$)로 나타났다. Model 3에서는 회복탄력성을 포함시켜 위계적 회귀분석을 실시한 결과 전공만족도($\beta=.214$, $p<1.0$)와 회복탄력성($\beta=.302$, $p<.05$)이 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났고, 설명력은 30.5%($F=4.783$, $p<.001$)로 나타났다.

<표 5> 대학생활적응에 미치는 영향요인

Variables	Model 1			Model 2			Model 3		
	β	t	p	β	t	p	β	t	p
동아리 활동 유	.118	.309	.003	.01	.035	.972	-.01	-.10	.922
동아리 활동 무	.432	.84	.391	.310	.045	.852	.29	2.01	.048
임상실습경험 유	.088	.837	.405	.105	1.082	.283	.099	1.001	.320
임상실습경험 무	.251	2.508	.024	.173	1.798	.076	.162	1.652	.103
전공만족도 유	.24	.405	.004	.310	.327	.003	.214	.058	.004
전공만족도 무	.532	.20	.364	.066	.59	.556	.061	.52	.587
학업스트레스				.340	.62	.981	.32	.54	.854
회복탄력성							.302	.359	.024
R ²	.243			.383			.386		
Adj. R ²	.197			.301			.305		
F(p)	5.210(.000)			5.319(.000)			4.783(.000)		

IV. 결론 및 논의

대학생들의 대학생활적응은 학업수행능력에 긍정적 영향을 미칠 뿐 아니라 그들의 사회적 관계 형성에도 영향을 미치므로 대학생활 부적응은 개인적·사회적으로 다양한 문제를 발생할 가능성이 있다(최효진·이은주, 2012). 특히 우리나라 대학생들은 초등학교부터 고등학교까지 주입식교육 방식에 길들여져 있다가 대학생이 되면서 자기주도적으로 학업을 수행함으로써 오는 중압감으로 인하여 큰 혼란을 경험하며 이로 인하여 대학생들의 학업스트레스가 매우 크게 나타나고 있는데(박신희·민형덕·고현, 2020), 과중한 학업스트레스는 결국 학교생활적응에도 부정적 영향을 미치게 된다.

따라서 본 연구에서는 간호대학생들의 대학생활적응에 영향을 미치는 요인을 파악하고 그 결과를 기초로 대학생활적응 향상을 위한 비교과활동 프로그램 개발을 위한 기초자료로 활용하고자 시도된 서술적 조사연구이다.

먼저 본 연구 대상자인 간호 대학생의 일반적 특성에 따른 대학생활적응에 관한 결과에서는 임상실습경험 유무, 전공만족도, 동아리 활동경험 유무에 따라 통계적으로 유의한 차이가 있는 것으로 나타났다. 즉 임상실습경험이 없는 1, 2학년이 임상실습경험이 있는 3, 4학년에 비해 대학생활적응이 통계적으로 더 높은 것으로 나타났고($F=.578, p=.004$), 전공만족도가 높을수록 대학생활적응 정도가 더 높게 나타났다($F=-2.947, p=.004$). 동아리 활동을 하는 학생들이 하지 않는 학생보다 대학생활적응이 더 높게 나타났다($t=1.084, p=.005$).

본 연구결과를 지지하는 선행연구인 홍세화·김지수·주도빈(2020)의 연구에서 임상실습경험이 있는 3, 4학년을 대상으로 연구한 결과에서 동아리 활동, 간호학과 지원동기, 거주 환경, 교수와 상담횟수에서 유의한 차이가 있는 것으로 보고하였는데, 특히 동아리활동에 참여하는 학생이 참여하지 않는 학생보다 대학생활적응 정도가 더 높게 나타났다. 그리고 강영숙·황선경(2013)의 연구, 박신희(2017)의 연구, 이재검·김원종(2021)의 연구에서는 전공만족도가 높은 학생이 대학생활적응 정도가 높은 것으로 나타나, 본 연구결과를 지지하였다.

전공만족도는 현재 자신이 속한 학과에 대한 평가 산물로 미래 직업에 대한 비전이 높을수록 전공만족도는 높게 나타나 학과 수업 참여에 더욱 적극적으로 노력(강영숙·황선경, 2013; 박신희, 2017; 이재검·김원종, 2021)할 뿐 아니라 동아리 활동에도 적극성을 나타낸다는 선행연구 결과보고(오윤희, 2019)가 있다. 따라서 간호대학생의 대학생활적응 정도

를 높이기 위해서는 전공만족이 중요한 요소임을 알 수 있고, 간호대학생의 전공만족도를 향상시키기 위한 다양한 방안을 모색하는 것은 중요한 사안임을 알 수 있다.

본 연구에서는 임상현장실습경험이 없는 학년 보다 임상현장실습경험이 있는 학년에서 대학생활적응이 더 낮게 나타났는데, 본 연구를 지지하는 선행연구(박신희·민형덕·고현, 2020)를 찾아보면 임상실습교과목과 복합적으로 이루어지는 학년에서부터 실습으로 인한 긴장과 스트레스, 학업의 과중함 등으로 인하여 대학생활만족도가 급격히 떨어진다는 연구결과를 보고하였다. 따라서 본 연구에서는 임상실습경험 유무에 따라 1, 2학년 보다 임상현장실습경험이 있는 3, 4학년 두 그룹으로 나누었고 3학년부터 임상현장실습이 교과목으로 구성되어 있는 점을 고려해볼 때 전공교과목과 임상현장실습교과목을 동시에 학습하면서 오는 학업의 과중도가 1, 2학년에 비해 높고, 특히 전공교과목에서 배운 간호이론을 임상현장실습을 수행하는 과정에서 통합 및 적용하는 과정에서 오는 과중한 학업부담과 다양한 심리적 부담감이 타학과 학생들보다 대학생활적응이 더 어려울 수 있다는 보고(이재겸·김원종, 2021)는 본 연구 결과를 뒷받침하고 있다.

이상의 결과를 통해 볼 때 후속연구에서는 간호대학생들의 대학생활적응도에 대해 학년별 차이와 그 요소를 파악하고 그에 따른 대안을 찾기 위한 연구를 지속하여 간호대학생들의 대학생활적응도를 높이기 위한 노력을 지속할 것을 제언한다.

스트레스를 근본적으로 제거한다는 것은 현실적으로 불가능하므로, 대학생들이 겪고 있는 학업스트레스로 인한 대학생활 부적응 문제를 완화하기 위해서는 대학생들이 학업스트레스를 경험하면서도 이에 적응 및 대처해 나아갈 수 있도록 하는 요인이 무엇인지를 확인하는 연구가 매우 중요하리라 사료된다. 특히 회복탄력성은 대학생들이 대학생활적응에 긍정적 영향을 미치는 것으로 여러 문헌을 통해 확인할 수 있었다(김유정·유하나·박미정, 2016).

본 연구의 대상자들의 대학생활적응의 예측요인으로 학업스트레스, 회복탄력성, 동아리활동경험, 임상실습경험, 전공만족도이었고, 그 중 가장 큰 영향을 미치는 요인으로 회복탄력성으로 나타났다. 본 연구결과를 지지하는 이재겸·김원종, 2021의 연구에서도 회복탄력성이 대학생활적응에 가장 영향력이 큰 요인으로 보고하였다.

대학생활적응에 대한 실패는 환경 부적응으로 인한 심리적 불안과 우울 및 스트레스 등으로 새로운 환경으로 전환하기 위한 욕구로 중도탈락의 발생과 새로운 환경의 적응에 지속적 어려움으로 적응위기를 경험할 가능성이 높아(박신희·민형덕·고현, 2020) 이에 대한 대처로 대학생들의 대학생활적응을 강화시킬 수 있는 방안은 매우 시급하다.

이상의 연구결과를 통하여 볼 때 간호 대학생들의 대학생활적응력을 높이기 위해서는 대

학생의 회복탄력성을 강화하기 위한 노력이 무엇보다 중요하다는 것을 확인할 수 있었다. 회복탄력성은 스트레스를 무조건 회피하는 것이 아니라 스트레스에 노출되었을 때 불안하고 극복불능이라고 느끼는 위기적 심리상태에서 원래의 안정된 심리상태로 되찾는 능력을 의미한다(박홍주·김남희, 2020). 따라서 회복탄력성의 강화는 단순히 개인적 노력만으로는 강화가 어려우므로 재학기간 동안 대학과 학과 자체에서 이를 개발 및 성장시킬 수 있도록 다양한 프로그램 적용과 체험활동 등의 지원과 노력은 매우 시급하고 중요하리라 사료된다. 또한 동아리 활동과 같은 다양한 비교과활동 프로그램을 통해 간호 대학생들의 대학생활적응 효과를 검증하는 연구도 중요하다고 사료된다.

본 연구의 목적은 간호 대학생의 대학생활적응에 미치는 영향을 파악하여 대학생활적응을 증진시키기 위한 비교과활동 프로그램 개발을 위한 기초자료로 활용하기 위함이다. 본 연구에서는 간호 대학생의 대학생활적응에 미치는 중요한 요소로 회복탄력성을 확인하였다.

본 연구 결과를 근거로 다음과 같이 제언을 하고자 한다. 첫째, 간호대학생의 대학생활적응에 영향을 미치는 다양한 변수를 추가하여 반복 연구를 할 필요가 있다. 둘째, 간호 대학생의 대학생활적응을 증진시키기 위해 비교과활동프로그램 개발과 그 효과를 검증하는 연구를 제언하는 바이다.

【참고문헌】

- 강명희·이수연(2013), “청소년의 학업스트레스와 심리적 안녕감의 관계에서 희망 및 자아탄력성의 매개효과”, 『한국청소년학회』, 20(6): 265-293.
- 강영숙·황선경(2013), “간호대학생의 자아존중감과 전공만족도 및 진로동기와의 관련성”, 『한국산학기술학회』, 14(7): 3301-3309.
- 김유정·유하나·박미정(2016), “간호대학생의 전공선택동기가 전공만족도, 대학생활만족도 및 자기주도 학습능력에 미치는 영향”, 『한국산학기술학회지』, 17(10): 261-270.
- 김정아·김인아(2018), “전문대학생의 아르바이트 경험과 사회적지지, 자아탄력성이 진로스트레스에 미치는 영향”, 『한국산학기술학회논문지』, 19(4): 463-471.
- 박병기·박선미(2012), “학업스트레스 척도의 개발 및 타당화”, 『한국교육심리학회』, 26(6): 563-585.
- 박신영(2017), “간호대학생의 대학생활적응 측정도구 개발”, 단국대학교 대학원 박사학위논문.
- 박신희·민형덕·고현(2020), “대학생이 인식한 학업 및 취업스트레스와 대학생활적응 관계에서 회복탄력성과 사회적지지의 매개효과”, 『학습자중심교과교육학회지』, 20(8): 719-744.
- 박홍주·김남희(2020), “간호대학생의 임상실습 스트레스, 회복탄력성 및 우울과의 관계”, 『경북간호과학지』, 24(2): 21-29.
- 오윤희(2019), “간호대학 신입생의 대인관계 능력이 대학생활 적응에 미치는 영향: 공감능력의 매개효과”, 남부대학교 대학원 석사학위논문.
- 이재겸·김원종(2021), “간호대학생의 회복 탄력성과 성격유형이 전공만족도에 미치는 영향”, 『한국산학기술학회』, 22(6): 100-107.
- 이지원·어용숙(2013), “간호대학생의 임상실습 스트레스와 스트레스 대처방식이 대학생활적응에 미치는 영향”, 『보건의료산업학회』, 7(2): 125-134.
- 차남현(2016), “대학생의 학업 스트레스와 학교생활적응”, 『지역사회간호학회지』, 27(2): 124-131.
- 차선경·이은미(2014), “간호대학생과 일반대학생의 스트레스, 우울 및 자살사고 비교”, 『한국간호교육학회지』, 20(4): 650-658.
- 최효진·이은주(2012), “간호 대학 신입생의 학업스트레스와 대학생활적응의 관계에서 자기효능감의 매개효과”, 『기본간호학회지』, 19(2): 261-268.

홍세화·김지수·주도빈(2020), “간호대학생의 회복탄력성이 학업스트레스와 학업성취도에 미치는 영향”, 『한국융합학회논문지』, 11(9): 443-450.

Connor, K. M. & J. R. Davidson(2003), “Development of a new resilience scale: the Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC)”, 『Depression and Anxiety』, 18(2): 76-82.