

The Effect on Self-care Through Mindfulness Programs Based on the Eightfold Path: Focusing on Care Workers

Eunsoon Yang & Kyunghwa Jang

Abstract: This study is aimed to verify that mindfulness programs have an effect on their own self-care as these programs based on the Eightfold Path are carried out by care workers. After considering two groups consisting of the experimental group with 14 care workers in K city of Gyeongsangbuk-do and the controlled group with 14 members of the local club in the same area, the homogeneity is verified and the effectiveness is investigated based on the pretest and posttest designs between two groups. With the measurement of levels in mindfulness awareness, self-esteem and their job stress of the experimental group, the Eightfold Path programs proved to be effective in easing the burn-out of care workers. These care workers can achieve the self-care through the mindfulness training on the basis of the Eightfold Path, and prevent their own burn-out by engaging in constant self-reflection and implement the repetitive mindfulness training. And the follow-up study related to the self-care in implementing the mindfulness training of care workers by various age categories and job groups is required.

Key Words: the Eightfold Path, Mindfulness, Self-care, Burn-out, Stress

팔정도에 기초한 마음챙김 프로그램이 자기돌봄에 미치는 효과: 돌봄종사자를 중심으로*

양 은 순** · 장 경 화(자목)***

연구 목적: 본 연구는 돌봄종사자를 대상으로 팔정도에 기초한 마음챙김 프로그램을 실시하여 마음챙김 프로그램이 자기돌봄에 효과가 있는지를 검증하는데 목적이 있다.

연구 방법: 연구 방법으로 경북 K시의 돌봄종사자 14명의 실험집단과 같은 지역의 동호회 회원 14명의 통제집단을 구성하여, 두 집단 간의 사전-사후검사 설계를 바탕으로 동질성과 효과성을 분석하였다.

연구 내용: 실험집단의 마음챙김 주의자각, 자아존중감 및 스트레스의 척도를 측정하여 팔정도 프로그램이 무기력증에 처한 돌봄종사자들에게 유의미한 효과가 있음을 검증하였다.

결론 및 제언: 팔정도에 기초한 마음챙김 훈련을 통해 돌봄종사자들은 자기돌봄을 이룰 수 있으며 꾸준한 자기성찰과 반복적인 마음챙김 훈련으로 무기력증을 예방할 수 있다. 다양한 연령대와 직군별로 마음챙김 훈련에 따른 자기돌봄 효과와 관련된 후속 연구가 필요하다.

핵심어: 팔정도, 마음챙김, 자기돌봄, 무기력증, 스트레스

□ 접수일: 2023년 5월 9일, 수정일: 2023년 5월 29일, 게재확정일: 2023년 6월 20일

* 이 논문은 2022년 대한불교진흥원의 연구비 지원에 의해 이루어졌음.

** 주저자, 동국대학교 WISE 캠퍼스 불교학과 박사과정수료(First Author, Completion of Doctoral Course, Dongkuk Univ.(WISE), Email: yes318@daum.net)

*** 교신저자, 동국대학교 WISE 캠퍼스 교양융합교육원 교수

(Corresponding Author, Professor, Dongkuk Univ.(WISE), Email: everviriya@hanmail.net)

www.kci.go.kr

I. 서론

현대 의료기술의 발달은 사람들의 수명을 연장하면서 급속도로 고령화를 촉진하고 있다. 고령화로 파킨슨, 만성질환, 알츠하이머와 같은 치매 등이 발생한다. 현재 고령화 사회로 돌봄이 필요한 인구가 급증하는 만큼 돌봄종사자 또한 상대적으로 많이 필요하다. 그렇지만 돌봄종사자들이 필요한 곳은 비단 노인에게만 국한되어 있는 것은 아니다. 사회가 발달할수록 질병과 사고는 더욱 다양해지고, 이로 인한 만성질환 환자, 죽음이 임박한 말기 암환자, 또는 장애를 갖고 있는 자녀, 육아나 신생아 등 도처에서 돌봄종사자들이 필요한 실정이다.

도움이 필요한 누군가를 같은 장소에서 반복적으로 돌보는 일이 돌봄종사자들의 주 업무다. 이는 육체적·정신적 피로를 초래할 수 있고 돌봄종사자는 이로 인한 무기력감과 계속되는 스트레스 등으로 무기력증(burnout)을 호소하고 있다. 특히 가족 간의 돌봄은 가족 구성원 중 누군가의 희생으로 이어질 수 있어서 문제가 더욱 심각하다. 가족 중 누군가가 치매나 만성질환을 앓고 있는 경우, 언제 끝날지 모르는 불안은 보호자들에게 압박감과 스트레스로 이어져 ‘간병살인’이나 ‘동반자살’과 같은 극단적인 사례로 이어지기도 하는데 이러한 추세는 점차 늘어나고 있다. 이러한 현상을 두고 전문가들은 보호자들이 오랜 돌봄으로 피로와 스트레스가 쌓여 극단적인 행동을 일으켰다고 보고 있다. 따라서 이러한 비극의 악순환을 끊어내기 위해서는 돌봄서비스 같은 공공서비스 등의 확충뿐만 아니라 지금까지 등한시한 돌봄 종사자 또는 보호자들에 대한 심리 대책이 필요해 보인다(심기문, 2020).

무기력증은 특정 분야가 아닌 돌봄이 필요한 모든 직무군이나 가정에서 발생할 수 있다. 앞서 언급한 바와 같이 현대사회는 돌봄에 종사하는 많은 인력을 요구하는 만큼 돌봄종사자들의 무기력증에 따른 자기돌봄의 중요성이 대두된다. 따라서 현재 돌봄 스트레스로 인해 무기력증을 경험하고 있는 돌봄종사자가 각자의 일상에서 언제든지 스스로 활용할 수 있는 자기돌봄 프로그램이 절실히 요구되는 상황이다.

인간의 뇌는 일생에 걸쳐 지속해 변화할 수 있는 신경가소성 능력을 갖추고 있다. 하지만 스트레스에 노출되면 코르티솔이라는 호르몬이 분비되어 우울증, 불안, 불면증, 무기력증과 같은 부작용을 일으킬 수 있다. 또한 특정한 생각과 행동이 반복되면 그에 따른 신경회로가 강화되어 습관 형성에 영향을 미치게 되는데, 새로운 것을 배우고 실행하여 반복하면 뇌에서는 새로운 사고 프로세스가 형성되어 기존의 신경회로를 바꿀 수 있다. 따라서 긍정적인 생각을 반복하면 뇌에서는 긍정적인 변화를 이루는 신경 회로가 확대되어진다(Gazelle, 2021).

따라서 본 연구는 현재 돌봄을 하고 있거나 예전에 행했었던 사람들을 대상으로 돌봄 종사자가 돌봄 스트레스에 따른 무기력증 문제를 해결하기 위해, 새로운 사고 과정의 전환 방법으로써 불교의 실천 수행인 팔정도 마음챙김 프로그램을 제안하고 이 마음챙김 프로그램을 통해 자기 자신의 돌봄(능력)에 어떤 도움이 되는지를 탐구하고자 한다.

선행연구의 동향을 살펴보면 1970년대 존카밋진은 ‘마음챙김에 기반을 둔 스트레스 완화’(MBSR: mindfulness-based stress reduction) 프로그램을 개발하였다. 이 프로그램은 불교명상을 주류 의학계에 성공적으로 도입시켰으며 2000년 이후 미국의 주요 의료기관 관련 클리닉이 200곳 이상 개설되어 스트레스와 관련된 질병 치료에 널리 사용되고 있다(안양규, 2011). 국내에서도 마음챙김을 기반으로 한 스트레스(정현갑 외, 2007), 자살예방(장경화, 2022) 프로그램 등 마음챙김에 대한 효과를 입증하는 논문이 있다. 자기돌봄에 대한 논문으로는 심리적 건강과 실무 적응에 어려움을 겪는 신규간호사(이지윤 외, 2015), 호스피스 병동에서 환자를 돌보는 자원봉사자(이성경, 2022), 물리치료사(장경화·김민재, 2022) 등을 대상으로 한 내용이 주를 이루고 있다. 그러나 팔정도와 관련된 마음챙김 논문은 찾아보기 어렵고, 팔정도의 올바른 이해를 기반한 마음챙김 프로그램이 돌봄종사자 자신의 자기돌봄에 어떠한 영향을 미치는지에 대한 연구는 전무하다.

본 프로그램은 돌봄종사자가 현장에서 현재 경험하고 있는 몸과 마음에서 일어나는 현상을 관찰자 입장에서, 집착 또는 편견 없이 있는 그대로를 볼 수 있는 방법을 제시한다. 따라서 팔정도를 기반으로 한 마음챙김 프로그램이 돌봄종사자들의 자기돌봄에 어떤 기능을 반영할 수 있는지 규명할 필요가 있다고 본다.

본 연구는 돌봄 스트레스에 따른 무기력증의 대처 방법으로 팔정도에 기초한 마음챙김 프로그램을 구성하고 그 구성요소인 마음챙김과 자아존중감, 스트레스 감소가 실제로 돌봄종사자들의 자기돌봄에 어떤 효과가 있는지를 입증하고자 한다. 본 프로그램은 자신을 보호하며 동시에 돌봄 대상자를 보호할 방법의 하나이며 무기력증 예방에 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.

II. 팔정도의 이론적 배경

1. 바른 견해(正見)

바른 견해는 사성제를 올바르게 이해하는 것이며 선과 불선을 명확하게 아는 것이다(이중표, 2020). 선과 불선이란 우리의 삶이 행복해지는 데 있어 유익한 것인지 해로운 것인지에 따라 나뉜다. 그러므로 바른 견해는 일상에서 실천하여 자신의 삶을 변화시키는 힘을 가지게 된다.

2. 바른 사유(正思惟)

바른 사유는 바른 견해를 바탕으로 탐심이 없고 성냄이 없고 다른 사람에게 해를 끼치지 않는 방향으로 마음을 돌이키는 것을 말한다. 올바른 사유는 우리의 마음이 일어나는 모든 생각과 감정을 관찰하고 그것들이 선한 것인지 불선한 것인지 판단할 수 있는 지혜를 의미한다(일묵, 2013).

3. 바른 언어(正語)

바른 언어는 바른 견해와 바른 사유를 바탕으로 한다. 바른 언어는 거짓말 또는 타인에 대한 비방, 이간질, 거친 말, 쓸데없는 말을 하지 않고 상대방에게 진실하고 이롭게 하는 말, 화합시키는 말을 하는 것이다.

4. 바른 행위(正業)

바른 행위는 몸으로 행하는 바른 행위를 말한다. 함부로 산 생명을 죽이거나 남이 주지 않는 물건을 훔치거나 다른 사람의 배우자를 취하는 행위 등을 하지 않는 것을 말한다. 즉, 타인에게 자비와 봉사, 보시 등을 행하며 다른 이들에게 해를 끼치지 않는 것이다.

5. 바른 생계(正命)

바른 생계는 올바른 생계 수단을 말한다. 무기 거래, 인신매매, 술 또는 마약 판매 등 비도덕적이거나 부정적인 방식으로 돈을 벌거나, 삶을 유지하는 것을 지양하는 것을 말한다.

6. 바른 노력(正精進)

바른 노력은 불선을 버리고 선을 계발하는 노력을 말한다. 이미 일어난 불선은 버리고 아직 일어나지 않은 불선은 일어나지 않도록 하고, 이미 생겨난 선은 더욱 증장하고 아직 일어나지 않은 선은 일어나게 하는 것이다.

7. 바른 마음챙김(正念)

바른 마음챙김은 현재 자신의 몸과 느낌, 마음, 심리작용을 있는 그대로 알아차리는 것을 말한다. 마음챙김은 대상과 직면하여 있는 그대로 볼 수 있고, 바르게 사유하여 대상에 깊이 들어갈 수 있는 역할을 한다.

8. 바른 집중(正定)

바른 집중은 마음챙김에서 기인한 평온한 마음 상태를 말한다. 이때 마음은 고요해지고 행복을 경험하게 된다. 모든 현상이 무상하고 무상하기에 괴로움이며 고정되거나 변하지 않는 실체가 없다는 사실을 통찰하는 것이다.

III. 연구방법

1. 연구설계 및 연구대상

팔정도에 기초한 마음챙김 프로그램을 실험집단과 통제집단으로 나누어 실험집단을 대상으로 2022년 10월 1일부터 10월22일까지 4주간에 걸쳐 1주 2회기, 회기별 2시간씩 총 16시간을 실시하였다. 실험집단의 경우 사전검사는 프로그램 1회기 시작 전에 실시하였고, 사후검사는 8회기를 마치고 실시하였다. 통제집단의 사전·사후검사는 실험집단의 검사 일정에 맞춰 실시하였다.

본 프로그램의 연구는 실험집단과 통제집단의 사전사후 설계를 사용하였으며 두 집단 간

의 비교 분석을 위하여 마음챙김 주의자각과 스트레스, 자아존중감 척도를 사용하였다.

본 연구의 대상자인 실험집단과 통제집단은 모두 성별과 나이가 비교적 유사한 비율로 구성하였다. 실험집단은 K시의 간호사, 요양보호사, 자원봉사자 등 14명으로 구성하였고, 통제집단은 같은 지역의 동호회 회원 14명으로 구성하였다.

2. 팔정도 마음챙김 프로그램 구성 및 세부 내용

1) 프로그램 구성

팔정도에 기초한 마음챙김 프로그램은 팔정도의 이론적 이해와 팔정도를 삶에 적용하기 위한 다양한 활동과 명상 실습으로 구성되었다. 이 프로그램의 목적은 무기력증을 예방하기 위한 자기돌봄이다. 자기 돌봄은 자기 자신에게 관심을 가지고 자기 자신을 보살피는 것으로 마치 자기 자신을 대할 때 다른 사람을 돌보는 것처럼 일상생활에서 자신을 보호할 방법을 익히는 것이다(안양규, 2019). 특히 본 프로그램의 명상 실습은 자신에게 불선한 마음이나 불편한 상황이 다가올 때 어떤 대상이나 장소에 구애 없이 언제든지 자기 자신의 호흡이나 몸으로 돌아가 실천할 수 있도록 간결하게 구성하였다. 따라서 팔정도의 8가지 요소를 자신의 생활에 잘 갖추면 돌봄종사자 자신의 여러 가지 스트레스가 감소할 것이다.

2) 회기별 프로그램 활동의 세부 내용

회기	제 목	활동 세부 내용
1	바른 견해	• 오리엔테이션 • 사전 설문지 작성 • 팔정도와 라이프 밸런스의 상관관계 • 바른 견해에 대한 이해 • 명상실습: 숫자세기 명상
2	바른 사유	• 바른 사유에 대한 이해 • 행복아 넌 누구니 • 다른 이로부터 받은 친절함의 경험 • 나와 우리 이심전심 • 자기 돌봄 방법 설명 • 명상실습: 걷기명상

3	바른 언어	• 바른 언어에 대한 이해 • 나에게 위로 되는 말 • 마음챙김 보자기 아트 I • 명상실습: 호흡명상
4	바른 행위	• 바른 행위에 대한 이해 • 우리, 공존할 수 있는가 • 명상실습1: 바디스캔 명상 • 명상실습2: 동작명상
5	바른 생계	• 바른 생계에 대한 이해 • 마음챙김 보자기 아트 II • 명상실습1: 바디스캔 명상 • 명상실습2: 나를 위한 자비 명상
6	바른 노력	• 바른 정진에 대한 이해 • 팔정도와 라이프 밸런스와 나의 일에 대한 자부심 • 명상실습: 퍼즐 만다라 명상
7	바른 마음챙김	• 바른 마음챙김에 대한 이해 • 임상사례 말기환자 동영상 시청 • 명상실습1: 호흡명상 • 명상실습2: 자애명상
8	바른 집중	• 바른 집중에 대한 이해 • 팔정도를 나의 일상으로 • 사후 설문지 작성 • 개별 인터뷰

3. 측정도구

1) 마음챙김 주의자각 척도(Mind Attention Awareness Scale)

현재 일어나고 있는 것에 대한 주의와 자각의 정도를 측정하는 도구이다. 질문지는 총 15문항이며 단일 요인으로 구성되었다. 일상생활에서 각 문항에 해당되는 상황들의 경험에 대한 빈도를 ‘거의 항상 그렇다’에서 ‘거의 그렇지 않다’까지 6점 척도로 평가한다. 점수가 높을수록 마음챙김 수준이 높은 것으로 보며, 주위에서 일어나는 일들에 대해 지각수준이 높은 것을 의미한다(한국심리학회 심리검사심의회위원회, 2011).

2) 돌봄종사자 스트레스 척도

본 연구에서는 연구대상자들이 느끼는 스트레스 정도를 단일문항인 5점 척도로 구성하였

으며, 점수가 높을수록 스트레스 또한 높다는 것을 의미한다.

3) 자아존중감 척도

개인의 자아존중감을 측정하기 위한 도구이다. 질문지는 총 10문항이며 단일 차원의 척도이다. 처음 설계는 고등학생들의 자아존중감을 측정하기 위한 것이었으나 오랜 시간에 걸쳐 점차적으로 광범위한 집단에 대한 연구를 시행하며 또한 다양한 집단에 적용하게 되었다. 각 문항은 4점 척도로, 점수가 높을수록 자아존중감이 높은 것을 의미한다(서초구립 반포종합사회복지관·서울대학교 실천사회복지연구회, 2007).

4. 자료 분석 방법

본 연구는 SPSS 21.0을 활용하여 다음과 같이 자료를 분석하였다.

첫째, 측정도구의 신뢰도 검증과 연구참여자의 인구학적 특성에 대한 기술통계를 실시하였다. 둘째, 실험집단과 통제집단 간의 사전 동질성을 검증하기 위해 Mann-Whitney U test를 실시하였다. 셋째, 연구참여자의 수가 적을 때는 모수를 가정하기 어렵기 때문에 모수 검정을 통해 발생할 수 있는 오류를 줄이는 데 비모수 검정이 효과적이다(장경화·김소정, 2022 재인용). 따라서 본 연구에서도 마음챙김 프로그램의 사전-사후 간 유의미한 차이를 알아보기 위해 비모수 검정인 Wilcoxon 부호순위검정을 실시하였다.

IV. 연구결과

1. 척도의 신뢰도 검증

본 연구에서 활용한 척도의 신뢰도를 검증한 결과, 마음챙김 주의자각 척도는 Cronbach's $\alpha = .949$, 스트레스 척도는 Cronbach's $\alpha = .710$, 자아존중감 척도는 Cronbach's $\alpha = .780$ 로, 모두 Cronbach's $\alpha = .60$ 보다 높게 나타나 신뢰할 수 있는 척도임을 알 수 있다. 신뢰도 검증 결과는 <표 2>와 같다.

〈표 2〉 신뢰도 검증

척도	항목수	Cronbach's α
마음챙김 주의자각	15	.949
스트레스	1	.710
자아존중감	10	.780

2. 실험집단과 통제집단의 일반적 특성

마음챙김 프로그램에 참여한 돌봄 종사자들의 인구학적 특성을 알아보기 위해 기술통계를 실시하였다. 실험집단과 통제집단의 돌봄 종사자는 각각 14명으로, 분석결과는 〈표 3〉과 같다.

〈표 3〉 연구참여자의 인구학적 특성

구분		실험집단 N(%)	통제집단 N(%)
성별	남	1(7.1%)	3(21.4%)
	여	13(92.9%)	11(78.6%)
연령	50세 미만	2(14.3%)	11(78.6%)
	50세 - 54세	5(35.7%)	3(21.4%)
	55세 - 59세	3(21.4%)	0(0.0%)
	60세 이상	4(28.6%)	0(0.0%)
돌봄 경력	3년 미만	5(35.7%)	13(92.9%)
	3년 이상 - 6년 미만	3(21.4%)	0(0.0%)
	6년 이상 - 9년 미만	3(21.4%)	0(0.0%)
	9년 이상	3(21.4%)	1(7.1%)

3. 실험집단과 통제집단의 동질성 검증

마음챙김 프로그램을 실시하기 전에, 실험집단과 통제집단의 주요 변수들에 대한 동질성 검증을 위해 Mann-Whitney U test를 실시하였으며, 그 결과는 〈표 4〉와 같다. 동질성 검증에 대한 결과를 좀 더 자세히 살펴보면, 마음챙김 주의자각은 실험집단의 평균이 3.84 점, 통제집단의 평균은 4.49점으로, 두 집단 간에는 통계적으로 유의미한 차이가 나타나지

않았다($U=66.0$, $p=.141$). 스트레스는 실험집단과 통제집단의 평균이 각각 3.21점과 2.57점으로 나타나 마찬가지로 두 집단 간에 통계적으로 유의미한 차이가 없는 것을 알 수 있다($U=65.5$, $p=.120$). 마지막으로 자아존중감은 실험집단의 평균이 2.73점, 통제집단의 평균은 2.91점으로, 두 집단의 평균 차이가 통계적으로 유의미하지 않은 것으로 나타났다($U=67.5$, $p=.159$).

따라서 주요 변수에 대한 실험집단과 통제집단의 평균을 비교한 결과, 두 집단 간에는 통계적으로 유의미한 차이가 나타나지 않았으므로 동질성이 확보되었다고 볼 수 있다.

〈표 4〉 실험집단과 통제집단의 동질성 검증

구분	집단	N	M(SD)	U	Z	p
마음챙김 주의자각	실험집단	14	3.84(1.09)	66.0	-1.473	.141
	통제집단	14	4.49(.83)			
스트레스	실험집단	14	3.21(1.19)	65.5	-1.553	.120
	통제집단	14	2.57(.85)			
자아 존중감	실험집단	14	2.73(.25)	67.5	-1.410	.159
	통제집단	14	2.91(.35)			

4. 프로그램의 효과성 검증

돌봄 종사자들을 대상으로 마음챙김 프로그램을 실시한 후, 실험집단과 통제집단의 주요 변수에 대한 사전-사후의 효과성 검증을 위해 Wilcoxon 부호순위검정을 실시하였으며, 그 결과는 〈표 5〉와 같다.

마음챙김 주의자각의 경우 실험집단의 평균이 사전검사($M=3.84$)에 비해 사후검사($M=4.74$)에서 0.9점이 증가하였으며, 이는 통계적($Z=-3.181$, $p<.01$)으로 유의미한 변화인 것으로 나타났다. 반면, 통제집단의 경우 사전검사($M=4.49$)에 비해 사후검사($M=4.63$)가 0.14점이 증가하였지만, 통계적($Z=-1.366$, $p>.05$)으로는 유의미한 차이가 없는 것으로 나타났다.

스트레스의 경우 실험집단의 평균은 사후검사($M=3.21$)가 사전검사($M=2.29$)보다 0.92점이 감소하여 통계적($Z=-2.511$, $p<.05$)으로 유의미한 수준에서의 변화임을 알 수 있었다. 그러나 통제집단의 평균은 사후검사($M=2.57$)가 사전검사($M=2.43$)보다 0.14점 감소하였지만, 통계적($Z=-.513$, $p>.05$)으로는 유의미하지 않은 것으로 나타났다.

자아존중감의 경우 실험집단의 평균이 사전검사($M=2.73$)에 비해 사후검사($M=2.99$)에서 0.26점이 증가하였으며, 이는 통계적($Z=-2.456$, $p<.05$)으로 유의미한 변화인 것으로 나타난 반면, 통제집단의 경우는 사전검사($M=2.91$)에 비해 사후검사($M=2.94$)의 변화가 0.03점으로 나타나 통계적($Z=-.962$, $p>.05$)으로도 유의미한 차이가 없음을 알 수 있었다.

이러한 결과를 통해 돌봄 종사자들에게 마음챙김 프로그램이 마음챙김 주의자각 수준을 향상시키고, 스트레스를 감소시키며, 자아존중감을 높이는 데 효과가 있다는 것이 검증되었다.

〈표 5〉 주요 변인에 대한 마음챙김 프로그램의 효과성 검증

구분	집단	N	사전	사후	점수변화	Z	p
마음챙김 주의자각	실험집단	14	3.84	4.74	+0.9	-3.181	.001**
	통제집단	14	4.49	4.63	+0.14	-1.366	.172
스트레스	실험집단	14	3.21	2.29	-0.92	-2.511	.012*
	통제집단	14	2.57	2.43	-0.14	-.513	.608
자아 존중감	실험집단	14	2.73	2.99	+0.26	-2.456	.014*
	통제집단	14	2.91	2.94	+0.03	-.962	.336

* $p<.05$, ** $p<.01$

V. 결론

본 연구는 팔정도를 기반으로 한 마음챙김 프로그램이 돌봄종사자들의 자기돌봄에 미치는 영향을 검증한 것이다. 돌봄종사자가 타인을 보살피는 과정에서 반복적으로 발생하는 스트레스를 완화하고자 부정적인 사고에서 긍정적인 사고로 전환을 시도한 것으로, 현재 자신이 경험하고 있는 그대로를 수용하고 일상생활에서 자신을 돌볼 수 있으며, 균형 있는 삶의 방향을 형성하는 데 도움을 주고자 함이 본 연구의 목적이다.

본 연구는 4주간에 걸쳐 주 2회, 매회 2시간씩 총 8회를 전·후반기로 나누어 마음챙김 프로그램을 진행하였다. 이에 따른 교육의 효과를 알아보기 위해 실험집단과 통제집단을 각각 14명으로 구분하고 그 집단들의 사전-사후검사 진행 결과를 비교 분석하였으며 그 결과는 다음과 같다.

첫째, 사전 검사에서는 프로그램에 참여한 실험집단이나 참여하지 않은 통제집단 모두 마음챙김 주의자각, 스트레스, 자아존중감 등의 동질성이 확인되었다.

둘째, 사후 검사에서는 실험집단의 참여자들에게 마음챙김 주의자각 수준을 향상하고, 스트레스를 감소시키며, 자아존중감을 높이는 데 팔정도 마음챙김 프로그램이 효과가 있다는 것이 검증되었다.

셋째, 팔정도 마음챙김 프로그램의 교육을 진행하지 않은 통제집단에서는 사후검사에서의 유의미한 결과가 나타나지는 않았다.

넷째, 연구 참여자들은 이번 프로그램에서 팔정도를 통해 선한 마음과 불선한 마음이 어떤 것인지 구체적인 내용을 알게 되었으며, 불선한 생각이나, 불편함을 경험할 때 몸의 자각도 함께 일어나 그것이 스트레스로 이어질 수 있음을 발견했다. 그리고 무엇보다도 마음챙김 프로그램 중 자기돌봄의 방법들이 일상생활에서 언제 나 쉽게 자신을 돌볼 수 있는 행위와 명상법이 다양하다는 것을 알게 되었다.

결과적으로, 스스로 자신을 돌볼 수 있는 안전한 방법 등에 대해 자신을 돌볼 수 있는 자신감이 프로그램 실행 전보다 상승한 것으로 확인되었다. 자기돌봄은 돌봄종사자인 자신은 물론 자신이 돌보고 있는 돌봄대상자에게도 필요한 것이다. 이에 따라 참가자들은 자기돌봄의 필요성과 효과를 체험하였다.

본 연구의 결과를 바탕으로 해당 연구의 한계와 후속 연구를 위한 제언은 다음과 같다.

첫째, 팔정도 마음챙김 프로그램은 처음 8주간에 걸쳐 교육을 실시하는 것으로 기획하였으나 참여자들 간의 시간 조율이 되지 않아 불가피하게 4주간으로 단축하였다. 물론 4주의 시간으로도 효과를 검증하기는 하였으나 후속 연구에서는 애초 기획대로 8주간에 걸쳐 시행해 4주와 비교해서 어떤 차이가 있을지 비교 분석해 볼 필요가 있다고 생각된다.

둘째, 본 연구의 실험집단과 통제집단의 대상은 중년여성에 편중되어 있다. 무기력증은 다양한 연령층과 다양한 직무군에서 일어나기 때문에 본 연구 결과를 일반화하는데 한계가 있을 수밖에 없다. 후속 연구에서는 다양한 환경, 조건들을 가진 대상자의 확대뿐만 아니라 프로그램의 시행 횟수나 시행 기간 등의 조정을 통해 연구 결과를 보다 일반화시킬 수 있을 것으로 여겨진다.

셋째, 팔정도 프로그램은 특히 개인의 역량과 꾸준한 점검에 따라 편차가 큰 수행이다. 자기돌봄이 익숙해지기 위해서는 무엇보다도 자신의 성찰이 필요하다. 따라서 추가로 동료들과의 나눔, 또는 전문지도자의 도움을 받고 점검할 필요가 있다.

본 연구의 팔정도 마음챙김 프로그램은 개인이 훈련해야 하는 수행 프로그램이다. 추후 돌봄종사자들이 스스로 자기돌봄이 익숙해지기까지는 계속된 실습과 정기적인 보수교육으로 이어질 수 있도록 프로그램을 보완할 수 있는 후속 연구가 필요하다.

【참고문헌】

- 게일 가젤(Gail Gazelle) 저, 손현선 역(2021), 『하버드 회복탄력성 수업』, 경기도: 현대지성.
- 서초구립 반포종합사회복지관·서울대학교 실천사회복지연구회(2007), 『실천가와 연구자를 위한 사회복지 척도집』(제2판), 서울: 나눔의 집.
- 심기문(2020), “돌봄의 굴레서 잇단 비극…“보호자 번아웃 대책 절실””, 『서울경제』 (11월 11일), <<https://www.sedaily.com/NewsView/1ZAD5DRQWQ>(2023. 5. 1. 검색)>.
- 일묵스님(2013), 『이해하고 내려놓기』, 서울: 궁리출판.
- 이성경(2022), “호스피스 자원봉사자를 위한 자비돌봄 프로그램 적용에 관한 연구”, 위덕대학교 일반대학원 박사학위논문.
- 이중표(2020), 『맞지마 니까야』, 서울: 불광출판사.
- 이지윤·이미자·박소영(2015), “신규간호사의 사회심리적 건강과 자기 돌봄이 실무 적응 어려움에 미치는 영향”, 『간호행정학회지』, 21(5): 459-468, <DOI: 10.1111/jkana.2015.21.5.459>.
- 안양규(2011), “MBSR(Mindfulness-Based Stress Reduction)의 개발과 불교의 영향”, 『불교학보』, (58): 267-297.
- 안양규(2019), 『붓다, 자기사랑을 말하다』, 경기도: 올리브그린향.
- 장경화·김소정(2022), “마음챙김-자기연민 프로그램이 물리치료사의 소진에 미치는 효과”, 『인문사회21』, 13(4): 1961-1973, <DOI: 10.22143/HSS21.13.4.136>.
- 장경화(2022), “마음챙김을 기반으로 한 온나(온전한 나)프로그램이 자살예방에 미치는 효과”, 『인문사회21』, 13(6): 2887-2898, <DOI: 10.22143/HSS21.13.6.198>.
- 장현갑·김정모·배재홍(2007), “한국형 마음챙김 명상에 기반한 스트레스 감소 프로그램의 개발과 SCL-90-R로 본 효과성 검증”, 『한국심리학회지』, 12(4): 833-850, <DOI: 10.17315/kjhp.2007.12.4.010>.
- 한국심리학회 심리검사심의위원회(2011), 『연구자를 위한 최신 심리척도북』, 서울: 학지사.

