

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS



Tarea 1:  
**Ejercicios**

*Luis Erick Montes Garcia* - 419004547  
*Hele Michelle Salazar Zaragoza* - 316068895

Trabajo presentado como parte del curso de **Matematicas Aplicadas para las Ciencias II** impartido por el profesor **Juan Carlos Balleza**.

Entrega 1 de Marzo 2019

**Link al código fuente:** [git@github.com:lemg98/Matematicas-Aplicadas-II.git](https://github.com/lemg98/Matematicas-Aplicadas-II.git)

1. Ejercicio 1. Sea  $\vec{a} = 3\hat{i} + 4\hat{j} + 5\hat{k}$  y  $\vec{b} = \hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$ . Calcule (y además represente gráficamente) cada una de las siguientes operaciones:

$$\begin{aligned} a) \vec{a} + \vec{b} \\ (3, 4, 5) + (1, -1, 1) \\ = (3+1, 4+(-1), 5+1) \\ = (4, 3, 6) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b) 6\vec{a} + 8\vec{b} \\ 6(3, 4, 5) + 8(1, -1, 1) \\ = (6 \cdot 3, 6 \cdot 4, 6 \cdot 5) + (8 \cdot 1, 8 \cdot -1, 8 \cdot 1) \\ = (18, 24, 30) + (8, -8, 8) \\ = (26, 16, 38) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c) -2\vec{a} \\ -2(3, 4, 5) \\ = (-2 \cdot 3, -2 \cdot 4, -2 \cdot 5) \\ = (-6, -8, -10) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} d) \vec{a} \cdot \vec{b} \quad (3, 4, 5) \cdot (1, -1, 1) \\ = (3 \cdot 1) + (4 \cdot (-1)) + (5 \cdot 1) \\ = 3 + (-4) + 5 \\ = 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} e) \vec{a} \times \vec{b} \quad (3\hat{i}, 4\hat{j}, 5\hat{k}) \times (\hat{i}, -\hat{j}, \hat{k}) \\ = ((4 \cdot 1) - (5 \cdot (-1)))\hat{i} + ((5 \cdot 1) - (3 \cdot 1))\hat{j} + (3 \cdot (-1) - (4 \cdot 1))\hat{k} \\ = (4+5)\hat{i} + (5-3)\hat{j} + (-3-4)\hat{k} \\ = 9\hat{i} + 2\hat{j} - 7\hat{k} \end{aligned}$$

2. Ejercicio 2. Encuentre las ecuaciones de rectas y planos que se piden:

- a) Recta que pasa por el punto  $(0,1,0)$  y su vector de dirección está dado por el vector  $3\hat{i} + \hat{k}$ .

**Solución:**  $(x, y, z) = (0, 1, 0) + \lambda(3, 0, 1) = (3\lambda, 1, \lambda)$ .

- b) La recta que pasas por los puntos  $(0, 2, -1)$  y  $(-3, 1, 0)$ .

**Solución:** Obtenemos el vector de dirección  $v = (0, 2, -1) - (-3, 1, 0) = (-3, 1, -1)$  y decimos  $(x, y, z) = (0, 2, -1) + \lambda(-3, 1, -1) = (-3\lambda, 2+\lambda, -1-\lambda)$ .

- c) La ec. del plano perpendicular al vector  $\langle -2, 1, 2 \rangle$  y que pasa por el punto  $P = (-1, 1, 3)$ .

**Solución:** Obtenemos el punto  $PX = (x - (-1), y - 1, z - 3)$  que debe ser perpendicular al vector normal. Por tanto  $(x + 1, y - 1, z - 3) \cdot (-2, 1, 2) = -2x - 2 + y - 1 + 2z - 6 = 0$ . Concluimos que la ecuación es  $2x - y - 2z + 9 = 0$ .

3. Ejercicio 3. Calcule  $\vec{v} \cdot \vec{w}$  para los siguientes vectores:

$$\begin{aligned} a) \vec{v} = -\hat{i} + \hat{j} \text{ y } \vec{w} = \hat{k} \\ \vec{v} = (-1, 1, 0) \text{ y } \vec{w} = (0, 0, 1) \\ (-1, 1, 0) \cdot (0, 0, 1) \\ = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b) \vec{v} = -2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k} \text{ y } \vec{w} = 3\hat{i} + 2\hat{j} - 2\hat{k} \quad (-2, -1, 1) \cdot (3, 2, -2) \\ = (-2 \cdot 3) + (-1 \cdot 2) + (1 \cdot -2) \\ = (-6) + (-2) + (-2) \\ = -6 - 2 - 2 \\ = -10 \end{aligned}$$

4. Ejercicio 4. Calcule  $\vec{v} \times \vec{w}$  para los vectores del ejercicio anterior.

$$a) \vec{v} = (-i, j, 0) \quad \vec{w} = (0, 0, k)$$

$$\begin{aligned} \vec{v} \times \vec{w} &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} i - \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} j + \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} k \\ &= (1-0)i - (0-(-1))j + (0-0)k \\ &= i - j \end{aligned}$$

$$b) \vec{v} = (-2i, -j, k) \quad \vec{w} = (3i, 2j, -2k)$$

$$\begin{aligned} \vec{v} \times \vec{w} &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ -2 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} i - \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} j + \begin{vmatrix} -2 & -1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} k \\ &= (2-2)i - (3-4)j + (-4+3)k \\ &= j - k \end{aligned}$$

5. Ejercicio 5. Encuentre el área del paralelogramo generado por los vectores del Ejercicio 3.

■ **Solución:** Tomamos los resultados del inciso anterior y decimos  $a = \sqrt{1^2 + 1^2 + 0^2} = \sqrt{2}u^2$ .

■ **Solución:** Tomamos los resultados del inciso anterior y decimos  $a = \sqrt{0^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{2}u^2$ .

6. Ejercicio 6. Encuentre el volumen del paralelepípedo determinado por los vertices  $A(0, 1, 0), B(1, 1, 1), C(0, 2, 0), D(3, 1, 2)$ .

**Solución:** Encontramos los vectores  $\vec{AB} = (1-0, 1-1, 1-0) = (1, 0, 1)$   
 $\vec{AC} = (0-0, 2-1, 0-0) = (0, 1, 0)$  y  $\vec{AD} = (3-0, 1-1, 2-0) = (3, 0, 2)$ .

$$\mathbf{V} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 2 \end{vmatrix} = \mathbf{2} - \mathbf{3} = -\mathbf{1}$$

Puesto que el volumen debe ser positivo este es  $1u^3$ .

7. Ejercicio 7. Multiplicar las matrices AB, y también hacer el producto BA. ¿Es cierto que AB=BA?

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} 3+0+0 & 0+0+0 & 3+0+1 \\ 2+0+0 & 0+0+0 & 2+0+1 \\ 1+0+0 & 0+0+0 & 1+0+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 4 \\ 2 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{BA} = \begin{pmatrix} 3+0+1 & 0+0+0 & 1+0+1 \\ 3+1+1 & 0+0+0 & 1+1+1 \\ 0+0+1 & 0+0+0 & 0+0+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 5 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$\therefore AB \neq BA$

8. Ejercicio 8

9. Ejercicio 9. Encuentre el volumen del paralelepipedo generado por los vectores  $(1, 0, 1)$ ,  $(1, 1, 1)$ ,  $(3, 2, 0)$ .

$$\vec{a} = (i, 0j, k), \vec{b} = (i, j, k) \text{ y } \vec{c} = (-3i, 2j, 0k).$$

$$|(a \times b) \cdot c|$$

$$\begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} i - \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} j + \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} k$$

$$(0-1)i - (1-1)j + (1-0)k$$

$$= -i + k \cdot (-3i, 2j, 0)$$

$$= -1(-3) + 0 + 0$$

$$= 3$$

10. Ejercicio 10

11. Ejercicio 11. El volumen de un tetraedro con aristas concurrentes  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  está dado por la expresión  $V = \frac{1}{6} \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$ .

- a) Exprese dicho volumen como un determinante.

$$V = \frac{1}{6} \vec{a} \cdot |\vec{b} \times \vec{c}|$$

- b) Calcule  $V$  cuando  $\vec{a} = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$ ,  $\vec{b} = \hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$ ,  $\vec{c} = \hat{i} + \hat{j}$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 1(0-1)i - 1(0-1)j + 1(1+1)k = -1 + 1 + 2 = 2$$

$$V = \frac{1}{6} \cdot 2 = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

12. Ejercicio 12

13. Ejercicio 13. Sea  $A = (0, 4)$ ,  $B = (3, 1)$  y  $C = (2, 10)$ .

- a) ¿Cuáles son las coordenadas del vector  $\vec{AB}$ , y del vector  $\vec{BA}$ .

$$\vec{AB} = (3i - 0i, 1j - 4j, 0k - 0k) = (3i, -3j, 0k)$$

$$\vec{BA} = (0i - 3i, 4j - 1j, 0k - 0k) = (-3i, 3j, 0k).$$

- b) ¿Cuáles son las coordenadas del vector  $\vec{AC}$ , y del vector  $\vec{BC}$ , y también  $\vec{AC} + \vec{CB}$ .

$$\vec{AC} = (-2i - 0i, -10j - 4j, 0k - 0k) = (-2i, -14j, 0k)$$

$$\vec{BC} = (-2i - 3i, -10j - 1j, 0k - 0k) = (-5i, -11j, 0k)$$

$$\vec{CB} = (3i + 2i, 1j + 10j, 0k - 0k) = (5i, 11j, 0k)$$

$$\vec{AC} + \vec{CB} = (-2i, -14j, 0k) + (5i, 11j, 0k) = (3i, -3j, 0k)$$

- c) Describa gráficamente por qué  $\vec{AC} + \vec{CB} = \vec{AB}$

14. Ejercicio 14