

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS



Tarea 1:
Ejercicios

Luis Erick Montes Garcia - 419004547
Hele Michelle Salazar Zaragoza - 316068895

Trabajo presentado como parte del curso de **Matemáticas Aplicadas para las Ciencias II** impartido por el profesor **Juan Carlos Balleza**.

Entrega 1 de Marzo 2019

Link al código fuente: [git@github.com:lemg98/Matematicas-Aplicadas-II.git](https://github.com:lemg98/Matematicas-Aplicadas-II.git)

1. Ejercicio 1. Sea $\vec{a} = 3\hat{i} + 4\hat{j} + 5\hat{k}$ y $\vec{b} = \hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$. Calcule (y además represente gráficamente) cada una de las siguientes operaciones:

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad \vec{a} + \vec{b} \\ (3, 4, 5) + (1, -1, 1) \\ = (3 + 1, 4 + (-1), 5 + 1) \\ = (4, 3, 6) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(b)} \quad 6\vec{a} + 8\vec{b} \\ \mathbf{6}(3, 4, 5) + \mathbf{8}(1, -1, 1) \\ = (6 \cdot 3, 6 \cdot 4, 6 \cdot 5) + (8 \cdot 1, 8 \cdot (-1), 8 \cdot 1) \\ = (18, 24, 30) + (8, -8, 8) \\ = (26, 16, 38) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(c)} \quad -2\vec{a} \\ -\mathbf{2}(3, 4, 5) \\ = (-2 \cdot 3, -2 \cdot 4, -2 \cdot 5) \\ = (-6, -8, -10) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(d)} \quad \vec{a} \cdot \vec{b} \quad (3, 4, 5) \cdot (1, -1, 1) \\ = (3 \cdot 1) + (4 \cdot (-1)) + (5 \cdot 1) \\ = 3 + (-4) + 5 \\ = 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(e)} \quad \vec{a} \times \vec{b} \quad (3\hat{i}, 4\hat{j}, 5\hat{k}) \times (\hat{i}, -\hat{j}, \hat{k}) \\ = ((4 \cdot 1) - (5 \cdot (-1)))\hat{i} + ((5 \cdot 1) - (3 \cdot 1))\hat{j} + (3 \cdot (-1) - (4 \cdot 1))\hat{k} \\ = (4 + 5)\hat{i} + (5 - 3)\hat{j} + (-3 - 4)\hat{k} \\ = 9\hat{i} + 2\hat{j} - 7\hat{k} \end{aligned}$$

2. Ejercicio 2

3. Ejercicio 3. Calcule $\vec{v} \cdot \vec{w}$ para los siguientes vectores:

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad \vec{v} = -\hat{i} + \hat{j} \text{ y } \vec{w} = \hat{k} \\ \vec{v} = (-1, 1, 0) \text{ y } \vec{w} = (0, 0, 1) \\ (-1, 1, 0) \cdot (0, 0, 1) \\ = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(b)} \quad \vec{v} = -2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k} \text{ y } \vec{w} = 3\hat{i} + 2\hat{j} - 2\hat{k} \quad (-2, -1, 1) \cdot (3, 2, -2) \\ = (-2 \cdot 3) + (-1 \cdot 2) + (1 \cdot -2) \\ = (-6) + (-2) + (-2) \\ = -6 - 2 - 2 \\ = -10 \end{aligned}$$

4. Ejercicio 4

5. Ejercicio 5. Encuentre el área del paralelogramo generado por los vectores del Ejercicio 3.

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad \vec{v} = (-i, j, 0) \quad \vec{w} = (0, 0, k) \\ \vec{v} \times \vec{w} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} i - \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} j + \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} k \\ (1 - 0)i - (-1 - 0)j + (0 - 0)k \end{aligned}$$

$$= i + j$$

$$(b) \vec{v} = (-2i, -j, k) \quad \vec{w} = (3i, 2j, -2k)$$

$$\begin{aligned} \vec{v} \times \vec{w} &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ -2 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} i - \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} j + \begin{vmatrix} -2 & -1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} k \\ &= (2-2)i - (4-3)j + (-4+3)k \\ &= -j - k \end{aligned}$$

6. Ejercicio 6

7. Ejercicio 7. Multiplicar las matrices AB, y también hacer el producto BA. ¿Es cierto que AB=BA?

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} 3+0+0 & 0+0+0 & 3+0+1 \\ 2+0+0 & 0+0+0 & 2+0+1 \\ 1+0+0 & 0+0+0 & 1+0+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 4 \\ 2 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{BA} = \begin{pmatrix} 3+0+1 & 0+0+0 & 1+0+1 \\ 3+1+1 & 0+0+0 & 1+1+1 \\ 0+0+1 & 0+0+0 & 0+0+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 5 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\therefore AB \neq BA$$

8. Ejercicio 8

9. Ejercicio 9. Encuentre el volumen del paralelepipedo generado por los vectores (1, 0, 1), (1, 1, 1), (3, 2, 0).

$$\vec{a} = (i, 0j, k), \quad \vec{b} = (i, j, k) \text{ y } \vec{c} = (-3i, 2j, 0k).$$

$$|(a \times b) \cdot c|$$

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} i - \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} j + \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} k \\ &= (0-1)i - (1-1)j + (1-0)k \\ &= -i + k \cdot (-3i, 2j, 0) \\ &= -1(-3) + 0 + 0 \\ &= 3 \end{aligned}$$

10. Ejercicio 10

11. Ejercicio 11. El volumen de un tetraedro con aristas concurrentes $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ está dado por la expresión $V = \frac{1}{6} \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$.

(a) Exprese dicho volumen como un determinante.

$$V = \frac{1}{6} \vec{a} \cdot |\vec{b} \times \vec{c}|$$

(b) Calcule V cuando $\vec{a} = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}, \vec{b} = \hat{i} - \hat{j} + \hat{k}, \vec{c} = \hat{i} + \hat{j}$

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} &= 1(0-1) - 1(0-1) + 1(1+1) = -1 + 1 + 2 = 2 \\ V &= \frac{1}{6} \cdot 2 = \frac{2}{6} u^3 \end{aligned}$$

12. Ejercicio 12

13. Ejercicio 13. Sea $A = (0, 4)$, $B = (3, 1)$ y $C = (2, 10)$.

(a) ¿Cuáles son las coordenadas del vector \overrightarrow{AB} , y del vector \overrightarrow{BA} .

$$\overrightarrow{AB} = (3i - 0i, 1j - 4j, 0k - 0k) = (3i, -3j, 0k)$$

$$\overrightarrow{BA} = (0i - 3i, 4j - 1j, 0k - 0k) = (-3i, 3j, 0k).$$

(b) ¿Cuáles son las coordenadas del vector \overrightarrow{AC} , y del vector \overrightarrow{BC} , y también $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB}$.

$$\overrightarrow{AC} = (-2i - 0i, -10j - 4j, 0k - 0k) = (-2i, -14j, 0k)$$

$$\overrightarrow{BC} = (-2i - 3i, -10j - 1j, 0k - 0k) = (-5i, -11j, 0k)$$

$$\overrightarrow{CB} = (3i + 2i, 1j + 10j, 0k - 0k) = (5i, 11j, 0k)$$

$$\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB} = (-2i, -14j, 0k) + (5i, 11j, 0k) = (3i, -3j, 0k)$$

(c) Describa gráficamente por qué $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{AB}$

14. Ejercicio 14