



Barbue & Turbot / *Scophthalmus* sp.



A - IMMATURE

GONADES
TRANSPARENTES À
TRANSLUCIDES



B - EN DÉVELOPPEMENT

Gonades se remplissent
et deviennent opaques

NON FLUANT



C - EN PONTE

FLUANT

OPAQUES ET
BLANCHÂTRES




D - RÉGRESSION/RÉGÉNÉRATION

GONADES FLASQUES
RÉSIDUS DE
LAITANCE

SANG DANS LES
TISSUS



Barbue & Turbot / *Scophthalmus sp.*



E - OMISSION DE PONTE

NON DÉTERMINABLE À L'ŒIL

F - ANORMAL

GONADES
NÉCROSÉES,
SCLÉROSÉES ou
INTERSEXUÉES



Photo	Sexe	Espèces	Taille de 1ère maturité
		<i>Scophthalmus rhombus</i>	31 - 34 cm
		<i>Scophthalmus maximus</i>	30 - 38 cm

Références/Photos :

CIEM (WKASMSF 2018 & WKMATCH 2012),
IFREMER,

Quéro J-C. et Vayne J-J.2008. Les poissons de mer des pêches françaises : delachaux et niestlé, 304

© J. Baudrier - Ifremer Martinique