



**Sprat / *Sprattus sprattus*****A - IMMATURE**



FORME TUBULAIRE

GONADES VIDES,  
SANS ŒUFSTRANSLUCIDES ET DE  
COULEUR VARIABLE**B - EN DÉVELOPPEMENT**

Gonades se remplissent et deviennent opaques

œufs non hydratés  
PARFOIS visibles**C - EN PONTE**

AU MOINS 1 ŒUF HYDRATÉ VISIBLE

DE + EN +  
TRANSPARENT**D - RÉGRESSION/RÉGÉNÉRATION**

GONADES MOLLES ET DÉTENDUES

QUELS ŒUFS HYDRATÉS ENCORE PRÉSENTS

SANG DANS LES TISSUS

NA

Pas de données photos



NA

Pas de données photos



**Sprat / *Sprattus sprattus*****E - OMISSION DE PONTE**

NON DÉTERMINABLE À L'ŒIL

**F - ANORMAL**

GONADES  
NÉCROSÉES,  
SCLÉROSÉES ou  
INTERSEXUÉES



Photo	Sexe	Espèces	Taille de 1ère maturité
		<i>Sprattus sprattus</i>	8 - 11 cm

**Références/Photos :**

CIEM (WKASMSF 2018 &amp; WKMATCH 2012),

IFREMER,

Quéro J-C. et Vayne J-J.2008. Les poissons de mer des pêches françaises : delachaux et niestlé, 304