


Barbue & Turbot / *Scophthalmus* sp.



A - IMMATURE

GONADES
TRANSPARENTES À
TRANSLUCIDES

SANS ŒUFS



B - EN DÉVELOPPEMENT

GONADES OPAQUES

œufs non hydratés
PARFOIS visibles



C - EN PONTE

AU MOINS 1 ŒUF
HYDRATÉ VISIBLE






D - RÉGRESSION/RÉGÉNÉRATION

Aspect général
"rabougri"

GONADES FLASQUES
et PAROI ÉPAISSE

QQUES ŒUFS
HYDRATÉS ENCORE
PRÉSENTS



Barbue & Turbot / *Scophthalmus sp.*

E - OMISSION DE PONTE

NON DÉTERMINABLE À L'ŒIL

F - ANORMAL

GONADES
NÉCROSÉES,
SCLÉROSÉES ou
INTERSEXUÉES



Photo	Sexe	Espèces	Taille de 1ère maturité
		<i>Scophthalmus rhombus</i>	31 - 32 cm
		<i>Scophthalmus maximus</i>	34 - 45 cm

Références/Photos :

CIEM (WKASMSF 2018 & WKMATCH 2012),

IFREMER Quéro J-C. et Vayne J-J.2008. Les poissons de mer des pêches françaises : delachaux et niestlé, 304