



# PROTOCOLE DE PRISE DE PHOTO DES GONADES DE POISSONS

Les phases de maturité des gonades prises en photo se basent sur **l'échelle universelles du CIEM**.




Il est recommandé de prendre plusieurs photos en changeant d'angle de vu à chaque étape de photographie afin de s'assurer d'avoir au moins une photo exploitable.

Chaque photo est prise avec une **échelle graduée** et un **papier d'identification** indiquant l'espèce prise en photo, son sexe et sa phase de maturité (+ origine géographique si besoin).

Cas des individus immatures	Cas des individus fluants
Mettre en évidence la transparence des gonades avec un objet en métal glissé dessous	Prendre photo en strippant le poisson avant ouverture de la cavité abdominale
	

## Pour toutes les phases de maturité des 2 sexes :

- Ouvrir la cavité abdominale du poisson avec un scalpel ou un couteau sans abîmer les gonades
- Bien écarter et dégager les parois de la cavité en laissant les autres organes autour des gonades
- Si besoin, maintenir les parois avec des épingles
- Positionner le poisson sur un fond blanc et de façon à avoir un éclairage des gonades optimum (- de reflet possible)
- Si besoin, nettoyer délicatement le sang, les contenus stomacaux et les parasites
- Prendre en photo **les 2 gonades dans la cavité abdominale avec les autres organes autour**
- Enlever les autres organes à l'aide d'un scalpel
- Prendre en photo **les 2 gonades dans la cavité abdominale sans les autres organes**
- Retirer les 2 gonades du poisson à l'aide d'un scalpel sans les abîmer
- Si possible, garder les 2 gonades attachées l'une à l'autre, telles qu'on les trouve dans la cavité abdominale
- Prendre en photo **les 2 gonades à l'extérieur de la cavité abdominale**

		
1 - Gonades dans cavité avec les organes	2 - Gonades dans cavité sans les organes	3 - Gonades à l'extérieur de la cavité