





Sprat / *Sprattus sprattus***A - IMMATURE**

FORME TUBULAIRE

GONADES VIDES,
SANS ŒUFSTRANSLUCIDES ET DE
COULEUR VARIABLE**B - EN DÉVELOPPEMENT**Gonades se remplissent
et deviennent opaquesœufs non hydratés
PARFOIS visiblesATTENTION : période
de ponte étalée et par à-
coup**C - EN PONTE**ATTENTION : période
de ponte étalée et par à-
coupAU MOINS 1 ŒUF
HYDRATÉ VISIBLEDE + EN +
TRANSPARENT**D - RÉGRESSION/RÉGÉNÉRATION**GONADES MOLLES ET
DÉTENDUESQUELS ŒUFS
HYDRATÉS ENCORE
PRÉSENTSSANG DANS LES
TISSUS

NA

Pas de données photos



NA

Pas de données photos



Sprat / *Sprattus sprattus***E - OMISSION DE PONTE**

NON DÉTERMINABLE À L'ŒIL

F - ANORMAL

GONADES
NÉCROSÉES,
SCLÉROSÉES ou
INTERSEXUÉES



Photo	Sexe	Espèces	Taille de 1ère maturité
		<i>Sprattus sprattus</i>	8 - 11 cm

Références/Photos :

CIEM (WKASMSF 2018 & WKMATCH 2012),

IFREMER,

Quéro J-C. et Vayne J-J.2008. Les poissons de mer des pêches françaises : delachaux et niestlé, 304

© J. Baudrier - Ifremer Martinique