

**Baudroie / *Lophius sp.*****A - IMMATURE**GONADES  
"APPLATIES"GONADES  
TRANSPARENTES À  
TRANSLUCIDES

SANS ŒUFS

**B - EN DÉVELOPPEMENT**Gonades se remplissent  
et deviennent opaquesœufs non hydratés  
PARFOIS visibles**C - EN PONTE**AU MOINS 1 ŒUF  
HYDRATÉ VISIBLE**D - RÉGRESSION/RÉGÉNÉRATION**Aspect général  
"rabougrî"GONADES FLASQUES  
et PAROI ÉPAISSEParfois qq œufs  
hydratés encore  
présents


**Baudroie / *Lophius sp.*****E - OMISSION DE PONTE**

NON DÉTERMINABLE À L'ŒIL

**F - ANORMAL**

GONADES  
NÉCROSÉES,  
SCLÉROSEÉES ou  
INTERSEXUÉES

<b>NA</b>	Pas de données photos

**Photo****Sexe****Espèces****Taille de 1ère maturité***Lophius piscatorius*

31 - 58 cm

*Lophius budegassa*

24 - 43 cm

**Références/Photos :**

CIEM (WKASMSF 2018 &amp; WKMATCH 2012),

IFREMER Quéro J-C. et Vayne J-J.2008. Les poissons de mer des pêches françaises : delachaux et niestlé, 304