


Barbue & Turbot / *Scophthalmus sp.*



A - IMMATURE

GONADES
TRANSPARENTES À
TRANSLUCIDES

SANS ŒUFS



B - EN DÉVELOPPEMENT

GONADES OPAQUES

œufs non hydratés
PARFOIS visibles



C - EN PONTE

AU MOINS 1 ŒUF
HYDRATÉ VISIBLE





D - RÉGRESSION/RÉGÉNÉRATION


Aspect général
"rabougri"

GONADES FLASQUES
et PAROI ÉPAISSE

QUES ŒUFS
HYDRATÉS ENCORE
PRÉSENTS



Barbue & Turbot / *Scophthalmus sp.*



E - OMISSION DE PONTE

NON DÉTERMINABLE À L'ŒIL

F - ANORMAL

GONADES
NÉCROSÉES,
SCLÉROSÉES ou
INTERSEXUÉES



| Photo | Sexe | Espèces | Taille de 1ère maturité |
|-------|------|-----------------------------|-------------------------|
| | ♀ | <i>Scophthalmus rhombus</i> | 31 - 32 cm |
| | | <i>Scophthalmus maximus</i> | 34 - 45 cm |

Références/Photos :

CIEM (WKASMSF 2018 & WKMATCH 2012),
IFREMER,

Quéro J-C. et Vayne J-J.2008. Les poissons de mer des pêches françaises : delachaux et niestlé, 304

© J. Baudrier - Ifremer Martinique