

Baudroie / *Lophius sp.***A - IMMATURE**GONADES
"APPLATIES"GONADES
TRANSPARENTES À
TRANSLUCIDES

SANS ŒUFS

**B - EN DÉVELOPPEMENT**Gonades se remplissent
et deviennent opaquesœufs non hydratés
PARFOIS visibles**C - EN PONTE**AU MOINS 1 ŒUF
HYDRATÉ VISIBLE**D - RÉGRESSION/RÉGÉNÉRATION**Aspect général
"rabougrî"GONADES FLASQUES
et PAROI ÉPAISSEParfois qq œufs
hydratés encore
présents


Baudroie / *Lophius sp.***E - OMISSION DE PONTE**

NON DÉTERMINABLE À L'ŒIL

F - ANORMAL

GONADES
NÉCROSÉES,
SCLÉROSEÉES ou
INTERSEXUÉES

NA Pas de données photos 	NA Pas de données photos
--	--

Photo**Sexe****Espèces****Taille de 1ère maturité***Lophius piscatorius*

31 - 58 cm

Lophius budegassa

24 - 43 cm

Références/Photos :

CIEM (WKASMSF 2018 & WKMATCH 2012),

IFREMER,

Quéro J-C. et Vayne J-J. 2008. Les poissons de mer des pêches françaises : delachaux et niestlé, 304