


Mérous / *Epinephelinae* sp.**A - IMMATURE**


GONADES
TRANSPARENTES À
TRANSLUCIDES

SANS ŒUFS


**B - EN DÉVELOPPEMENT**

GONADES OPAQUES

œufs non hydratés
PARFOIS visibles

**C - EN PONTE**

AU MOINS 1 ŒUF
HYDRATÉ VISIBLE

**D - RÉGRESSION/RÉGÉNÉRATION**

Aspect général
"rabougrí"

GONADES FLASQUES
et PAROI ÉPAISSE

QUELS ŒUFS
HYDRATÉS ENCORE
PRÉSENTS



Mérous / *Epinephelinae* sp.**E - OMISSION DE PONTE**

NON DÉTERMINABLE À L'ŒIL

F - ANORMAL

GONADES
NÉCROSÉES,
SCLÉROSÉES ou
INTERSEXUÉES

NA Pas de données photos 	NA Pas de données photos
--	--

Photo	Sexe	Espèces	Taille de 1ère maturité
		Cephalopholis fulva	NA
		Epinephelus guttatus	NA
		Epinephelus striatus	NA

Références/Photos :

CIEM (WKASMSF 2018 & WKMATCH 2012),

IFREMER,

Quéro J-C. et Vayne J-J. 2008. Les poissons de mer des pêches françaises : delachaux et niestlé, 304