





**Sprat / *Sprattus sprattus*****A - IMMATURE**

FORME TUBULAIRE

GONADES VIDES,  
SANS ŒUFSTRANSLUCIDES ET DE  
COULEUR VARIABLE**B - EN DÉVELOPPEMENT**Gonades se remplissent  
et deviennent opaquesœufs non hydratés  
PARFOIS visiblesATTENTION : période  
de ponte étalée et par à-  
coup**C - EN PONTE**ATTENTION : période  
de ponte étalée et par à-  
coupAU MOINS 1 ŒUF  
HYDRATÉ VISIBLEDE + EN +  
TRANSPARENT**D - RÉGRESSION/RÉGÉNÉRATION**GONADES MOLLES ET  
DÉTENDUESQUELS ŒUFS  
HYDRATÉS ENCORE  
PRÉSENTSSANG DANS LES  
TISSUS

NA

Pas de données photos



NA

Pas de données photos



**Sprat / *Sprattus sprattus*****E - OMISSION DE PONTE**

NON DÉTERMINABLE À L'ŒIL

**F - ANORMAL**

GONADES  
NÉCROSÉES,  
SCLÉROSÉES ou  
INTERSEXUÉES



Photo	Sexe	Espèces	Taille de 1ère maturité
		<i>Sprattus sprattus</i>	8 - 11 cm

**Références/Photos :**

CIEM (WKASMSF 2018 &amp; WKMATCH 2012),

IFREMER,

Quéro J-C. et Vayne J-J.2008. Les poissons de mer des pêches françaises : delachaux et niestlé, 304

© J. Baudrier - Ifremer Martinique