


# Baliste océanique / *Canthidermis sufflamen*



## A - IMMATURE

GONADES  
TRANSPARENTES À  
TRANSLUCIDES


SANS ŒUFS



## B - EN DÉVELOPPEMENT

GONADES OPAQUES

œufs non hydratés  
PARFOIS visibles



## C - EN PONTE

AU MOINS 1 ŒUF  
HYDRATÉ VISIBLE




## D - RÉGRESSION/RÉGÉNÉRATION

Aspect général  
"rabougri"

GONADES FLASQUES  
et PAROI ÉPAISSE

QQUES ŒUFS  
HYDRATÉS ENCORE  
PRÉSENTS



**Baliste océanique / *Canthidermis sufflamen*****E - OMISSION DE PONTE**

NON DÉTERMINABLE À L'ŒIL

**F - ANORMAL**

GONADES  
NÉCROSÉES,  
SCLÉROSÉES ou  
INTERSEXUÉES



Photo	Sexe	Espèces	Taille de 1ère maturité
		Canthidermis sufflamen	NA

**Références/Photos :**

CIEM (WKASMSF 2018 &amp; WKMATCH 2012),

IFREMER Quéro J-C. et Vayne J-J.2008. Les poissons de mer des pêches françaises : delachaux et niestlé, 304