

Prova generale del 14/07/2023

In tutti i quesiti proposti la soluzione è la risposta alla lettera A)

Domanda 1: (codice domanda: ssm2023441)

Un ragazzo di 28 anni con stenosi valvolare aortica severa viene avviato alla sostituzione valvolare aortica in ministernotomia. L'intervento viene eseguito con un'incisione:

- ☒ A: Del tratto craniale dello sterno a forma di J, al III o IV spazio intercostale dx
- ☐ B: Trasversale del tratto caudale dello sterno
- ☐ C: Del tratto caudale dello sterno a forma di T
- ☐ D: Medio-ascellare sx al V spazio intercostale
- ☐ E: Medio-ascellare dx al V spazio intercostale

Domanda 2: (codice domanda: ssm2023442)

Lo pneumotorace NON è in genere associato a:

- ☒ A: Lacerazione esofagea non iatrogena
- ☐ B: Rottura di blebs subpleuriche polmonari
- ☐ C: Rottura di bolle enfisematose polmonari
- ☐ D: Manovra invasive di diagnostica pleuropolmonare
- ☐ E: Trauma toracico trafittivo

Domanda 3: (codice domanda: ssm2023443)

Un paziente di 30 anni con sindrome di Marfan giunge in ospedale con una dissezione aortica di tipo B. Quando è indicato l'intervento chirurgico?

- ☒ A: Se sono presenti segni clinici e radiologici di malperfusion e/o rottura imminente
- ☐ B: Se il vero lume è più grande del falso lume
- ☐ C: Se il falso lume è trombizzato
- ☐ D: Se l'aorta misura tra 30 e 35 mm di diametro
- ☐ E: Se tutti i vasi viscerali nascono dal vero lume

Domanda 4: (codice domanda: ssm2023444)

Quali sono le arterie che nascono dall'arco dell'aorta in assenza di varianti anatomiche?

- ☒ A: Tronco anonimo, carotide sx e succlavia sx
- ☐ B: Tronco anonimo, carotide dx, vertebrale sx e succlavia dx
- ☐ C: Succlavia dx, carotide sx e carotide dx
- ☐ D: Tronco anonimo, carotide dx e succlavia sx
- ☐ E: Vertebrale dx, carotide dx e succlavia sx

Domanda 5: (codice domanda: ssm2023445)

Giunge in ambulatorio un paziente con diagnosi di acromegalia. Quale delle seguenti condizioni è atipica nel paziente acromegalico?

- ☒ A: Ipoglicemia
- ☐ B: Sindrome da intrappolamento del nervo ulnare
- ☐ C: Sindrome da intrappolamento del nervo mediano al polso
- ☐ D: Iperprolattinemia
- ☐ E: Ipertensione

Domanda 6: (codice domanda: ssm2023446)

Giunge all'osservazione un paziente di 49 anni con emangioblastoma cerebellare. In anamnesi, il paziente ha storia di feocromocitoma, cisti pancreatiche e carcinoma a cellule renali. Quale tra le seguenti è la diagnosi più probabile?

- ☒ A: Sindrome di Von Hippel-Lindau
- ☐ B: MEN1
- ☐ C: MEN2
- ☐ D: Complesso della sclerosi tuberosa
- ☐ E: Neurofibromatosi Tipo 1

Domanda 7: (codice domanda: ssm2023447)

Una donna di 45 anni miope si reca al Pronto Soccorso lamentando visione offuscata in un occhio, fotopsie (flash luminosi) e miodesopsie (mosche e ragnatele) con la comparsa di un'ombra in una zona del campo visivo che si estende progressivamente. Quale tra le seguenti è la diagnosi più probabile?

- ☒ A: Distacco di retina
- ☐ B: Glaucoma
- ☐ C: Neurite ottica acuta
- ☐ D: Congiuntivite batterica
- ☐ E: Degenerazione maculare senile

Domanda 8: (codice domanda: ssm2023448)

Il glaucoma è:

- ☒ A: Una otticopatia progressiva
- ☐ B: Una neoplasia oculare benigna
- ☐ C: Una neoplasia oculare maligna
- ☐ D: Una neoplasia del nervo ottico
- ☐ E: Una degenerazione retinica

Domanda 9: (codice domanda: ssm2023449)

Un uomo di 57 anni accusa diplopia orizzontale binoculare. La visione doppia peggiora nello sguardo verso destra. Quale tra le seguenti è la diagnosi più probabile:

- ☒ A: Paralisi isolata del VI nervo cranico di destra
- ☐ B: Paralisi isolata del VI nervo cranico di sinistra
- ☐ C: Paralisi isolata del IV nervo cranico di sinistra
- ☐ D: Paralisi isolata del IV nervo cranico di destra
- ☐ E: Paralisi completa del III nervo cranico di destra

Domanda 10: (codice domanda: ssm2023450)

Quale nervo innerva il muscolo cricotiroideo?

- ☒ A: Nervo laringeo superiore
- ☐ B: Nervo laringeo ricorrente
- ☐ C: Nervo glossofaringeo
- ☐ D: Nervo laringeo medio
- ☐ E: Nervo ipoglosso

Domanda 11: (codice domanda: ssm2023451)

Un paziente di otto anni viene accompagnato al Pronto Soccorso per comparsa di tumefazione cervicale mediana anteriore, dolorabile ed iperemica. Agli atti deglutitori si apprezza rapporto con l'osso ioide. Quale tra le seguenti è la diagnosi più probabile?

- ☒ A: Cisti del dotto tireoglossa
- ☐ B: Metastasi linfonodale
- ☐ C: Adenopatia suppurata
- ☐ D: Ranula
- ☐ E: Ascesso parafaringeo

Domanda 12: (codice domanda: ssm2023452)

Un paziente di 55 anni, sottoposto due anni prima a chirurgia implantare a livello dell'arcata alveolare superiore destra, lamenta dolore da giorni a livello facciale infraorbitario destro. L'esame endoscopico mostra edema e secrezioni purulente a carico del complesso ostio-meatale destro. Quale tra le seguenti è la diagnosi più probabile?

- ☒ A: Sinusite odontogena etmoido-mascellare
- ☐ B: Nevralgia del trigemino
- ☐ C: Danno iatrogeno del nervo alveolare superiore
- ☐ D: Sinusite frontale
- ☐ E: Carcinoma del rinofaringe

Domanda 13: (codice domanda: ssm2023453)

Un uomo di 76 anni giunge al Pronto Soccorso con un quadro clinico di ileo meccanico. Quale tra le seguenti è la diagnosi più probabile?

- ☒ A: Carcinoma del colon
- ☐ B: Calcolosi della colecisti
- ☐ C: Appendicite
- ☐ D: Diverticolo perforato
- ☐ E: Megacolon tossico

Domanda 14: (codice domanda: ssm2023454)

Ad un giovane di 30 anni vengono diagnosticati un feocromocitoma, aumento del paratormone ed un nodulo tiroideo positivo per carcinoma midollare. Quale tra le seguenti è la diagnosi più probabile:

- ☒ A: MEN2A
- ☐ B: MEN1
- ☐ C: Tumore del polmone
- ☐ D: Iperaldosteronismo
- ☐ E: Tumore endocrino del pancreas

Domanda 15: (codice domanda: ssm2023455)

Un uomo di 55 anni affetto da molto tempo da disturbi dispeptici viene alla osservazione per una tumefazione della fossa clavicolare sinistra (Segno di Troisier). Qual è il sospetto diagnostico più verosimile tra i seguenti?

- ☒ A: Tumore dello stomaco
- ☐ B: Tumore del timo
- ☐ C: Tumore del colon
- ☐ D: Tumore della tiroide
- ☐ E: Gastrite cronica

Domanda 16: (codice domanda: ssm2023456)

Un uomo di 62 anni ha di recente sviluppato un diabete mellito con costante perdita di peso e dolore puntorio localizzato ai quadranti superiori dell'addome ed irradiato al dorso. Qual è il sospetto diagnostico più probabile tra i seguenti?

- ☒ A: Tumore del pancreas avanzato
- ☐ B: Tumore del retto
- ☐ C: Epatite cronica
- ☐ D: Diverticolosi
- ☐ E: Poliposi familiare

Domanda 17: (codice domanda: ssm2023457)

Un uomo di 45 anni è affetto da calcolosi della colecisti, diverticoli del colon, reflusso gastroesofageo. Quale nome si associa a quest'insieme di patologie?

- ☒ A: Triade di Saint
- ☐ B: Sindrome di Marfan
- ☐ C: Sindrome di Mallory-Weiss
- ☐ D: Sindrome di Lynch
- ☐ E: Sindrome di Peutz-Jeghers

Domanda 18: (codice domanda: ssm2023458)


In un uomo di 75 anni affetto da molto tempo da dispepsia cronica resistente alla terapia, quale è tra le seguenti l'indagine diagnostica iniziale più appropriata?

- ☒ A: Esofagogastroduodenoscopia con eventuale biopsia
- ☐ B: RX Digerente
- ☐ C: Clisma opaco a doppio contrasto
- ☐ D: TC addome pelvi
- ☐ E: RM addome

Domanda 19: (codice domanda: ssm2023459)

Un uomo di 70 anni è affetto da adenocarcinoma del retto localizzato a 5 cm dal margine anale esterno, cT3N1M0. Quale delle seguenti strategie terapeutiche è la più appropriata?


- ☒ A: Chemioradioterapia neoadiuvante, ristadiatione, chirurgia
- ☐ B: Chemioterapia neoadiuvante, chirurgia
- ☐ C: Chemioterapia e follow-up ad un anno
- ☐ D: Chirurgia diretta
- ☐ E: Radiofrequenza



Un uomo di 43 anni da un anno circa lamenta frequenti rigurgiti post-prandiali e notturni associati a disfagia ingravescente. Riferisce saltuario dolore toracico con valutazione cardiologica negativa. Esegue esofago-gastro-duodenoscopia negativa per lesioni neoplastiche ed esofagografia con contrasto per os di cui si allega il radiogramma. Alla luce dei reperti anamnestici e della radiografia quale è la diagnosi più verosimile tra le seguenti?

- ☒ A: Acalasia
- ☐ B: GIST del fondo gastrico
- ☐ C: Diverticolo epifrenico
- ☐ D: Malattia da reflusso gastroesofageo
- ☐ E: Ernia iatale sintomatica

Domanda 21: (codice domanda: ssm2023461)



Paziente di 39 anni giunge in Pronto Soccorso per dolore toracico anteriore sinistro intensificato dagli atti respiratori. Alla valutazione clinica viene riscontrata tachipnea con 34 atti respiratori/minuto. All'esame obiettivo riduzione del murmure vescicolare sinistro. EGA (in area ambiente): pH7.50, PaO₂ 62 mmHg, PaCO₂ 28 mmHg. Esegue RX del torace di cui si allega il radiogramma. Il quadro clinico, radiologico e emogasanalitico orienta per:

- ☒ A: Pneumotorace massivo sinistro meritevole di drenaggio toracico urgente
- ☐ B: Pneumotorace apicale sinistro meritevole di monitoraggio clinico strumentale
- ☐ C: Esteso focolaio bronco pneumonico sinistro meritevole di terapia antibiotica
- ☐ D: Severo quadro di scompenso cardiaco con edema polmonare meritevole di inquadramento e trattamento cardiologico urgente
- ☐ E: Versamento pleurico massivo sinistro meritevole di drenaggio toracico urgente

Domanda 22: (codice domanda: ssm2023462)

Paziente giunge in Pronto Soccorso con dolore addominale associato a febbre con brivido ed ittero. Come si chiama l'associazione dei tre segni clinici presentati dal paziente?

- ☒ A: Triade di Charcot
- ☐ B: Triade di Reynolds
- ☐ C: Triade di Trousseau
- ☐ D: Triade di Calot
- ☐ E: Triade di Virchow

Domanda 23: (codice domanda: ssm2023463)

In un neonato, l'atresia esofagea di III tipo è:

- ☒ A: La forma più frequente
- ☐ B: Secondaria ad esofago di Barrett
- ☐ C: Caratterizzata dalla presenza di una fistola tracheoesofagea prossimale
- ☐ D: Secondaria a reflusso gastroesofageo
- ☐ E: Secondaria ad ingestione accidentale di caustici

Domanda 24: (codice domanda: ssm2023464)

Qual è il sistema di classificazione più utilizzato per la contrattura capsulare periprotetica mammaria?

- ☒ A: Baker
- ☐ B: Allen
- ☐ C: Regnault
- ☐ D: Blondeel
- ☐ E: House Brackmann

Domanda 25: (codice domanda: ssm2023465)

Una donna di 35 anni giunge presso l'ambulatorio di ginecologia riferendo amenorrea da circa 6 mesi, disturbi del sonno e dispareunia. I cicli negli anni precedenti sono sempre stati regolari per ritmo, durata e quantità. Porta in visione esami ormonali che evidenziano elevati valori di FSH e LH, bassi livelli di Estradiolo e Progesterone e null'altro di rilevante. La causa più probabile di amenorrea è:

- ☒ A: Menopausa prematura
- ☐ B: Adenoma ipofisario prolattino secernente
- ☐ C: Amenorrea da causa ipotalamica
- ☐ D: Amenorrea da causa ipofisaria
- ☐ E: Sindrome dell'ovaio policistico

Domanda 26: (codice domanda: ssm2023466)

Una gestante di 45 anni alla diciassettesima settimana di gravidanza, con bitempo risultato ad alto rischio per un'elevata translucenza nucale, si sottopone ad amniocentesi. Il risultato del cariotipo fetale evidenzia una trisomia del cromosoma 13 che determina la seguente sindrome:

- ☒ A: Patau
- ☐ B: Down
- ☐ C: Edwards
- ☐ D: Klinefelter
- ☐ E: Turner

Domanda 27: (codice domanda: ssm2023467)

Giunge in ambulatorio di ginecologia una donna di 60 anni, in menopausa da 5 anni, che riferisce perdite ematiche vaginali da qualche giorno. La donna riferisce al medico di avere recentemente eseguito un Pap test con esito regolare e di non aver avuto traumi genitali o rapporti sessuali negli ultimi giorni. La strategia diagnostica iniziale più adeguata tra le seguenti è:

- ☒ A: Ecografia pelvica transvaginale seguita da isteroscopia
- ☐ B: Tampone microbiologico vaginale
- ☐ C: HPV-DNA test
- ☐ D: Colposcopia
- ☐ E: Vulvosopia

Domanda 28: (codice domanda: ssm2023468)

Una gestante alla trentaquattresima settimana di gravidanza si reca in Pronto Soccorso per forti algie pelviche, intensa cefalea e dolore a barra. Il quadro clinico evidenzia PA = 150/100, contrazioni uterine tetaniche, perdite ematiche genitali, dilatazione della cervice 2 cm, alterazioni del tracciato cardiocografico con bradicardia e decelerazioni tardive. La diagnosi più probabile è:

- ☒ A: Distacco di placenta
- ☐ B: Minaccia di parto pretermine
- ☐ C: Parto pretermine con rottura delle membrane
- ☐ D: Placenta previa
- ☐ E: Prolasso del funicolo

Domanda 29: (codice domanda: ssm2023469)

Una ragazza di 15 anni si presenta con la mamma in visita dal ginecologo perché non è ancora comparso il menarca. La ragazza, nata da parto eutocico, dimostra uno sviluppo completo dei caratteri sessuali secondari e un'altezza nella norma per età ed etnia; la paziente riferisce però saltuarie algie addominali circa una volta al mese, che si risolvono dopo qualche giorno e l'assunzione di antidolorifici. Quale tra le seguenti diagnosi è la più probabile?

- ☒ A: Imene imperforato
- ☐ B: Rabbdomiosarcoma vaginale
- ☐ C: Leiomioma sottosieroso uterino
- ☐ D: Endometriosi
- ☐ E: Sindrome di Rokitansky

Domanda 30: (codice domanda: ssm2023470)

Quale dei seguenti farmaci è assolutamente controindicato in gravidanza?

- ☒ A: Methotrexate
- ☐ B: Paracetamolo
- ☐ C: Insulina
- ☐ D: Eparina
- ☐ E: Nifedipina

Domanda 31: (codice domanda: ssm2023471)

Quale tra le seguenti modificazioni del funzionamento dell'apparato cardiovascolare NON fa parte dell'adattamento materno fisiologico alla gravidanza?

- ☒ A: Riduzione della gittata cardiaca
- ☐ B: Aumento del volume cardiaco
- ☐ C: Modificazione della posizione del cuore per elevazione del diaframma
- ☐ D: Aumento della frequenza cardiaca
- ☐ E: Riduzione della pressione arteriosa

Domanda 32: (codice domanda: ssm2023472)

Quale dei seguenti reperti clinico-strumentali NON è tipico della mola vescicolare completa?

- ☒ A: Beta-hCG ridotta per l'epoca gestazionale
- ☐ B: Metrorragia
- ☐ C: Ipertensione
- ☐ D: Presenza di cisti ovariche multiple
- ☐ E: Assenza di embrione e/o feto all'ecografia

Domanda 33: (codice domanda: ssm2023473)

Quale tra le seguenti è una frequente complicazione delle fratture della parete posteriore dell'acetabolo con lussazione della testa femorale?

- ☒ A: Paralisi del nervo sciatico
- ☐ B: Lesione dell'arteria iliaca esterna
- ☐ C: Paralisi del nervo femorale
- ☐ D: Rottura dell'arteria femorale profonda
- ☐ E: Paralisi del nervo otturatorio

Domanda 34: (codice domanda: ssm2023474)

Una donna di 53 anni, che espleta il lavoro di segretaria, riferisce al proprio medico curante disturbi alla mano destra iniziati da alcuni mesi. Nello specifico lamenta dolore e parestesie in corrispondenza delle prime tre dita della mano che peggiorano durante la notte. Il dolore e le parestesie peggiorano nella iperflessione del polso ed il segno di Tinel è positivo. Ispettivamente si apprezza ipotrofia dell'eminanza tenar dal lato interessato. Qual è la diagnosi più probabile tra le seguenti?

- ☒ A: Sindrome del tunnel carpale
- ☐ B: Sindrome del tunnel cubitale
- ☐ C: Una compressione del nervo ulnare al livello del canale di Guyon
- ☐ D: Esiti post-traumatici
- ☐ E: Sindrome di Pancoast

Domanda 35: (codice domanda: ssm2023475)

Un ragazzo di undici anni frequenta una scuola di calcetto. Gli allenamenti si svolgono da alcuni mesi su un campo in cemento. Il ragazzo lamenta da quattro settimane dolore al tallone che migliora a riposo e peggiora dopo gli allenamenti. All'esame obiettivo si apprezza dolore alla pressione in corrispondenza della porzione posteriore del calcagno. Quale tra le seguenti è la diagnosi più probabile?

- ☒ A: Malattia di Sever
- ☐ B: Malattia di Köhler
- ☐ C: Malattia di Freiberg
- ☐ D: Malattia di Panner
- ☐ E: Malattia di Sinding-Larsen-Johansson

Domanda 36: (codice domanda: ssm2023476)

Quale delle seguenti è la più frequente lesione neoplastica dello scheletro?

- ☒ A: Metastasi ossea
- ☐ B: Condrosarcoma
- ☐ C: Osteosarcoma
- ☐ D: Cordoma
- ☐ E: Osteoblastoma

Domanda 37: (codice domanda: ssm2023477)

Un paziente di 65 anni viene sottoposto ad intervento di artroprotesi del ginocchio destro per presenza di una grave artrosi sintomatica. A distanza di due anni dall'intervento, durante i quali la sintomatologia dolorosa è completamente regredita, il paziente inizia a lamentare rigidità, dolore e tumefazione del ginocchio operato. Esegue un'artrocentesi del ginocchio che da esito ad un liquido torbido di colorito giallastro, concentrazione proteica di 3,7 g/dL, glucosio 10 mg/dL, LDH 4.800 U/L. L'ipotesi diagnostica più verosimile tra le seguenti è:

- ☒ A: Infezione periprotetica
- ☐ B: Errato posizionamento delle componenti protesiche
- ☐ C: Sinovite villonodulare pigmentosa
- ☐ D: Frattura periprotetica
- ☐ E: Emartro

Domanda 38: (codice domanda: ssm2023478)

In un paziente a cui in esito ad una TURV è stata diagnosticata una neoplasia vescicale pT1 G3, associata a Cis, dopo quanto tempo è necessario ripetere la TURV?

- ☒ A: Da 2 a 6 settimane
- ☐ B: Dopo 3 mesi
- ☐ C: Dopo 1 settimana
- ☐ D: Dopo 8 settimane
- ☐ E: Mai, si procede con la cistectomia radicale

Domanda 39: (codice domanda: ssm2023479)

Un uomo di 70 anni giunge all'osservazione dell'Urologo per un valore di PSA totale di 20,6 ng/mL. All'esame obiettivo l'esplorazione rettale è dubbia per neoplasia prostatica. L'iter diagnostico considerato attualmente più appropriato tra i seguenti è:

- ☒ A: RM multiparametrica della prostata, biopsia prostatica, scintigrafia ossea
- ☐ B: PET/TC con 18F-FDG
- ☐ C: Ecografia sovrapubica, biopsia prostatica
- ☐ D: Ecografia prostatica transrettale, TC addome pelvi
- ☐ E: Biopsia prostatica, TC addome pelvi senza MdC

Domanda 40: (codice domanda: ssm2023480)

Un paziente di 65 anni, operato da 3 mesi di prostatectomia radicale per una neoplasia con un Gleason 3+3, riferisce incontinenza diurna e notturna. La diagnosi più probabile tra le seguenti è:

- ☒ A: Incompetenza sfinteriale post-operatoria
- ☐ B: Iperattività detrusoriale idiopatica
- ☐ C: Stenosi uretrale
- ☐ D: Ridotta compliance detrusoriale
- ☐ E: Ostruzione cervico-uretrale

Domanda 41: (codice domanda: ssm2023481)

Un bambino di tre anni viene portato in Pronto Soccorso perché ha ingerito un numero imprecisato di compresse di acido acetilsalicilico. All'ingresso il bambino accusa vertigini soggettive, ha vomito, e all'obiettività si evidenzia tachipnea. Quale dei seguenti provvedimenti NON è corretto?

- ☒ A: Infondere rapidamente abbondanti liquidi per forzare la diuresi
- ☐ B: Eseguire radiografia del torace
- ☐ C: Somministrare carbone attivo
- ☐ D: Se necessario alcalinizzare le urine
- ☐ E: Valutare la stabilità del respiro e del circolo, posizionare accesso venoso, eseguire esami ematici (valutazione della salicilateria, emogasanalisi, glicemia, elettrolitemia, creatininemia, esame urine)

Domanda 42: (codice domanda: ssm2023482)

Una bambina di due anni viene portata in Pronto Soccorso per un quadro insorto rapidamente da un'ora circa, caratterizzato da tosse abbaiente, stridore inspiratorio, agitazione, febbre elevata, scialorrea, disfagia. SpO2 in aria ambiente uguale 90%. Quale tra le seguenti è la diagnosi più probabile?

- ☒ A: Epiglottite acuta
- ☐ B: Laringite ipoglottica
- ☐ C: Inalazione di corpo estraneo
- ☐ D: Bronchiolite
- ☐ E: Polmonite

Domanda 43: (codice domanda: ssm2023483)

Viene ricoverato un bambino di cinque anni che presenta un rash cutaneo purpureo palpabile localizzato in particolare agli arti inferiori, dolori addominali associati a tracce ematiche nelle feci, dolore articolare, tumefazione alle ginocchia ed ematuria macroscopica. Quale tra le seguenti è la diagnosi più probabile?

- ☒ A: Porpora di Schonlein-Henoch
- ☐ B: Malattia reumatica
- ☐ C: Artrite idiopatica giovanile
- ☐ D: Malattia di Kawasaki
- ☐ E: Orticaria da farmaci

Domanda 44: (codice domanda: ssm2023484)

Una ragazza di 12 anni presenta da alcuni giorni un quadro clinico in progressivo peggioramento, caratterizzato da labilità emotiva e continui brevi ed involontari movimenti degli arti e della mimica facciale, non presenti durante il sonno. La ragazza due mesi fa circa ha sofferto di una tonsillite febbrile, accompagnata da malessere e tumefazione dolente dei linfonodi sottomandibolari e seguita da dolore e tumefazione migranti alle articolazioni delle ginocchia. Quale tra le seguenti è la diagnosi più probabile?

- ☒ A: Corea di Sydenham
- ☐ B: Insorgenza di un quadro psicotico
- ☐ C: Crisi epilettiche parziali
- ☐ D: Crisi d'ansia
- ☐ E: Dermatomirosite

Domanda 45: (codice domanda: ssm2023485)

Un bambino di cinque anni con storia di trauma cranico accidentale occorso cadendo da circa un metro d'altezza, arriva in Pronto Soccorso. All'ingresso il bambino è vigile, orientato ed ha un esame obiettivo generale e neurologico negativo e ricorda e descrive l'accaduto. Lamenta soltanto una cefalea di media entità. Il bambino dopo il trauma ha pianto subito ed ha vomitato. Quale tra i seguenti comportamenti clinici è il più indicato?

- ☒ A: Rassicurare i genitori e trattenere il bambino per un periodo di osservazione clinica in Pronto Soccorso
- ☐ B: Ricoverare il bambino per le prime 96 ore dopo trauma
- ☐ C: Eseguire radiografia del cranio per valutare la presenza di eventuali fratture
- ☐ D: Eseguire TC del cranio urgente
- ☐ E: Rassicurare i genitori e dimettere il bambino, dando indicazioni per un eventuale nuovo accesso in Pronto Soccorso

Domanda 46: (codice domanda: ssm2023486)

Un lattante di dieci mesi di origini nigeriane, in Italia da poche settimane, giunge in Pronto Soccorso per pianto inconsolabile. Non presenta febbre. Alla valutazione clinica si osservano irritabilità, tachicardia ed edema di tre dita della mano destra, che appaiono calde ed eritematose. La restante obiettività clinica è nella norma, ad eccezione di modica epatosplenomegalia. Qual è l'ipotesi diagnostica più probabile?

- ☒ A: Drepanocitosi
- ☐ B: Artrite psoriasica
- ☐ C: Patereccio erpetico
- ☐ D: Leucemia acuta
- ☐ E: Congelamento

Domanda 47: (codice domanda: ssm2023487)

Arriva in Pronto Soccorso un lattante di tre mesi con tosse e “wheezing”, che presenta all’obiettività rientramenti intercostali, alitamento delle pinne nasali, bilancia toraco-addominale ed aumento della frequenza respiratoria e cardiaca. Non è febbrile, ma viene riferita scarsa assunzione di latte da alcune ore. Nel sospetto di bronchiolite quale comportamento clinico tra i seguenti è più corretto assumere in questo caso?

- ☒ A: Somministrare ossigeno se la SpO2 in aria ambiente è inferiore al 94%, posizionare un accesso venoso e disporre il ricovero
- ☐ B: Somministrare O2 e cortisonici per aerosol e provare ad alimentarlo
- ☐ C: Somministrare O2 e cortisonici per aerosol e richiedere RX del torace
- ☐ D: Somministrare aerosol con soluzione salina ipertonica e adrenalina, iniziare terapia antibiotica e predisporre il ricovero
- ☐ E: Provare ad alimentare il lattante, consolandolo in attesa della radiografia del torace

Domanda 48: (codice domanda: ssm2023488)

Viene portata dal pediatra una bambina di quattro anni che lamenta da alcuni giorni artralgie migranti e mialgie. L’esame obiettivo è sostanzialmente negativo. La madre riferisce che una settimana prima dell’esordio della sintomatologia aveva notato nella bambina la presenza di un’area eritematosa, con zona centrale più pallida sulla superficie posteriore della gamba sinistra, a livello del cavo popliteo, durata parecchi giorni e risoltasi spontaneamente. La bambina era stata in vacanza in una zona collinare del Friuli-Venezia Giulia. Quale tra le seguenti ipotesi diagnostiche è la più probabile?

- ☒ A: Malattia di Lyme
- ☐ B: Distrofia muscolare di Duchenne
- ☐ C: Malattia reumatica
- ☐ D: Artrogriposi
- ☐ E: Artrite idiopatica giovanile

Domanda 49: (codice domanda: ssm2023489)

Una donna di 43 anni giunge alla nostra osservazione per la comparsa, da alcuni mesi, di episodi ricorrenti di dispnea per broncocostrizione. Concomitano congestione nasale ed artralgie. Alla radiografia del torace si evidenziano infiltrati polmonari multipli e periferici. Quale tra queste diagnosi deve essere presa primariamente in considerazione?

- ☒ A: La granulomatosi eosinofila con poliangioite (EGPA)
- ☐ B: Arterite di Takayasu
- ☐ C: Artrite reumatoide con interessamento polmonare
- ☐ D: Malattia di Behcet
- ☐ E: Dermatomiosite

Domanda 50: (codice domanda: ssm2023490)



Giunge in ambulatorio un uomo di 32 anni con prurito diffuso senza interessamento del capo presente da due settimane. Riferisce che il prurito è più accentuato nelle ore notturne. Alla valutazione clinica sono presenti papule, alcune escoriate, e lesioni da grattamento. Alla faccia laterale del secondo dito di una mano si osservano lesioni lineari di circa un centimetro di lunghezza con una piccola papula ad una estremità. Quale tra le seguenti è la prima patologia che si deve sospettare?

- ☒ A: Scabbia
- ☐ B: Orticaria
- ☐ C: Leishmaniosi cutanea
- ☐ D: Pemfigoide bolloso
- ☐ E: Pediculosi


Domanda 51: (codice domanda: ssm2023491)



Giunge al reparto di dermatologia una paziente di 60 anni con eruzione maculo-papulosa morbilliforme diffusa, edema del volto, intenso prurito e febbre elevata. Tre settimane prima aveva iniziato un trattamento con allopurinolo. Si eseguono esami ematici con riscontro di ipereosinofilia ($2000/\text{mm}^3$), linfociti atipici (più del 5%), aumento di transaminasi, lipasi e amilasi. Il quadro clinico è compatibile con:

- ☒ A: Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms (DRESS)
- ☐ B: Dermatite livedoide di Nicolau
- ☐ C: Acute Generalized Exanthematous Pustulosis (AGEP)
- ☐ D: Symmetrical Drug-Related Intertriginous and Flexural Exanthema (SDRIFE)
- ☐ E: Sindrome di Sezary

Domanda 52: (codice domanda: ssm2023492)



Allo striscio di sangue periferico si osserva questa morfologia eritrocitaria con schistociti. Il quadro è indicativo di:

- ☒ A: Microangiopatia trombotica
- ☐ B: Anemia emolitica autoimmune
- ☐ C: Ellissocitosi
- ☐ D: Macro-ovalocitosi
- ☐ E: Drepanocitosi

Domanda 53: (codice domanda: ssm2023493)

Un uomo di 78 anni con nota diverticolosi del colon e anamnesi ematologica negativa si presenta alla visita medica con anemia (Hb 6,8 g/dL, MCV 72 fL). Il numero delle piastrine, dei globuli bianchi e la formula leucocitaria sono normali. Questo quadro fa pensare, in prima istanza, a:

- ☒ A: Un'anemia da carenza di ferro
- ☐ B: Un'anemia da carenza di acido folico
- ☐ C: Una sindrome talassemica
- ☐ D: Un'anemia da carenza di vitamina B12
- ☐ E: Una porpora trombotica trombocitopenica

Domanda 54: (codice domanda: ssm2023494)

La tipizzazione linfocitaria di un paziente di 82 anni, che presenta una conta leucocitaria di $65.350 \text{ cellule/mm}^3$, con linfociti rappresentanti l'82% dei leucociti, ha le seguenti caratteristiche: CD5+, CD23+, CD200+, CD20+dim, CD19+, sIgk+dim, CD10-. Il quadro è diagnostico per:

- ☒ A: Leucemia linfatica cronica
- ☐ B: Linfocitosi monoclonale benigna
- ☐ C: Linfoma follicolare leucemizzato
- ☐ D: Leucemia plasmacellulare
- ☐ E: Leucemia acuta T-linfoblastica

Domanda 55: (codice domanda: ssm2023495)

Una paziente di 40 anni affetta da ipertensione arteriosa e con recente diagnosi di carcinoma papillare della tiroide è stata sottoposta ad intervento chirurgico di tiroidectomia totale e successiva terapia radiometabolica. Alla luce di tali informazioni l'andamento di quale fra i seguenti parametri è indicato seguire nel follow-up di questa paziente:

- ☒ A: Tireoglobulina
- ☐ B: CEA
- ☐ C: Calcitonina
- ☐ D: Cromogranina
- ☐ E: Anticorpi anti-recettore del TSH

Domanda 56: (codice domanda: ssm2023496)

La prolattina è un ormone polipeptidico prodotto e secreto dalle cellule lattotrope dell'adenipofisi. Fra le seguenti quale NON rappresenta una possibile causa di iperprolattinemia?

- ☒ A: Terapia con amiodarone
- ☐ B: Terapia con farmaci antagonisti dopaminergici
- ☐ C: Gravidanza
- ☐ D: Adenoma ipofisario secernente prolattina
- ☐ E: Craniofaringioma

Domanda 57: (codice domanda: ssm2023497)

Un uomo di 55 anni giunge con stigmati cliniche di acromegalia. Quale indagine è più utile all'accertamento diagnostico?

- ☒ A: Dosaggio di insulin like growth factor-I (IGF-I)
- ☐ B: Dosaggio di insulin like growth factor-II (IGF-II)
- ☐ C: Dosaggio di ormone della crescita (GH) dopo test al TRH
- ☐ D: Dosaggio di ormone della crescita (GH) dopo test all'arginina
- ☐ E: RX diretta cranio

Domanda 58: (codice domanda: ssm2023498)

Un uomo di 77 anni, con progressivo decadimento delle condizioni generali, all'obiettività neurologica presenta tremore a riposo, ipertonia, rigidità muscolare e micrografia. L'ipotesi diagnostica più probabile tra le seguenti è:

- ☒ A: Malattia di Parkinson
- ☐ B: Malattia di Alzheimer
- ☐ C: Malattia di Kreutzfeldt-Jakob
- ☐ D: Malattia di Pick
- ☐ E: Sclerosi Multipla

Domanda 59: (codice domanda: ssm2023499)

Per la prima valutazione dei disturbi cognitivi nell'anziano quale tra i seguenti è il test più appropriato?

- ☒ A: Il Mini Mental State Examination
- ☐ B: Instrumental Activity of Daily Living
- ☐ C: Test del Quoziente Intellettivo per adulti
- ☐ D: Geriatric Depression scale
- ☐ E: Activities of Daily Living

Domanda 60: (codice domanda: ssm2023500)

Un uomo di 85 anni con febbre a 38°C e tosse da due giorni, sviluppa uno stato confusionale fluttuante durante l'arco della giornata, caratterizzato da agitazione psicomotoria e allucinazioni. Quale tra le seguenti è la diagnosi più probabile?

- ☒ A: Delirium
- ☐ B: Esordio di demenza
- ☐ C: Coma diabetico
- ☐ D: Abuso di benzodiazepine
- ☐ E: Abuso di neurolettici

Domanda 61: (codice domanda: ssm2023501)

Un uomo di 45 anni, fumatore, con un'anamnesi positiva per ipercolesterolemia e diabete, si reca presso il Pronto Soccorso, lamentando da circa 48 ore episodi di intenso dolore retrosternale, a riposo, con irradiazione alla spalla sinistra della durata di cinque-dieci minuti. All'ECG, eseguito durante uno degli attacchi, si osserva un sotto-slivellamento del tratto ST di 1,5 mm in V2-V5. Le analisi di laboratorio non mostrano alterazioni degli enzimi cardiaci. Quali tra le seguenti è la diagnosi più probabile?

- ☒ A: Angina instabile
- ☐ B: Angina stabile
- ☐ C: Infarto miocardico acuto
- ☐ D: Scompenso cardiaco
- ☐ E: Cardiomiopatia takotsubo

Domanda 62: (codice domanda: ssm2023502)

Il farmaco di prima linea, in assenza di controindicazioni, in una paziente di 54 anni con diagnosi di angina stabile riscontrata durante una visita presso l'ambulatorio di cardiologia è:

- ☒ A: Beta-bloccante
- ☐ B: Nitrato a lunga durata d'azione
- ☐ C: Digossina
- ☐ D: Ranolazina
- ☐ E: Ivabradina

Domanda 63: (codice domanda: ssm2023503)

Lo spostamento verso l'atrio sinistro in sistole dei lembi della valvola mitrale, senza ispessimento, è segno ecocardiografico suggestivo di quale lesione valvolare?

- ☒ A: Prolasso della valvola mitrale
- ☐ B: Endocardite reumatica
- ☐ C: Stenosi mitralica
- ☐ D: Insufficienza valvolare grave
- ☐ E: Endocardite infettiva

Domanda 64: (codice domanda: ssm2023504)

Ad un uomo di 50 anni è stata diagnosticata cardiomiopatia dilatativa idiopatica. È stata prescritta una terapia a base di ACE-inibitori e betabloccanti. In questo caso sarebbe necessario prescrivere anche una terapia a base di:

- ☒ A: Antialdosteronici e SGLT2 inibitori
- ☐ B: Digossina e calcioantagonisti
- ☐ C: Cortisonici e diuretici
- ☐ D: Calcioantagonisti e SGLT2 inibitori
- ☐ E: Antialdosteronici e calcioantagonisti

Domanda 65: (codice domanda: ssm2023505)

Una donna di 77 anni viene valutata per un possibile impianto di pacemaker. Indicazione certa all'impianto di pacemaker in caso di blocco Atrio-Ventricolare (A-V) viene data:

- ☒ A: Dal blocco A-V di III grado o di II grado avanzato sintomatico
- ☐ B: Dal blocco A-V di II grado con QRS stretti
- ☐ C: Dal blocco A-V di II grado tipo 1 asintomatico
- ☐ D: Dal blocco A-V di I grado
- ☐ E: Dalle malattie neuromuscolari con blocco A-V di I grado

Domanda 66: (codice domanda: ssm2023506)

Una paziente di 45 anni senza precedenti cardiovascolari salvo la presenza di ipertensione arteriosa in terapia con ramipril a basso dosaggio, si reca in Pronto Soccorso per un dolore toracico anteriore che non si modifica con lo sforzo ma con gli atti del respiro. Viene dosata la troponina ad alta sensibilità che risulta elevata, mentre l'ECG mostra un quadro compatibile con ripolarizzazione precoce e una frequenza cardiaca di 70 bpm. Qual è la diagnosi più probabile tra le seguenti?


- ☒ A: Miopericardite acuta
- ☐ B: Insufficienza mitralica da rottura di muscolo papillare
- ☐ C: Sindrome di Wolff-Parkinson-White
- ☐ D: Ulcera peptica
- ☐ E: Reflusso gastroesofageo

Domanda 67: (codice domanda: ssm2023507)

Un uomo di 70 anni si reca in Pronto Soccorso per un quadro di scompenso cardiaco congestizio secondario ad una pericardite costrittiva con funzione cardiaca altrimenti conservata. Quale di queste opzioni terapeutiche rappresenta il trattamento più adeguato?

- ☒ A: Diuretici e chirurgia quando possibile
- ☐ B: Pericardiocentesi precoce
- ☐ C: Inotropi per via endovenosa
- ☐ D: Beta bloccanti e ACE inibitori
- ☐ E: FANS, cortisonici e pericardiocentesi in caso di mancata risposta

Domanda 68: (codice domanda: ssm2023508)



Un paziente di 85 anni giunge all'ambulatorio di Endoscopia Digestiva per eseguire una esofagogastroduodenoscopia (EGDS) in seguito a riferita emissione di feci scure con riscontro agli esami ematochimici di anemia (Hb: 9.8 g/dL) ipocromica microcitica. L'EGDS mostra in sede antrale il quadro riportato. Qual è la diagnosi endoscopica di quanto osservato?

- ☒ A: Ulcera gastrica antrale tipo Forrest IIc
- ☐ B: Ulcera gastrica antrale tipo Forrest I
- ☐ C: Ulcera gastrica antrale tipo Forrest III
- ☐ D: Polipo iperplastico
- ☐ E: Singola formazione diverticolare dell'antro gastrico

Domanda 69: (codice domanda: ssm2023509)

Un paziente di 63 anni affetto da cirrosi epatica dismetabolica ed alcool relata è stato recentemente dimesso dal reparto di gastroenterologia dove era stato ricoverato per stato confusionale secondario ad encefalopatia epatica. Quale fra le terapie sottoelencate è più appropriata per la prevenzione della recidiva di encefalopatia epatica?

- ☒ A: Lattulosio/lattitolo + rifaximina
- ☐ B: Lattulosio/lattitolo + metronidazolo
- ☐ C: Lattulosio/lattitolo + propranololo
- ☐ D: Lattulosio/lattitolo + furosemide
- ☐ E: Lattulosio/lattitolo + canrenone

Domanda 70: (codice domanda: ssm2023510)

Ad un paziente di 80 anni con storia di pregressa ulcera gastrica viene prescritto acido acetilsalicilico a basse dosi. Quale ulteriore farmaco è bene che venga prescritto?

- ☒ A: Inibitore di pompa protonica per os
- ☐ B: Misoprostolo a dose standard per os
- ☐ C: Misoprostolo ad alte dosi per os
- ☐ D: Dispositivo medico con idrossido di alluminio e acido ialuronico per os
- ☐ E: Sucralfato per os

Domanda 71: (codice domanda: ssm2023511)

In un paziente di 74 anni ricoverato in un reparto di Pneumologia per dispnea acuta non febbrile ed insufficienza respiratoria acuta ipossiémica di natura da definire, con RX torace che non mostra nessuna lesione a focolaio, quale tra i seguenti accertamenti diagnostici è irrinunciabile?

- ☒ A: Dosaggio D-dimero ematico
- ☐ B: Ricerca antigeni urinari *Legionella pneumophila* e *Streptococcus pneumoniae*
- ☐ C: Procalcitoninemia
- ☐ D: TC torace senza contrasto
- ☐ E: Mioglobinemia

Domanda 72: (codice domanda: ssm2023512)

Una paziente di 73 anni, ex fumatrice di 70 pack-years, in ossigenoterapia domiciliare a lungo termine per una BPCO (ultima spirometria eseguita circa 12 mesi prima con VEMS post-broncodilatatore pari al 30% del teorico) viene ricoverata per la presenza di insufficienza respiratoria cronica riacutizzata secondaria a polmonite acquisita in comunità al lobo medio e scompenso cardiaco. Quale tra i seguenti trattamenti è irrinunciabile?

- ☒ A: Ossigenoterapia
- ☐ B: Glucocorticoidi per via sistemica
- ☐ C: Nitroderivati per via endovenosa
- ☐ D: Beta-bloccante per via endovenosa
- ☐ E: Aminofillina per via endovenosa

Domanda 73: (codice domanda: ssm2023513)

Una donna di 65 anni, ex fumatrice di 40 pack-years, affetta da BPCO con VEMS pari al 28% del teorico (ultima spirometria eseguita circa sei mesi fa) giunge all'osservazione con la seguente emogasanalisi arteriosa eseguita mentre la paziente respirava aria ambiente: pH=7,35, PaO₂=40 mmHg, PaCO₂=55 mmHg, HCO₃⁻=27 mmol/L. Questa emogasanalisi è più indicativa di una paziente con:

- ☒ A: Insufficienza respiratoria acuta parziale con acidosi respiratoria compensata
- ☐ B: Insufficienza respiratoria globale acuta su cronica con acidosi respiratoria scompensata
- ☐ C: Acidosi metabolica pura
- ☐ D: Alcalosi respiratoria
- ☐ E: Alcalosi metabolica

Domanda 74: (codice domanda: ssm2023514)

I "criteri di Duke modificati" per la diagnosi di endocardite infettiva sono distinti in criteri maggiori e criteri minori. Tra i seguenti NON è un criterio maggiore:

- ☒ A: Fenomeni vascolari
- ☐ B: Significativa insufficienza valvolare di nuova insorgenza
- ☐ C: Ecocardiogramma positivo per nuova parziale deiscenza di protesi valvolare
- ☐ D: Due distinte emocolture positive per *Streptococcus bovis*
- ☐ E: Una singola emocoltura positiva per *Coxiella burnetii*

Domanda 75: (codice domanda: ssm2023515)

Un paziente con sintomi di meningite acuta presenta esami ematochimici nella norma. La rachicentesi evidenzia un liquor con una pressione di 35 cm H₂O, limpido, con leucociti 460/mm³ (linfo-monociti 89%), protidorrachia 42 mg/dL e glicorrachia 56 mg/dL (con glicemia 88 mg/dL). Quale tra le seguenti è la diagnosi più probabile?

- ☒ A: Meningite da enterovirus
- ☐ B: Meningoencefalite da amebe a vita libera
- ☐ C: Meningite pneumococcica
- ☐ D: Meningoencefalite da *Cryptococcus neoformans*
- ☐ E: Meningite da *Haemophilus influenzae*

Domanda 76: (codice domanda: ssm2023516)

Un uomo di 75 anni con cardiopatia ischemica nota viene accompagnato in Pronto Soccorso per la comparsa nella notte di dispnea ingravescente. All'arrivo il paziente è vigile e tachi-dispnoico. All'auscultazione del torace si riscontano bilateralmente rumori umidi "a marea montante". La pressione arteriosa è 185/90 mmHg, la frequenza cardiaca è 130 bpm con PaO₂ 45 mmHg in area ambiente e pH 7,33. Quale tra i seguenti è il primo provvedimento da intraprendere?

- ☒ A: Ventilazione meccanica non invasiva
- ☐ B: Somministrazione di dopamina
- ☐ C: Posizionamento di lacci emostatici a rotazione sui quattro arti
- ☐ D: Somministrazione di furosemide per os
- ☐ E: Fluidoterapia

Domanda 77: (codice domanda: ssm2023517)

Un uomo di 30 anni viene rinvenuto in un giardino pubblico dal personale del 118 privo di coscienza, bradipnoico e con polso conservato. Sono evidenti segni di recente venopuntura ed è presente un laccio emostatico. Le pupille sono miotiche, la pressione è 90/60 mmHg. Il farmaco da somministrare tra i seguenti è:


- ☒ A: Naloxone
- ☐ B: Flumazenil
- ☐ C: Diazepam
- ☐ D: Pralidossima
- ☐ E: Fisostigmina

Domanda 78: (codice domanda: ssm2023518)

Un uomo di 80 anni presenta da alcuni giorni febbre e otalgia per cui ha utilizzato antibiotico topico. Per la persistenza della sintomatologia il paziente si reca in Pronto Soccorso. Gli accertamenti laboratoristici rilevano una leucocitosi neutrofila e aumento della proteina C reattiva. Durante l'osservazione al PS il paziente sviluppa un picco febbrile con rigidità nucale e successiva riduzione dello stato di coscienza fino al coma. Tra le seguenti l'ipotesi più probabile è che il paziente abbia sviluppato:

- ☒ A: Una meningite secondaria a otite da *Streptococcus pneumoniae*
- ☐ B: Uno "stroke" emorragico
- ☐ C: Una perforazione timpanica
- ☐ D: Uno stato di male epilettico
- ☐ E: Uno "stroke" ischemico

Domanda 79: (codice domanda: ssm2023519)



Un paziente di 56 anni si presenta in Pronto Soccorso con dolore diffuso in zona epigastrica. Appare ansioso, agitato, in cerca di una posizione per alleviare il dolore. Sono presenti sudorazione profusa, bradicardia, extrasistoli. L'accompagnatore ha riferito che il paziente accusava nausea e ha avuto 2 episodi di vomito alimentare circa 40 minuti prima. Si procede all'effettuazione di un ECG, emocromo, dosaggio enzimi specifici (Troponina, CPK, SGOT, LDH), RX torace, ecocardiogramma ed eco addome. Sono presenti leucocitosi ed iperglicemia. Si rimane in attesa del referto di enzimi specifici. Il referto dell'ECG è il seguente. Alla luce del quadro clinico ed elettrocardiografico, quale tra le seguenti è la diagnosi più probabile?

- ☒ A: STEMI
- ☐ B: Blocco di branca dx
- ☐ C: ECG nella norma
- ☐ D: Pericardite acuta
- ☐ E: NSTEMI

Domanda 80: (codice domanda: ssm2023520)

Una donna di 59 anni, nepalese, non fumatrice, giunta in Italia da circa un mese, si presenta dal medico con tosse, febbre, serotina ed un recente episodio di emottisi. Riferisce calo ponderale di 2 Kg negli ultimi 2 mesi, nessuna comorbidità. Quale tra le seguenti è la diagnosi più probabile?

- ☒ A: Tubercolosi polmonare
- ☐ B: Infarto polmonare
- ☐ C: Edema polmonare
- ☐ D: BPCO
- ☐ E: Cuore polmonare acuto

Domanda 81: (codice domanda: ssm2023521)

Un paziente di 65 anni, fumatore (40 pack-years), iperteso, con tosse anche produttiva, espettorato striato di sangue e dispnea si presenta in Pronto Soccorso. Non febbre, decubito indifferente, calo ponderale di 5 Kg nell'ultimo mese, senza variazione del regime alimentare. Sono stati eseguiti emocromo, ECG, RX torace e il dosaggio del BNP che risulta 80 pg/mL. In attesa degli altri referti, quale tra le seguenti è la diagnosi più probabile?

- ☒ A: Carcinoma polmonare
- ☐ B: Scompenso cardiaco congestizio
- ☐ C: Edema polmonare
- ☐ D: Cardiopatia ischemica
- ☐ E: Pneumotorace

Domanda 82: (codice domanda: ssm2023522)

Un paziente di 80 anni, iperteso e diabetico giunge in Pronto Soccorso accusando da alcune ore afasia, capogiri, difficoltà alla deambulazione, deviazione della rima buccale. Il quadro clinico regredisce dopo circa un'ora. Quale tra le seguenti è la diagnosi più probabile?

- ☒ A: Attacco ischemico transitorio
- ☐ B: Infarto cerebrale
- ☐ C: Tumore cerebrale
- ☐ D: Ematoma cerebrale
- ☐ E: Emorragia subaracnoidea

Domanda 83: (codice domanda: ssm2023523)

Un paziente di 68 anni lamenta astenia e dispnea. All'esame obiettivo presenta toni cardiaci parafonici, pressione arteriosa 90/70 mmHg che cala ulteriormente in fase espiratoria, turgore delle vene giugulari. All'ECG si rilevano alterazioni aspecifiche della ripolarizzazione. Quale tra le seguenti è la diagnosi più probabile?

- ☒ A: Versamento pericardico
- ☐ B: Dissezione aortica
- ☐ C: Cardiomiopatia ipertrofica
- ☐ D: Miocardite acuta
- ☐ E: Ischemia miocardica acuta

Domanda 84: (codice domanda: ssm2023524)

Un uomo di 86 anni, in terapia per scompenso cardiaco cronico, lamenta da alcuni giorni dispnea ingravescente, ortopnea e comparsa di edemi declivi. Riferisce di non aver assunto con regolarità la terapia domiciliare. Quale tra i seguenti farmaci deve essere rapidamente reintrodotta con contestuale rivalutazione della posologia?

- ☒ A: Diuretico dell'ansa
- ☐ B: Antiaggregante piastrinico
- ☐ C: Beta bloccante
- ☐ D: ACE inibitore
- ☐ E: Calcio antagonista

Domanda 85: (codice domanda: ssm2023525)

Al primo riscontro di fibrillazione atriale persistente quale score tra i seguenti può essere utilizzato per determinare la necessità di terapia anticoagulante?

- ☒ A: CHA₂DS₂-VASc
- ☐ B: Wells
- ☐ C: Geneva
- ☐ D: CURB
- ☐ E: SOFA

Domanda 86: (codice domanda: ssm2023526)

Nella malattia del rene policistico autosomica dominante (ADPKD) quale tra le seguenti è una lesione extrarenale tipica:

- ☒ A: Aneurismi cerebrali
- ☐ B: Cisti sebacee
- ☐ C: Sordità
- ☐ D: Alterazioni corneali
- ☐ E: Alterazioni ungueali

Domanda 87: (codice domanda: ssm2023527)

Una paziente di 36 anni si presenta in Pronto Soccorso con forti dolori trafittivi al quadrante addominale inferiore sx e al fianco sx che si irradiano al dorso e all'inguine. Manovra di Giordano positiva. Nausea e vomito. Nessuna comorbidità. Pressione arteriosa 150/80 mmHg, 101 bpm, SpO₂ 99% in aria ambiente. Quale tra le seguenti è la diagnosi più probabile?

- ☒ A: Colica renale
- ☐ B: Colica biliare
- ☐ C: Gravidanza extrauterina
- ☐ D: Appendicite acuta
- ☐ E: Pancreatite acuta

Domanda 88: (codice domanda: ssm2023528)

Nella sindrome da lisi tumorali le seguenti manifestazioni sono tutte tipiche TRANNE una, quale?

- ☒ A: Iperglicemia
- ☐ B: Iperuricemia
- ☐ C: Iperpotassiemia
- ☐ D: Aumento della creatininemia
- ☐ E: Iperfosforemia

Domanda 89: (codice domanda: ssm2023529)

Un paziente di 65 anni affetto da ipertensione arteriosa da diversi anni si presenta ad una prima valutazione nefrologica ambulatoriale per recente insorgenza di edemi declivi. Allo stick urine è presente una albuminuria di 300 mg/dL. Quale tra i seguenti gruppi di esami di approfondimento è più opportuno in prima istanza?

- ☒ A: Emocromo, indici di funzionalità renale, elettroliti completi, assetto lipidico, elettroforesi siero-proteica, esame urine, proteinuria delle 24 h
- ☐ B: Assetto lipidico, indici di funzionalità renale, enzimi epatici, indici di colestasi, bilirubinemia totale e frazionata, omocisteinemia
- ☐ C: Emocromo, indici di funzionalità renale, elettroliti completi e test di Farley
- ☐ D: Emocromo con reticolociti, volume di filtrazione glomerulare, uricemia, elettroliti completi, assetto marziale, PTH
- ☐ E: Test genetico per le podocitopatie

Domanda 90: (codice domanda: ssm2023530)

L'attuale stadiazione della malattia renale cronica secondo le linee guida internazionali e nazionali:

- ☒ A: Prevede la suddivisione in stadi di malattia renale ingravescente secondo il filtrato glomerulare stimato o misurato
- ☐ B: Necessita di valutazione ecografica della morfologia renale con valutazione dello spessore cortico-midollare
- ☐ C: Non riconosce gli stadi precoci in cui sono presenti segni di patologia renale ma non di compromissione funzionale
- ☐ D: Riconosce la presenza di 3 stadi di malattia renale cronica lieve, moderata e severa sulla base dei valori di creatininemia
- ☐ E: Può essere utilizzata solo nei pazienti con diagnosi istologica di nefropatia cronica

Domanda 91: (codice domanda: ssm2023531)

In una paziente di 63 anni con recente diagnosi di adenocarcinoma gastrico di tipo intestinale, metastatico a livello epatico e polmonare, la valutazione immunoistochimica sul tessuto neoplastico ha documentato l'iperespressione di HER-2. E' stata posta l'indicazione ad eseguire un trattamento chemioterapico di prima linea. Quale terapia a bersaglio molecolare è indicato associare al trattamento chemioterapico?

- ☒ A: Trastuzumab
- ☐ B: Panitumumab
- ☐ C: Bevacizumab
- ☐ D: Cetuximab
- ☐ E: Rituximab

Domanda 92: (codice domanda: ssm2023532)

Il pembrolizumab è un farmaco immunoterapico indicato nel trattamento di numerosi tumori solidi in fase metastatica come tumore polmonare non-microcitoma, melanoma, carcinoma uroteliale, carcinoma renale, carcinoma testa/collo. Che tipo di anticorpo è?

- ☒ A: E' un anticorpo monoclonale anti-PD1
- ☐ B: E' un anticorpo monoclonale anti-VEGF
- ☐ C: E' un anticorpo monoclonale anti-TIGIT
- ☐ D: E' un anticorpo monoclonale anti-HER-2
- ☐ E: E' un anticorpo monoclonale anti-CTLA4

Domanda 93: (codice domanda: ssm2023533)

A seguito della comparsa di ittero, una paziente di 61 anni in buone condizioni cliniche generali esegue degli accertamenti diagnostici che si concludono con una diagnosi di tumore della testa del pancreas. La paziente viene sottoposta ad intervento chirurgico di duodenocefalopancreasectomia e l'esame istologico depone per "adenocarcinoma della testa del pancreas". La stadiazione è pT2pN1M0. Quale trattamento medico è più indicato?

- ☒ A: Chemioterapico adiuvante secondo lo schema FOLFIRINOX
- ☐ B: Chemioterapico adiuvante secondo lo schema CHOP
- ☐ C: Chemioterapico adiuvante secondo lo schema Ciclofosfamide-Adriamicina
- ☐ D: Immunoterapico adiuvante con Atezolizumab
- ☐ E: Chemioterapico adiuvante con Topotecan

Domanda 94: (codice domanda: ssm2023534)

Un uomo di 27 anni lamenta da circa 2 anni dolore lombare irradiato ai glutei. La sintomatologia è accentuata al risveglio e migliora progressivamente nell'arco della giornata. Gli esami mostrano moderato incremento degli indici di flogosi ma la radiografia del bacino e del rachide lombosacrale non evidenziano alterazioni di rilievo. Quale tra questi esami è più indicato effettuare?

- ☒ A: RM bacino
- ☐ B: TC bacino
- ☐ C: TC rachide lombosacrale
- ☐ D: Ecografia rachide lombosacrale
- ☐ E: Biopsia osteomidollare

Domanda 95: (codice domanda: ssm2023535)

Un uomo di 34 anni presenta da circa due mesi febbre intermittente accompagnata a faringodinia. Durante gli episodi ha notato un rash color salmone sul tronco e sulle braccia. Agli esami di laboratorio si evidenzia un incremento degli indici di flogosi ed un marcato aumento dei valori di ferritina. Quale tra le seguenti è la diagnosi più probabile?

- ☒ A: Malattia di Still dell'adulto
- ☐ B: Artrite reumatoide
- ☐ C: Sclerosi sistemica
- ☐ D: Dermatomiomiosite
- ☐ E: Polimialgia reumatica

Domanda 96: (codice domanda: ssm2023536)

Una donna di 60 anni affetta da diabete mellito di tipo 1 dall'età di 28 anni, complicato da retinopatia e nefropatia diabetica, ha un colesterolo LDL=130 mg/dL, in assenza di terapia ipolipemizzante. Secondo le linee guida ESC del 2019, il suo target dovrebbe essere:

- ☒ A: LDL<55 mg/dL
- ☐ B: LDL<70 mg/dL
- ☐ C: LDL<100 mg/dL
- ☐ D: LDL<116 mg/dL
- ☐ E: LDL<130 mg/dL

Domanda 97: (codice domanda: ssm2023537)

Un paziente di anni 80, si presenta al Pronto Soccorso per la comparsa acuta, circa due ore prima, di ipostenia dell'emisoma di destra. Obiettività neurologica: paziente vigile, collaborante; deficit di forza agli arti di destra con caduta precoce alla manovra di Mingazzini, lieve deficit del linguaggio con anomalie. L'indagine diagnostica da effettuare immediatamente è:

- ☒ A: TC cerebrale con studio angiografico dei vasi cerebrali
- ☐ B: Spettroscopia con RM cerebrale
- ☐ C: Ecodoppler dei tronchi sopraortici
- ☐ D: Angiografia cerebrale
- ☐ E: Elettroencefalogramma

Domanda 98: (codice domanda: ssm2023538)

Paziente di 45 anni moderatamente iperteso in trattamento farmacologico con antipertensivi. Da circa una settimana presenta episodi caratterizzati da clonie che interessano inizialmente la mano destra e si estendono successivamente all'emivolto omolaterale. Gli episodi durano circa 30 secondi e sono seguiti da una perdita di forza che persiste per diverse ore. Quale tra le seguenti è l'ipotesi diagnostica più probabile?

- ☒ A: Epilessia parziale motoria
- ☐ B: Esordio di una sindrome extrapiramidale
- ☐ C: Espressione di ischemie cerebrali focali transitorie
- ☐ D: Miopatia
- ☐ E: Ischemie midollari

Domanda 99: (codice domanda: ssm2023539)

Una ragazza di 20 anni si presenta all'osservazione dei sanitari in merito ad un disturbo caratterizzato da parestesie localizzate simmetricamente a livello distale nei 4 arti. Interrogata, riferisce che i sintomi sono comparsi il giorno precedente ma stanno progredendo per intensità. Due settimane prima dell'esordio dei sintomi, viene segnalata una gastroenterite regredita dopo circa cinque giorni. All'esame obiettivo neurologico, gli unici elementi di rilievo riguardano una ipoestesia distale agli arti inferiori e superiori e assenza dei riflessi achillei bilateralmente, con ipo-eccitabilità di tutti gli altri riflessi osteotendinei. L'ipotesi diagnostica più probabile tra le seguenti è:

- ☒ A: Poliradicolonevrite acuta (S. di Guillain-Barré)
- ☐ B: Esordio di una Sclerosi Multipla
- ☐ C: Ictus vertebrobasilare
- ☐ D: Intossicazione da benzodiazepine
- ☐ E: Compressione midollare (S. Brown-Séquard)

Domanda 100: (codice domanda: ssm2023540)

La Disforia di genere può essere definita come:

- ☒ A: Il disagio affettivo tra il ruolo, il genere espresso dall'individuo e il sesso attribuito alla nascita
- ☐ B: Un comportamento che si osserva in un adolescente maschio eterosessuale che utilizza uno o più indumenti femminili per eccitarsi sessualmente e masturbarsi da solo o in uno scambio con un partner
- ☐ C: Un timore o un pensiero dell'adolescente che pensa di essere attirato da persone dello stesso sesso
- ☐ D: Una condizione caratterizzata soprattutto dalla ambiguità degli organi genitali esterni e si possono distinguere due categorie principali: lo pseudoermafroditismo femminile, più frequente, e quello maschile
- ☐ E: Una condotta psicopatica che si accompagna ad altre manifestazioni come la prostituzione e la tossicodipendenza

Domanda 101: (codice domanda: ssm2023541)

Un paziente di 48 anni giunge in Pronto Soccorso trasportato dal 118 che è stato allertato da un familiare del paziente in seguito ad episodio delirante acuto (il paziente sospettava che la compagna lo tradisse) associato ad uno stato di agitazione psicomotoria. La compagna del paziente è molto preoccupata perché nell'ultima settimana aveva notato cambiamenti comportamentali con insorgenza di insonnia, ansia libera, manie di persecuzione e deficit attentivi. In anamnesi nulla di rilevante, nega familiarità per patologie neurologiche e/o psichiatriche. Viene riferita una febbre con astenie e mialgie insorte da circa due settimane e durata di tre giorni. All'esame obiettivo si evidenzia disorientamento spazio-temporale, difficoltà nella comprensione delle consegne e nel reperimento dei vocaboli in un contesto di obiettività internistica nella norma. Qual è il percorso diagnostico più appropriato?

- ☒ A: RM encefalo con MdC + EEG
- ☐ B: RM encefalo senza MdC
- ☐ C: TC cerebrale senza MdC
- ☐ D: Potenziali evocativi visivi
- ☐ E: Angio-RM encefalo

Domanda 102: (codice domanda: ssm2023542)

Qual è il farmaco più indicato come stabilizzatore dell'umore nel trattamento di pazienti affetti da sindrome bipolare di tipo I?

- ☒ A: Acido valproico
- ☐ B: Fluoxetina
- ☐ C: Venlafaxina
- ☐ D: Carbamazepina
- ☐ E: Pregabalin

Domanda 103: (codice domanda: ssm2023543)

La scintigrafia miocardica è indicata per studiare:

- ☒ A: Perfusioni cardiaca
- ☐ B: Ipertensione arteriosa
- ☐ C: Tumori cardiaci
- ☐ D: Infezione di valvole cardiache
- ☐ E: Rottura di muscolo papillare

Domanda 104: (codice domanda: ssm2023544)

In un paziente con recidiva biochimica da carcinoma prostatico, sottoposto a prostatectomia radicale, quale indagine tra le seguenti è più indicata per la identificazione di tutte le possibili sedi di malattia?


- ☒ A: PET/TC con 68Ga-PSMA
- ☐ B: PET/TC con 18F-FDG
- ☐ C: PET/TC con 18F-DOPA
- ☐ D: Scintigrafia ossea
- ☐ E: PET/TC con 68Ga-DOTA-peptidi (DOTATATE, DOTATOC, DOTANOC)

Domanda 105: (codice domanda: ssm2023545)

I 68Ga-DOTA-peptidi (DOTATATE, DOTATOC, DOTANOC) sono radiofarmaci PET impiegati routinariamente per lo studio:

- ☒ A: Dei tumori neuroendocrini ben differenziati
- ☐ B: Dei disturbi del movimento
- ☐ C: Dei carcinomi squamo-cellulari
- ☐ D: Dei carcinomi della prostata
- ☐ E: Dell'amiloidosi cardiaca

Domanda 106: (codice domanda: ssm2023546)



Paziente HBsAg positivo con recente riscontro di massa palpabile in addome, esegue TC con MdC e.v. che evidenzia una lesione epatica sospetta per una diagnosi di epatocarcinoma. Qual è il comportamento contrastografico tipico dell'epatocarcinoma?


- ☒ A: Wash-in arterioso con wash-out portale-tardivo
- ☐ B: Wash-in portale e wash-out arterioso
- ☐ C: Enhancement centripeto progressivo
- ☐ D: Assenza di contrast-enhancement
- ☐ E: L'epatocarcinoma non presenta un pattern contrastografico specifico

Domanda 107: (codice domanda: ssm2023547)

Donna di 22 anni, accede al Pronto Soccorso per incidente stradale. Riferisce dolore addominale diffuso. PA: 130/70 mmHg, SpO2 97% in aria ambiente. ECO-FAST dubbia. Qual è l'indagine più appropriata per l'inquadramento diagnostico terapeutico tra le seguenti?

- ☒ A: TC spirale dell'addome con MdC
- ☐ B: Esame diretto dell'addome
- ☐ C: Ecografia con MdC
- ☐ D: Laparoscopia esplorativa
- ☐ E: RM whole body


Domanda 108: (codice domanda: ssm2023548)



Paziente di 87 anni con dolore in regione dorsale. Quali reperti di rilievo si possono evidenziare in queste immagini RX e TC?

- ☒ A: Crollo vertebrale dorsale
- ☐ B: Crollo vertebrale lombare
- ☐ C: Dissezione dell'aorta
- ☐ D: Morbo di Paget
- ☐ E: Ernia discale

Domanda 109: (codice domanda: ssm2023549)



Una paziente di 56 anni è affetta da carcinoma squamocellulare della cervice uterina, inoperabile per estesa infiltrazione dei parametri. Il trattamento programmato consiste in una chemioradioterapia. La radioterapia è effettuata con irradiazione della regione pelvica seguita dal posizionamento nella vagina e nell'utero di un applicatore caricato con sorgenti di iridio-192, come riportato in figura. Come si definisce quest'ultima tecnica di trattamento?

- ☒ A: Brachiterapia intracavitaria
- ☐ B: Radioterapia esterna
- ☐ C: Radioterapia intraoperatoria
- ☐ D: Radio-immunoterapia
- ☐ E: Brachiterapia interstiziale

Domanda 110: (codice domanda: ssm2023550)

Uomo, 63 anni, ex calciatore professionista, oggi allenatore, effettua una visita per idoneità sportiva. Nessuna malattia in anamnesi. All'ECG si riscontra presenza di bassi voltaggi periferici, emiblocco di branca anteriore sinistro e pseudo-necrosi anteriore. Esami ematochimici ed elettroforesi sierica ed urinaria nella norma. Viene prescritto ecocardiogramma che mostra ipertrofia simmetrica del ventricolo sinistro, del ventricolo destro e del setto. Viene effettuata una biopsia endomiocardica che riscontra: "Miocellule di dimensioni aumentate, talora frammentate ed atrofiche; nell'interstizio miocardico è presente una sostanza eosinofila, amorfa, omogenea". Alla luce del quadro clinico e di quello istologico, quale è la diagnosi più probabile tra le seguenti?

- ☒ A: Amiloidosi cardiaca
- ☐ B: Miocardite cronica
- ☐ C: Fibrosi secondaria a pregresso evento ischemico
- ☐ D: Cardiomiopatia aritmogena
- ☐ E: Cardiomiopatia ipertrofica

Domanda 111: (codice domanda: ssm2023551)

Donna, 23 anni, da circa due mesi presenta nodulo del quadrante superiore interno della mammella sinistra che, riferisce, è in accrescimento. Quando l'assistita si presenta al curante il nodulo è di 2,2 cm, clinicamente a margini netti, mobile, di consistenza teso-elastica. Viene eseguita biopsia eco-guidata il cui esame istologico mostra: "Lesione fibroepiteliale a cellularità stromale diffusamente aumentata in assenza di atipie; proliferazione ghiandolare con note di iperplasia duttale senza atipie. È presente 1 mitosi/10 HPF". In base al quadro clinico e a quello istologico, quale è la diagnosi più probabile tra le seguenti?

- ☒ A: Fibroadenoma
- ☐ B: Tumore filloide
- ☐ C: Carcinoma duttale infiltrante
- ☐ D: Adenoma tubulare
- ☐ E: Mixoma mammario

Domanda 112: (codice domanda: ssm2023552)

Una donna di 54 anni, durante esami ematochimici di routine, presenta un incremento del TSH con valori normali di fT3 e fT4. Viene effettuata ecografia tiroidea che mostra la presenza di noduli multipli, tra i quali un nodulo del lobo sinistro, del diametro massimo di 18 mm, con aspetto ipoecogeno, a bordi irregolari, con presenza di microcalcificazioni. Viene effettuato agoaspirato di tale nodulo che mostra all'esame citologico: "Numerose emazie associate a gruppi di cellule con nuclei ingranditi, ovali, talora sovrapposti, che mostrano incisure e pseudoinclusioni nucleari". In base al quadro clinico e citologico, quale è la diagnosi più probabile tra le seguenti?

- ☒ A: Carcinoma papillifero
- ☐ B: Nodulo colloideo-cistico
- ☐ C: Nodulo iperplastico
- ☐ D: Carcinoma midollare
- ☐ E: Adenoma follicolare

Domanda 113: (codice domanda: ssm2023553)

Uomo di 72 anni, fumatore con storia di etilismo, sviluppa una progressiva difficoltà nella deglutizione. All'esame obiettivo non vengono riscontrati segni particolari; si decide quindi di sottoporre il paziente ad EGDS durante la quale si riscontra la presenza di una lesione a placca, centralmente erosa, di 1 cm di diametro massimo, al livello del terzo medio dell'esofago su cui si effettua una biopsia; l'esame istologico mostra: "Proliferazione costituita da cellule di grandi dimensioni, con citoplasma abbondante ed eosinofilo e con nuclei di dimensioni aumentate e nucleolo prominente". In base al quadro clinico ed a quello istologico, quale è la diagnosi più probabile tra le seguenti?

- ☒ A: Carcinoma squamocellulare
- ☐ B: Adenocarcinoma
- ☐ C: Infezione da Citomegalovirus
- ☐ D: Infezione fungina
- ☐ E: Ulcera eosinofila

Domanda 114: (codice domanda: ssm2023554)

Un uomo di 22 anni giunge in Pronto Soccorso, presenta febbre oltre i 38,5°C, rigidità nucale e forte cefalea. Viene eseguita una rachicentesi e alla lettura microscopica del vetrino, nel liquor cefalo-rachidiano si evidenziano numerosi polimorfonucleati e diplococchi Gram negativi. Quale tra i seguenti microrganismi è il probabile responsabile dell'infezione?

- ☒ A: *Neisseria meningitidis*
- ☐ B: *Staphylococcus aureus*
- ☐ C: *Streptococcus pneumoniae*
- ☐ D: *Escherichia coli*
- ☐ E: *Streptococcus agalactiae*

Domanda 115: (codice domanda: ssm2023555)

Una donna di 30 anni, alle prime settimane di gravidanza, ha eseguito varie indagini di laboratorio ed è risultata negativa alla ricerca di anticorpi anti-Toxoplasma gondii. Quale raccomandazione del proprio ginecologo non può mancare, per la prevenzione dell'infezione materno-fetale?

- ☒ A: Evitare il consumo di carne cruda o poco cotta
- ☐ B: Evitare il contatto con cani randagi
- ☐ C: Evitare di frequentare ambienti sovra-affollati
- ☐ D: Evitare il consumo di verdura cotta
- ☐ E: Usare repellenti per evitare punture di zanzara

Domanda 116: (codice domanda: ssm2023556)

Una giovane donna di 20 anni, agli esami di controllo eseguiti per astenia profonda, presenta un emocromo con emoglobina 8,5 g/dL, MCV 64 fL e piastrine $500 \times 10^9/L$. All'anamnesi riferisce probabile beta Talassemia Minor e flussi mestruali molto abbondanti. Quale tra le seguenti procedure è la più adeguata?

- ☒ A: Si esegue la valutazione della sideremia, transferrinemia e ferritinemia e, se presente carenza di ferro, si prescrive terapia marziale; successivamente si procede con la valutazione dell'elettroforesi delle emoglobine
- ☐ B: Nei portatori di beta Talassemia Minor non è opportuno alcun trattamento marziale per cui si prescrive il dosaggio della vitamina B12 e dell'acido folico per l'eventuale supporto con vitamine emoaattive
- ☐ C: Si contatta lo specialista Ematologo e il Servizio Trasfusionale per il supporto trasfusionale urgente con emazie
- ☐ D: Si prescrive subito l'elettroforesi delle emoglobine per porre diagnosi certa di beta Talassemia Minor e si invia quindi la paziente dallo specialista Ematologo
- ☐ E: Si prescrive una gastroscopia e una rettocolonscopia nell'ipotesi di una anemizzazione da perdita cronica di sangue

Domanda 117: (codice domanda: ssm2023557)

La diagnosi di fenilchetonuria avviene solitamente nell'ambito di:

- ☒ A: Un programma di screening neonatale basato sulla determinazione dei livelli plasmatici di fenilalanina misurati almeno 48 ore dopo la nascita
- ☐ B: Un programma di screening neonatale basato sulla valutazione dell'attività dell'enzima fenilalanina idrossilasi epatico dopo la comparsa dei sintomi caratteristici mediante valutazioni biochimiche e molecolari
- ☐ C: Approcci diagnostici prenatali basati sulla determinazione delle mutazioni responsabili nel DNA fetale
- ☐ D: Approcci diagnostici neonatali effettuati selettivamente su figli di pazienti affetti dalla malattia
- ☐ E: Approcci diagnostici neonatali effettuati selettivamente su figli di pazienti affetti da questa o da altre malattie del metabolismo degli aminoacidi

Domanda 118: (codice domanda: ssm2023558)

Il vaccino antimorbillo è:

- ☒ A: Costituito da virus vivi e attenuati
- ☐ B: Combinato con il vaccino anti-pertosse e anti-rotavirus
- ☐ C: Ottenuto mediante la tecnica del DNA ricombinante
- ☐ D: Costituito da virus inattivati
- ☐ E: Costituito da subunità virali

Domanda 119: (codice domanda: ssm2023559)

La tossina tetanica:

- ☒ A: E' una neurotossina che causa paralisi spastica potenzialmente letale
- ☐ B: E' una neurotossina che causa paralisi flaccida potenzialmente letale
- ☐ C: E' una enterotossina che causa intossicazioni alimentari
- ☐ D: Viene prodotta da spore di Clostridium tetani
- ☐ E: Induce un'efficace risposta immunitaria dopo la guarigione clinica

Domanda 120: (codice domanda: ssm2023560)

Indicare, quale delle seguenti affermazioni concernenti Il Servizio Sanitario Nazionale è corretta:

- ☒ A: I Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) sono costituiti dall'insieme delle attività, dei servizi e delle prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale eroga a tutti i cittadini gratuitamente o con il pagamento di un ticket, indipendentemente dal reddito e dal luogo di residenza
- ☐ B: La definizione dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) compete alle Regioni
- ☐ C: Le Aziende Sanitarie Locali sono state istituite con la legge 833/1978
- ☐ D: I medici di Medicina Generale ed i Pediatri di Libera Scelta sono professionisti "dipendenti" dal Servizio Sanitario Regionale
- ☐ E: Nel 2001 una legge costituzionale ha attribuito alle Regioni potere esclusivo in tema di sanità

Domanda 121: (codice domanda: ssm2023561)

Tra gli studi epidemiologici:

- ☒ A: Quelli di coorte si basano sull'osservazione nel tempo di soggetti esposti e non esposti ad un fattore di rischio
- ☐ B: Quelli di coorte consentono di calcolare la prevalenza della malattia negli esposti e nei non esposti ad un fattore di rischio
- ☐ C: Quelli caso-controllo consentono di calcolare l'incidenza della malattia negli esposti e nei non esposti ad un fattore di rischio
- ☐ D: Quelli caso-controllo non sono indicati per le malattie rare
- ☐ E: Quelli trasversali sono studi di incidenza

Domanda 122: (codice domanda: ssm2023562)

Cosa si intende con il termine "rischio" nell'ambito della Medicina del Lavoro?

- ☒ A: La probabilità del raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione
- ☐ B: La proprietà intrinseca di un determinato fattore di provocare un danno alla salute
- ☐ C: Una qualsiasi situazione in cui una persona è esposta ad uno o più fattori di rischio
- ☐ D: Abbreviazione con la quale si identifica un documento di valutazione dei rischi
- ☐ E: Qualsiasi danno alla salute provocato da un'esposizione nociva

Domanda 123: (codice domanda: ssm2023563)

Quali tra le seguenti definizioni riguardo l'ipoacusia da rumore è corretta?

- ☒ A: E' di tipo percettivo, bilaterale e simmetrica
- ☐ B: E' di tipo percettivo e generalmente asimmetrica
- ☐ C: E' di tipo trasmissivo, bilaterale e simmetrica
- ☐ D: E' di tipo trasmissivo e generalmente asimmetrica
- ☐ E: E' di tipo centrale e generalmente asimmetrica

Domanda 124: (codice domanda: ssm2023564)

Arriva all'osservazione medica un bambino di 3 anni accompagnato dai genitori che riferiscono caduta accidentale dalle scale. Il bambino appare spaventato e all'ispezione i sanitari notano la presenza di multiple ecchimosi in fasi cromatiche differenti sulla regione dorsale di entrambi gli avambracci. Gli esami radiologici mostrano esiti di fratture anche "a legno verde" agli arti. I sanitari si consultano in merito alla necessità di informare l'autorità giudiziaria. Tale obbligo grava:

- ☒ A: Su chiunque, nell'esercizio della professione sanitaria, abbia prestato la propria opera o assistenza, nei casi che possano presentare i caratteri di un delitto procedibile d'ufficio
- ☐ B: Solo sul medico che abbia prestato la propria opera o assistenza, nei casi che possano presentare i caratteri di un delitto procedibile d'ufficio
- ☐ C: Solo sul medico che abbia prestato la propria opera o assistenza, nei casi che possano presentare i caratteri di un delitto procedibile a querela della persona offesa
- ☐ D: Su chiunque, nell'esercizio della professione sanitaria, abbia prestato la propria opera o assistenza, nei casi che possano presentare i caratteri di un delitto procedibile a querela della persona offesa
- ☐ E: L'obbligo non sussiste in quanto i genitori sarebbero perseguibili penalmente

Domanda 125: (codice domanda: ssm2023565)

Una persona maggiorenne viene trasportata con urgenza in Pronto Soccorso a seguito di incidente stradale. I medici riscontrano la necessità di intervenire con urgenza perché gli accertamenti hanno evidenziato un vasto ematoma intracranico. La persona è incosciente e non è in grado di prestare consenso. Quale tra i seguenti comportamenti è quello corretto?

- ☒ A: Il medico e i componenti dell'equipe sanitaria assicurano le cure necessarie, riconoscendo la sussistenza dello "stato di necessità"
- ☐ B: Il medico e i componenti dell'equipe sanitaria devono astenersi da qualsiasi cura finché la persona non sia in grado di esprimere un valido consenso
- ☐ C: Il medico segnala il caso alla Procura della Repubblica per ottenere l'autorizzazione ad intervenire
- ☐ D: Il medico e l'equipe sanitaria intervengono solo con il consenso di eventuali familiari presenti
- ☐ E: Il medico interviene chirurgicamente anche in presenza di Direttive Anticipate di Trattamento (DAT) contrarie all'intervento confermate dal fiduciario

Domanda 126: (codice domanda: ssm2023566)

Per un gruppo di 500 pazienti è stato calcolato un rischio relativo (RR) di 5,65 rispetto all'esposizione ad uno specifico fattore di rischio. Ciò significa che la probabilità di sviluppare una certa malattia è:

- ☒ A: Molto alta quando l'individuo è esposto al fattore di rischio
- ☐ B: Molto bassa quando l'individuo è esposto al fattore di rischio
- ☐ C: Nulla quando l'individuo è esposto al fattore di rischio
- ☐ D: Equivalente tra l'essere e il non essere esposti
- ☐ E: Più bassa negli esposti rispetto ai non esposti (fattore protettivo)

Domanda 127: (codice domanda: ssm2023567)

Qual è il primo provvedimento da adottare in un paziente in coma con ostruzione delle vie aeree per perdita del tono muscolare al fine di ripristinarne la pervietà?

- ☒ A: Iperestensione del capo e sublussazione della mandibola
- ☐ B: Ventilazione manuale con maschera facciale
- ☐ C: Posizionamento di maschera laringea
- ☐ D: Curarizzazione ed intubazione oro-tracheale
- ☐ E: Esecuzione di cricotiroidotomia

Domanda 128: (codice domanda: ssm2023568)

Un uomo di 28 anni, ASA1, deve essere sottoposto ad intervento di colecistectomia. Il paziente non ha subito precedenti interventi chirurgici. In sala operatoria dopo somministrazione di profilassi antibiotica e di Ondansetron l'anestesista procede ad induzione dell'anestesia con Propofol, Fentanyl, Cisatracurium, anestesia topica delle prime vie aeree con lidocaina. Dopo l'intubazione tracheale compaiono orticaria, angioedema delle palpebre e delle labbra, ipotensione e tachicardia. Quale delle seguenti classi di farmaci è più frequentemente causa di reazione anafilattica in corso di anestesia generale?

- ☒ A: Miorilassanti
- ☐ B: Anestetici locali
- ☐ C: Oppioidi
- ☐ D: Ipnotici
- ☐ E: Antiemetici

Domanda 129: (codice domanda: ssm2023569)

Un uomo di 30 anni, per altro sano, deve essere sottoposto ad intervento chirurgico di colecistectomia laparoscopica. Quale tra le seguenti procedure deve essere effettuata preliminarmente per la riduzione del rischio perioperatorio:

- ☒ A: Valutazione anestesiológica (accurata anamnesi ed esame obiettivo)
- ☐ B: Esecuzione delle prove di funzionalità respiratoria ed emogasanalisi
- ☐ C: ECG e consulenza cardiologica
- ☐ D: Assetto emocoagulativo completo
- ☐ E: Screening sierologico per anticorpi anti-HBV, anti-HCV e anti-HIV

Domanda 130: (codice domanda: ssm2023570)

Uomo di 30 anni, cade dalla scala mentre sta potando un albero. Viene chiamato il 118 che lo trasporta al Pronto Soccorso. All'arrivo in Pronto Soccorso è vigile e cosciente, GCS 15/15. Non presenta deficit di lato. Lamenta un forte dolore all'emitorace destro dove all'esame obiettivo sono evidenti ematomi multipli. All'auscultazione del torace il murmure vescicolare è ridotto a destra. I suoi parametri vitali sono: SpO2 92% in aria ambiente, FR 30 atti/min, PA 120/70 mmHg, FC 100 bpm, ritmo sinusale, emoglobina 13,5 g/dL. Quale tra le seguenti è la diagnosi più probabile


- ☒ A: Pneumotorace monolaterale
- ☐ B: Shock emorragico da rottura di milza
- ☐ C: Shock spinale da frattura mielica
- ☐ D: Emotorace massivo dx
- ☐ E: Angina pectoris

Domanda 131: (codice domanda: ssm2023571)

Una paziente di 62 anni viene sottoposta in anestesia generale al posizionamento di uno stent ureterale per calcolosi renale. Non si registrano complicanze intraoperatorie. Al risveglio presenta brivido scuotente, tachipnea, tachicardia. I parametri vitali sono: GCS 14/15 SpO2 99% in aria ambiente, PA 140/100 mmHg, temperatura di 39,5 gradi centigradi. Quale tra le seguenti è la diagnosi più probabile?

- ☒ A: Urosepsi
- ☐ B: Broncospasmo
- ☐ C: Nausea e vomito post-operatorio (PONV)
- ☐ D: Ipertermia maligna
- ☐ E: Shock anafilattico

Domanda 132: (codice domanda: ssm2023572)



Una donna di 32 anni, si reca in Pronto Soccorso per cardiopalmo. APR negativa. All'esame obiettivo: GCS 15/15, SpO2 99% in aria ambiente, FR 29 minuto, PA 110/65 mmHg, FC 180 bpm. L'ECG mostra il seguente tracciato: tachicardia parossistica sopraventricolare da rientro nodale. Alla luce del quadro ECG e dei parametri vitali quale tra i seguenti è l'intervento terapeutico più appropriato?

- ☒ A: Adenosina ev
- ☐ B: Atropina ev
- ☐ C: KCl ev
- ☐ D: Cardioversione elettrica sincronizzata
- ☐ E: Isoproterenolo ev

Domanda 133: (codice domanda: ssm2023573)

Un uomo di 70 anni deve essere operato d'urgenza per occlusione intestinale. Quale condotta è consigliata per ridurre il rischio di inalazione del contenuto gastrico all'induzione dell'anestesia generale?

- ☒ A: Intubazione in sequenza rapida
- ☐ B: Posizionamento di maschera laringea
- ☐ C: Intubazione fibroscopica
- ☐ D: Intubazione selettiva
- ☐ E: Tracheostomia

Domanda 134: (codice domanda: ssm2023574)

Una donna di 78 anni deve essere sottoposta a chirurgia ortopedica per riduzione di una frattura distale della tibia. L'anestesista decide di eseguire un blocco del nervo sciatico popliteo con 15 mL di bupivacaina 0,5% e un blocco del nervo femorale con 12 mL di bupivacaina 0,5%. In assenza momentanea di ecografo i blocchi vengono eseguiti con elettro-neurostimolatore. Alla comparsa di agitazione psicomotoria della paziente viene somministrato Midazolam 1 mg. A seguire la paziente riferisce sapore metallico, quindi sviluppa una crisi convulsiva. In base al sospetto clinico, oltre ad assicurare una adeguata gestione delle vie aeree è indicato procedere a:

- ☒ A: Somministrazione di emulsione lipidica 20% per via endovenosa
- ☐ B: Somministrazione di 100 mL di ipertonica al 3% nel sospetto di ipertensione endocranica
- ☐ C: Infusione continua di dexmedetomidina
- ☐ D: Somministrazione di levetiracetam
- ☐ E: Somministrazione di fenobarbitale

Domanda 135: (codice domanda: ssm2023575)

La riabilitazione propriocettiva si prefigge:

- ☒ A: Il recupero del controllo motorio tramite la stimolazione di afferenze cinestetiche
- ☐ B: Il recupero della sensibilità estero-cettiva in generale
- ☐ C: Di rieducare il paziente al recupero dell'emilato plegico dopo un ictus
- ☐ D: Il recupero delle sensibilità profonde tramite la stimolazione di afferenze termo-dolorifiche
- ☐ E: Il recupero della sensibilità estero-cettiva nell'emilato plegico del paziente dopo un ictus

Domanda 136: (codice domanda: ssm2023576)

Un uomo di 80 anni, sottoposto ad impianto di artroprotesi d'anca per coxartrosi sinistra, viene trasferito dal reparto di Ortopedia al reparto di Medicina Riabilitativa per iniziare la riabilitazione. In anamnesi sono presenti: cardiopatia ischemica cronica e disturbi cognitivi con autonomia ancora conservata, ma con saltuari episodi di disorientamento, specialmente notturni. Al suo arrivo il paziente presenta dolore intenso a livello dell'anca operata ed il personale infermieristico riferisce che la notte precedente, durante un episodio di disorientamento, il paziente ha tentato più volte di scavalcare le sponde del letto. Clinicamente l'arto inferiore sinistro si presenta tumefatto alla radice della coscia, accorciato rispetto al controlaterale, extraruotato, con difficoltà alla mobilizzazione passiva che provoca intenso dolore. Non sono presenti deficit vascolo-nervosi periferici obiettabili. Come è più opportuno procedere?

- ☒ A: Richiedere una radiografia dell'anca urgente per il sospetto di una lussazione dell'impianto protesico
- ☐ B: Non si deve prendere alcun provvedimento, è normale che dopo un intervento l'arto sia gonfio e dolente
- ☐ C: Raccomandare al fisioterapista una intensa mobilizzazione per recuperare l'articolazione dell'anca
- ☐ D: Richiedere un ecodoppler venoso dell'arto inferiore sinistro urgente per escludere la presenza di trombosi venosa profonda
- ☐ E: Richiedere un angio-RM urgente per il sospetto di una lesione dell'arteria femorale

Domanda 137: (codice domanda: ssm2023577)

Un uomo di 36 anni asmatico si presenta in Pronto Soccorso per una esacerbazione grave dell'asma. La sintomatologia migliora dopo somministrazione di salbutamolo per via inalatoria. Quale dei seguenti meccanismi prioritariamente può spiegare l'effetto farmacologico dei farmaci beta-2-agonisti?

- ☒ A: Aumento della AMP ciclico nelle cellule muscolari lisce tracheo-bronchiali
- ☐ B: Azione sui recettori purinergici nelle cellule muscolari lisce tracheo-bronchiali
- ☐ C: Riduzione della clearance muco-ciliare
- ☐ D: Riduzione del tono simpatico
- ☐ E: Aumento della performance diaframmatica

Domanda 138: (codice domanda: ssm2023578)

Un uomo di 62 anni è in trattamento con furosemide, digossina e ramipril per uno scompenso cardiaco a bassa frazione di eiezione. Sebbene la terapia abbia migliorato la performance cardiaca e la qualità di vita, il soggetto si reca dal proprio medico curante lamentandosi della difficoltà ad urinare nelle ultime 24 ore. Il medico, non rilevando segni di deplezione intravascolare di volume, aumenta la dose di furosemide. Tuttavia, a distanza di 6 ore, non ci sono miglioramenti. Il paziente stava assumendo autonomamente ibuprofene 1200 mg/die per la comparsa di dolore alla gamba durante la deambulazione. Quale dei seguenti meccanismi è più probabilmente responsabile dell'oliguria?

- ☒ A: Riduzione del filtrato glomerulare a causa della terapia con ibuprofene
- ☐ B: Riduzione del filtrato glomerulare a causa della terapia con digossina
- ☐ C: Peggioramento dello scompenso cardiaco nonostante la terapia
- ☐ D: Riduzione della secrezione di renina mediata da furosemide
- ☐ E: Ipokaliemia indotta da furosemide

Domanda 139: (codice domanda: ssm2023579)

Un uomo di 52 anni, a seguito di un infarto miocardico, da 2 mesi è in terapia con un regime poli-farmacologico definito dal cardiologo. A successivi controlli presenta un incremento delle transaminasi circa 3-5 volte superiore ai valori normali di riferimento. Quale tra i seguenti farmaci è più probabile abbia causato l'alterazione dei parametri di laboratorio epatici?

- ☒ A: Atorvastatina
- ☐ B: Atenololo
- ☐ C: Warfarin
- ☐ D: Clopidogrel
- ☐ E: Isosorbide dinitrato

Domanda 140: (codice domanda: ssm2023580)

Un paziente è affetto da una malattia a trasmissione autosomica recessiva che colpisce 1 individuo su 10.000 nella popolazione generale (frequenza del portatore sano nella popolazione generale 1/50). Suo fratello sano sposa una donna non consanguinea. Che rischio hanno come coppia di avere un figlio affetto da questa specifica patologia?

- ☒ A: 1/300
- ☐ B: 1/600
- ☐ C: 1/900
- ☐ D: 1/1800
- ☐ E: 1/100