

Diagnosi codificata	Diagnosi	Descrizione testuale	Biomarcatori	Nfl – fold change (sani rispetto AD: 0,54)
AD	Malattia di Alzheimer	Esordio subdolo, lento, caratterizzato da deficit della memoria a breve termine (o “di fissazione” o anche detta “memoria episodica”) che peggiorano progressivamente nell’arco di mesi. Tipico quadro forma amnestica: dimenticare la posizione degli oggetti o gli appuntamenti. Memoria a lungo termine (autobiografica e e semantica) conservata. Irrascibilità. Talora depressione (“umore deflesso”).	CSF: Ab42/Ab40 sempre alterato. P-tau e t-tau possono essere alterati. Plasma: Ab42/40, ptau181, ptau217	1
AD-PPA	Variante logopenica Malattia di Alzheimer	Afasia progressiva primaria con anomia (difficoltà a "trovare le parole" o “impoverimento del linguaggio” o “difficoltà nel reperimento dei vocaboli”) e deficit di ripetizione di frasi.	CSF: Ab42/Ab40 sempre alterato. P-tau e t-tau possono essere alterati. Plasma: Ab42/40, ptau181, ptau217 alterati	1
VAD	Demenza vascolare	Deterioramento da danno cerebrovascolare (ictus strategici, infarti multipli, malattia dei piccoli vasi/leucoaraiosi/leucoencefalopatia vascolare cronica). Deficit delle funzioni esecutive, rallentamento ideomotorio. Decorso classicamente "a gradini".		1,29
MIXED	Demenza mista (Malattia di Alzheimer + danno vascolare)	Presenza di deficit della memoria episodica tipica della malattia di Alzheimer + disturbi esecutivi + disturbi comportamentali (“rigidità”, “ansia”, “depressione”, “ossessioni”, “deliri”), soprattutto in presenza di multipli fattori di rischio cardiovascolare	CSF: Ab42/Ab40 sempre alterato. P-tau e t-tau possono essere alterati. Plasma: Ab42/40, ptau181, ptau217 alterati	1,37

SCD	Disturbo cognitivo soggettivo	Calo cognitivo (deficit della memoria a breve termine o “di fissazione” o anche detta “memoria episodica”) percepito soggettivamente dal paziente con i test neuropsicologici normali.	CSF: Ab42/Ab40 P-tau e t-tau possono essere alterati. Plasma: Ab42/40, ptau181, ptau217 possono essere alterati.	Può essere alterato.
LATE	Limbic-predominant Age-related TDP-43 Encephalopathy	Pazienti >75 anni, caratterizzata da un deficit isolato della deficit della memoria a breve termine (o “di fissazione” o anche detta “memoria episodica”) lentamente progressivo. Gli altri domini possono essere intaccati solo in fase avanzata.		>1 (non ci sono studi specifici)
FTD	Fronto temporal dementia	Due grandi quadri: variante comportamentale (bvFTD: disinibizione/apatia, cambiamento di personalità) e afasie progressive primarie (non-fluente/agrammatica e semantica). Memoria relativamente risparmiata all'esordio. Forte componente familiare.		1,68
PDD	Lewy body diseases spectrum	Fluttuazioni cognitive, allucinazioni visive, parkinsonismo, disturbo comportamentale del sonno REM, deficit attentivo-visuospatiale, ipersensibilità ai neurolettici.	CSF: Ab42/Ab40 P-tau e t-tau possono essere alterati. Plasma: Ab42/40, ptau181, ptau217 possono essere alterati.	PDD 0,71 DLB 0,84