

Cálculo Infinitesimal 3 – Lista 4 - 2020

Prof. Flavio Dickstein.

Questão 1. Calcule o volume V do parabolóide $z = 1 - (x^2 + y^2)$ situado na região $z > 0$.

Resolução 1. Considere o parabolóide $z = 1 - (x^2 + (ay)^2)$ situado na região $z > 0$. Então, usando a mudança de variáveis $u = x$, $v = ay$, $w = z$ (de jacobiano $J = \frac{1}{a}$) temos

$$V = \int_0^1 \int_{x^2 + (ay)^2 \leq 1-z} 1 \, dx dy dz = \frac{1}{a} \int_0^1 \int_{u^2 + v^2 \leq 1-w} 1 \, du dv dw.$$

Se $u = \sqrt{1-w} \cos \theta$, $v = \sqrt{1-w} \sin \theta$ ($J = (1-w)r$), $r \in (0, 1)$ e $\theta \in (0, 2\pi)$,

$$\int_{u^2 + v^2 \leq 1-w} 1 \, dx dy = (1-w) \int_0^1 \int_0^{2\pi} r \, dr = (1-w)\pi.$$

Logo,

$$V = \frac{\pi}{a} \int_0^1 1-w \, dw = \frac{\pi}{2a}.$$

Isto resolve as questões 1 e 2.

Questão 2. Um sólido de forma cilíndrica tem a base circular de raio 1 e altura 2. Ele tem densidade de massa ρ variável, $\rho(x, y, z) = x^2 + y^2 + z$. Determine sua massa M .

Resolução 2. Usando coordenadas cilíndricas, $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $z = z$ (jacobiano r) temos

$$M = \int_C \rho = \int_0^1 \int_0^2 \int_0^{2\pi} r^3 + zr \, d\theta dz dr = 2\pi \int_0^1 r^3 z + r \frac{z^2}{2} \Big|_0^2 dr = 2\pi \int_0^1 2r^3 + 2r \, dr = 3\pi.$$

Questão 3. Seja Ω a região de \mathbb{R}^3 situada entre as esferas de raio 1 e de raio 2. Seja $f(r) = r^{-3}$. Calcule $I = \int_{\Omega} f$.

Resolução 3. Usando coordenadas esféricas (jacobiano $r^2 \sin \varphi$), temos

$$\int_1^2 \int_0^\pi \int_0^{2\pi} r^{-1} \sin \varphi \, d\theta d\varphi dr = 4\pi \int_1^2 r^{-1} \, dr = 4\pi \log r \Big|_1^2 = 4\pi \log 2.$$

Questão 4. Considere a função radial em \mathbb{R}^3 $f(r) = r^{-p}$, onde $p > 0$. Seja $I = \int_{r>1} f(r)$. Mostre que $I < \infty$ se $p > 3$ e $I = \infty$ se $p \leq 3$.

Seja $J = \int_{r<1} f(r)$. Mostre que $J < \infty$ se $p < 3$ e $J = \infty$ se $p \geq 3$.

Resolução 4. Fazendo como no exercício anterior, obtemos para $p \neq 3$

$$I = 4\pi \int_1^\infty r^{2-p} dr = \frac{4\pi}{3-p} r^{3-p} \Big|_1^\infty.$$

Então, $I = \infty$ se $p < 3$ e $I = \frac{4\pi}{p-3}$ se $p > 3$. No caso $p = 3$, teremos $\log \infty = \infty$. Analogamente,

$$J = \frac{4\pi}{3-p} r^{3-p} \Big|_0^1.$$

Logo, $J = \infty$ se $p > 3$ e $J = \frac{4\pi}{3-p}$ se $p < 3$. Novamente, $p = 3$ está do lado da divergência, pois $\log 0 = -\infty$.

Questão 5. Mostre que um cone de altura h e área da base A tem volume igual a $\frac{1}{3}Ah$.

Resolução 5. Podemos usar o Princípio de Cavalieri, mas eu vou aplicar o Teorema de Pappus, usando que o centro de massa CM do triângulo ABC está em $\frac{1}{3}(A+B+C)$. Se o cone é obtido pela rotação de um triângulo retângulo de catetos de comprimento h e r , então CM está a uma distância $\frac{r}{3}$ do eixo de rotação. Usando Pappus, o volume do cone vale

$$V = 2\pi \frac{r}{3} \frac{1}{2} rh = \frac{1}{3} \pi r^2 h = \frac{1}{3} Ah.$$

Questão 6. Mostre uma pirâmide de altura h e área da base A tem volume igual a $\frac{1}{3}Ah$.

Resolução 6. As seções horizontais da pirâmide e do cone têm a mesma área. Usando o Princípio de Cavalieri, a pirâmide e o cone têm o mesmo volume.

Questão 7. Sejam C_z o cilindro $x^2 + y^2 \leq 1$ e C_y o cilindro $x^2 + z^2 \leq 1$. Calcule o volume de $\Omega = C_z \cap C_y$. (Sugestão: Mostre que a interseção de Ω com planos x constante são quadrados. Use Fubini.)

Resolução 7. Considere o plano paralelo ao plano yz . Considere $|x_0| \leq 1$. A interseção de C_z com o plano $x = x_0$ é a faixa $y^2 \leq 1 - x_0^2$, isto é,

$$-\sqrt{1 - x_0^2} \leq y \leq \sqrt{1 - x_0^2}.$$

A interseção de C_y com o plano $x = x_0$ é a faixa

$$-\sqrt{1 - x_0^2} \leq z \leq \sqrt{1 - x_0^2}.$$

Portanto a interseção de $C_z \cap C_y$ com o plano $x = x_0$ é um quadrado de lado $2\sqrt{1 - x_0^2}$ e área $A(x_0) = 4(1 - x_0^2)$. Usando Fubini,

$$V = \int_{-1}^1 A(x) dx = 4 \int_{-1}^1 (1 - x^2) dx = \frac{16}{3}.$$