

Polinomios

Habiendo estudiado dos casos particulares de los polinomios, retomamos el concepto para estudiarlos en general.

Recordemos:

polinomio: Un polinomio de grado n (entero no negativo) es una expresión de la forma

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

$$a_i \in \mathbb{R}, i=0, \dots, n, a_n \neq 0.$$

Recordese también que todo polinomio define una función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

Si operamos polinomios, la suma, resta, producto, vuelve a ser un polinomio.

Definición: Sea f un polinomio de grado n , $n \geq 1$.

Se dice que $x=c$ es un cero o una raíz de f si $f(c)=0$.

Ej: Si $f(x) = x^3 + x^2 - 4x - 4$, entonces $c=2$, $c=-2$ son ceros de f . En efecto, $f(-2) = (-2)^3 + (-2)^2 - 4(-2) - 4 = -8 + 4 + 8 - 4 = 0$.

igualmente $f(2) = 2^3 + 2^2 - 4(2) - 4 = 8 + 4 - 8 - 4 = 0$.

Recordemos en qué consiste el algoritmo de la división.

Algoritmo de la división: Dados dos enteros m, n , $m > 0$, existen otros 2 enteros q y r , tales que $n = mq + r$, con $0 \leq r < m$.

$$n = mq + r, \quad 0 \leq r < |m|$$

\downarrow \swarrow \searrow
 Dividendo Divisor cociente Residuo.

Ej: Dados $n=17$, $m=3$, entonces,

$$17 = 3(5) + 2 \quad 0 \leq 2 < 3$$

$$\begin{array}{r} 17 \overline{) 17} \\ \underline{15} \\ 2 \end{array}$$

$n = -16$, $m = 3$

$$\begin{array}{r} -16 \overline{) 3} \\ \underline{-18} \\ -16 + 18 = 2 \end{array}$$

$$-16 = 3(-6) + 2 \quad 0 \leq 2 < 3.$$

De igual manera, existe algoritmo de la división entre polinomios.

Algoritmo: Sean $f(x)$, $g(x)$ dos polinomios de grado $n, \geq 1$. Existen dos polinomios $q(x)$ y $r(x)$, tales que

$$f(x) = g(x)q(x) + r(x), \text{ donde } 0 \leq \deg(r(x)) < \deg(g(x)) \text{ o } r(x) = 0.$$

\swarrow \downarrow \downarrow \searrow
 Dividendo Divisor cociente residuo

Ejemplo: Dados los polinomios $f(x) = 2x^4 - x^3 + 2x + 1$
 $g(x) = x^2 - 2$, encontrar polinomios $q(x)$ y $r(x)$ tales que
 $f(x) = g(x)q(x) + r(x)$.

S// Tomamos los polinomios $f(x)$ y $g(x)$ y completamos con ceros los términos que no aparecen en el dividendo $f(x)$.

$$2x^4 - x^3 + 2x + 1 = 2x^4 - x^3 + 0x^2 + 2x + 1.$$

$$\begin{array}{r}
 2x^4 - x^3 + 0x^2 + 2x + 1 \quad \begin{array}{l} | x^2 - 2 \\ 2x^2 - x + 4 \end{array} \\
 - 2x^4 \\
 \hline
 -x^3 + 4x^2 + 2x + 1 \\
 x^3 - 2x \\
 \hline
 4x^2 + 1 \\
 - 4x^2 + 8 \\
 \hline
 9
 \end{array}$$

¿Cuántas veces cabe x^2 entre $2x^4$?

$$\frac{2x^4}{x^2} = 2x^2 \text{ veces}$$

$$2x^4 - x^3 + 2x + 1 = (x^2 - 2)(2x^2 - x + 4) + 9$$

Ej 2: Sean $f(x) = x^5 - 3x^2 + 2x - 4$, $g(x) = x^2 - x + 1$.

Halle $\frac{f(x)}{g(x)}$.

Sol// Usamos el algoritmo de la división para hallar el cociente

$$\begin{array}{r}
 x^5 + 0x^4 + 0x^3 - 3x^2 + 2x - 4 \quad \begin{array}{l} | x^2 - x + 1 \\ x^3 + x^2 - 4 \end{array} \\
 - x^5 \\
 \hline
 x^4 - x^3 - 3x^2 + 2x - 4 \\
 - x^4 x^3 - x^2 \\
 \hline
 -4x^2 + 2x - 4 \\
 4x^2 - 4x + 4 \\
 \hline
 -2x
 \end{array}$$

Termina la división

$$\text{como } 0 \leq \text{gr}(-2x) < \text{gr}(x^2 - x + 1) \\ 0 \leq 1 < 2$$

Así $x^5 - 3x^2 + 2x - 4 = (x^2 - x + 1)(x^3 + x^2 - 4) - 2x$

$$\frac{x^5 - 3x^2 + 2x - 4}{x^2 - x + 1} = x^3 + x^2 - 4 - \frac{2x}{x^2 - x + 1}$$

En general si $f(x) = g(x)q(x) + r(x)$, $0 \leq \text{gr } r < \text{gr } g$
 entonces $r(x) = 0$

$$\frac{f(x)}{g(x)} = q(x) + \frac{r(x)}{g(x)}$$

Existen resultados importantes de polinomios, que enunciaremos como teoremas.

TEOREMA DEL RESIDUO:

El residuo de dividir un polinomio $f(x)$ de grado $n \geq 1$ entre un polinomio de la forma $g(x) = x - c$ es igual a $f(c)$.

¶ Dado $f(x)$, $g(x) = x - c$, existen dos polinomios $q(x)$, $r(x)$ tales que $f(x) = g(x)q(x) + r(x)$, donde
 $\text{gr } r(x) < \text{gr } (x - c) = 1 \Rightarrow r(x) = 0$
 $\text{gr } r(x) = 0 \text{ ó } r(x) = 0$.

Como $\text{gr } r(x) = 0$ ó $r(x) = 0$, se tiene que $r(x)$ es constante, luego $r(x) = r$. Así,

$$f(x) = g(x)q(x) + r$$

$$f(x) = (x - c)q(x) + r, \text{ de donde}$$

$$f(c) = (c - c)q(c) + r, \text{ es decir, } r = f(c).$$

Ej: Encuentra el residuo de dividir $f(x) = 3x^{480} - 2x^{100} + 1$ entre $g(x) = x + 1$.

¶ Por el Teorema del residuo, el residuo de la división de $f(x)$ entre $x + 1$ es igual a $f(-1)$.

Así, $f(-1) = 3(-1)^{480} - 2(-1)^{100} + 1 = 3 - 2 + 1 = 2$, luego el residuo de la división es 2.

Otro Teorema importante es el Teorema del factor.

TEOREMA DEL FACTOR

Sea $f(x)$ un polinomio de grado n , $n \geq 1$.

$x=c$ es raíz & cero de f si y sólo si $(x-c)$ es un factor de f .

¶ En primer lugar decimos que $g(x)$ es un factor del polinomio $f(x)$ si el residuo de la división de f entre g es cero, es decir

$$f(x) = g(x)q(x).$$

Para demostrar el teorema debemos demostrar los dos sentidos de la implicación.

$$x=c \text{ es raíz de } f \iff (x-c) \text{ es factor de } f$$

veamos:

\Rightarrow) $x=c$ es raíz de $f \rightarrow (x-c)$ es un factor de f .

Por el algoritmo de la división dados $f(x)$, $g(x)=x-c$, existen $q(x)$, $r(x)$ tales que

$$f(x) = (x-c)q(x) + r(x), \quad \text{gr } r(x) = 0 \text{ o } r(x) = 0.$$

Por el Teorema del residuo, $r(x) = f(c)$,

luego
$$f(x) = (x-c)q(x) + f(c).$$

Como $x=c$ es raíz de f , $f(c)=0$, luego

$$f(x) = (x-c)q(x), \text{ de donde se concluye}$$

que $(x-c)$ es un factor de f .

4-) $(x-c)$ es un factor de $f \rightarrow x=c$ es una raíz de f .

Como $(x-c)$ es un factor de f , $f(x) = (x-c)g(x)$.

luego $f(c) = (c-c)g(c)$, de donde $f(c) = 0$
y por tanto $x=c$ es raíz de $f(x)$.

Ej: Demostrar que $(x+1)$ es un factor de
 $f(x) = x^3 + x^2 - 4x - 4$

S// Se queda probar que $(x+1)$ es un factor de
 $f(x)$ haciendo la división de $f(x)$ entre $(x+1)$
y mostrando que el residuo es cero ó
más sencillo usando el Teorema del factor.

Cuál sentido se usa? \rightarrow ó \leftarrow ?

Claramente debemos usar \rightarrow .

$f(c) = 0 \rightarrow x-c$ es un factor de f .

En este caso $c = -1$ pues $g(x) = x+1 = x - (-1)$

$$f(-1) = (-1)^3 + (-1)^2 - 4(-1) - 4 = -1 + 1 + 4 - 4 = 0.$$

Como $f(-1) = 0$, concluimos que $x+1$ es un factor
de $f(x)$.

Ej: Halle las raíces del polinomio $f(x) = x^4 - 81$.

S// Ahora usamos el teorema del factor en el
otro sentido. 4-) $(x-c)$ factor de $f \rightarrow x=c$ es raíz.

Entonces si conocemos los factores de $f(x) = x^4 - 81$,
conocemos sus raíces. por lo tanto factorizamos
el polinomio $f(x)$.