

Función

El concepto de función es de los conceptos mas importantes, puesto que puede usarse en diversas situaciones de la vida cotidiana. Veamos cómo se define.

Definición: (función)

Sean A, B dos conjuntos diferentes de vacío.
Una función de A en B es una ley de correspondencia que asigna a cada elemento de A un único elemento de B .

Se acostumbra denotar las funciones con letras, f, g, h, \dots etc.

Se escribe $f: A \rightarrow B$ para indicar que f es una función de A en B .

Al conjunto de Salida se le conoce como Dominio. Se escribe $D_f = A$. Al conjunto de llegada se le llama Codominio. Se denota como $C_f = B$.

Se escribe $f(x) = y$ para indicar que y es la imagen de x mediante f .
 x es la variable independiente, y es la variable dependiente.

El conjunto de todas las imágenes se conoce como el rango o recorrido de la función. Se denota por R_f . Es decir,


$$R_f = \{ y \in B \mid f(x) = y, \text{ para algún } x \in D_f \}$$

Observe: $R_f \subseteq C_f$. (El rango es un subconjunto del codominio).

Hay diversas formas de Representar una función

FORMAS DE REPRESENTACIÓN: Una función $f: X \rightarrow Y$
Se puede representar por medio de:

i) Un diagrama Sagital



$$D_f = X = \{1, 3, 5, -1\}$$

$$C_f = Y = \{a, b, c, d, e\}$$

$$R_f = \{a, c, d\}$$

observe $f(1) = f(5) = a$, $f(3) = c$, $f(-1) = d$.

ii) Una tabla de valores


x	f	y
a		a
b		c
c		b
d		b
		d

$$D_f = \{a, b, c, d\}$$

$$C_f = \{a, b, c, d\}$$

$$R_f = \{a, b, c\}$$

iii) Una gráfica



$$D_f = [a, b]$$

$$C_f = [c, d] \text{ o cualquier conjunto q' contenga } [c, d]$$

Ej: \mathbb{R}

$$R_f = [c, d]$$

iv) Expresiones Matemáticas Variables

$$f(x) = \sqrt{x-1} \text{ ent } D_f = \{x \in \mathbb{R} / x-1 \geq 0\} = [1, \infty)$$

$$g(x) = \frac{x^2-4}{x}, \quad x \in [1, 2]. \text{ ent } D_g = [1, 2]$$

Observe que la función g tiene definido en forma explícita el dominio, mientras que f no. En este caso, el dominio está dado por los valores de x para los cuales la expresión tiene sentido.

Así, para la función $\sqrt{x-1}$, se debe cumplir $x-1 \geq 0$ lo cual significa $x \geq 1$. De ahí $D_f = [1, \infty)$. En este caso se dice que el dominio está definido implícitamente. Ahora, considere la función $h(x)$, donde

$$h(x) = \begin{cases} x-2 & x \leq -3 \\ x^2 & -3 < x < 1 \\ 2x & x \geq 4 \end{cases}$$

$h(x)$ es una función definida a trozos. Varias expresiones definen la función. El dominio de h es:

$$D_h = (-\infty, -3] \cup (-3, 1) \cup [4, \infty) = (-\infty, 1) \cup [4, \infty)$$

observe: $h(-5) = -5-2 = -7$ pues $-5 \leq -3$

$$h(0) = 0^2 = 0 \quad \text{y} \quad h(5) = 2 \cdot 5 = 10.$$

v) Parejas Ordenadas

$$f = \{ (x, y) / y = f(x) \}$$

La primera componente indica los elementos del Dominio mientras que la segunda componente, las imágenes.

Ej: Si $f = \{ (-2, 4), (0, 0), (1, 1), (2, 4) \}$, entonces

$$f(-2) = 4, \dots, f(1) = 1. \quad D_f = \{ -2, 0, 1, 2 \}$$

$$R_f = \{ 4, 0, 1 \} = \{ 0, 1, 4 \}$$

vi) Ecuaciones:

Una ecuación en dos variables, x e y , puede tener soluciones de x en términos de y o de y en términos de x . En ocasiones estas soluciones definen funciones y se dice que son funciones definidas implícitamente por la ecuación.

Ej: La ecuación $x^2 + y^2 = 9$ no define ni a x como función de y , ni a y como función de x . Pues dado un valor de una de las vbles, se obtienen 2 valores para la otra.

veamos y en términos de x .

$$x^2 + y^2 = 9 \Rightarrow y^2 = 9 - x^2 \Rightarrow y = \pm \sqrt{9 - x^2}$$

observe que dado un valor de x ($x \in [-3, 3]$), se obtienen 2 valores para y , luego no representa una función.

En realidad se puede afirmar que la ecuación define dos funciones. $y_1 = \sqrt{9 - x^2}$, $y_2 = -\sqrt{9 - x^2}$


vii) Ejemplos

La relación que asigna a cada persona su edad, es una función, pues a cada persona le corresponde una única edad. Es claro que la relación contraria no define una función, pues muchas personas tienen la misma edad.

Problema 1: Un rectángulo tiene área de 16 m^2 .
Expresa su perímetro como función de la longitud
de uno de sus lados.

En general para encontrar el modelo que representa
el problema es útil:

- i) Hacer un dibujo. (Si es posible),
 - ii) Definir la variable dependiente, vble independiente.
 - iii) Se busca relación entre las variables.
- S//



x : Longitud de la base
 y : Longitud de la altura
 P : Perímetro
 A : Área.

$$A = xy = 16.$$

$$P = 2x + 2y$$

Para expresar el perímetro en términos de x y y
 Se busca una relación entre las variables. Como $A = xy = 16$
 se despeja x o y . Por ejemplo despejamos y .


$$A = xy = 16 \Rightarrow y = \frac{16}{x}. \text{ Reemplazando en } P$$

Se tiene $P = 2x + 2y = 2x + 2 \cdot \frac{16}{x} = 2x + \frac{32}{x}.$

Así, $P(x) = 2x + \frac{32}{x} = \frac{2x^2 + 32}{x},$ con $x > 0.$ Pues x es una longitud.

Problema 2: Un triángulo rectángulo tiene hipotenusa
de longitud 8 unidades. Expresa el área del
triángulo en función de uno de sus catetos.

S //



Sean x : Longitud de la base
 y : Longitud de la altura
 A : área.

$$A(x) = ? \quad \text{o} \quad A(y) = ?$$

Se sabe $A = \frac{1}{2} \text{base} \cdot \text{altura} = \frac{1}{2}xy$. Entonces se busca la relación entre x e y .

Por Teorema de Pitágoras, $8^2 = x^2 + y^2$.

Se despeja una de las dos variables. Por ejemplo y .

$$y^2 = 64 - x^2 \Rightarrow y = \pm \sqrt{64 - x^2}.$$

Como x, y representan longitudes, $x \geq 0, y \geq 0$.

Así, $y = \sqrt{64 - x^2}$. De otro lado, $64 - x^2 \geq 0 \Rightarrow x^2 \leq 64$
 de donde $|x| \leq 8 \Rightarrow -8 \leq x \leq 8$. Como $x \geq 0$,
 $x \in [0, 8]$

Así, $A = \frac{1}{2}xy = \frac{1}{2}x \cdot \sqrt{64 - x^2}, \quad x \in [0, 8].$

Observe: Si V es la función definida como

$V = xyz$, entonces el dominio es

$$D_V = \{(x, y, z) / x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}, z \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}^3.$$

Pero si V representa el volumen de una caja de

Largo x , ancho y , alto z , entonces $V = xyz$

y su dominio es $D_V = \{(x, y, z) / x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\}$.

Es decir, el dominio de una función depende del contexto.