



Lena 17

La paciente, de 17 años, es hija única. Sus padres llevan separados casi diez años; la separación fue muy conflictiva y causó un gran sufrimiento emocional, especialmente a la madre. La madre tardó mucho tiempo en superar la separación. El padre vive ahora con una nueva pareja, descrita como más joven, con más éxito profesional y más dominante que la madre de la paciente. La madre no tiene pareja. Se describe a sí misma como una persona ansiosa y reconoce rasgos de personalidad similares en su hija.

La paciente se presenta como una persona muy inteligente, reflexiva, controlada y extremadamente orientada al rendimiento. Cursa el décimo curso de secundaria (Gymnasium) y obtiene excelentes resultados académicos. Constantemente antepone las exigencias académicas y las expectativas de rendimiento a sus propias necesidades. Durante la terapia, ha ido siendo capaz de percibir sus propias necesidades de forma cada vez más consciente. En consonancia con las necesidades psicológicas básicas de Grawe, el objetivo terapéutico es, en particular, restablecer un mejor equilibrio en lo que respecta a la necesidad de placer y disfrute, ya que hasta ahora han predominado sus necesidades de seguridad, orientación y control. En general, la paciente parece muy controlada y centrada, y se concede poco tiempo para el descanso o la recuperación.

Informa de que los síntomas obsesivo-compulsivos comenzaron durante la pandemia de COVID-19. Además, percibe a la nueva pareja de su padre como muy dominante y exigente, y tiene dificultades para expresar sus propias necesidades dentro de este sistema familiar.

Diagnósticos:

Trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) – pensamientos obsesivos predominantes / obsesiones rumiativas

Trastorno de ansiedad social – diagnóstico provisional (sospecha)

Síntomas: La paciente describe pensamientos obsesivos intrusivos al ver cuchillos. Estos pensamientos incluyen el temor de que podría o tendría que hacer daño a otras personas o mascotas, especialmente a personas cercanas a ella. Estos pensamientos desencadenan una intensa ansiedad y tensión. Tras una mejora parcial de los síntomas obsesivo-compulsivos, se desarrolló una creciente inseguridad social y ansiedad social.