



# Mathias 38

38-jähriger Patient, verheiratet, Vater einer dreijährigen Tochter, seit 22 Jahren als Stahlarbeiter in einer Eisengießerei tätig, aktuell seit 12 Monaten arbeitsunfähig. Seit dem plötzlichen Tod der Mutter vor 20 Jahren wiederkehrende depressive Episoden. Vor 11 Jahren Suizidversuch im Zusammenhang mit Alkoholkonsum nach Trennung von der ersten Ehefrau. Belastende psychosoziale Situation mit finanziellen Sorgen, Unterhaltsverpflichtungen für zwei Kinder aus erster Ehe sowie konflikthafter Auseinandersetzungen mit der Ex-Ehefrau und der Angst vor Kontaktverlust zu den Kindern. Sozialer Rückzug und fehlender Freundeskreis. Die aktuelle Rehabilitation erlebt der Patient als Möglichkeit, Unterstützung und neue berufliche Perspektiven zu erhalten.

Seit etwa 10 Jahren bestehen chronische Rückenschmerzen, vor 5 Jahren Bandscheibenvorfall L4/5 und L5/S1. Aktuell linksbetonte Lumboischialgien mit Ausstrahlung bis zum Kniegelenk sowie Schmerzverstärkung unter psychischer Belastung. Körperliche Einschränkungen zeigen sich insbesondere beim Heben und Tragen schwerer Lasten, längerem Sitzen oder Stehen sowie beim Bücken. Medikamentöse Behandlung mit trizyklischem Antidepressivum und Opioid führte zu einer teilweisen Schmerzreduktion.

Psychopathologisch zeigt sich ein deutlich depressives Syndrom mit gedrückter Stimmung, Antriebslosigkeit, Kraftlosigkeit, reduzierter Lebensfreude, Schlafstörungen, Konzentrations- und Aufmerksamkeitsstörungen sowie wiederkehrenden Suizidgedanken. Zusätzlich bestehen ausgeprägte Selbstunsicherheit, Misstrauen gegenüber Mitmenschen, erhöhte Kränkbarkeit sowie impulsive aggressive Durchbrüche mit erheblichen interaktionellen Konflikten im privaten und beruflichen Umfeld. Frühere psychotherapeutische Kontakte wurden vom Patienten als wenig hilfreich erlebt.

Diagnosen: F33.1 rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode; F61.0 kombinierte Persönlichkeitsstörung; F45.41 chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren

Symptome: anhaltende Niedergestimmtheit, Antriebsverlust, soziale Isolation, Schlafstörungen, verminderte Belastbarkeit, Konzentrationsstörungen, wiederkehrende Suizidgedanken, impulsive Aggressionsdurchbrüche, Misstrauen, schnelle Kränkbarkeit sowie chronische Schmerzen mit deutlicher körperlicher Funktionseinschränkung.