竞赛图 Hamilton 路径的定量渐近与 Wormald 角 Hessian

刘星辰、叶祥宇

2026 年 11 月 7 日

摘要。本文证明 n 阶竞赛图中有向 Hamilton 路径的最大数目满足

$$P(n)=\left(\frac{\cosh 1}{\cos 1}+O(n^{-1})\right)\frac{n!}{2^{n-1}}.$$

证明以我们早期的常数因子计数框架为基础，将统一永久式估计、非主子阵局部对角缩放和保留度差惩罚的路径估计与 Fang–Huang 谱比较结合。Divoux–Wang 已确定圈与路径的尖锐首项常数。我们另从 Wormald 随机吹胀公式的原角函数独立推导完整 Hessian，证明其对每个正则基图正定，并明确说明与 Bhattacharjee 结果的重合。对每个固定奇数基阶数，本文证明圆环基图最终唯一最大化两个吹胀模型的路径与圈期望，并证明正则内部块常数严格单调。

1. 引言

竞赛图是完全图的一个定向。记 $H(T)$ 为竞赛图 T 中有向 Hamilton 路径的数目，$C(T)$ 为有向 Hamilton 圈的数目。路径按顶点顺序计数，圈则不区分循环起点。令

$$P(n)=\max_{|V(T)|=n}H(T),\qquad \mu_n=\frac{n!}{2^{n-1}},\qquad \nu_n=\frac{(n-1)!}{2^n}.$$

Szele [10] 用期望的线性性给出了这个问题的第一个下界。在均匀随机竞赛图中，一个给定的顶点排列以概率 $2^{-(n-1)}$ 形成有向路径，故路径数的期望为 μ_n，从而 $P(n)\ge\mu_n$。对 $n\ge 3$，同样的计算给出圈数期望 ν_n。Szele 还证明了上界 $P(n)=O(n!2^{-3n/4})$，并猜想 $(P(n)/n!)^{1/n}$ 趋于 $1/2$。因此，最初的问题是确定路径数的指数增长率。

Alon [2] 通过永久式解决了这一问题。邻接矩阵 A 的永久式等于覆盖全部顶点的互不相交有向圈族的数目，因而是 Hamilton 圈数的上界。将 Brégman 不等式用于 per A，再利用出度之和为 $\binom{n}{2}$，可以证明所得上界在出度尽可能均匀时最大。由圈数上界加上一个新顶点的构造，Alon 得到 $P(n)=O(n^{3/2}\mu_n)$。Friedgut–Kahn [7] 以熵方法细化了这一类计数，将圈数上界改进为 $O(n^{\alpha}\nu_n)$，其中 $\alpha\approx 1.249$；相应的路径上界具有同样的多项式因子。这些结果确定了指数增长率，但上、下界之间仍相差一个随 n 增长的多项式。

提高下界则需要改变边的随机定向方式。Adler、Alon 和 Ross [9] 在完全图中选取近乎覆盖全部边的边不交三角形族，再将各三角形独立、均匀地定向为有向三圈。若一个顶点排列中有某个三角形连续出现，该排列形成有向路径的概率便比独立定向模型更大。对均匀随机的顶点排列，他们用 Brun 筛证明这类连续出现的次数趋于均值为一的 Poisson 分布，由此得到下界 $(e-o(1))\mu_n$；同一构造也改进了圈数下界。Wormald [6] 进一步考虑固定基图的随机吹胀：块间方向由基图决定，块内分别取均匀随机竞赛图或随机正则竞赛图。沿一个无穷阶数序列，圆环基图给出的圈数下界常数超过 2.85588，其数值计算又预示了约为 2.855958 的极限常数。不过，这些构造只给出下界，尚不能排除其他竞赛图具有更多的 Hamilton 圈或路径。

Divoux–Wang [12] 确定了这个常数，证明全体竞赛图的最大圈数为 $(L+o(1))\nu_n$，最大路径数为 $(L+o(1))\mu_n$，其中 $L=\cosh 1/\cos 1$。他们仍从永久式出发，但保留了仅由度数给出的上界无法反映的矩阵信息。对于圈数至少达到随机期望的竞赛图，Brégman 不等式先限制其度差平方和；删去少量度差过大的顶点后，剩余邻接矩阵经标量归一化后接近双随机矩阵。为计入被删顶点，他们按 Hamilton 圈在这些顶点上形成的有向路段分类，将每类路段及其连接端点编码为核心上的加权矩阵。随后利用 Sinkhorn 缩放、McCullagh 型永久式近似以及 Liu 的行列式—永久式恒等式，将圈数归结




图 1: 圆环图 Car_7 及删除顶点 0 后的偶阶图。左图每个顶点的出度均为 3；右图各顶点的出度为 2 或 3。两图均画出全部边。

为反对称矩阵的行列式比值。Fang–Huang [11] 的矩阵比较定理给出该比值的上界，圆环图及其偶阶删点图达到相同的渐近值。路径结论再由增添顶点的论证得到。

第一作者于 2026 年 10 月 8 日公开存档的路径计数稿 [14] 已证明 $(L - O(n^{-1}))\mu_n \le P(n) \le (C_* + O(n^{-1}))\mu_n$，并给出下文使用的主要分析框架。它消除了多项式间隙，但两侧首项常数仍满足 $L < C_*$。该稿包含正路径卷积、统一永久式估计、非主子阵缩放及异常顶点分析，早于 [12] 于 10 月 16 日提交 arXiv v1。本文将这一框架与 Fang–Huang [11] 的谱矩比较结合，得到尖锐的全局定量估计，细化 [12, 定理 1.4] 的首项渐近式；重点在于删点、缩放与求和后仍保留统一的 $O(n^{-1})$ 误差。本文没有证明这一误差阶不可改进。

定理 1.1。 存在绝对常数 K', n_1，使所有整数 $n \ge n_1$ 满足

$$(L - K'/n)\mu_n \le P(n) \le (L + K'/n)\mu_n.$$

奇阶圆环图 Car_n 的顶点集为 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$,其中 $i \to j$ 当且仅当 $j-i$ 的模 n 代表元属于 $\{1, \dots, (n-1)/2\}$。定理的下界由奇阶圆环图，以及从 Car_{n+1} 删除一个顶点所得的偶阶图达到，误差为 $O(\mu_n/n)$。

本文的另一部分研究 Wormald 的随机吹胀模型。固定奇数 $d \ge 3$ 及一个 d 阶基图 T^*，将每个顶点替换为 m 个顶点，块间所有边的方向由 T^* 决定。若各内部块独立取均匀随机竞赛图，记所得模型为 $\mathcal{T}(T^*, m)$；若各块独立取均匀随机正则竞赛图，记为 $\mathcal{R}(T^*, m)$，此时要求 m 为奇数。总阶数为 $N = dm$。以下圈数和路径数分别以 ν_N 和 μ_N 归一化。

Wormald [6] 的定理 4 以角 Hessian 的行列式非零为条件，给出正则基图的期望渐近式。他对若干小阶基图作了计算，并猜想这一条件总成立。我们证明该矩阵正定，并对每个正则基图求出其行列式。

定理 1.2。 设 T^* 为正则竞赛图，A 为其邻接矩阵。令 $S = A - A^T$、$C = S/d$ 及 $E = (e_1 - e_d, \dots, e_{d-1} - e_d)$。Wormald 角函数在原点的 Hessian $\mathbf{H}$ 为正定矩阵，且

$$\mathbf{H} = E^T(I + C^2)(I - C^2)^{-1}E, \qquad \mathcal{H} = d\,\frac{\det(I + C^2)}{\det(I - C^2)} > 0,$$

$$\sqrt{d/\mathcal{H}} = \rho_d(S) := \frac{\det(I + S/d)}{\det(I + iS/d)} \in \mathbb{Q}_{>0}.$$




图 2: 有向三圈的吹胀示例。每个内部块在图中均选为有向三圈，块间粗箭头表示相应方向的全部 9 条边。在随机模型中，内部块按规定的分布独立抽取。

这里 $\mathcal{H} = \det \mathbf{H}$, 平方根取正值。角函数的定义见第 9 节。结合 Wormald [6] 的定理 1、4、5, 固定 d 后，模型 $\mathcal{T}(T^*, m)$ 的归一化圈、路径期望均趋于 $\rho_d(S)$，模型 $\mathcal{R}(T^*, m)$ 的相应极限均为 $e^{1/d}\rho_d(S)$。

模型常数也可直接由 Divoux–Wang [12, 命题 5.1] 得出，无须经过 Hessian 计算；第 10.1 节另写出这一推导。其命题 7.1、引理 9.1 已给出谱比值上界和圆环取等。下面结合这些结论、Fang–Huang [11] 的等号条件，以及正则基图的零行和条件，确定取等基图；非正则情形则另作估计。

推论 1.3。 对每个固定奇数 $d \geq 3$，存在 M_d，使所有 $m \geq M_d$ 时，Car_d 在同构意义下唯一最大化两个模型的 Hamilton 圈数和路径数期望。对于 $\mathcal{R}(T^*, m)$，只考虑奇数 m。

下式中的 r_d 是 Divoux–Wang [12, 第 7 节及引理 9.1] 已给出的二项式闭式，正则块因子 $e^{1/d}$ 来自 Wormald [6, 定理 1]。由 Fang–Huang [11, 引理 4.2] 所列显式频率，还可推出如下单调性。

推论 1.4。 置

$$r_d = \frac{(1+1/d)^d + (1-1/d)^d}{(1+i/d)^d + (1-i/d)^d}, \qquad \mathfrak{r}_d = e^{1/d} r_d.$$

沿奇数 $d \geq 3$，$\mathfrak{r}_d$ 严格递增并趋于 L。

定理 1.2 直接证明 Wormald [6] 关于原 Hessian 的猜想 6。推论 1.3 结合已有计数与谱比较，补入等号分析及非正则基图估计。猜想 2 的极限存在性由 [12] 的闭式及 Wormald 的 $e^{1/d}$ 因子即得，推论 1.4 则补充严格单调性。第 10 节保留直至 d^{-5} 项、余项为 $O(d^{-6})$ 的展开，作为该闭式的进一步计算。

Bhattacharjee [13, 定理 1.1、1.3，命题 3.1，引理 3.2 及推论 3.3] 也处理 Wormald 的猜想 2 和 6。原角 Hessian、正定性、行列式／有理平方公式和圆环极限由我们的 Wormald 项目 [15] 与其工作独立得到。本文保留直接推导，并明确记录重合。10 月 8 日路径存档 [14] 属于本文的另一条主线，不用于确定 Hessian 的日期。Bhattacharjee 于 10 月 14 日公开发布的版本 [16] 已有完整 Hessian；[15]

所引本方固定稿件提交日期为 10 月 19 日。Git 提交时间与公开发行时间含义不同，这些记录不支持本方 Hessian 更早的主张。

各项内容的定位和依赖如下。

内容	范围与已有工作的关系
常数因子路径框架	独立存档于 [14]；当时上界常数为 $C_* > L$。
尖锐全局路径估计	计数误差控制与 [11] 结合，给出最终统一 $O(n^{-1})$ 误差；尖锐首项渐近见 [12]。
有符号永久式估计	保留 [14] 的独立证明；图论计数应用使用其非负特例。
原角 Hessian 与圆环极限	与 [13,16] 重合的独立推导；早期路径档案不支持该部分的先后主张。
固定基图期望极值	谱等号分析、非正则基衰减及有限图类比较给出最终唯一性。
正则块常数单调性	已知圆环谱的严格单调性推论。

推论 1.3 先固定基阶数 d。此时基图只有有限多个同构类；正则非圆环基有严格极限间隙，非正则基的归一化期望趋于零。因此可对全部基图及四种期望取共同阈值。该结论比较期望，正则内部块模型仅允许奇数 m。

1.1 永久式估计与路径计数

McCullagh [5] 已在适度偏离条件下给出行列式近似及 $O(n^{-1})$ 相对误差。Divoux–Wang [12, 命题 3.1] 对非负双随机矩阵证明了对矩阵类一致的 $1 + o(1)$ 版本；细化其系数估计及 Gamma 平均，也可在这一情形保留 $O(n^{-1})$。第 3 节采用固定元素界和算子范数界，给出后文所需的形式与详细证明。定理 1.1 的定量结论在于经过删点、缩放和求和后，最终路径数仍具有同阶误差。

证明从永久式的系数展开出发，对行指标和列指标的互异性分别作容斥。双中心化使含一度顶点的项消失；二度分量的总和由高斯配对计算，得到行列式主项。其余分量先收缩二度链，再按边数与顶点数之差估计。这样可以控制随矩阵阶数增长的一段系数。尾项另作估计：先用永久式极化化为半正定情形，再用 Han–Niles-Weed [3, 引理 4.3–4.4] 所用的复高斯矩与 AM–GM 估计控制其模，最后应用 Cauchy 系数估计。两部分合起来给出所需误差，不必将形式级数代入未经证明的收敛区域。

路径部分采用 Irving–Omar [1] 所讨论的行列式—永久式恒等式的竞赛图特例：

$$H(T) = \sum_{U \subseteq V(T)} \det(I + A[U]) \operatorname{per} A[U^c].$$

右端各项均非负，因而可以直接估计每个永久式，再对删集求和。大删集的总贡献由阶乘尾界控制；对其余删集，永久式估计还须经过对角缩放，才能用于原来的邻接矩阵。求和时保留删集大小的原权重，并利用其各阶固定矩可求和的性质；若一律用最大的删集大小代入，就会产生额外的对数因子。

少量度差很大的顶点使这一步较为复杂。我们按异常顶点集及其补集将矩阵分为四块，再按跨块匹配展开永久式。一个匹配在剩余部分占用的行、列可能具有不同的指标，因此只估计主子矩阵不够。第 4 节同时处理不同的行删集与列删集，并估计对角缩放因子和高斯行列式因子的变化。这与 Divoux–Wang 对圈在异常集内形成的有向路径段分类有所区别：这里的求和对象是永久式展开中的行列匹配。

为了得到对所有竞赛图成立的路径上界，只需考虑 $H(T) \geq \mu_n$ 的图。Brégman 不等式先限制出度的离差平方和；该量过大时可直接给出充分小的上界。若仍有异常顶点，则利用上述跨块展开估

计。其余图的缩放计算中，度差产生一个负指数因子。中间某些误差为平方根量级，单独取绝对值会丢失所需精度；将它们与负指数合并估计，最终仍只损失 $O(n^{-1})$。此时主项为

$$\rho_n(S) = \frac{\det(I + S/n)}{\det(I + iS/n)}, \qquad S = A - A^T.$$

和 [12] 一样，我们用 Fang–Huang [11] 的矩阵比较将其控制在传递竞赛图的相应比值以下。后者可显式计算，等于 $L + O(n^{-1})$。下界由小度差图的双侧路径估计得到：奇阶圆环图的度差为零，其偶阶删点图的度差绝对值为一。命题 6.6 给出全阶数谱比较，命题 7.3 集中陈述统一的度差惩罚；第 7、8 节直接完成定理 1.1，推论 8.2a 再给出近极值者的度数方差稳定性。

1.2 随机吹胀中的 Hessian 与等号条件

Wormald [6] 将 Hamilton 圈投影为基图上的闭游走；圈在每个内部块留下覆盖该块的有向路径森林。将闭游走与块内路径的计数写成生成函数后，期望问题化为多元有理函数的系数渐近。对正则基图，其公式中的常数取决于一个由隐式方程定义的角 Hessian，并以该 Hessian 的非退化性为条件。于是，计算这个矩阵既能去掉渐近公式中的条件，也能用来比较不同基图。

本文从原隐式方程求导，得到定理 1.2 的完整矩阵恒等式及正定性，从而直接验证 Wormald 渐近式所要求的非退化条件。恒等式 $\sqrt{d/\det \mathbf{H}} = \rho_d(S)$ 又把该 Hessian 与已有谱理论联系起来。模型极限 $\rho_d(S)$ 本身可由 [12, 命题 5.1] 直接推出；不能用 Wormald 以非退化为前提的计数公式反推 Hessian 非退化。

在正则基图中，我们沿用 [12] 的比较，并接入 Fang–Huang [11] 的等号分类。带符号相似再加零行和条件，即确定圆环基图。非正则基图另用 Brégman 不等式估计。固定阶数的基图只有有限多个同构类，严格的极限差因而给出推论 1.3。推论 1.4 采用显式谱的短证明；另保留高阶展开的计算。上述模型极限始终先固定基图阶数，再令块阶趋于无穷。

1.3 进一步问题与本文安排

定理 1.1 尚不能确定各有限阶数的路径最大图，也没有给出首个修正项的系数。另一个问题是估计阈值 M_d 随 d 的增长。若令基图阶数与块阶数同时趋于无穷，还需要对基图阶数一致的误差估计。

第 2 节约定记号。第 3、4 节证明永久式与非主子阵缩放估计，第 5 节集中给出正路径卷积、可和权重及统一尾项。第 6 节建立全阶数谱比较，第 7、8 节直接证明尖锐路径界并给出度数方差稳定性。第 9—11 节处理原角 Hessian 和固定基图期望极值，第 12 节汇总已完成的主定理证明。附录保留辅助恒等式，并陈述实际使用的标准估计。

2. 预备知识与记号

2.1 随机基准与误差约定

记 $\mathfrak{S}_n$ 为 $[n]$ 的置换群。对 $\pi \in \mathfrak{S}_n$，以 I_π 表示其相邻边全部顺向的示性函数。每个排列使用 $n-1$ 条互异的无向边，因而

$$H(T) = \sum_{\pi \in \mathfrak{S}_n} I_\pi(T), \qquad \mathbb{E} I_\pi = \prod_{j=1}^{n-1} \frac{1}{2} = 2^{-(n-1)},$$

$$\mathbb{E} H(T) = \sum_{\pi \in \mathfrak{S}_n} \mathbb{E} I_\pi = n! 2^{-(n-1)} = \mu_n.$$

最大值至少等于平均值，所以 $P(n) \geq \mu_n$。以 $\mathcal{T}_n$ 表示顶点标号为 $[n]$ 的全部竞赛图，本文中“统一 $O(n^{-1})$”的含义是

$$\exists K<\infty\,\exists n_0\,\forall n\ge n_0\,\forall T\in\mathcal{T}_n:\quad |\mathrm{error}(n,T)|\le K/n.$$

常数 K,n_0 对竞赛图及删集一致；若另有预先固定的参数 b,A_0,B_0，则允许依赖这些参数。

2.2 符号矩阵与谱因子

定义 2.1（符号矩阵与度差）。

邻接矩阵 A 的对角元为零，且 $A_{ij}=1$ 当且仅当 $i\to j$。定义

$$S=A-A^{\mathsf T},\qquad 2A=J-I+S,\qquad s=S\mathbf{1}.$$

其中 I 为同阶单位矩阵，$J=\mathbf{1}\mathbf{1}^{\mathsf T}$，$\mathbf{1}$ 为全一列向量；写成 $I_p,J_p,\mathbf{1}_p$ 时下标表示维数 p。上标 $\mathsf T$ 表示转置。若 d_i^+ 为出度，则 $s_i=2d_i^+-(n-1)$ 且 $\sum_i s_i=0$。向量的二范数和最大范数分别为

$$\|x\|_2=\left(\sum_i |x_i|^2\right)^{1/2},\quad \|x\|_\infty=\max_i|x_i|.$$

使用记号

$$\mathcal{E}=\|s\|_2^2,\qquad d=\|s\|_\infty,\qquad a=\frac{s}{n-1},\qquad \tau=\|a\|_2^2.$$

标准化度差 a 与 τ 在 $n\ge 2$ 时定义。奇阶正则图指每个顶点的出度都为 $(n-1)/2$，等价于 $s=0$；偶阶平衡图指每个顶点的出度均为 $n/2$ 或 $n/2-1$，等价于 $s_i\in\{-1,1\}$。因此，d 衡量最大的顶点不平衡程度，τ 则衡量归一化后的不平衡平方总量。

定义 2.2（子矩阵与永久式）。

对顶点集 U，$A[U]=A[U,U]$ 表示主子矩阵。对可能不同的行、列集 R,C，$A[R,C]$ 取这些行与列，并始终按原顶点标号递增排列。一般矩阵 $M[R,C]$ 采用相同约定。U^c 表示相对于当前顶点全集的补集。空和为零、空积为一，空矩阵的行列式和永久式均为一。对 m 阶方阵 M，永久式定义为

$$\operatorname{per}M=\sum_{\pi\in\mathfrak{S}_m}\prod_{i=1}^{m}M_{i,\pi(i)}.$$

定义 2.3（频率与谱因子）。

实矩阵 M 的奇异值是 $M^{\mathsf T}M$ 的特征值的非负平方根。算子范数 $\|M\|_{\mathrm{op}}=\sup_{\|x\|_2=1}\|Mx\|_2$ 等于最大奇异值；Frobenius 范数 $\|M\|_F=(\sum_{i,j}|M_{ij}|^2)^{1/2}$ 的平方等于奇异值平方之和。对反对称矩阵 S，记其非零成对特征值为 $\pm i\lambda_j$（$i^2=-1$），其中 $\lambda_j>0$，必要时补零频率。每个 λ_j 在奇异值中出现两次。定义

$$x_j=\frac{\lambda_j^2}{n^2},\qquad D_n(S)=\det(I-S^{\mathsf T}S/n^2)^{-1/2},$$

$$\rho_n(S)=D_n(S)\det(I+S/n)=\prod_j\frac{1+x_j}{1-x_j}.$$

反对称奇异值成对出现，且 $\|S\|_F^2=n(n-1)$，故

$$\sum_j x_j=\frac{n-1}{2n},\qquad \|S/n\|_{\mathrm{op}}^2\le\frac{n-1}{2n}<\frac12.$$

因此 D_n 与 ρ_n 都为正，且有绝对常数上界。特别地，

$$D_n(S) = \det(I + iS/n)^{-1}.$$

以下 log 均为自然对数。由 $-\log(1-x) = \int_0^x (1-u)^{-1}\,du \le 2x$（$0 \le x \le 1/2$），得到

$$0 \le \log D_n(S) \le 2\sum_j x_j < 1, \qquad 1 \le D_n(S) < e.$$

同理由 $\log(1+x) \le x$ 得 $\log \rho_n(S) < 3/2$。因此，乘以 $D_n(S)$ 或 $\rho_n(S)$ 不改变误差的阶。引理 6.1 将给出更精确的上界。

3. 永久式的一致渐近估计

本节证明一个关于永久式的统一估计。将行列和均为一的矩阵写成 $(J_n+E)/n$, 其中 $E\mathbf{1} = E^{\mathsf T}\mathbf{1} = 0$。在元素有界且 $\|E/n\|_{\mathrm{op}} \le q < 1$ 的条件下，永久式的主项由一个行列式给出。第 4 节将把这一估计用于缩放后的竞赛图子矩阵。

McCullagh [5] 在适度偏离条件下得到了行列式主项。这里给出固定元素界 C、奇异值谱隙 q 下的自包含版本，其误差对这些参数所确定的矩阵类一致成立。证明分别控制系数与尾项，以便将结论一致地用于第 4 节中的删除和缩放。Li [8, Theorem 2.1] 的近期相关近似假设中心扰动的最大绝对行和或列和为 $o(n)$；这一条件不覆盖相应行列和为 n 量级的稠密核。

这套证明的主要结构已见于 10 月 8 日的独立路径存档 [14]。这里保留有符号实矩阵版本，并明确其与后续应用的区别：图论部分实际使用非负的缩放矩阵，有符号一般性是定理本身的额外范围，而非这些应用的必要条件。例如

$$B = \frac{1}{7}\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -2 & 1 & 1 \\ 1 & -3 & 2 \end{pmatrix}, \qquad E = 3B$$

满足 $B\mathbf{1} = B^{\mathsf T}\mathbf{1} = 0$、$\|B\|_{\mathrm{op}} = 5/7 < 1$，而 $J_3 + E$ 含负元素。对任意 $m \ge 1$，令 $E_m = E \otimes J_m$、$n = 3m$，则 E_m 双中心化，条目绝对值至多 $9/7$，且 $\|E_m/n\|_{\mathrm{op}} = 5/7$，而 $J_n + E_m$ 仍含负元素。因此同一组固定参数在任意大的阶数上都容许有符号输入；这个例子区分两类假设，不承担渐近结论的证明。第 3.6 节另解释从 [12] 的非负版本证明提取定量误差的途径；这里不主张该方法原则上不能处理有符号输入。

3.1 定理与证明思路

定理 3.1（永久式的一致渐近估计）。

固定 $0 \le C < \infty$ 和 $0 \le q < 1$。设 $n \ge 1$，$E \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 满足

$$E\mathbf{1} = E^{\mathsf T}\mathbf{1} = 0, \qquad \max_{i,j}|E_{ij}| \le C, \qquad \|E/n\|_{\mathrm{op}} \le q.$$

令 $B = E/n$。对所有满足上述条件的矩阵，一致地有

$$\frac{\operatorname{per}(J_n + E)}{n!} = \det(I - BB^{\mathsf T})^{-1/2} + O_{C,q}(n^{-1}). \tag{3.1}$$

式 (3.1)也可写成行列式因子乘以相对误差 $1 + O_{C,q}(n^{-1})$。下标 C, q 表示误差常数和起始阶数可依赖这两个预先固定的参数，但须同时适用于所有满足条件的矩阵。

本节所用行列式平方根，在有关实区间上均取正平方根。假设给出 $\|B\|_{\mathrm F}^2 \le C^2$。因此，行列式因子不小于一，并且被只依赖 C, q 的常数一致控制。

对行、列指标的互异性分别作容斥，永久式的每个系数可表示为二部多重图之和。中心化消去一度顶点；二度分量对应高斯配对，其总和给出行列式主项。其余分量按超额（边数减顶点数）分类，每单位超额带来一个 n^{-1} 因子。我们先估计次数不超过 αn 的系数，再以复分析方法控制其余系数。

证明中使用高斯级数 $G(t)$；它与第 7.4 节的数值上限 $G = 100/19$ 是不同对象。令

$$f(t) = \frac{\operatorname{per}(J_n + tE)}{n!}, \qquad G(t) = \det(I - t^2 BB^{\mathsf{T}})^{-1/2}.$$

选取 $1 < \sigma < R < 1/q$；当 $q = 0$ 时不要求上界。例如可取

$$R = \frac{3+q}{2(1+q)}, \qquad \sigma = \frac{1+R}{2}.$$

本节另定义控制函数 $\Gamma(r)$，不与第 7 节的度差乘积 Γ 混用：

$$\Gamma(r) = \exp\left(\frac{C^2 r^2}{2(1-q^2r^2)}\right), \qquad r \ge 0,\ rq < 1.$$

本节在 $q = 0$ 时均省去涉及 $1/q$ 的上界限制。所有常数仅依赖 C, q 及所选半径。第 3.6 节将它们合并为显式误差界。

对上述半径，

$$R - 1 = \frac{1-q}{2(1+q)} > 0, \qquad 1 - Rq = \frac{2 - q - q^2}{2(1+q)} = \frac{(1-q)(q+2)}{2(1+q)} > 0,$$

$$\sigma - 1 = (R-1)/2 > 0, \qquad R - \sigma = (R-1)/2 > 0.$$

以下以 s_i 表示 B 的奇异值。则

$$\sum_i s_i^2 = \sum_{i,j} B_{ij}^2 \le n^2 (C/n)^2 = C^2, \qquad 0 \le s_i \le q.$$

由 $-\log(1-u) = \int_0^u (1-v)^{-1}\,dv \le u/(1-u)$，

$$\begin{aligned} \log G(r) &= -\frac{1}{2}\sum_i \log(1 - r^2 s_i^2) \\ &\le \frac{1}{2}\sum_i \frac{r^2 s_i^2}{1 - r^2 s_i^2} \le \frac{r^2 \sum_i s_i^2}{2(1 - r^2 q^2)} \le \frac{C^2 r^2}{2(1 - r^2 q^2)}. \end{aligned}$$

因此 $1 \le G(1) \le \Gamma(1)$。若 $|f(1) - G(1)| \le K/n$，则

$$\left| \frac{f(1)}{G(1)} - 1 \right| = \frac{|f(1) - G(1)|}{G(1)} \le K/n,$$

因此绝对误差界也给出同阶的相对误差界。

3.2 系数与高斯配对

定义 3.1（永久式系数与重标度）。

写 $f(t) = \sum_{k=0}^{n} a_k t^k$。按永久式中来自 E 的元素展开，得到

$$a_k = \frac{1}{(n)_k} \sum_{\substack{I, J \subseteq [n] \\ |I| = |J| = k}} \operatorname{per} E[I, J],$$

这里 $0 \le k \le n$，所以分母 $(n)_k$ 非零。对 $k > n$ 直接令 $a_k = 0$，不使用含 $1/(n)_k$ 的表达式。定义

$$F_k = \frac{(n)_k}{n^k} a_k = \frac{1}{k!} \sum_{\substack{i_1,\dots,i_k \text{ distinct} \\ j_1,\dots,j_k \text{ distinct}}} \prod_{\ell=1}^{k} B_{i_\ell j_\ell}, \qquad F(t) = \sum_{k=0}^{n} F_k t^k.$$

当 $k > n$ 时，右侧为空和，按约定取零；以下形式恒等式也采用这一约定。

定义 3.2（集合分划与权重）。

对任意有限集合 E，记 $\mathfrak{P}(E)$ 为将 E 拆成互不相交非空块的全部集合分划，并记 $\mathfrak{P}_k = \mathfrak{P}([k])$。“$k$ 个坐标互异” 的示性函数具有标准的分划格容斥展开。[5, Section 8] 的永久式计算也使用成对分划展开。其中，大小为 d 的块带 Möbius 权重 $(-1)^{d-1}(d-1)!$；整个分划的权重在此定义为 $\mu(\pi) = \prod_{D \in \pi} (-1)^{|D|-1}(|D|-1)!$。分别对 F_k 的行坐标和列坐标应用这一展开。每对分划对应一个二部多重图：边带互异标号 $1, \dots, k$，两侧的顶点分别为行、列分划的块，每个大小为 d 的块带上述权重。

每个顶点的数值标签独立地在 $[n]$ 中求和；不同顶点的数值标签允许相同。如果某个行顶点的度数为一，对其标签求和得到 B 的一个列和，因而为零。度数为一的列顶点同样给出零行和。因此，只有所有顶点度数至少为二的图留下贡献。

例如，在二次和三次项中，保留下来的行、列分划各自都只有一个块。两侧 Möbius 权重的乘积分别为 1 和 4，再除以 $k!$，得到

$$F_2 = \frac{1}{2} \sum_{i,j} B_{ij}^2, \qquad F_3 = \frac{2}{3} \sum_{i,j} B_{ij}^3, \qquad |F_3| \le \frac{2C^3}{3n}.$$

其中二次项是高斯主项的一部分，三次项则具有 $O(n^{-1})$ 的界。

所有顶点度数均为二的连通分量称为纯二度分量，其总指数生成函数为 $G(t)$。可用两个独立标准实高斯向量 X, Y 直接验证：由 Wick 公式，

$$\mathbb{E} \exp(t X^{\mathsf{T}} B Y)$$

中 t^k 的系数恰等于边标号两侧的配对分划之和，而这些正是所有顶点均为二度的图。先对条件高斯分布积分，再将 BB^{T} 对角化，得到

$$\mathbb{E} \exp(t X^{\mathsf{T}} B Y) = \mathbb{E} \exp\left(\frac{t^2}{2} X^{\mathsf{T}} B B^{\mathsf{T}} X \right) = \det(I - t^2 B B^{\mathsf{T}})^{-1/2}.$$

该解析恒等式在 $|t| \|B\|_{\mathrm{op}} < 1$ 时成立，并确定全部形式系数。特别地，G 的系数非负，且

$$G(r) \le \Gamma(r) \qquad (r \ge 0,\ rq < 1),$$

因为 $-\log(1-x) \le x/(1-x)$，且 $\sum_i s_i^2 = \|B\|_{\mathrm{F}}^2 \le C^2$；这里 s_i 为 B 的奇异值。

从每个留下贡献的图中删除全部纯二度分量，称剩余部分为核心。核心可以不连通。如果核心有 h 条边、v 个顶点，定义其超额为 $j = h - v$。非空核心满足 $j \ge 1$。带边标号的分量分解给出逐系数恒等式

$$F(t) = G(t) \left(1 + \sum_{j \ge 1} C_j(t) \right),$$

其中 C_j 是超额为 j 的核心生成级数，系数包括 Möbius 符号和矩阵收缩。该等式在形式级数意义下成立：固定次数 k 只涉及有限多个 $j < k$，无须假设关于 j 的级数在非零 t 处收敛。由 F_k 的互异指标定义，所有高于 n 次的系数均为零。

定义 3.3（核心级数）。

对 $\pi,\sigma\in\mathfrak{P}_h$，以 $D_\pi(a)$、$D_\sigma(a)$ 表示含边标号 a 的两个分划块。令行块标签为 $x_D\in[n]$，列块标签为 $y_E\in[n]$，定义收缩

$$\mathcal{W}_B(\pi,\sigma)=\sum_{x:\pi\to[n]}\sum_{y:\sigma\to[n]}\prod_{a=1}^{h}B_{x_{D_\pi(a)},y_{D_\sigma(a)}}.$$

两个求和遍历全部函数，不要求单射。定义 $\mathcal{K}_{j,h}$ 为满足下列条件的分划对：每个块大小至少为二；对应二部多重图的每个连通分量至少含一个大小不小于三的块；$h-|\pi|-|\sigma|=j$。其中 $|\pi|$ 是块数，不是原集合大小。连通分量指能通过边依次相接到达的顶点组成的极大集合；度数按入射半边数计，重边分别计数，压缩后自环向其顶点贡献二度。核心级数定义为

$$C_j(t)=\sum_{h=0}^{\infty}c_{j,h}t^h,\qquad c_{j,h}=\frac{1}{h!}\sum_{(\pi,\sigma)\in\mathcal{K}_{j,h}}\mu(\pi)\mu(\sigma)\mathcal{W}_B(\pi,\sigma).$$

对固定 h，上述和为有限和。非空核心两侧至少各含一个块，故 $j\le h-2$，从而 $h\le j+1$ 时 $c_{j,h}=0$。以下也使用较弱的条件 $j<h$。空图的贡献为 $F_0=G(0)=1$，不计入 C_j。

记 $g_k=[t^k]G(t)$，$k\ge0$，其中 $[t^k]$ 表示系数提取。于是 $g_0=1$，且奇数 k 时 $g_k=0$。引理 3.2 将证明加权范数 $\|C_j\|_R=\sum_h|c_{j,h}|R^h$ 有限。

固定从 E 中选出的行集 I、像集 J，大小均为 k。在这些位置上选择双射的总权重是 $\operatorname{per}E[I,J]$；其余 $n-k$ 行可以任意双射到其余列，总共有 $(n-k)!$ 种。因此

$$[t^k]\operatorname{per}(J+tE)=(n-k)!\sum_{|I|=|J|=k}\operatorname{per}E[I,J],$$

$$a_k=\frac{(n-k)!}{n!}\sum_{|I|=|J|=k}\operatorname{per}E[I,J]=\frac{1}{(n)_k}\sum_{|I|=|J|=k}\operatorname{per}E[I,J].$$

给定行集、列集及一个双射，将这 k 条匹配边依次编为 $1,\dots,k$ 有 $k!$ 种方式；故

$$\sum_{\boldsymbol{i},\boldsymbol{j}\ \text{distinct}}\prod_{h=1}^{k}B_{i_hj_h}=k!\sum_{|I|=|J|=k}\operatorname{per}B[I,J]=\frac{k!}{n^k}\sum_{|I|=|J|=k}\operatorname{per}E[I,J].$$

对任一条件 $\mathcal{A}$，$\mathbf{1}\{\mathcal{A}\}$ 在条件成立时为一，否则为零；它是标量示性函数，和全一向量 $\mathbf{1}_p$ 不同。对分划 π 定义

$$\mu(\pi)=\prod_{D\in\pi}(-1)^{|D|-1}(|D|-1)!,\quad \mathbf{1}_\pi(\boldsymbol{i})=\prod_{D\in\pi}\mathbf{1}\{i_h\text{ 在}D\text{ 上相等}\}.$$

则

$$\mathbf{1}\{i_1,\dots,i_k\text{ 互异}\}=\sum_{\pi\in\mathfrak{P}_k}\mu(\pi)\mathbf{1}_\pi(\boldsymbol{i}).$$

验证方式如下。设给定坐标的相等类为 $D_1,\dots,D_r$，则右端分解为

$$\prod_{a=1}^{r}\left(\sum_{\pi\in\mathfrak{P}(D_a)}\mu(\pi)\right).$$

置换符号 $\operatorname{sgn}(\pi)=(-1)^{\#\{(i,j):i<j,\ \pi(i)>\pi(j)\}}$，即逆序对数为偶数时取一、奇数时取负一。大小为 d 的块可以放成一个有向循环的方式为 $(d-1)!$，循环的置换符号为 $(-1)^{d-1}$。因此括号内等于该集合上全部置换的符号和：大小一时为一，大小至少二时用乘一个固定换位的双射使正负项成对抵消，值为零。

两侧代入得

$$F_k=\frac{1}{k!}\sum_{\pi,\sigma\in\mathfrak{P}_k}\mu(\pi)\mu(\sigma)\sum_{\boldsymbol{i},\boldsymbol{j}}\mathbf{1}_\pi(\boldsymbol{i})\mathbf{1}_\sigma(\boldsymbol{j})\prod_{h=1}^{k}B_{i_hj_h}.$$

若 π 有单元素块 $\{h\}$，对仅出现一次的标签 i_h 求和便得到 $\sum_i B_{ij_h}=0$。列侧同理。对于 $k=2$，只剩一对二元素块，权重 $(-1)(-1)=1$；对于 $k=3$，只剩一对三元素块，权重 $2\cdot 2=4$。故

$$F_2=\frac{1}{2!}\sum_{i,j}B_{ij}^2,\quad F_3=\frac{4}{3!}\sum_{i,j}B_{ij}^3,\quad |F_3|\le\frac{2}{3}n^2(C/n)^3=\frac{2C^3}{3n}.$$

令 $K=BB^{\mathsf{T}}$、$Q=B^{\mathsf{T}}B$。四次项为

$$\begin{aligned}F_4=&\frac{1}{8}(\operatorname{tr}K)^2+\frac{1}{4}\operatorname{tr}(K^2)\\&-\frac{3}{4}\sum_i\left(\sum_j B_{ij}^2\right)^2-\frac{3}{4}\sum_j\left(\sum_i B_{ij}^2\right)^2+\frac{3}{2}\sum_{i,j}B_{ij}^4.\end{aligned}$$

前三类分划配对分别为：两侧都是 $2+2$（$3\cdot 3=9$ 对）；一侧为 4、另一侧为 $2+2$（每个方向三对，块权重 -6）；两侧都是 4（权重 36）。除以 $4!=24$ 后得到上述系数。两侧配对相同的三对给 $3/24=1/8$；配对不同的六对给 $6/24=1/4$。其中 g_4 为高斯主项，其余为非高斯修正。

标准实高斯变量 X 的密度为 $(2\pi)^{-1/2}e^{-x^2/2}$。先设 $u\in\mathbb{R}$，配方得

$$\mathbb{E}e^{uX}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}}e^{-x^2/2+ux}\,dx=e^{u^2/2}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}}e^{-(x-u)^2/2}\,dx=e^{u^2/2}.$$

对 $v\in\mathbb{R}^n$，独立标准向量的多元母函数为 $\mathbb{E}e^{v^{\mathsf{T}}X}=e^{\|v\|^2/2}$。对坐标求导得到

$$\mathbb{E}\prod_{h=1}^{2r}X_{i_h}=\sum_{\mathcal{P}\text{ 为配对}}\prod_{\{a,b\}\in\mathcal{P}}\mathbf{1}\{i_a=i_b\},\qquad \mathbb{E}\prod_{h=1}^{2r+1}X_{i_h}=0.$$

实高斯矩可由一维积分计算。标准实高斯向量的坐标相互独立，密度均为 $(2\pi)^{-1/2}e^{-x^2/2}$。令

$$m_r=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}}x^re^{-x^2/2}\,dx.$$

归一化给出 $m_0=1$。奇函数对称积分给出 $m_{2r+1}=0$。对 $r\ge 1$ 分部积分：

$$\begin{aligned}m_{2r}&=-\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}}x^{2r-1}\,d(e^{-x^2/2})\\&=\frac{2r-1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}}x^{2r-2}e^{-x^2/2}\,dx\\&=(2r-1)m_{2r-2}=(2r-1)(2r-3)\cdots 1.\end{aligned}$$

这里边界项为零，因为 $|x|^ae^{-x^2/2}\to 0$ 对每个固定整数 $a\ge 0$ 成立。记 $(-1)!!=1$，于是统一写成 $m_{2r}=(2r-1)!!$，包括 $r=0$。

对指标列 $i_1,\dots,i_k$，定义重数 $c_a=\#\{h:i_h=a\}$。独立性给出有限乘积

$$\mathbb{E}\prod_{h=1}^{k}X_{i_h}=\prod_{a=1}^{n}m_{c_a}.$$

任一 c_a 为奇数时右侧为零。若全部 c_a 为偶数，所有允许配对必须把相同指标的位置配在一起。c_a 个位置的配对数满足

$$p_0=1,\qquad p_{2r}=(2r-1)p_{2r-2}=(2r-1)!!.$$

所以允许配对的总数是 $\prod_a(c_a-1)!!$，与前面算得的矩相同。定义 Kronecker 符号 $\delta_{ab}=\mathbf{1}\{a=b\}$，便得到

$$\mathbb{E}\prod_{h=1}^{2r}X_{i_h}=\sum_{\mathcal{P}}\prod_{\{a,b\}\in\mathcal{P}}\delta_{i_ai_b}.$$

这里 $\mathcal{P}$ 遍历 $[2r]$ 的配对；$r=0$ 时空配对贡献一，奇数阶矩为零。

先取实数 t 满足 $|t|q<1$,对 Y 积分,然后对 BB^{T} 作正交对角化。标准向量密度为 $(2\pi)^{-n/2}e^{-\|x\|_2^2/2}$；正交变换保持 $\|x\|_2$ 和 Jacobian 绝对值一，故变换后的密度相同且仍为各坐标密度的乘积。因此:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}e^{tX^{\mathsf{T}}BY}&=\mathbb{E}_Xe^{t^2\|B^{\mathsf{T}}X\|^2/2}\\&=\prod_i\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}}e^{-(1-t^2s_i^2)x^2/2}\,dx\\&=\prod_i(1-t^2s_i^2)^{-1/2}=G(t).\end{aligned}$$

为将等式推广到复圆盘，令 $U=X^{\mathsf{T}}BY$，并取实数 r 满足 $|t|<r<1/q$。当 $q=0$ 时 $B=0$，结论直接成立。对实数 u，有

$$e^{r|u|}\le e^{ru}+e^{-ru}.$$

由于 Y 与 $-Y$ 同分布，U 与 $-U$ 同分布，所以

$$\mathbb{E}e^{r|U|}\le\mathbb{E}e^{rU}+\mathbb{E}e^{-rU}=2G(r)<\infty.$$

由指数级数各项非负，对 $k\ge0$ 有

$$\frac{r^k|U|^k}{k!}\le e^{r|U|}\quad\Longrightarrow\quad\mathbb{E}|U|^k\le\frac{k!}{r^k}\mathbb{E}e^{r|U|}\le\frac{2k!}{r^k}G(r)<\infty.$$

因此对每个整数 $N\ge0$ 都可以对有限和逐项取期望:

$$\sum_{k=0}^{N}\frac{r^k}{k!}\mathbb{E}|U|^k=\mathbb{E}\sum_{k=0}^{N}\frac{r^k|U|^k}{k!}\le\mathbb{E}e^{r|U|}\le2G(r).$$

再令 $s=|t|/r<1$。逐点控制指数级数的余项:

$$\left|e^{tU}-\sum_{k=0}^{N}\frac{t^kU^k}{k!}\right|\le\sum_{k>N}s^k\frac{r^k|U|^k}{k!}\le s^{N+1}e^{r|U|}.$$

取期望后得到显式误差

$$\left|\mathbb{E}e^{tU}-\sum_{k=0}^{N}\frac{t^k}{k!}\mathbb{E}U^k\right|\le 2G(r)s^{N+1}\longrightarrow 0.$$

因此，对任意满足 $|t|<1/q$ 的复数 t，有

$$\mathbb{E}e^{tU}=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{t^k}{k!}\mathbb{E}U^k,\qquad \sum_{k=0}^{\infty}\frac{|t|^k}{k!}|\mathbb{E}U^k|\le 2G(r)<\infty.$$

现将所得系数与 $G(t)$ 比较。令 s_i 为 B 的奇异值。每个因子的级数由 $c_0=1$ 及以下递推确定：

$$c_{m+1}=\frac{2m+1}{2m+2}c_m,\qquad c_m=\frac{(2m)!}{4^m(m!)^2},\qquad (1-z)^{-1/2}=\sum_{m\ge 0}c_m z^m\quad(|z|<1).$$

这里递推来自 $(1-z)f'(z)=f(z)/2$ 的逐项系数比较；由 $c_{m+1}/c_m<1$，右边在 $|z|<1$ 绝对收敛。再计算

$$\frac{d}{dz}\big[(1-z)f(z)^2\big]=-f(z)^2+2(1-z)f(z)f'(z)=-f(z)^2+f(z)^2=0.$$

在零处其值为一，所以 $(1-z)f(z)^2=1$；因而确定了零处取值为一的分支。有限个因子相乘得到

$$G(t)=\prod_{i}\left(\sum_{m\ge 0}c_m s_i^{2m}t^{2m}\right),\qquad |t|q<1.$$

实区间内，上式和已算出的高斯积分相等。如果它的某个系数与 $\mathbb{E}U^k/k!$ 不同，取最小的不同次数 k_0，两级数之差除以 t^{k_0} 后沿实数 $t\to 0$ 便得到

$$0=\lim_{t\to 0}\frac{\mathbb{E}e^{tU}-G(t)}{t^{k_0}}=\frac{\mathbb{E}U^{k_0}}{k_0!}-[t^{k_0}]G(t)\neq 0,$$

矛盾。因此全部系数相同；两侧在所述复圆盘内都由绝对收敛的级数给出，等式在那里也成立。指数的 $1/k!$ 与带边标号的指数生成函数的 $1/k!$ 一致；Wick 配对对应两侧所有块均为二元素的分划。这里仅在固定谱隙圆盘内交换收敛级数；对核心超额 j 的无穷和仍只使用形式系数恒等式。

对于任意留下贡献的图，所有度数至少二，故

$$2(h-v)=\sum_{u}(\deg u-2)\ge 0.$$

若 $h-v=0$，所有顶点度数恰为二，每个连通分量都是纯二度分量。删除这些分量后，非空核心必有 $j=h-v\ge 1$。将边标号集合分成纯二度部分与核心部分的 $\binom{k}{h}$ 因子，和 $1/k!$ 相乘为 $1/[h!(k-h)!]$，因此生成函数正好相乘。

置 $K=BB^{\mathsf{T}}$。由矩阵特征值分解和 $-\log(1-u)=\sum_{r\ge 1}u^r/r$，

$$\log G(t)=\frac{1}{2}\sum_{r=1}^{\infty}\frac{t^{2r}}{r}\operatorname{tr}(K^r)=A_s t^2+B_s t^4+C_s t^6+O(t^8),$$

记 $A_s=\operatorname{tr}K/2$、$B_s=\operatorname{tr}(K^2)/4$、$C_s=\operatorname{tr}(K^3)/6$。将指数函数按幂展开：

$$G(t)=1+(A_st^2+B_st^4+C_st^6)+\frac{1}{2}(A_st^2+B_st^4)^2+\frac{1}{6}(A_st^2)^3+O(t^8)$$
$$=1+A_st^2+(B_s+A_s^2/2)t^4+(C_s+A_sB_s+A_s^3/6)t^6+O(t^8).$$

所以

$$g_2=\tfrac{1}{2}\operatorname{tr}K,$$
$$g_4=\tfrac{1}{4}\operatorname{tr}(K^2)+\tfrac{1}{8}(\operatorname{tr}K)^2,$$
$$g_6=\tfrac{1}{6}\operatorname{tr}(K^3)+\tfrac{1}{8}\operatorname{tr}K\operatorname{tr}(K^2)+\tfrac{1}{48}(\operatorname{tr}K)^3.$$

所有奇次系数为零，因为 $G(t)$ 仅含 t^2。标量 A_s,B_s,C_s 仅在本段指数展开中使用。

二元素分划 $12|34,13|24,14|23$ 共三种。两侧各选一种，共九对；其中三对相同、六对不同。相同配对时矩阵标签和为 $(\sum_{ij}B_{ij}^2)^2=(\operatorname{tr}K)^2$；不同配对时标签和为 $\operatorname{tr}(K^2)$。所以纯二度贡献为

$$\frac{3}{4!}(\operatorname{tr}K)^2+\frac{6}{4!}\operatorname{tr}(K^2)=g_4.$$

一侧是四元素块，其 Möbius 权重为 -6；另一侧选二元素配对，有三种，每种权重为 $(-1)^2=1$。所以行色四度项为

$$\frac{3(-6)}{24}\sum_i\sum_{j,k}B_{ij}^2B_{ik}^2=-\frac{3}{4}\sum_i\left(\sum_jB_{ij}^2\right)^2.$$

交换行列颜色后得到列色四度项

$$-\frac{3}{4}\sum_j\sum_{i,k}B_{ij}^2B_{kj}^2=-\frac{3}{4}\sum_j\left(\sum_iB_{ij}^2\right)^2.$$

两侧都是四元素块，权重乘积为 $(-6)^2=36$，故最后一项为

$$\frac{36}{24}\sum_{i,j}B_{ij}^4=\frac{3}{2}\sum_{i,j}B_{ij}^4.$$

这四类相加得到前面的 F_4；含一度顶点的分划均因中心化而无贡献。

3.3 非高斯核心的估计

我们先对每条二度链的内部指标求和，再用算子范数控制所得矩阵乘积。压缩这些链后，超额为 j 的图至多有 $2j$ 个顶点。令

$$W=\max\left\{1,CR+\frac{C^2R^2}{1-Rq}\right\},\qquad D=710W^3,\qquad T_1=\frac{3}{2}W^2+\frac{10}{3}W^3.$$

引理 3.2（压缩核心活动量）。

在上述记号下，

$$\|C_j\|_R\le(Dj/n)^j\qquad(j\ge1),\tag{3.2}$$

且首超额满足更精确的界

$$\|C_1\|_R\le T_1/n.$$

其中 $\|H\|_R = \sum_{k\ge 0} |[t^k]H| R^k$。

证明。

压缩所有内部顶点均为二度的极大路径。每条压缩边对应一条两端度数至少为三、长度为正的链。允许自环、重边和非连通压缩图。若 b 为度数至少为三的顶点数，e 为压缩边数，则压缩不改变超额，并给出

$$e = b + j, \qquad 2j = \sum_{i=1}^{b} (d_i - 2), \qquad 1 \le b \le 2j, \qquad e \le 3j.$$

增饰计数恒等式。固定超额及原始边数，对所有有序度数序列 $(d_1, \dots, d_b)$、顶点的两种颜色配置、带标号半边配对及与颜色相容的正链长求和。除去临时标号后的绝对 Möbius 补偿为 $1/(b! \prod_i d_i)$。链收缩应先对内部数值指标求和，再取绝对值。

这里的结构顶点是两个边标号分拆的块，其数值指标取自 $[n]$。具有相同数值指标的不同块仍视为不同顶点。原始互异性约束已由 Möbius 反演处理，因此以下直接对分拆对计数。临时为 b 个高度数顶点及每个顶点的 d_i 个半边分别加标号，并用这些标号为每条链选择唯一读取方向。遍历全部有序度数序列后，每个原始带边标号的核心有 $b! \prod_i d_i!$ 种增饰。对一个固定的度数序列，只有与之相容的顶点标号出现；对所有序列求和才恰好产生完整的 $b!$ 因子。每个结构顶点都能由其颜色及入射原始边标号辨认，每个入射半边则由其原始边标号辨认，故没有额外的自同构稳定子。反过来，给定增饰后的半边配对及全部正链长，所有链位置均被确定，原始 h 个边标号可以按 $h!$ 种方式分配到这些位置。在满足二部颜色奇偶条件时，内部顶点及其颜色也随之确定。

除去原始指数生成函数的 $h!$ 因子及临时增饰，再乘回高度数顶点的绝对 Möbius 权重 $\prod_i (d_i - 1)!$，补偿为

$$\frac{1}{b! \prod_i d_i}.$$

这一步包含自环和链反转：将每一对不同的带标号半边排序，从较小者开始读取该链。链的反转只改变这些位置上的原始边标号次序，不另产生因子二；自环的两个半边也使用同一约定。内部二度顶点的绝对 Möbius 权重为一，也没有额外的链长阶乘。异色端点之间的链长为奇数，同色端点之间为偶数；尤其自环的长度至少为二且为偶数。计数时仍须满足这些颜色与链长条件。

例如，取一个行色四度顶点，以及两个长度为二的自环，各经过一个单独的列色二度顶点。此时 $j = b = 1$、$h = 4$。四个原始边标号分成两对共有三种方式，四度顶点的 Möbius 权重为 $(-1)^3 3! = -6$，而两个二度顶点的权重相乘为 $+1$；除以 $4!$ 后，其带符号贡献为

$$-\frac{3}{4} \sum_i \left(\sum_k B_{ik}^2 \right)^2.$$

即使某些求和项中数值指标相等，两个结构列顶点仍然不同。交换两种颜色得到 $-\frac{3}{4} \sum_k (\sum_i B_{ik}^2)^2$。绝对补偿界使用的是这些项的绝对值。重边的例子是一个行顶点和一个列顶点之间的三条长度为一的链，其贡献为 $\frac{(2!)^2}{3!} \sum_{i,k} B_{ik}^3 = \frac{2}{3} \sum_{i,k} B_{ik}^3$，恰为前述三次项。上述自环和平行边的计数均遵守反转约定，压缩前的图仍为二部图。

仅在取上界时忽略颜色限制。固定 j, b 后，所得总补偿为

$$U_{j,b} = \frac{2^b}{b!} \frac{(2e)!}{2^e e!} \sum_{\substack{d_1 + \cdots + d_b = 2e \\ d_i \ge 3}} \frac{1}{d_1 \cdots d_b}, \qquad e = b + j.$$

以下估计须先对每条链的内部数值指标求和，再取绝对值；若先逐项将 B 换成 $|B|$，便无法保留算子谱隙的控制。长度为一的链对应矩阵元素，绝对值不超过 C/n。对于长度 $\ell \ge 2$ 的链，先求和

内部标签，其收缩是由 $B, B^{\mathsf T}$ 交替相乘所得矩阵的一个元素。两端行或列的二范数不超过 $C/\sqrt{n}$，中间因子的算子范数不超过 q。因此，收缩的绝对值不超过

$$\frac{C^2}{n} q^{\ell-2}.$$

按 R 加权对长度求和，每条链的总活动量不超过 W/n。对 b 个高度数顶点标签求和至多给出 n^b，故

$$\|C_j\|_R \le n^{-j} \sum_{b=1}^{2j} U_{j,b} W^{b+j}.$$

度数组合数为 $\binom{2j-1}{b-1} \le 4^j$：写 $d_i = 3 + x_i$，则 $\sum_i x_i = 2j - b$。此外，$\prod_i d_i^{-1} \le 3^{-b}$，半边配对数不超过 $(6j)^{b+j}$。于是

$$\sum_{b=1}^{2j} U_{j,b} W^{b+j} \le (24jW)^j \sum_{b=1}^{2j} \frac{(4jW)^b}{b!}.$$

取 $\theta = 1/(2W) \le 1/2$，则

$$\sum_{b=0}^{2j} \frac{(4jW)^b}{b!} \le \theta^{-2j} \exp(4jW\theta) = (2\mathrm{e}W)^{2j}.$$

因此，活动量至多为 $(96\mathrm{e}^2 W^3 j)^j \le (710 W^3 j)^j$。后一不等式使用 $\mathrm{e} < 87/32$；将指数级数求和至六次，再以 $8/(7 \cdot 7!)$ 控制尾项，即得此界。

当 $j = 1$ 时仅有 $b = 1, 2$。补偿公式分别给出

$$U_{1,1} = \frac{3}{2}, \qquad U_{1,2} = \frac{10}{3}.$$

结合链界即有 $\|C_1\|_R \le T_1/n$。

压去一个二度顶点同时减少一条边和一个顶点，故 $h - v$ 不变。压缩图满足

$$2e = \sum_{i=1}^{b} d_i, \quad e - b = j, \quad 2j = \sum_{i=1}^{b} (d_i - 2) \ge b,$$

因此 $b \le 2j$、$e = b + j \le 3j$。除去临时标号并计入 Möbius 权重后，所得系数为

$$\frac{1}{h!} \cdot \frac{h!}{b! \prod_i d_i!} \cdot \prod_i (d_i - 1)! = \frac{1}{b!} \prod_i \frac{(d_i - 1)!}{d_i!} = \frac{1}{b! \prod_i d_i}.$$

对 $2e$ 个半边，配对数由递推 $p_{2e} = (2e-1) p_{2e-2}$、$p_0 = 1$ 得

$$p_{2e} = (2e-1)(2e-3) \cdots 1 = \frac{(2e)!}{2^e e!}.$$

颜色配置数为 2^b；故在忽略不相容颜色和链长后得到 $U_{j,b}$。链长一的收缩为 B_{ij}。若长度 $\ell \ge 2$，写收缩为 $r^{\mathsf T} M_1 \cdots M_{\ell-2} c$，其中 r, c 是 B 的行或列，则

$$\|r\|_2^2, \|c\|_2^2 \le n (C/n)^2 = C^2/n,$$

$$|r^{\mathsf T}M_1\cdots M_{\ell-2}c|\le\|r\|_2\prod_{a}\|M_a\|_{\mathrm{op}}\|c\|_2\le (C^2/n)q^{\ell-2}.$$

按长度加权后

$$R\frac{C}{n}+\sum_{\ell=2}^{\infty}R^{\ell}\frac{C^2}{n}q^{\ell-2}=\frac{1}{n}\left(CR+\frac{C^2R^2}{1-Rq}\right)\le W/n.$$

剩余 b 个顶点的数值标签至多有 n^b 种选择，故 $n^b(W/n)^e=n^{-j}W^{b+j}$。链的内部求和保留了因子 $q^{\ell-2}$。

度数组合计数：置 $x_i=d_i-3\ge 0$，则 $\sum_i x_i=2j-b$，所以

$$\#\{(d_1,\dots,d_b)\}=\binom{(2j-b)+b-1}{b-1}=\binom{2j-1}{b-1}\le 2^{2j-1}\le 4^j.$$

并且 $\prod_i 1/d_i\le 3^{-b}$，配对数至多为 $(2e)^e\le(6j)^{b+j}$。于是

$$\begin{aligned}U_{j,b}W^{b+j}&\le\frac{2^b}{b!}(6j)^{b+j}4^j3^{-b}W^{b+j}\\&=(24jW)^j\frac{(4jW)^b}{b!}.\end{aligned}$$

若 $0<\theta\le 1$ 且 $b\le 2j$，则 $\theta^b\ge\theta^{2j}$，故

$$\sum_{b=0}^{2j}\frac{(4jW)^b}{b!}\le\theta^{-2j}\sum_{b=0}^{\infty}\frac{(4jW\theta)^b}{b!}=\theta^{-2j}e^{4jW\theta}.$$

取 $\theta=1/(2W)$ 后，上式为 $(2W)^{2j}e^{2j}$。乘以 $(24jW)^j$，即得 $(96e^2W^3j)^j$。这里用到的有理数界为

$$e<\sum_{h=0}^{6}\frac{1}{h!}+\frac{1}{7!}\sum_{r=0}^{\infty}8^{-r}=\frac{1957}{720}+\frac{1}{4410}<\frac{87}{32},$$

$$96(87/32)^2=\frac{22707}{32}=709.59375<710.$$

当 $j=1$：$b=1,e=2,d_1=4$，所以

$$U_{1,1}=\frac{2}{1!}\frac{4!}{2^2\,2!}\frac{1}{4}=\frac{3}{2}.$$

当 $b=2,e=3$，唯一度数列为 $(3,3)$，故

$$U_{1,2}=\frac{2^2}{2!}\frac{6!}{2^3\,3!}\frac{1}{3\cdot 3}=\frac{10}{3}.$$

合并两种情形，得 $T_1=(3/2)W^2+(10/3)W^3$。

固定一个压缩核心，给剩下的 b 个高度数顶点指定数值标签。设其 e 条压缩边对应的内部结构顶点集合分别为 $V_1,\dots,V_e$；这些集合互不相交。数值标签可以相等，但每个结构顶点对应独立求和变量。因此有限和的分配律给出

$$\sum_{\text{全部内部标签}}\prod_{r=1}^{e}\left(\prod_{a\in\mathrm{chain}_r}B_{i_aj_a}\right)=\prod_{r=1}^{e}\left[\sum_{\text{链}r\text{ 的内部标签}}\prod_{a\in\mathrm{chain}_r}B_{i_aj_a}\right].$$

每个中括号是一个交替矩阵乘积的单个元素；现在才对它取绝对值。正链长的求和也分离为 e 个几何级数。因此固定高度数标签后的总绝对活动量至多为 $(W/n)^e$。再对 n^b 种高度数标签求和，得到

$$n^b(W/n)^e = W^e n^{b-e} = W^{b+j}n^{-j}.$$

这里各链的内部结构顶点集互不相交，故求和变量独立；数值标签仍可相同。

当 $j=1, b=1$ 时，有一个四度顶点、四个半边。配对只能为

$$(12)(34),\quad (13)(24),\quad (14)(23).$$

每个配对给两个自环，颜色有两种，补偿分母 $b!d_1 = 4$；总数 $2\cdot 3/4 = 3/2$。

当 $j=1, b=2$ 时，两顶点各三度。半边配对分成两类：全部三条边连接两个顶点，数目为 $3! = 6$；每个顶点各有一个自环，剩下的两个半边连成一条边，数目为 $3\cdot 3 = 9$。两类和为十五。顶点颜色四种，补偿分母为 $2!\cdot 3\cdot 3 = 18$，所以

$$\frac{4}{18}(6+9) = \frac{10}{3}.$$

忽略颜色与链长的相容条件给出上界，两个情形分别产生 T_1 的两项。□

3.4 线性系数窗口与阶乘恢复

活动量界式 (3.2)在 j/n 较小时有效。取

$$\alpha = \min\left\{\frac{1}{4}, \frac{1}{16D}, \frac{\log\sigma}{2}\right\}, \qquad M = \lfloor \alpha n \rfloor.$$

并令 $v_j = (Dj/n)^j$。当 $j+1 \le M$ 时，

$$\frac{v_{j+1}}{v_j} = \frac{D(j+1)}{n}\left(1+\frac{1}{j}\right)^j \le \frac{\mathrm{e}D(j+1)}{n} \le 3D\alpha < \frac{1}{2}.$$

故对 $n \ge 4/\alpha$，

$$\sum_{j=2}^{M} v_j \le 2v_2 = \frac{8D^2}{n^2}.$$

形式核心恒等式中，次数不超过 M 的贡献只能来自超额 $j \le M$。结合 G 系数非负、活动量引理及加权系数和的卷积不等式，得到

$$\sum_{k=0}^{M} |F_k - [t^k]G| R^k \le \Gamma(R)\left(\frac{T_1}{n} + \frac{8D^2}{n^2}\right).$$

该估计仅涉及次数不超过 M 的系数。

记 $g_k = [t^k]G$，并在 $0 \le k \le M$ 时令 $r_k = n^k/(n)_k$。由于 $\alpha \le 1/4$，

$$\log r_k = \sum_{\ell=0}^{k-1} -\log(1-\ell/n) \le \frac{k(k-1)}{2n(1-\alpha)} \le \frac{k^2}{n} \le \alpha k.$$

由 $\alpha \le (\log\sigma)/2$ 可知 $r_k \le \sigma^k$，并且

$$0 \le r_k - 1 \le \frac{k(k-1)}{2n(1-\alpha)} r_k.$$

因为 $a_k = r_k F_k$，可以分解为

$$a_k - g_k = r_k(F_k - g_k) + (r_k - 1)g_k.$$

第一部分由上述 R 加权估计控制。对第二部分，使用高斯系数的二阶矩：

$$\sum_{k\ge 0} k(k-1) g_k \sigma^k = \left((t\partial_t)^2 - t\partial_t\right) G(t)\big|_{t=\sigma}.$$

令 $a_i = \sigma^2 s_i^2$。对 $G(t) = \prod_i (1 - t^2 s_i^2)^{-1/2}$ 求导，得到

$$\frac{\left((t\partial_t)^2 - t\partial_t\right) G(t)}{G(t)}\bigg|_{t=\sigma} = \left(\sum_i \frac{a_i}{1-a_i}\right)^2 + \sum_i \frac{a_i(1+a_i)}{(1-a_i)^2}.$$

定义

$$u_\sigma = \frac{\sigma^2 C^2}{1-\sigma^2 q^2}, \qquad v_\sigma = \frac{\sigma^2 C^2 (1+\sigma^2 q^2)}{(1-\sigma^2 q^2)^2},$$

$$K_G = \frac{\Gamma(\sigma)}{2(1-\alpha)} \left(u_\sigma^2 + v_\sigma\right).$$

导数公式中的两项分别不超过 u_σ^2 与 v_σ。因此，

$$\sum_{k=0}^{M} (r_k - 1) g_k \le K_G / n.$$

这给出误差界的前两项。

由 $e < 3$、$\alpha \le 1/(16D)$，

$$\frac{v_{j+1}}{v_j} \le 3D\alpha \le 3/16 < 1/2, \quad \sum_{j=2}^{M} v_j \le v_2 \sum_{r=0}^{\infty} 2^{-r} = 2(2D/n)^2 = 8D^2/n^2.$$

若 $H(t) = \sum h_k t^k$、$K(t) = \sum k_k t^k$，则

$$\sum_{r=0}^{M} |[t^r](HK)| R^r \le \sum_{a,b\ge 0} |h_a||k_b| R^{a+b} = \|H\|_R \|K\|_R.$$

在 $r \le M$ 的系数中只需 $j \le M$；所以先截取有限超额和再使用这个不等式，没有计算 $\sum_{j\ge 1} C_j(R)$。

阶乘恢复中的积分界为

$$-\log(1-u) = \int_0^u \frac{dv}{1-v} \le \frac{u}{1-\alpha} \quad (0 \le u \le \alpha).$$

累加 $u = 0, 1/n, \ldots, (k-1)/n$ 得

$$\log r_k \le \frac{k(k-1)}{2n(1-\alpha)} \le k^2/n \le \alpha k, \quad r_k \le e^{\alpha k} \le \sigma^k.$$

由 $e^x - 1 \le xe^x$ 得 $r_k - 1 \le [k(k-1)/(2n(1-\alpha))]r_k$。因此

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{M} |a_k - g_k| &\le \sum_{k=0}^{M} r_k|F_k - g_k| + \sum_{k=0}^{M}(r_k-1)g_k \\ &\le \sum_{k=0}^{M} R^k|F_k - g_k| + \frac{1}{2n(1-\alpha)}\sum_{k\ge 0} k(k-1)g_k\sigma^k.\end{aligned}$$

令 $D_t = t\partial_t$、$a_i(t) = t^2 s_i^2$。逐次微分为

$$\begin{aligned}D_t \log G &= \sum_i \frac{a_i}{1-a_i} =: A(t), \\ D_t A &= \sum_i \frac{2a_i}{(1-a_i)^2}, \\ D_t G &= GA, \\ D_t^2 G &= G\left[A^2 + \sum_i \frac{2a_i}{(1-a_i)^2}\right], \\ \frac{(D_t^2 - D_t)G}{G} &= A^2 + \sum_i \left[\frac{2a_i}{(1-a_i)^2} - \frac{a_i}{1-a_i}\right] \\ &= A^2 + \sum_i \frac{a_i(1+a_i)}{(1-a_i)^2}.\end{aligned}$$

在 $t = \sigma$，$a_i \le \sigma^2 q^2$，故

$$A(\sigma) \le \frac{\sigma^2 C^2}{1-\sigma^2 q^2} = u_\sigma, \quad \sum_i \frac{a_i(1+a_i)}{(1-a_i)^2} \le \frac{\sigma^2 C^2(1+\sigma^2 q^2)}{(1-\sigma^2 q^2)^2} = v_\sigma.$$

结合 $G(\sigma) \le \Gamma(\sigma)$，恰得到 K_G/n。

定义投影 $\mathcal{P}_M \sum_k h_k t^k = \sum_{k=0}^{M} h_k t^k$。因为超额 j 的非空核心至少有 $j+1$ 条原始边，次数不超过 M 时不会出现 $j > M$，故有

$$\mathcal{P}_M(F - G) = \mathcal{P}_M\left(G\sum_{j=1}^{M} C_j\right).$$

这右边是有限个核心级数之和，因而加权范数合法。由三角不等式和卷积估计，

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{M}|F_k-g_k|R^k &= \|\mathcal{P}_M(F-G)\|_R\\ &\le \left\|G\sum_{j=1}^{M}C_j\right\|_R\\ &\le \|G\|_R\sum_{j=1}^{M}\|C_j\|_R\\ &\le \Gamma(R)\left[T_1/n+\sum_{j=2}^{M}(Dj/n)^j\right]\\ &\le \Gamma(R)(T_1/n+8D^2/n^2).\end{aligned}$$

此处只用有限个 C_j 的加权范数。恢复 a_k 时，第一部分满足

$$\sum_{k=0}^{M}r_k|F_k-g_k|\le\sum_{k=0}^{M}\sigma^k|F_k-g_k|\le\sum_{k=0}^{M}R^k|F_k-g_k|.$$

第二部分 $(r_k-1)g_k$ 由前述高斯导数矩估计。

3.5 控制剩余系数

前一节已估计次数不超过 M 的系数，且 M 与 n 成正比。为用 Cauchy 不等式估计更高次系数，只需在固定圆周 $|t|=R>1$ 上将 f 控制为 $\exp(O(\sqrt{n}))$。以下两个引理给出这一上界，并保留归一化因子 $n!/n^n$。

引理 3.3（永久式极化）。

对复方阵 Z，其奇异值取 Z^*Z 的特征值的非负平方根，相应范数仍按定义 2.3 计算。记 $|Z|=(Z^*Z)^{1/2}$ 为算子绝对值，其中平方根取 Hermitian 半正定平方根，而非逐元素取绝对值。对 Hermitian 矩阵写 $H\ge 0$，意思是每个向量均满足 $x^*Hx\ge 0$。则

$$|\operatorname{per}Z|\le\sqrt{\operatorname{per}|Z|\ \operatorname{per}|Z^*|}.$$

证明。

在复向量空间采用内积 $\langle x,y\rangle=x^*y$。在 $(\mathbb{C}^n)^{\otimes n}$ 中令

$$\xi=(n!)^{-1/2}\sum_{\pi\in\mathfrak{S}_n}e_{\pi(1)}\otimes\cdots\otimes e_{\pi(n)}.$$

则 $\|\xi\|=1$，且 $\langle\xi,Z^{\otimes n}\xi\rangle=\operatorname{per}Z$。作极分解 $Z=U|Z|$；若 Z 奇异，将极分解的部分等距因子延拓为酉矩阵 U。记 $T=|Z|^{\otimes n}$，$V=U^{\otimes n}$。在由半正定算子 T 诱导的半内积中应用 Cauchy–Schwarz 不等式，得到

$$|\langle\xi,VT\xi\rangle|\le\sqrt{\langle V^*\xi,TV^*\xi\rangle\langle\xi,T\xi\rangle}.$$

两个因子分别为 $\operatorname{per}(U|Z|U^*)=\operatorname{per}|Z^*|$ 与 $\operatorname{per}|Z|$。由于它们是半正定张量幂的对角矩阵元，均非负。□

引理 3.4（半正定永久式界）。

设 $n\ge 1$，H 为 $n\times n$ 的 Hermitian 半正定矩阵，特征值为 $\lambda_1,\dots,\lambda_n$。则

$$\operatorname{per} H \le \frac{n!}{n^n} h_n(\lambda_1, \dots, \lambda_n),$$

其中 h_n 为 n 次完全齐次对称多项式，定义为

$$h_n(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = \sum_{\substack{k_1, \dots, k_n \ge 0 \\ k_1 + \cdots + k_n = n}} \prod_{i=1}^{n} \lambda_i^{k_i}.$$

各 k_i 为整数；多项式中的零次幂恒为一，包括 $\lambda_i = 0$ 时的 λ_i^0。这个多项式与第 2 节标量权重 $h_k = ((k+1)/2)^{k/2}$ 是不同对象。若 $\lambda_1 = 1$ 且 $0 \le \lambda_i < 1$（$i \ge 2$），则

$$\operatorname{per} H \le \frac{n!}{n^n} \prod_{i=2}^{n} (1 - \lambda_i)^{-1}.$$

证明。

令 Z 为协方差矩阵为 H 的圆对称复高斯向量。复 Wick 公式给出 $\operatorname{per} H = \mathbb{E} \prod_i |Z_i|^2$。逐点 AM–GM 不等式把该乘积控制为 $n^{-n} \|Z\|^{2n}$。酉对角化后，$\|Z\|^2$ 与 $\sum_i \lambda_i |\zeta_i|^2$ 同分布，其中 ζ_i 为独立标准圆对称复高斯变量，其矩为 $\mathbb{E}|\zeta_i|^{2k} = k!$。于是，多项式展开给出

$$\mathbb{E} \left(\sum_i \lambda_i |\zeta_i|^2 \right)^n = n! h_n(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

最后，$h_n(1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ 是关于 $\lambda_2, \dots, \lambda_n$、总次数不超过 n 的全部单项式之和，不超过各自无穷几何级数的乘积。□

引理 3.4 中的高斯恒等式和 AM–GM 比较，是 Han–Niles-Weed [3，arXiv v2，引理 4.3–4.4] 用于半正定输入的工具。引理 3.3 将它们连接到这里需要的一般矩阵。

令 $\beta = RC/(1 - Rq)$，并记 $P_n = J_n/n$，它是到全一向量方向的正交投影。一般写 $u^\perp = \{v : u^* v = 0\}$ 表示向量 u 的正交补。双中心化假设给出 $P_n B = B P_n = 0$。在 $|t| = R$ 上，因而有

$$|P_n + tB| = P_n + R(B^{\mathsf{T}} B)^{1/2}, \qquad |(P_n + tB)^*| = P_n + R(B B^{\mathsf{T}})^{1/2}.$$

两者的特征值均为全一方向上的 1，以及 $\mathbf{1}^\perp$ 上的 $R s_i$，必要时包含零奇异值。由于 $Rq < 1$，两个引理结合精确恒等式 $f(t) = (n^n/n!) \operatorname{per}(P_n + tB)$，给出

$$|f(t)| \le \prod_i (1 - R s_i)^{-1} \le \exp\left(\frac{R}{1 - Rq} \sum_i s_i \right) \le \exp(\beta \sqrt{n}).$$

最后一步使用 $\sum_i s_i \le \sqrt{n}\, \|B\|_{\mathrm{F}} \le C\sqrt{n}$。因此，Cauchy 系数估计给出

$$\sum_{k > M} |a_k| \le \frac{R}{R - 1} \exp\bigl(\beta \sqrt{n} - \alpha n \log R \bigr).$$

对于高斯尾部，利用其系数非负，可用稍松但便利的界

$$\sum_{k > M} g_k \le \Gamma(\sigma) \sigma^{-M} \le \sigma \Gamma(\sigma) \exp(-\alpha n \log \sigma).$$

两个尾项均随 n 指数衰减。将它们与有限窗口中的 $O(n^{-1})$ 估计合并，即证明定理 3.1。

对任意 M，

$$\begin{aligned}\langle \xi, M^{\otimes n}\xi\rangle &= \frac{1}{n!}\sum_{\pi,\sigma\in\mathfrak{S}_n}\prod_{h=1}^{n} M_{\pi(h),\sigma(h)} \\ &= \frac{1}{n!}\sum_{\pi\in\mathfrak{S}_n}\sum_{\tau\in\mathfrak{S}_n}\prod_{i=1}^{n} M_{i,\tau(i)} = \operatorname{per} M.\end{aligned}$$

这里 $\tau=\sigma\circ\pi^{-1}$；固定 π 时 $\sigma\mapsto\tau$ 是双射。$n!$ 个基张量相互正交，故 $\|\xi\|^2=(n!)^{-1}n!=1$。若 $T\ge 0$，

$$|\langle a, Tb\rangle|^2 = |\langle T^{1/2}a, T^{1/2}b\rangle|^2 \le \langle a,Ta\rangle\langle b,Tb\rangle.$$

取 $a=V^*\xi, b=\xi$，利用 $VTV^*=(U|Z|U^*)^{\otimes n}=|Z^*|^{\otimes n}$，得到引理 3.3。

标准圆对称复变量 $\zeta=x+iy$ 的密度为 $\pi^{-1}e^{-|z|^2}$。极坐标积分给出

$$\begin{aligned}\mathbb{E}|\zeta|^{2k} &= \pi^{-1}\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\infty} r^{2k}e^{-r^2} r\,dr \\ &= \int_0^{\infty} u^k e^{-u}\,du = k!.\end{aligned}$$

记 $I_k=\int_0^\infty u^k e^{-u}\,du$，分部积分给出 $I_k=kI_{k-1}$、$I_0=1$。

对整数 $a,b\ge 0$，极坐标积分给出一维混合矩

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\zeta^a(\overline{\zeta})^b] &= \frac{1}{\pi}\int_0^{\infty} r^{a+b+1}e^{-r^2}\,dr\int_0^{2\pi} e^{i(a-b)\theta}\,d\theta \\ &= \begin{cases} a!, & a=b,\\ 0, & a\ne b.\end{cases}\end{aligned}$$

若 $a\ne b$，角积分为 $[e^{i(a-b)\theta}/(i(a-b))]_0^{2\pi}=0$；若 $a=b$，角积分为 2π，再用 $u=r^2$ 得 $\int_0^\infty u^a e^{-u}\,du=a!$。

令 $\zeta_1,\dots,\zeta_n$ 独立，$Z=L\zeta$、$H=LL^*$。对指标列 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\in[n]^n$，上式和独立性表明：当某个数值指标在两列中的重数不同时，混合矩为零；重数均相同且为 c_j 时，混合矩为 $\prod_j c_j!$。这正好等于把第一列的每个位置与第二列的同值位置双射配对的方法数。因此

$$\mathbb{E}\prod_{i=1}^{n}\zeta_{a_i}\prod_{j=1}^{n}\overline{\zeta}_{b_j} = \sum_{\sigma\in\mathfrak{S}_n}\prod_{i=1}^{n}\delta_{a_i,b_{\sigma(i)}}.$$

展开乘积并交换有限求和，得到

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\prod_{i=1}^{n}|Z_i|^2 &= \sum_{\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}}\prod_i L_{i,a_i}\prod_j \overline{L}_{j,b_j}\sum_{\sigma\in\mathfrak{S}_n}\prod_i \delta_{a_i,b_{\sigma(i)}} \\ &= \sum_{\sigma\in\mathfrak{S}_n}\sum_{\boldsymbol{a}}\prod_i L_{i,a_i}\overline{L}_{\sigma(i),a_i} \\ &= \sum_{\sigma\in\mathfrak{S}_n}\prod_i\left(\sum_{a=1}^{n} L_{i,a}\overline{L}_{\sigma(i),a}\right) \\ &= \sum_{\sigma\in\mathfrak{S}_n}\prod_i H_{i,\sigma(i)} = \operatorname{per} H.\end{aligned}$$

第二行使用 $b_{\sigma(i)}=a_i$ 消去全部 b 指标，第三行使用各个 a_i 独立求和。L 可以奇异；取 $L=H^{1/2}$ 即可，因此本证明涵盖半正定矩阵有零特征值的情形。协方差的含义也由同样的二次矩计算确定：$\mathbb{E}Z_i\overline{Z}_j=H_{ij}$，$\mathbb{E}Z_iZ_j=0$。

对每个样本，$|Z_i|^2\ge 0$；AM–GM 给出

$$\prod_i |Z_i|^2 \le \left(\frac{\sum_i |Z_i|^2}{n}\right)^n, \qquad \operatorname{per} H \le n^{-n}\mathbb{E}\|Z\|_2^{2n}.$$

酉变换保持 $\|Z\|$，再由多项式定理，

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left(\sum_i \lambda_i|\zeta_i|^2\right)^n &= \sum_{k_1+\cdots+k_n=n} \frac{n!}{\prod_i k_i!}\prod_i \lambda_i^{k_i}\mathbb{E}|\zeta_i|^{2k_i}\\ &= n!\sum_{k_1+\cdots+k_n=n}\prod_i \lambda_i^{k_i} = n!h_n(\lambda).\end{aligned}$$

若 $\lambda_1=1$，以 $k_1=n-\sum_{i\ge 2}k_i$ 消去第一变量，

$$h_n(1,\lambda_2,\dots,\lambda_n)=\sum_{\substack{k_2,\dots,k_n\ge 0\\ \sum k_i\le n}}\prod_{i\ge 2}\lambda_i^{k_i} \le \prod_{i=2}^{n}\sum_{k_i=0}^{\infty}\lambda_i^{k_i}=\prod_{i=2}^{n}(1-\lambda_i)^{-1}.$$

记 $P=P_n$。因 $P^2=P$、$PB=B^{\mathsf T}P=BP=PB^{\mathsf T}=0$，

$$(P+tB)^*(P+tB)=P+R^2B^{\mathsf T}B \quad (|t|=R).$$

这两个部分作用在正交子空间上，故平方根为 $P+R(B^{\mathsf T}B)^{1/2}$。两个极化因子具有相同特征值 $1, Rs_1,\dots$；全一方向对应的零奇异值可从乘积中省去，因为相应因子为一。定义 $A_R=\prod_i(1-Rs_i)^{-1}>0$。只对这个正上界取对数，避免 $f(t)=0$ 时出现未定义的 $\log|f(t)|$。代入归一化因子，得

$$\begin{aligned}|f(t)| &= \frac{n^n}{n!}|\operatorname{per}(P+tB)| \le \prod_i (1-Rs_i)^{-1},\\ \log A_R &= -\sum_i \log(1-Rs_i) \le \sum_i \frac{Rs_i}{1-Rs_i} \le \frac{R}{1-Rq}\sum_i s_i \le \frac{RC}{1-Rq}\sqrt{n}=\beta\sqrt{n}.\end{aligned}$$

所以 $|f(t)|\le A_R\le e^{\beta\sqrt{n}}$，包括 $f(t)=0$ 的情形。零点并非纯粹假想：取 $n=3$、

$$E=\begin{pmatrix}0&1&-1\\-1&0&1\\1&-1&0\end{pmatrix}, \qquad B=E/3.$$

此时双侧中心化，且

$$B^{\mathsf T}B=\frac{1}{9}(3I_3-J_3).$$

在全一方向上 J_3 的特征值为三，在零和子空间上为零，故 $B^{\mathsf T}B$ 的特征值为 $0,1/3,1/3$。因此 $\|B\|_{\mathrm{op}}=1/\sqrt{3}\le 3/5=:q<1$。六个永久式项分别来自恒等置换、三个换位和两个三循环，所以

$$\begin{aligned} 6f(t) &= 1 + 3(1-t^2) + (1+t)^3 + (1-t)^3 \\ &= 1 + 3 - 3t^2 + 2 + 6t^2 = 6 + 3t^2, \\ f(i\sqrt{2}) &= 1 + (i\sqrt{2})^2/2 = 0. \end{aligned}$$

取 $R = \sqrt{2} < 5/3 = 1/q$ 和 $\sigma = (1+\sqrt{2})/2$，则 f 在所取圆周 $|t| = R$ 上有零点，故 $\log|f(t)|$ 在该圆周上并非处处有定义。

Cauchy 系数公式沿圆周 $t = Re^{i\theta}$ 写成

$$a_k = \frac{1}{2\pi R^k}\int_0^{2\pi} f(Re^{i\theta})e^{-ik\theta}\,d\theta, \qquad |a_k| \le e^{\beta\sqrt{n}}R^{-k}.$$

于是

$$\sum_{k>M}|a_k| \le e^{\beta\sqrt{n}}\frac{R^{-M}}{R-1} \le \frac{R}{R-1}e^{\beta\sqrt{n}-\alpha n\log R}.$$

这里 $M \ge \alpha n - 1$。另一侧系数非负，所以

$$\sum_{k>M} g_k \le \sigma^{-M}\sum_{k>M} g_k\sigma^k \le \sigma\Gamma(\sigma)e^{-\alpha n\log\sigma}.$$

令 $c = \alpha\log R > 0$。若 $n \ge (2\beta/c)^2$，则 $\beta\sqrt{n} - cn \le -cn/2$。由 $ne^{-cn/2} \to 0$，第一个尾项为 $o(n^{-1})$，第二个同理。此处用到 $M = \lfloor \alpha n \rfloor$ 随 n 线性增长。

3.6 合并误差界

命题 3.5（显式误差界）。

对每个整数 $n \ge 4/\alpha$,

$$|f(1) - G(1)| \le \frac{\Gamma(R)T_1 + K_G}{n} + \frac{8\Gamma(R)D^2}{n^2} + \frac{R}{R-1}\exp\bigl(\beta\sqrt{n} - \alpha n\log R\bigr) + \sigma\Gamma(\sigma)\exp(-\alpha n\log\sigma)\,.$$

前两项来自第 3.4 节的系数窗口及阶乘恢复误差，后两项来自第 3.5 节的尾界。两个指数项均为 $o(n^{-1})$，从而得到定理 3.1 的一致误差率。

令 $c_1 = \alpha\log R > 0$、$c_2 = \alpha\log\sigma > 0$、$\beta = RC/(1-Rq) \ge 0$。对

$$n \ge N_1 := \max\{1, (2\beta/c_1)^2\},$$

有

$$\sqrt{n} \ge 2\beta/c_1 \implies \beta\sqrt{n} \le (c_1/2)n \implies \beta\sqrt{n} - c_1 n \le -c_1 n/2.$$

对任意固定 $c > 0$，函数 $u(x) = xe^{-cx}$ 在 $x \ge 0$ 上满足

$$u'(x) = e^{-cx}(1-cx), \qquad \max_{x\ge 0} u(x) = u(1/c) = 1/(ec).$$

因此，对 $n \ge N_1$,

$$\frac{R}{R-1}\exp(\beta\sqrt{n} - c_1 n) \le \frac{R}{R-1}e^{-c_1 n/2} \le \frac{2R}{ec_1(R-1)}\frac{1}{n},$$

$$\sigma\Gamma(\sigma)e^{-c_2 n} \le \frac{\sigma\Gamma(\sigma)}{ec_2}\frac{1}{n}.$$

若还要求 $n \ge 4/\alpha$，命题 3.5 的右边便至多为

$$\frac{1}{n}\left[\Gamma(R)T_1 + K_G + 8\Gamma(R)D^2 + \frac{2R}{ec_1(R-1)} + \frac{\sigma\Gamma(\sigma)}{ec_2}\right].$$

括号中的每个量都只依赖先固定的 C, q, R, σ，没有依赖正在估计的矩阵。若要把界写成所有 $n \ge 1$ 都成立的同一个常数，还须覆盖有限个小阶数。由 $|1 + E_{ij}| \le 1 + C$，

$$|f(1)| \le \frac{1}{n!}\sum_{\pi\in\mathfrak{S}_n}(1+C)^n = (1+C)^n, \qquad 1 \le G(1) \le \Gamma(1).$$

令 $N = \lceil \max\{N_1, 4/\alpha\}\rceil$，再把统一常数增大到至少

$$\max_{1\le n<N} n\left[(1+C)^n + \Gamma(1)\right]$$

即可覆盖有限个小阶数；若最大值集合为空，约定其值为零。□

已有永久式证明中的定量余项。

Divoux–Wang [12, 命题 3.1] 对非负双随机矩阵给出了统一的 $1 + o(1)$ 永久式近似。对于本文计数中出现的这一类矩阵，其证明可以细化为 $1 + O(N^{-1})$。这里的误差阶不是原命题的陈述，而是保留其估计中的参数依赖后得到的改进。本文定理 3.1 允许任意实双中心化矩阵 E，不要求 $J + E$ 非负；我们保留这一形式及其详细证明，不将两篇论文的定理假设视为完全相同。

上述细化只涉及 [12, 第 3.2–3.3 节] 的两处估计。其有限系数和已被控制为

$$\sum_{1\le E\le K\sqrt{N}} \frac{(cE/N)^{\lceil E/3\rceil}}{1 - cE/N}.$$

令 $\eta_N = cK/\sqrt{N}$。当 N 充分大时，这个和至多为

$$\frac{c}{N(1-\eta_N)}\sum_{E\ge 1} E\eta_N^{\lceil E/3\rceil - 1} = O(N^{-1}).$$

截断之后的系数尾项仍由原文的指数估计控制。在其 Gamma 平均步骤中，若 $G \sim \Gamma(N+1, 1)$ 且 $Z = N/G$，则

$$\mathbb{E}(Z-1) = 0, \qquad \mathbb{E}(Z-1)^2 = \frac{1}{N-1}.$$

对 $\Delta(s) = \det(I - s^2 B^T B)^{-1/2}$，固定的算子范数间隙与 Frobenius 范数界保证 Δ'' 在所用的固定窗口上一致有界。二阶 Taylor 展开和原文的窗口外估计因而给出 $O(N^{-1})$ 误差。这说明非负双随机情形的永久式误差可以由已有证明细化得到；全局路径估计还需要分别控制缩放、度差和例外顶点造成的误差。

4. 对角缩放与非主子矩阵

本节回到图论记号，$s = S\mathbf{1}$ 是度差向量，$a = s/(n-1)$，并假定 $n \ge 2$。定理 3.1 适用于经标量归一化后行列和相等的矩阵。竞赛图矩阵通常具有不同的行列和：若 $C = 2A/(n-1)$，则

$$C\mathbf{1} = \mathbf{1} + a, \qquad C^{\mathsf{T}}\mathbf{1} = \mathbf{1} - a.$$

因此，修正边际时还须估计永久式及其高斯因子的变化。先构造局部对角缩放，估计其总对数代价；再用 Gram 矩阵比较控制删行、删列的影响；最后，通过成对度差修正，使竞赛图子矩阵满足局部定理的条件，从而证明引理 4.4。

对一般阶数 $p \geq 1$，沿用 $P_p = J_p/p = \mathbf{1}_p\mathbf{1}_p^{\mathsf{T}}/p$，并令 $\Pi_p = I_p - P_p$，即去掉全一方向的正交投影。矩阵的总质量为 $\mathfrak{m}(X) = \sum_{i,j} X_{ij}$。双随机矩阵指元素非负、每行和每列之和均为一的方阵。本节常数在给定稠密度与中心核谱隙参数后统一。

定义 4.1（边际误差）。

对任意实 $p \times p$ 矩阵 Q（$p \geq 1$，此处不要求质量已经为 p），定义

$$\alpha(Q) = Q\mathbf{1}_p - \mathbf{1}_p, \qquad \beta(Q) = Q^{\mathsf{T}}\mathbf{1}_p - \mathbf{1}_p,$$

$$g(Q) = (\alpha(Q), \beta(Q)) \in \mathbb{R}^{2p}, \qquad \varepsilon(Q) = \|g(Q)\|_\infty,$$

$$\|g(Q)\|_2^2 = \sum_i \alpha(Q)_i^2 + \sum_j \beta(Q)_j^2.$$

(x, y) 同样指把两个向量首尾拼接，故 $\|(x, y)\|_\infty = \max(\|x\|_\infty, \|y\|_\infty)$。质量为 p 时两侧误差的和各为零；质量不为 p 时，以上定义仍成立，但须先归一化才调用引理 4.1。

以下以 n 表示全图阶数，以 $m = n - t$ 表示保留阶数。引理 4.1、4.2 中用 p 表示一般矩阵阶数，应用时取 $p = m$。矩阵 $C, C', \widehat{C}$ 为 n 阶，$X, \widetilde{X}, B_X, Z$ 为 m 阶，其总质量分别为

$$\mathfrak{m}(C') = n + \nu, \quad \mathfrak{m}(\widehat{C}) = n, \quad \mathfrak{m}(X) = m + \kappa, \quad \mathfrak{m}(\widetilde{X}) = \mathfrak{m}(B_X) = m.$$

这里 $Z = \Pi_m[(S - I)/(n - 1)][R, T]\Pi_m$，而 B_X 是缩放后的双随机矩阵。应用定理 3.1 时，扰动矩阵为 $mB_X - J_m$，归一化扰动为 $B_X - P_m$。

4.1 局部缩放及其代价

我们寻找形如 $B_{ij} = X_{ij}e^{x_i + y_j}$、行列和均为一的矩阵。将 (x, y) 换为 $(x + c\mathbf{1}, y - c\mathbf{1})$ 不改变 B；条件 $\sum x_i = \sum y_j$ 消去这一维自由度。奇异值谱隙控制其余子空间上的线性化平衡方程，而元素界进一步给出不依赖维数的无穷范数控制，从而可以使用压缩映射论证。

引理 4.1（局部缩放）。

设 $p \geq 1$，X 为总质量等于 p 的实 $p \times p$ 矩阵。记

$$\alpha = X\mathbf{1}_p - \mathbf{1}_p, \qquad \beta = X^{\mathsf{T}}\mathbf{1}_p - \mathbf{1}_p, \qquad \varepsilon = \max(\|\alpha\|_\infty, \|\beta\|_\infty).$$

假设 $|X_{ij}| \leq C/p$，每行和每列的绝对值之和至多为 2，并且

$$X_0 = X - \frac{\alpha\mathbf{1}_p^{\mathsf{T}} + \mathbf{1}_p\beta^{\mathsf{T}}}{p}, \qquad E = X_0 - P_p$$

满足 $|E_{ij}| \leq C_0/p$ 和 $\|E\|_{\mathrm{op}} \leq q < 1$，其中 $C, C_0 \geq 0$、$0 \leq q < 1$ 为固定参数。定义

$$L_0 = \frac{3}{2} + C_0 + \frac{C_0^2}{1 - q},$$

$$\varepsilon_0 = \min\left\{\frac{1}{256L_0^2}, \frac{1 - q}{2(32L_0 + 2)}\right\}.$$

若 $\varepsilon \le \varepsilon_0$，则存在满足 $\sum_i x_i = \sum_j y_j$ 的有限实向量 x, y，使 $B = \operatorname{diag}(e^x) X \operatorname{diag}(e^y)$ 的每行和每列之和均为 1。此外，

$$\|(x,y)\|_\infty \le 4L_0\varepsilon, \qquad |B_{ij}| \le 2C/p, \qquad \|B - P_p\|_{\mathrm{op}} \le (1+q)/2.$$

若 X 逐元素非负，则 B 为双随机矩阵，且与 X 具有相同的零支撑。

证明。

两个边际误差向量的元素和均为零。因此，X_0 的行列和均为 1，而 E 双侧中心化。令 $u = (\mathbf{1}_p, -\mathbf{1}_p)$、$N = uu^{\mathsf{T}}/(2p)$。平衡 Hessian H_0 的对角块为 I，非对角块分别为 X_0, X_0^{T}。其规范化逆可显式写出。置

$$R_L = (I - EE^{\mathsf{T}})^{-1}, \qquad R_R = (I - E^{\mathsf{T}}E)^{-1}, \qquad O = ER_R.$$

则 $(\mathsf{H}_0 + N)^{-1}$ 的四个分块为

$$M_{LL} = R_L - P_p/4, \qquad M_{RR} = R_R - P_p/4,$$

$$M_{LR} = -O - P_p/4, \qquad M_{RL} = -O^{\mathsf{T}} - P_p/4.$$

这是因为：在共同常数方向上，逆特征值为 $1/2$；在规范方向上为 1；在两个零和子空间上则是标准的分块逆。稠密元素界给出

$$|(R_L - I)_{ij}|,\ |(R_R - I)_{ij}| \le \frac{C_0^2}{p(1-q^2)},$$

$$|O_{ij}| \le \frac{C_0}{p} + \frac{C_0^2 q}{p(1-q^2)}.$$

最后一个估计由分解 $O = E + EE^{\mathsf{T}}ER_R$，再控制两端行、列的二范数得到。向量的一范数为

$$\|x\|_1 = \sum_i |x_i|,$$

相应的矩阵诱导一范数和无穷范数分别为 $\|M\|_{1\to 1} = \max_j \sum_i |M_{ij}|$、$\|M\|_{\infty\to\infty} = \max_i \sum_j |M_{ij}|$。因此，上述逆矩阵的这两种诱导范数均至多为 L_0。

令 H_X 的两个对角块分别为 $\operatorname{diag}(X\mathbf{1}_p)$ 和 $\operatorname{diag}(X^{\mathsf{T}}\mathbf{1}_p)$，非对角块为 X, X^{T}。差矩阵 $\mathsf{H}_X - \mathsf{H}_0$ 的两种诱导范数均至多为 3ε。由 Neumann 级数，$(\mathsf{H}_X + N)^{-1}$ 的两种诱导范数均至多为 $2L_0$。

记 $z = (x, y)$、$g = (\alpha, \beta)$，平衡方程为

$$0 = g + \mathsf{H}_X z + \mathcal{N}_X(z).$$

其中，$\mathcal{N}_X(z)$ 是 $X_{ij}(e^{x_i+y_j} - 1 - x_i - y_j)$ 的行和与列和拼接而成的向量。在球 $\|z\|_\infty \le R \le 1/4$ 上，绝对边际界给出

$$\|\mathcal{N}_X(z)\|_\infty \le 8R^2, \qquad \|D\mathcal{N}_X(z)\|_{\infty\to\infty} \le 16R.$$

这些向量均与 u 正交。在规范子空间 $u^{\perp}$ 上考虑

$$\mathcal{T}(z) = -(\mathsf{H}_X + N)^{-1}(g + \mathcal{N}_X(z)).$$

取 $R = 4L_0\varepsilon$。原点的像的范数至多为 $R/2$，而 Lipschitz 常数至多为 $128L_0^2\varepsilon \le 1/2$。因此，映射将规范子空间中的该球映入自身，且为压缩映射，其不动点即为有限势向量。若 $\varepsilon = 0$，直接取 $z = 0$。

最后，由 $R \le 1/4$ 得到元素界。行列绝对和的假设给出

$$\|B - X\|_{1\to 1},\ \|B - X\|_{\infty\to\infty} \le 32L_0\varepsilon.$$

又有 $\|X - X_0\|_{\mathrm{op}} \le 2\varepsilon$，由 ε_0 定义中的第二个条件即得中心核的谱隙界。正对角因子同时保留非负性与零支撑。引理得证。

仅找到平衡点还不足以估计永久式：恢复对角因子时，需要将永久式乘以 $\exp(-\sum x_i - \sum y_j)$。下面的引理既控制这一总代价，也给出比较高斯因子所需的 Frobenius 位移界。

引理 4.2（位移与容量）。

在上述假设下，再设 $X \ge 0$。以 $\theta_X = \sum_i x_i + \sum_j y_j$ 表示总缩放势。存在仅依赖固定稠密度与谱隙参数的常数，使

$$\|(x,y)\|_2 \le K\|(\alpha,\beta)\|_2, \qquad \|B - X\|_F \le \frac{K}{\sqrt{p}}\|(\alpha,\beta)\|_2,$$

$$0 \le \theta_X \le K\|(\alpha,\beta)\|_2^2.$$

一般质量。对于总质量为任意正数的非负矩阵 X，假设 $\widetilde{X} = pX/\mathfrak{m}(X)$ 满足引理 4.1 的条件，再对 $\widetilde{X}$ 应用以上结论。若 B 为其缩放，则有精确恒等式

$$\theta_X = \theta_{\widetilde{X}} + p\log\frac{p}{\mathfrak{m}(X)}, \qquad \operatorname{per} X = e^{-\theta_X}\operatorname{per} B.$$

特别地，若 $\kappa = \mathfrak{m}(X) - p$，则 $\operatorname{per} X \le e^{\kappa}\operatorname{per} B$。当质量不等于 p 时，θ_X 本身不必非负。

证明。

凸势函数为

$$\Phi_X(x,y) = \sum_{i,j} X_{ij}e^{x_i+y_j} - \sum_i x_i - \sum_j y_j.$$

其在原点的梯度为 $g = (\alpha,\beta)$，平衡点是最小值点。若 $R = \|(x,y)\|_\infty$，则沿 tz、$0 \le t \le 1$ 的 Hessian 不小于平衡矩阵 B 处 Hessian 的 e^{-2R} 倍。在规范子空间上，后者的最小特征值至少为 $1 - \|B - P_p\|_{\mathrm{op}}$。故整条线段上具有固定正下界 λ。对梯度积分得到 $\|z\|_2 \le \lambda^{-1}\|g\|_2$。再由稠密元素界和 $|e^{x_i+y_j} - 1| \le K|x_i + y_j|$，得到 Frobenius 位移估计。

由于 $\Phi_X(0) = p$、$\Phi_X(z) = p - \theta_X$，凸性给出 $\theta_X \ge 0$。强凸性给出 $\theta_X \le \|g\|_2^2/(2\lambda)$。非单位质量恒等式由将标量 $p/\mathfrak{m}(X)$ 吸收入两个对角势中得到。最后，利用 $p\log(\mathfrak{m}(X)/p) \le \kappa$ 得到永久式上界。

由质量 $\sum_{ij} X_{ij} = p$，

$$\sum_i \alpha_i = \sum_j \beta_j = 0, \quad X_0\mathbf{1} = X\mathbf{1} - \alpha - \mathbf{1}\frac{\sum_j \beta_j}{p} = \mathbf{1}, \quad X_0^{\mathsf{T}}\mathbf{1} = \mathbf{1}.$$

因 $P_p\mathbf{1} = \mathbf{1}$，所以 $E\mathbf{1} = E^{\mathsf{T}}\mathbf{1} = 0$。同一计算也给出

$$\Pi_p X \Pi_p = X - P_p - \frac{\alpha\mathbf{1}^{\mathsf{T}} + \mathbf{1}\beta^{\mathsf{T}}}{p} = E.$$

在常数子空间，令 $c=(\mathbf{1},\mathbf{1})$、$u=(\mathbf{1},-\mathbf{1})$，则

$$\mathsf{H}_0 c=2c,\quad \mathsf{H}_0 u=0,\quad Nc=0,\quad Nu=u.$$

因此逆在这两条直线上的特征值分别为 $1/2,1$。在两个零和子空间上，直接相乘验证

$$\begin{pmatrix} I & E\\ E^{\mathsf{T}} & I\end{pmatrix}\begin{pmatrix} R_L & -ER_R\\ -E^{\mathsf{T}}R_L & R_R\end{pmatrix}=\begin{pmatrix} I & 0\\ 0 & I\end{pmatrix},$$

其中使用

$$R_L-ER_RE^{\mathsf{T}}=I,\quad R_R-E^{\mathsf{T}}R_LE=I,\quad R_LE=ER_R.$$

最后一个恒等式可逐项由 Neumann 级数验证。将常数子空间上的投影按原分块表示，得到 $R_L-P_p/4$ 与 $-ER_R-P_p/4$ 等四块。

因为每行每列 E 的二范数至多 $C_0/\sqrt{p}$，

$$R_L-I=E(I-E^{\mathsf{T}}E)^{-1}E^{\mathsf{T}},\quad |(R_L-I)_{ij}|\le\frac{C_0^2}{p(1-q^2)},$$

$$O-E=EE^{\mathsf{T}}E(I-E^{\mathsf{T}}E)^{-1},\quad |(O-E)_{ij}|\le\frac{C_0^2 q}{p(1-q^2)}.$$

每个 $2p$ 维分块行的绝对和因此至多为

$$1+\frac14+\frac14+C_0+\frac{C_0^2(1+q)}{1-q^2}=\frac32+C_0+\frac{C_0^2}{1-q}=L_0.$$

矩阵对称，所以诱导一范数相同。又

$$\|X-X_0\|_{\infty\to\infty},\|X-X_0\|_{1\to1}\le 2\varepsilon,\quad \|\mathsf{H}_X-\mathsf{H}_0\|_{\infty\to\infty},\|\mathsf{H}_X-\mathsf{H}_0\|_{1\to1}\le 3\varepsilon.$$

令 $M=(\mathsf{H}_0+N)^{-1}$，$D=\mathsf{H}_X-\mathsf{H}_0$；则

$$(\mathsf{H}_X+N)^{-1}=(I+MD)^{-1}M=\sum_{h=0}^{\infty}(-MD)^h M,$$

$$\|(\mathsf{H}_X+N)^{-1}\|\le\frac{L_0}{1-3L_0\varepsilon}\le 2L_0.$$

这里任取上述一范数或无穷范数；$\varepsilon\le 1/(256L_0^2)$ 保证 $3L_0\varepsilon<1/2$。

对 $|h|\le 2R\le 1/2$，Taylor 积分余项为

$$e^h-1-h=h^2\int_0^1(1-t)e^{th}\,dt,\qquad |e^h-1-h|\le\tfrac12 e^{1/2}h^2.$$

每行绝对和至多二、$|x_i+y_j|\le 2R$，所以

$$\|\mathcal{N}_X(z)\|_\infty\le 2\cdot\tfrac12 e^{1/2}(2R)^2\le 8R^2.$$

导数中对同一行势与所有列势的绝对系数和至多为

$$2\sum_{j}|X_{ij}|\,|e^{x_i+y_j}-1|\le 2\cdot 2\cdot 2Re^{1/2}\le 16R.$$

两侧总和相等，故 $u^{\mathsf T}g=u^{\mathsf T}\mathcal{N}_X(z)=0$；又 $\mathsf{H}_X u=0$，所以逆保持 $u^{\perp}$。令 $R=4L_0\varepsilon$，则

$$\|\mathcal{T}(0)\|_\infty\le 2L_0\varepsilon=R/2,\quad \mathrm{Lip}(\mathcal{T})\le 2L_0\cdot 16R=128L_0^2\varepsilon\le 1/2.$$

因此 $\|\mathcal{T}(z)\|_\infty\le R/2+\|z\|_\infty/2\le R$。从 $z_0=0$、$z_{h+1}=\mathcal{T}(z_h)$ 出发，

$$\|z_{h+1}-z_h\|_\infty\le 2^{-h}\|z_1-z_0\|_\infty,\quad \sum_{h=0}^{\infty}\|z_{h+1}-z_h\|_\infty<\infty.$$

故迭代收敛到有限实向量，极限满足平衡方程。因为 $R\le 1/4$，$e^{x_i+y_j}\le e^{1/2}<2$，从而 $|B_{ij}|\le 2C/p$。同时

$$\|B-X\|_{\infty\to\infty},\|B-X\|_{1\to 1}\le 2\cdot 2Re^{1/2}\le 8R=32L_0\varepsilon,$$

$$\|B-P_p\|_{\mathrm{op}}\le q+(32L_0+2)\varepsilon\le (1+q)/2.$$

对非负 X，任意方向 $h=(v,w)$ 的 Hessian 二次型为

$$h^{\mathsf T}\nabla^2\Phi_X(z)h=\sum_{ij}X_{ij}e^{x_i+y_j}(v_i+w_j)^2\ge 0.$$

在平衡点 z_*，Hessian 为 $\left(\begin{smallmatrix} I & B\\ B^{\mathsf T} & I\end{smallmatrix}\right)$。在规范子空间上，将常数方向与零和方向分解；前者特征值二，后者下界 $1-\|B-P_p\|_{\mathrm{op}}$。若 $0\le t\le 1$，

$$X_{ij}e^{t(x_i+y_j)}=B_{ij}e^{-(1-t)(x_i+y_j)}\ge e^{-2R}B_{ij}.$$

故可取 $\lambda=e^{-2R}(1-\|B-P_p\|_{\mathrm{op}})>0$。由梯度线段积分，

$$0=\nabla\Phi_X(z_*)=g+\int_0^1\nabla^2\Phi_X(tz_*)z_*\,dt,$$

$$\lambda\|z_*\|_2^2\le -\langle g,z_*\rangle\le\|g\|_2\|z_*\|_2,\quad \|z_*\|_2\le\lambda^{-1}\|g\|_2.$$

对于 Frobenius 位移，

$$\begin{aligned}\|B-X\|_F^2&=\sum_{ij}X_{ij}^2(e^{x_i+y_j}-1)^2\\&\le K\frac{C^2}{p^2}\sum_{ij}(x_i+y_j)^2\\&\le K\frac{C^2}{p^2}\left(2p\sum_i x_i^2+2p\sum_j y_j^2\right)\le\frac{K'}{p}\|g\|_2^2.\end{aligned}$$

平衡时 $\sum_{ij}B_{ij}=p$，所以 $\Phi_X(z_*)=p-\theta_X$。强凸性给出

$$p-\theta_X\ge p+\langle g,z_*\rangle+\frac{\lambda}{2}\|z_*\|_2^2,$$

$$0 \le \theta_X \le -\langle g, z_*\rangle - \frac{\lambda}{2}\|z_*\|_2^2 \le \frac{\|g\|_2^2}{2\lambda}.$$

最后一个不等式由 $0 \le \|\sqrt{\lambda} z_* + g/\sqrt{\lambda}\|_2^2$ 得到。若质量为 $p+\kappa$，令 $c = p/(p+\kappa)$；将 $\frac{1}{2}\log c$ 同时加入两侧势，得到

$$\theta_X = \theta_{\widetilde{X}} + p\log c, \qquad \operatorname{per} X = e^{-\theta_X} \operatorname{per} B,$$

$$-\theta_X \le p\log(1+\kappa/p) \le \kappa.$$

此处 κ 允许为负，但必须满足 $p+\kappa > 0$。

为缩短本段公式，暂记 $P = P_p$、$L = R_L$、$R = R_R$、$O = ER_R$。中心化给出

$$EP = PE = E^{\mathsf T}P = PE^{\mathsf T} = 0, \quad LP = PL = RP = PR = P, \quad OP = PO = O^{\mathsf T}P = PO^{\mathsf T} = 0.$$

加入规范投影后的矩阵为

$$\mathsf{H}_0 + N = \begin{pmatrix} I + P/2 & E + P/2 \\ E^{\mathsf T} + P/2 & I + P/2 \end{pmatrix},$$

候选逆为 $M = \left(\begin{smallmatrix} L-P/4 & -O-P/4 \\ -O^{\mathsf T}-P/4 & R-P/4 \end{smallmatrix}\right)$。左上分块逐项相乘：

$$\begin{aligned} [(\mathsf{H}_0+N)M]_{LL} &= (I+P/2)(L-P/4) + (E+P/2)(-O^{\mathsf T} - P/4) \\ &= L - P/4 + P/2 - P/8 - EO^{\mathsf T} - P/8 \\ &= L - EO^{\mathsf T}. \end{aligned}$$

因为 $O^{\mathsf T} = E^{\mathsf T}L$,

$$L - EO^{\mathsf T} = L - EE^{\mathsf T}L = (I - EE^{\mathsf T})L = I.$$

右上分块为

$$\begin{aligned} [(\mathsf{H}_0+N)M]_{LR} &= (I+P/2)(-O-P/4) + (E+P/2)(R-P/4) \\ &= -O - P/4 - P/8 + ER + P/2 - P/8 \\ &= -O + ER = 0. \end{aligned}$$

左下分块为

$$\begin{aligned} [(\mathsf{H}_0+N)M]_{RL} &= (E^{\mathsf T}+P/2)(L-P/4) + (I+P/2)(-O^{\mathsf T} - P/4) \\ &= E^{\mathsf T}L + P/2 - P/8 - O^{\mathsf T} - P/4 - P/8 \\ &= E^{\mathsf T}L - O^{\mathsf T} = 0. \end{aligned}$$

右下分块为

$$\begin{aligned} [(\mathsf{H}_0+N)M]_{RR} &= (E^{\mathsf T}+P/2)(-O-P/4) + (I+P/2)(R-P/4) \\ &= -E^{\mathsf T}O - P/8 + R - P/4 + P/2 - P/8 \\ &= R - E^{\mathsf T}O \\ &= R - E^{\mathsf T}ER = (I - E^{\mathsf T}E)R = I. \end{aligned}$$

因此 M 是所求逆矩阵。
行侧余项和列侧余项分别为

$$\mathcal{N}_{L,i}(x,y)=\sum_j X_{ij}(e^{x_i+y_j}-1-x_i-y_j),$$

$$\mathcal{N}_{R,j}(x,y)=\sum_i X_{ij}(e^{x_i+y_j}-1-x_i-y_j).$$

其行侧偏导数为

$$\frac{\partial\mathcal{N}_{L,i}}{\partial x_k}=\mathbf{1}\{i=k\}\sum_j X_{ij}(e^{x_i+y_j}-1),\quad \frac{\partial\mathcal{N}_{L,i}}{\partial y_j}=X_{ij}(e^{x_i+y_j}-1).$$

列侧偏导数为

$$\frac{\partial\mathcal{N}_{R,j}}{\partial x_i}=X_{ij}(e^{x_i+y_j}-1),\quad \frac{\partial\mathcal{N}_{R,j}}{\partial y_k}=\mathbf{1}\{j=k\}\sum_i X_{ij}(e^{x_i+y_j}-1).$$

所以每个行侧 Jacobian 行的绝对和至多为

$$\left|\sum_j X_{ij}(e^{x_i+y_j}-1)\right|+\sum_j|X_{ij}||e^{x_i+y_j}-1|\le 2\sum_j|X_{ij}||e^{x_i+y_j}-1|.$$

当 $\|(x,y)\|_\infty\le R\le 1/4$ 时，右侧至多

$$2\sum_j|X_{ij}|\cdot 2Re^{2R}\le 8Re^{1/2}\le 16R.$$

列侧用列绝对和不超过二得到同一个界。用向量值函数沿连接两点的线段积分，

$$\mathcal{N}(z)-\mathcal{N}(w)=\int_0^1 D\mathcal{N}(w+t(z-w))(z-w)\,dt,$$

所以其 Lipschitz 常数至多 $16R$。再乘规范逆的 $2L_0$，得到压缩映射常数 $32L_0R=128L_0^2\varepsilon$。
令 $E_B=B-P_p$，其中 $P_p=J_p/p$。对 $h=(v,w)\in u^\perp$，有 $\sum_i v_i=\sum_j w_j$，所以可以唯一写成

$$v=c\mathbf{1}+v_0,\quad w=c\mathbf{1}+w_0,\quad \mathbf{1}^{\mathsf T}v_0=\mathbf{1}^{\mathsf T}w_0=0.$$

其范数平方为

$$\|h\|_2^2=2pc^2+\|v_0\|_2^2+\|w_0\|_2^2.$$

因为 $B\mathbf{1}=B^{\mathsf T}\mathbf{1}=\mathbf{1}$，交叉常数项为零，逐项计算

$$\begin{aligned}h^{\mathsf T}\begin{pmatrix}I & B\\ B^{\mathsf T} & I\end{pmatrix}h&=\|v\|^2+\|w\|^2+2v^{\mathsf T}Bw\\&=4pc^2+\|v_0\|^2+\|w_0\|^2+2v_0^{\mathsf T}E_Bw_0\\&\ge 4pc^2+\|v_0\|^2+\|w_0\|^2-2q_B\|v_0\|\|w_0\|\\&\ge 4pc^2+(1-q_B)(\|v_0\|^2+\|w_0\|^2)\\&\ge(1-q_B)\|h\|^2,\end{aligned}$$

其中 $q_B = \|E_B\|_{\mathrm{op}} < 1$，倒数第二步用 $2ab \le a^2 + b^2$。这给出位移与容量引理使用的强凸性常数。

4.2 高斯删除与中心化

从稠密归一化矩阵中删除 t 行，删去的行平方范数总量为 t/n 量级。将对数行列式导数用于对应的 Gram 矩阵损失，可以保留这个量级。随后改用另一侧 Gram 矩阵处理删列。这样，即使保留的是非主子矩阵，也能得到线性的删除误差。

定义 4.2（高斯行列式因子）。

对满足 $\|Z\|_{\mathrm{op}} < 1$ 的实矩阵 Z，定义

$$\mathcal{G}(Z) = \det(I - Z^{\mathsf{T}} Z)^{-1/2}.$$

改用 ZZ^{T} 得到相同数值；补零行或零列也不改变此值。

引理 4.3（Gram 删除与稳定性）。

设 $\|Z\|_{\mathrm{op}} \le q_* < 1$。删除行集 I 和列集 J，剩余集合为 R, T，则

$$0 \le \log \mathcal{G}(Z) - \log \mathcal{G}(Z[R,T]) \le \frac{\sum_{i\in I} \|Z_{i,\cdot}\|_2^2 + \sum_{j\in J} \|Z_{\cdot,j}\|_2^2}{2(1-q_*^2)}.$$

双侧中心化。对阶数为 $m \ge 1$ 且满足 $\|W\|_{\mathrm{op}} \le q_*$ 的方形余矩阵 W，置 $u = \mathbf{1}_m/\sqrt{m}$，则

$$0 \le \log \mathcal{G}(W) - \log \mathcal{G}(\Pi_m W \Pi_m) \le \frac{\|W^{\mathsf{T}} u\|_2^2 + \|Wu\|_2^2}{2(1-q_*^2)}.$$

稳定性。对于维数相同、算子范数均至多为 q_* 的两个实矩阵，另有

$$|\log \mathcal{G}(U) - \log \mathcal{G}(V)| \le \frac{\|U\|_F + \|V\|_F}{2(1-q_*^2)} \|U - V\|_F.$$

证明。

令 P_R 为投影到保留行坐标的对角投影矩阵。删除行使列侧 Gram 矩阵减少半正定矩阵 $Z^{\mathsf{T}}(I - P_R)Z$，其迹等于被删行的平方范数之和。对 $F(H) = -\frac{1}{2}\log\det(I-H)$ 和半正定方向 D，

$$DF(H)[D] = \tfrac{1}{2}\operatorname{tr}((I-H)^{-1}D) \le \frac{\operatorname{tr} D}{2(1-q_*^2)}.$$

积分此界，再改用行侧 Gram 矩阵处理删列。分别投影掉两个全一方向，以同一方法得到中心化界。对于最后一个结论，沿两个 Gram 矩阵之间的线段积分，并使用

$$\|U^{\mathsf{T}}U - V^{\mathsf{T}}V\|_* \le (\|U\|_F + \|V\|_F)\|U - V\|_F,$$

其中 $\|\cdot\|_*$ 为迹范数。两个 Gram 矩阵之间的线段仍满足同一算子谱隙条件。

现在设 S 为 $n \ge 4$ 阶竞赛符号矩阵，$s = S\mathbf{1}_n$、$\tau = \|s\|_2^2/(n-1)^2$。置

$$Y = \frac{S - I}{n-1}, \qquad D_n(S) = \det(I - S^{\mathsf{T}}S/n^2)^{-1/2}.$$

反对称性与奇异值成对出现给出

$$\|Y\|_{\mathrm{op}}^2 \le q_Y^2 = \frac{n(n-1)/2 + 1}{(n-1)^2} < 1.$$

取整数 $0 \le t < n$，任删 t 行与 t 列，记 $m = n - t \ge 1$、$Z = \Pi_m Y[R,T]\Pi_m$。Y 的每行和每列的平方二范数均为 $n/(n-1)^2$。此外，

$$\|Y\mathbf{1}_n\|_2^2 = \|Y^{\mathsf T}\mathbf{1}_n\|_2^2 = \tau + \frac{n}{(n-1)^2},$$

这里 $\mathbf{1}_I, \mathbf{1}_J \in \mathbb{R}^n$ 是原顶点全集 $[n]$ 中集合 I, J 的指示列向量：坐标属于相应集合时取一，否则取零。

$$\|Y\mathbf{1}_J\|_2^2,\ \|Y^{\mathsf T}\mathbf{1}_I\|_2^2 \le \frac{t^2 n}{(n-1)^2}.$$

因此，前一引理给出

$$0 \le \log \mathcal{G}(Y) - \log \mathcal{G}(Z) \le \frac{tn/(n-1)^2 + 2[\tau + n(1+t^2)/(n-1)^2]/m}{1 - q_Y^2}.$$

全矩阵的 Gram 恒等式为 $Y^{\mathsf T}Y = (S^{\mathsf T}S + I)/(n-1)^2$。它与 $S^{\mathsf T}S/n^2$ 的差半正定，且其迹为

$$\vartheta_n = \frac{2n-1}{n(n-1)} + \frac{n}{(n-1)^2}.$$

从而 $0 \le \log \mathcal{G}(Y) - \log D_n(S) \le 43/(4n)$。若 $m \ge n/2$，第一个损失至多为 $(24t + 18\tau + 8)/n$。两者都是相对于同一全矩阵核的非负损失，故

$$|\log \mathcal{G}(Z) - \log D_n(S)| \le \frac{24t + 18\tau + 11}{n}.$$

将 $1 - q_Y^2 = n(n-3)/(2(n-1)^2)$ 代入，再利用 $t \le n/2$ 即得上述常数。此估计适用于独立选择的行、列删集 I, J；反对称性仅用于原全矩阵 S。

对 $0 \le H \le q_*^2 I$，从谱分解或行列式微分公式得到

$$\frac{d}{dt}\left[-\frac{1}{2}\log\det(I - H - tD)\right] = \frac{1}{2}\operatorname{tr}((I - H - tD)^{-1}D).$$

若 $D \ge 0$ 且整条线段仍不超过 $q_*^2 I$，则右侧在 $[0, \operatorname{tr} D/(2(1-q_*^2))]$ 内。删除行时

$$H_0 = Z^{\mathsf T}P_R Z, \quad D = Z^{\mathsf T}(I - P_R)Z \ge 0, \quad \operatorname{tr} D = \sum_{i \in I}\sum_{j} Z_{ij}^2.$$

删除列时改用 $(P_R Z)(P_R Z)^{\mathsf T}$；删去的列平方范数不超过原列平方范数，所以两次损失可以相加。中心化使用投影 $I - uu^{\mathsf T}$，对应的第一步 Gram 损失为 $W^{\mathsf T}uu^{\mathsf T}W$，迹为 $\|W^{\mathsf T}u\|^2$；另一步至多为 $\|Wu\|^2$。

对任意 U, V，

$$U^{\mathsf T}U - V^{\mathsf T}V = U^{\mathsf T}(U - V) + (U - V)^{\mathsf T}V,$$

$$\|U^{\mathsf T}U - V^{\mathsf T}V\|_* \le \|U\|_F\|U - V\|_F + \|U - V\|_F\|V\|_F.$$

在 Gram 线段 $H_t = (1-t)V^{\mathsf T}V + tU^{\mathsf T}U$ 上仍有 $0 \le H_t \le q_*^2 I$。利用 $|\operatorname{tr}(AB)| \le \|A\|_{\mathrm{op}}\|B\|_*$ 再积分，得到引理中的 Lipschitz 常数。

由于 $S^{\mathsf T} = -S$，

$$(S-I)^{\mathsf T}(S-I)=(-S-I)(S-I)=-S^2+I=S^{\mathsf T}S+I.$$

因此

$$q_Y^2=\frac{n(n-1)/2+1}{(n-1)^2},\qquad 1-q_Y^2=\frac{n(n-3)}{2(n-1)^2}>0\quad(n\ge 4).$$

每行恰有 n 个模为 $1/(n-1)$ 的元素，平方范数为 $n/(n-1)^2$。又

$$Y\mathbf{1}=(s-\mathbf{1})/(n-1),\quad Y^{\mathsf T}\mathbf{1}=(-s-\mathbf{1})/(n-1),$$

$$\|s\mp\mathbf{1}\|^2=\|s\|^2+n\mp 2\sum_i s_i=\|s\|^2+n.$$

对删列指示向量，逐行有 $|(Y\mathbf{1}_J)_i|\le t/(n-1)$，故平方范数至多 $nt^2/(n-1)^2$。保留矩阵 $W=Y[R,T]$ 的全一方向满足

$$\begin{aligned}\|W\mathbf{1}_m/\sqrt{m}\|^2&\le\frac{1}{m}\|Y(\mathbf{1}_n-\mathbf{1}_J)\|^2\\&\le\frac{2}{m}\left[\tau+\frac{n}{(n-1)^2}+\frac{nt^2}{(n-1)^2}\right].\end{aligned}$$

另一个方向同理。代入删除和中心化界，得到上述损失 L。把它乘以 n 并代入谱隙:

$$nL\le\frac{2nt}{n-3}+\frac{4(n-1)^2\tau}{m(n-3)}+\frac{4n(1+t^2)}{m(n-3)}.$$

当 $m=n-t\ge n/2$ 时,

$$\frac{n}{n-3}\le 4,\quad\frac{4(n-1)^2}{m(n-3)}\le 18,\quad\frac{4n}{m(n-3)}\le 8,$$

$$\frac{4nt^2}{m(n-3)}\le 16t.$$

最后一个不等式由 $t/m\le 1$ 与 $n/(n-3)\le 4$ 得到。因此 $nL\le 24t+18\tau+8$。

全阶 Gram 的差为

$$\left(\frac{1}{(n-1)^2}-\frac{1}{n^2}\right)S^{\mathsf T}S+\frac{I}{(n-1)^2}\ge 0,$$

其迹为 ϑ_n。对数损失至多

$$\frac{\vartheta_n}{2(1-q_Y^2)}=\frac{3n^2-3n+1}{n^2(n-3)}\le\frac{43}{4n}.$$

最后一个不等式等价于 $31n^2-117n-4\ge 0$；在 $n=4$ 时为 $24>0$，之后递增。若 $a,b\ge 0$，则 $|a-b|\le\max(a,b)$；两项损失均相对 $\mathcal{G}(Y)$，因此

$$|\log\mathcal{G}(Z)-\log D_n(S)|\le\max\left(\frac{24t+18\tau+8}{n},\frac{43}{4n}\right)\le\frac{24t+18\tau+11}{n}.$$

4.3 竞赛图子矩阵的预处理

矩阵 $C = 2A/(n-1)$ 的行、列误差符号相反。将第 i 行乘以 $(1+a_i)^{-1}$ 可修正原行和，将第 i 列乘以 $(1-a_i)^{-1}$ 可修正原列和。两种修正同时进行后，边际仍有误差，以下估计这一误差。其主要作用是使总质量的一阶变化消失，并在恢复乘积中产生度差修正因子 Γ。

固定 $0 \le a_0 < 1$ 和有限正参数 A_0, B_0。本小节假设

$$a_i = \frac{s_i}{n-1}, \qquad \max_i |a_i| \le a_0, \qquad \tau = \sum_i a_i^2 \le A_0 \log n, \qquad t \le B_0 \log n.$$

定义

$$C = \frac{J - I + S}{n-1} = \frac{2A}{n-1}, \qquad \ell_i = \frac{1}{1+a_i}, \qquad r_i = \frac{1}{1-a_i}, \qquad g_i = \frac{1}{1-a_i^2}.$$

置 $C' = \operatorname{diag}(\ell) C \operatorname{diag}(r)$、$F = C' - C$、$\nu = \mathfrak{m}(C') - n$。为计算总质量，记 $v_i = a_i/(1-a_i^2)$、$w_i = a_i^2/(1-a_i^2)$，以及 $V = \sum_i v_i$、$W = \sum_i w_i$。展开 $\ell = \mathbf{1} - v + w$ 和 $r = \mathbf{1} + v + w$，得到精确恒等式

$$\nu = \frac{W^2 - V^2 + W + 2w^{\mathsf{T}} S v}{n-1}.$$

确切地说，$\mathbf{1}^{\mathsf{T}} S v = -(n-1)W$ 抵消了一阶质量变化。固定度差界给出 $W \le K\tau$、$|V| \le K\tau$、$\|v\|_2 \le K\sqrt{\tau}$。逐行估计 Sv 得到

$$|\nu| \le K \mathcal{M}_\tau, \qquad \mathcal{M}_\tau = \frac{\tau + \tau^2}{n} + \frac{\tau^{3/2}}{\sqrt{n}} = o(1).$$

边际恒等式为

$$C' \mathbf{1}_n - \mathbf{1}_n = \operatorname{diag}(\ell) C (r - \mathbf{1}_n),$$

$$(C')^{\mathsf{T}} \mathbf{1}_n - \mathbf{1}_n = \operatorname{diag}(r) C^{\mathsf{T}} (\ell - \mathbf{1}_n).$$

由于 C 的每行和每列二范数为 $O(n^{-1/2})$，且 $\|C\|_{\mathrm{op}} = O(1)$，无穷范数边际误差为 $O(\sqrt{\tau/n})$，二范数边际误差为 $O(\sqrt{\tau})$。直接逐元素估计还得到

$$\|F\|_F \le K\sqrt{\tau/n}.$$

归一化 $\widehat{C} = nC'/\mathfrak{m}(C')$。以 e_i, f_j 表示其行、列误差，故 $\sum e_i = \sum f_j = 0$。对大小均为 t 的任意删集 I, J，记 $R = [n] \setminus I$、$T = [n] \setminus J$、$m = n - t$，并令

$$X = \frac{n}{m} \widehat{C}[R, T], \qquad \kappa = \mathfrak{m}(X) - m, \qquad \widetilde{X} = \frac{m}{\mathfrak{m}(X)} X.$$

精确删行列质量恒等式为

$$\kappa = \frac{n}{m} \left[-\sum_{i \in I} e_i - \sum_{j \in J} f_j + \sum_{i \in I, j \in J} \widehat{C}_{ij} - \frac{t^2}{n} \right]. \tag{4.1}$$

每个保留行在最后一次归一化前的边际误差为

$$(X\mathbf{1}_m)_i-1=\frac{n}{m}\left[e_i+\frac{t}{n}-\sum_{j\in J}\widehat{C}_{ij}\right],$$

列侧有相同形式的对应恒等式。因此，

$$|\kappa|\le K\left[t\sqrt{\tau/n}+t^2/n\right],$$

$$\varepsilon(\widetilde{X})\le K(\sqrt{\tau/n}+t/n),\qquad \|g(\widetilde{X})\|_2\le K(\sqrt{\tau}+t/\sqrt{n}).$$

这里 $g(\widetilde{X})$ 为行、列边际误差的拼接向量。$\widetilde{X}$ 的元素均在 $[0,K/m]$ 内。

为应用引理 4.1，下面验证 $\widetilde{X}$ 的中心核条件。记

$$\eta=\frac{n^2}{\mathfrak{m}(C')\mathfrak{m}(X)}=1+O((t+1)/n),$$

则

$$\Pi_m\widetilde{X}\Pi_m=\eta\left[Z+\Pi_mF[R,T]\Pi_m\right].$$

由 $\mathfrak{m}(C')=n+o(1)$ 和 $\mathfrak{m}(X)=m+o(1)$，有 $\eta=(n/m)(1+o(1))$。压缩不增大 Y 的算子范数，第二项则由上述 Frobenius 界控制，故中心核的算子范数至多为 $1/\sqrt{2}+o(1)$。其元素为 $O(1/m)$，而原矩阵 $\widetilde{X}$ 的边际误差无穷范数趋于零。又因 $\widetilde{X}$ 的质量为 m，引理 4.1 中的 E 等于 $\Pi_m\widetilde{X}\Pi_m$。因此可固定 $q=3/4$ 及元素界 C,C_0。相应的 L_0,ε_0 仅依赖 a_0,A_0,B_0，所以引理 4.1 对充分大的 n 一致适用，给出双随机矩阵 B_X 及谱范数界 $7/8$。

二范数位移引理给出

$$\|B_X-\widetilde{X}\|_F\le K(\sqrt{\tau/n}+t/n).$$

与较强的中心核界结合，B_X 的中心算子范数仍至多为 $1/\sqrt{2}+o(1)$，例如最终至多为 $4/5$。元素继续满足 K/m 的界。

对 Z 应用高斯删除估计，并以对数 Lipschitz 界估计预缩放、归一化及对角缩放产生的扰动。由 $B_X-P_m=\Pi_mB_X\Pi_m$，得到

$$|\log\mathcal{G}(B_X-P_m)-\log D_n(S)|\le K\left[\sqrt{\tau/n}+(t+1)/n\right].$$

中心化产生的 τ/n 项已吸收入 $\sqrt{\tau/n}$。其中由删除产生的误差与 t/n 成线性关系，正适合对后续子集权重求和。

综上，各项误差如下。所有常数与最终适用阈值只依赖固定的 a_0,A_0,B_0。全阶质量误差在恢复对数中产生 $O(|\nu|)\le K\mathcal{M}_\tau$；删除引起的质量变化至多为 $K[t\sqrt{\tau/n}+t^2/n]$；高斯对数误差为 $K[\sqrt{\tau/n}+(t+1)/n]$。在阶数 $m\ge n/2$ 使用定理 3.1，增加 $O(1/m)=O(1/n)$。恢复标量因子得到 $e^{-1}\exp(O((t+1)/n))$。对于质量为 $m+\kappa$ 的 X，容量仅以 $e^{-\theta_X}\le e^{\kappa}$ 的形式使用，不能断言这种非单位质量下的 θ_X 非负。第 4.4 节精确恢复这些因子，得到引理 4.4 的误差指数。

逐元素验证

$$1-v_i+w_i=1-\frac{a_i}{1-a_i^2}+\frac{a_i^2}{1-a_i^2}=\frac{1}{1+a_i}=\ell_i,$$

$$1+v_i+w_i=\frac{1}{1-a_i}=r_i,\qquad a_iv_i=w_i,\quad \ell_ir_i=g_i=1+w_i.$$

令 $L=\mathbf{1}-v+w$、$R=\mathbf{1}+v+w$（这里 L,R 仅在本段表示向量）。则

$$L^{\mathsf T}JR=(n-V+W)(n+V+W)=(n+W)^2-V^2,$$

$$L^{\mathsf T}IR=\sum_i g_i=n+W.$$

反对称部分逐项展开为

$$\begin{aligned}L^{\mathsf T}SR=&\,\mathbf{1}^{\mathsf T}Sv+\mathbf{1}^{\mathsf T}Sw-v^{\mathsf T}S\mathbf{1}-v^{\mathsf T}Sv-v^{\mathsf T}Sw\\&+w^{\mathsf T}S\mathbf{1}+w^{\mathsf T}Sv+w^{\mathsf T}Sw\\=&\,-2(n-1)W+2w^{\mathsf T}Sv.\end{aligned}$$

这里 $\mathbf{1}^{\mathsf T}Sv=-(n-1)a^{\mathsf T}v=-(n-1)W$；$\mathbf{1}^{\mathsf T}Sw+w^{\mathsf T}S\mathbf{1}=0$；$v^{\mathsf T}Sv=w^{\mathsf T}Sw=0$；$-v^{\mathsf T}Sw=w^{\mathsf T}Sv$。所以

$$\begin{aligned}\mathfrak{m}(C')&=\frac{(n+W)^2-V^2-(n+W)-2(n-1)W+2w^{\mathsf T}Sv}{n-1}\\&=n+\frac{W^2-V^2+W+2w^{\mathsf T}Sv}{n-1}.\end{aligned}$$

由 $\sum_i a_i=0$,

$$V=\sum_i\left(a_i+\frac{a_i^3}{1-a_i^2}\right)=\sum_i\frac{a_i^3}{1-a_i^2},\quad |V|\le\frac{a_0}{1-a_0^2}\tau,\quad W\le\frac{\tau}{1-a_0^2},$$

$$\|v\|_2\le\frac{\sqrt{\tau}}{1-a_0^2},\quad \|Sv\|_\infty\le\sqrt{n}\|v\|_2,\quad |w^{\mathsf T}Sv|\le\|w\|_1\|Sv\|_\infty\le K\sqrt{n}\tau^{3/2}.$$

代回得到 $|\nu|\le K[(\tau+\tau^2)/n+\tau^{3/2}/\sqrt{n}]$。
因 $\mathrm{diag}(\ell)C\mathbf{1}=\mathbf{1}$,

$$C'\mathbf{1}-\mathbf{1}=\mathrm{diag}(\ell)C(r-\mathbf{1}).$$

且 $|r_i-1|\le K|a_i|$、$|\ell_i-1|\le K|a_i|$、$\|C_{i,\cdot}\|_2\le K/\sqrt{n}$。所以

$$\|C'\mathbf{1}-\mathbf{1}\|_\infty\le K\sqrt{\tau/n},\quad \|C'\mathbf{1}-\mathbf{1}\|_2\le K\|C\|_{\mathrm{op}}\sqrt{\tau}\le K'\sqrt{\tau}.$$

列侧同理。逐元素

$$F_{ij}=C_{ij}(\ell_ir_j-1),\quad |\ell_ir_j-1|\le K(|a_i|+|a_j|),$$

$$\|F\|_F^2\le\frac{K}{n^2}\sum_{ij}(a_i^2+a_j^2)=\frac{2K\tau}{n}.$$

对质量为 n 的 $\widehat{C}$，保留块的质量由容斥直接给出

$$\begin{aligned}\sum_{i\in R,j\in T}\widehat{C}_{ij} &= n-\sum_{i\in I}(1+e_i)-\sum_{j\in J}(1+f_j)+\sum_{i\in I,j\in J}\widehat{C}_{ij}\\ &= n-2t-\sum_{I}e_i-\sum_{J}f_j+\sum_{I,J}\widehat{C}_{ij}.\end{aligned}$$

而 $m^2/n=n-2t+t^2/n$，所以乘 n/m 再减 m 即得式 (4.1)。由 $\widehat{C}_{ij}\le K/n$，

$$|\kappa|\le\frac{n}{m}\left(2t\max(\|e\|_\infty,\|f\|_\infty)+(K+1)t^2/n\right)\le K'[t\sqrt{\tau/n}+t^2/n].$$

保留行的误差同样逐项为

$$\frac{n}{m}\left(1+e_i-\sum_{j\in J}\widehat{C}_{ij}\right)-1=\frac{n}{m}\left(e_i+t/n-\sum_{j\in J}\widehat{C}_{ij}\right).$$

归一化乘数 $m/(m+\kappa)$ 与一相差 $O(|\kappa|/m)$；故边际的无穷范数和二范数分别为 $K(\sqrt{\tau/n}+t/n)$、$K(\sqrt{\tau}+t/\sqrt{n})$。

从定义依次代入，

$$\widetilde{X}=\frac{m}{m+\kappa}\frac{n}{m}\frac{n}{n+\nu}C'[R,T]=\frac{n^2}{(n+\nu)(m+\kappa)}C'[R,T]=\eta C'[R,T].$$

又 $C=J/(n-1)+Y$，左右乘 Π_m 消掉 J，得到中心核恒等式。由于 $m=n-t$，

$$\eta=\frac{n}{m}(1+\nu/n)^{-1}(1+\kappa/m)^{-1}=1+O((t+1)/n).$$

因此

$$\|\Pi_m\widetilde{X}\Pi_m-Z\|_F\le|\eta-1|\|Z\|_F+|\eta|\|F[R,T]\|_F\le K[(t+1)/n+\sqrt{\tau/n}].$$

加上对角缩放的位移，

$$\|(B_X-P_m)-Z\|_F\le K[(t+1)/n+\sqrt{\tau/n}].$$

上述矩阵 Frobenius 范数均为 $O(1)$，算子范数最终至多固定的 $4/5<1$。Gram Lipschitz 界与删除界相加得

$$\begin{aligned}|\log\mathcal{G}(B_X-P_m)-\log D_n(S)| &\le K\left[\frac{t+\tau+1}{n}+\sqrt{\tau/n}\right]\\ &\le K'\left[\frac{t+1}{n}+\sqrt{\tau/n}\right],\end{aligned}$$

其中充分大 n 时 $\tau/n\le1$，故 $\tau/n\le\sqrt{\tau/n}$。

先记

$$e'=C'\mathbf{1}-\mathbf{1},\quad f'=(C')^{\mathsf{T}}\mathbf{1}-\mathbf{1},\quad \widehat{C}=\frac{n}{n+\nu}C'.$$

逐坐标有

$$e_i = (\widehat{C}\mathbf{1})_i - 1 = \frac{n}{n+\nu}(1+e_i') - 1 = \frac{ne_i' - \nu}{n+\nu},$$
$$f_j = (\widehat{C}^{\mathsf{T}}\mathbf{1})_j - 1 = \frac{n}{n+\nu}(1+f_j') - 1 = \frac{nf_j' - \nu}{n+\nu}.$$

因为 $\sum_i e_i' = \sum_j f_j' = \nu$，这些公式也验证

$$\sum_i e_i = \frac{n\nu - n\nu}{n+\nu} = 0, \quad \sum_j f_j = 0.$$

当 $|\nu| \le n/2$ 时，

$$\|e\|_\infty \le 2\|e'\|_\infty + 2|\nu|/n, \quad \|e\|_2 \le 2\|e'\|_2 + 2|\nu|/\sqrt{n},$$

$$\|f\|_\infty \le 2\|f'\|_\infty + 2|\nu|/n, \quad \|f\|_2 \le 2\|f'\|_2 + 2|\nu|/\sqrt{n}.$$

对 $0 < \tau \le A_0 \log n$，将 $|\nu|/n$ 除以 $\sqrt{\tau/n}$ 后，已有质量界给出至多常数乘

$$\frac{\sqrt{\tau} + \tau^{3/2}}{n^{3/2}} + \frac{\tau}{n} = o(1).$$

将 $|\nu|/\sqrt{n}$ 除以 $\sqrt{\tau}$ 得到同一个表达式。$\tau = 0$ 时 $a = 0$，所以 $\nu = 0$，无需作除法。这就分别推出两侧的无穷范数界 $K\sqrt{\tau/n}$ 和二范数界 $K\sqrt{\tau}$。

设

$$h = X\mathbf{1}_m - \mathbf{1}_m, \quad k = X^{\mathsf{T}}\mathbf{1}_m - \mathbf{1}_m, \quad \widetilde{X} = \frac{m}{m+\kappa}X.$$

那么归一化后的两侧误差精确为

$$\widetilde{\alpha}_i = \frac{mh_i - \kappa}{m+\kappa}, \qquad \widetilde{\beta}_j = \frac{mk_j - \kappa}{m+\kappa}.$$

由 $\sum_i h_i = \sum_j k_j = \kappa$，再次验证 $\sum_i \widetilde{\alpha}_i = \sum_j \widetilde{\beta}_j = 0$。当 $|\kappa| \le m/2$，

$$\|\widetilde{\alpha}\|_\infty \le 2\|h\|_\infty + 2|\kappa|/m, \quad \|\widetilde{\alpha}\|_2 \le 2\|h\|_2 + 2|\kappa|/\sqrt{m},$$

$$\|\widetilde{\beta}\|_\infty \le 2\|k\|_\infty + 2|\kappa|/m, \quad \|\widetilde{\beta}\|_2 \le 2\|k\|_2 + 2|\kappa|/\sqrt{m}.$$

这里 k 为列误差向量。保留块的行、列误差分别为

$$h_i = \frac{n}{m}\left(e_i + t/n - \sum_{j\in J}\widehat{C}_{ij}\right), \qquad k_j = \frac{n}{m}\left(f_j + t/n - \sum_{i\in I}\widehat{C}_{ij}\right).$$

由于 $\widehat{C}_{ij} \le K/n$，

$$\|h\|_\infty, \|k\|_\infty \le K'[\sqrt{\tau/n} + t/n],$$

$$\|h\|_2, \|k\|_2 \le K'[\sqrt{\tau} + t/\sqrt{n}].$$

质量项 $|\kappa|/\sqrt{m} \le K[t\sqrt{\tau}/n + t^2/n^{3/2}]$ 被上述二范数界吸收，因为 $t/n \to 0$；无穷范数质量项也被相应界吸收。局部缩放引理的行、列边际误差条件因而均成立。

局部定理的稠密度、谱隙与阈值次序。

归一化质量为 m，所以中心矩阵精确为

$$E = \widetilde{X} - P_m - \frac{\widetilde{\alpha}\mathbf{1}^{\mathsf{T}} + \mathbf{1}\widetilde{\beta}^{\mathsf{T}}}{m} = \Pi_m \widetilde{X} \Pi_m.$$

若 $0 \le \widetilde{X}_{ij} \le C_1/m$、两侧边际误差的无穷范数至多 ϵ_n，则

$$|E_{ij}| \le \frac{C_1 + 1 + 2\epsilon_n}{m} \le \frac{C_1 + 3}{m} \quad (\epsilon_n \le 1).$$

非负性使每个行列绝对和就是行列和，至多 $1 + \epsilon_n \le 2$。而

$$\|E\|_{\mathrm{op}} \le |\eta|\|Z\|_{\mathrm{op}} + |\eta|\|F[R,T]\|_F \le \frac{1}{\sqrt{2}} + o(1).$$

先固定 $q = 3/4$ 和元素界 $C_0 = C_1 + 3$；它们确定 L_0, ε_0。再选统一阶数阈值，使

$$\|E\|_{\mathrm{op}} \le 3/4, \quad \epsilon_n \le \varepsilon_0, \quad m \ge n/2, \quad |\nu| \le n/2, \quad |\kappa| \le m/2.$$

这些条件全由只含固定参数和 n 的上界保证，所以阈值在选择具体图和删集之前确定。局部定理首先给 $\|B_X - P_m\|_{\mathrm{op}} \le 7/8$；更精细地，

$$\|B_X - P_m\|_{\mathrm{op}} \le \|\Pi_m \widetilde{X} \Pi_m\|_{\mathrm{op}} + \|B_X - \widetilde{X}\|_F \le 1/\sqrt{2} + o(1) \le 4/5.$$

这一估计同样对竞赛图及删集一致。

取充分大的奇数 n 及相应的正则圆环竞赛图，记其邻接矩阵为 A_n、符号矩阵为 S_n^{cir}。此时所有度差为零，前面的预缩放因子均为一，而且

$$C = \frac{2A_n}{n-1} = \frac{J_n - I_n + S_n^{\mathrm{cir}}}{n-1}, \qquad C\mathbf{1}_n = C^{\mathsf{T}}\mathbf{1}_n = \mathbf{1}_n.$$

因此 $C' = X = \widetilde{X} = C$（这里不删行列，$t = 0$）。势向量取 $x = y = 0$ 就已满足平衡方程；局部缩放中的唯一小解给出 $B_X = C$。在常数向量方向上 $C - P_n$ 为零；在其正交补上，

$$(C - P_n)|_{\mathbf{1}_n^{\perp}} = \left.\frac{S_n^{\mathrm{cir}} - I_n}{n-1}\right|_{\mathbf{1}_n^{\perp}}, \qquad (S_n^{\mathrm{cir}} - I_n)^{\mathsf{T}}(S_n^{\mathrm{cir}} - I_n) = I_n - (S_n^{\mathrm{cir}})^2.$$

第 8.2 节的圆环变换保留符号矩阵的全部频率，最大正频率为 $\cot(\pi/(2n))$。因此

$$\begin{aligned}\|B_X - P_n\|_{\mathrm{op}} &= \frac{\sqrt{1 + \cot^2(\pi/(2n))}}{n-1} \\ &= \frac{1}{(n-1)\sin(\pi/(2n))} \\ &= \frac{2n}{\pi(n-1)} \frac{\pi/(2n)}{\sin(\pi/(2n))} \longrightarrow \frac{2}{\pi} < \frac{1}{\sqrt{2}}.\end{aligned}$$

这里使用了 $\sin u/u \to 1$。可见中心范数一般不趋于零；固定上界 $4/5$ 已足以应用定理 3.1。

4.4 非主永久式界的证明

下面将局部缩放和删除估计应用于竞赛图子矩阵。这里允许行删集与列删集不同，因为圈覆盖进入、离开异常集时可能使用不同的核心顶点。

引理 4.4（非主永久式界）。

固定 $0 \le b < 1$ 及正常数 A_0, B_0。对 $N \ge 2$ 阶竞赛图核心，置 $a = S\mathbf{1}/(N-1)$，$\tau = \sum_i a_i^2$。令 $I, J \subseteq [N]$ 分别为行、列删集；此处 I, J 为集合，和单位矩阵、全一矩阵的记号由下文的集合运算区分。假设

$$\max_i |a_i| \le b, \qquad \tau \le A_0 \log N, \qquad |I| = |J| = t \le B_0 \log N.$$

定义 $\ell_i = (1+a_i)^{-1}$、$r_i = (1-a_i)^{-1}$，以及

$$\Gamma = \prod_i (1-a_i^2), \qquad \mathcal{M}_\tau = \frac{\tau + \tau^2}{N} + \frac{\tau^{3/2}}{\sqrt{N}}.$$

令 $R = [N] \setminus I$、$T = [N] \setminus J$ 分别为保留行、列集；本式的 T 是列指标集。则有

$$\operatorname{per} A[R,T] \le e^{-1} D_N(S) \Gamma \left(\prod_{i \in I} \ell_i \right) \left(\prod_{j \in J} r_j \right) \frac{(N-t)!}{2^{N-t}} \exp(\varepsilon_{\tau,t}),$$

$$\varepsilon_{\tau,t} \le K \left[\mathcal{M}_\tau + \sqrt{\tau/N} + \frac{t+1}{N} + t\sqrt{\tau/N} + \frac{t^2}{N} \right].$$

对所有充分大的 N，该估计对每个满足条件的竞赛图及每对 I, J 同时成立。常数 K 和起始阶数仅依赖 b, A_0, B_0。

因子 Γ 记录度数不平衡的代价。对主删集 $I = J = U$，恢复的顶点权重为 $\ell_i r_i = (1-a_i^2)^{-1}$；删集不同时，行、列因子分别保留。误差中含有 $\sqrt{\tau/N}$ 量级的项，因此在最后一种情形中，必须保留 $\Gamma \le e^{-\tau}$。

证明中以 n 表示全核心阶数 N，并取 $a_0 = b$。前面的构造已给出缩放矩阵 B_X。现恢复全部对角因子和标量因子，再将所得高斯行列式与 $D_n(S)$ 比较。

证明。

由前面的构造，B_X 满足定理 3.1 的元素界和谱隙条件。因此

$$\operatorname{per} B_X = \frac{m!}{m^m} \mathcal{G}(B_X - P_m)(1 + O(1/m)).$$

行列缩放因子精确恢复为

$$\prod_{i \in R} (1+a_i) \prod_{j \in T} (1-a_j) = \Gamma \prod_{i \in I} \ell_i \prod_{j \in J} r_j.$$

因此，删除行恢复 ℓ 因子，删除列恢复 r 因子。标量因子满足

$$\operatorname{per} A[R,T] = \Gamma \prod_{i \in I} \ell_i \prod_{j \in J} r_j \left[\frac{m(n-1)\mathfrak{m}(C')}{2n^2} \right]^m e^{-\theta_X} \operatorname{per} B_X. \tag{4.2}$$

将 $m!/m^m$ 代入式 (4.2)后，剩余标量为

$$\frac{m!}{2^m} (1 - 1/n)^m \left[\frac{\mathfrak{m}(C')}{n} \right]^m.$$

其对数与 $e^{-1}m!/2^m$ 的对数之差为 $O((t+1)/n+|\nu|)$。容量界给出 $e^{-\theta_X}\le e^{\kappa}$。代入质量、高斯和零阶永久式误差，即可得到所需指数界。以下展开恢复因子的计算，所有常数均对竞赛图和删集一致。

行、列删集的因子分别为

$$\begin{aligned}\operatorname{per} C[R,T] &= \left(\prod_{i\in R}\ell_i^{-1}\right)\left(\prod_{j\in T}r_j^{-1}\right)\operatorname{per} C'[R,T]\\ &= \left(\prod_{i=1}^{n}(1+a_i)\prod_{j=1}^{n}(1-a_j)\right)\left(\prod_{i\in I}(1+a_i)^{-1}\right)\left(\prod_{j\in J}(1-a_j)^{-1}\right)\operatorname{per} C'[R,T]\\ &= \Gamma\prod_{i\in I}\ell_i\prod_{j\in J}r_j\operatorname{per} C'[R,T].\end{aligned}$$

从 $X=n^2C'[R,T]/[m(n+\nu)]$，得到

$$\operatorname{per} C'[R,T]=[m(n+\nu)/n^2]^m\operatorname{per} X.$$

再用 $A=(n-1)C/2$ 与 $\operatorname{per} X=e^{-\theta_X}\operatorname{per} B_X$，即得式 (4.2)。代入永久式近似后的标量为

$$\left[\frac{m(n-1)(n+\nu)}{2n^2}\right]^m\frac{m!}{m^m}=\frac{m!}{2^m}(1-1/n)^m(1+\nu/n)^m.$$

令 $u=1/n$。因

$$|\log(1-u)+u|\le\frac{u^2}{2(1-u)},$$

$$|m\log(1-1/n)+1|\le\left|1-\frac{m}{n}\right|+\frac{m}{2n^2(1-1/n)}\le\frac{t}{n}+\frac{1}{2(n-1)}.$$

当 $|\nu|/n\le 1/2$，$|m\log(1+\nu/n)|\le 2|\nu|$。容量部分满足 $-\theta_X\le\kappa$。高斯因子满足 $\mathcal{G}(B_X-P_m)\le D_n(S)e^{K[\sqrt{\tau/n}+(t+1)/n]}$。最后 $1+O(1/m)\le e^{K/n}$（增大统一阈值），所以误差指数逐项为

$$\varepsilon_{\tau,t}\le K\Bigg[\underbrace{\mathcal{M}_\tau}_{\text{全阶质量}}+\underbrace{t\sqrt{\tau/n}+t^2/n}_{\text{删除质量}}+\underbrace{\sqrt{\tau/n}+(t+1)/n}_{\text{高斯与标量}}+\underbrace{1/n}_{\text{永久式误差}}\Bigg].$$

合并相同量级即为引理 4.4。□

4.5 小度差时的双侧估计

当每个度差均为 $o(\sqrt{n})$ 时，原始边际已足够接近一，可以直接使用局部缩放。容量界随后从两侧控制恢复因子，得到定理 8.1 所需的近似。

引理 4.5（小度差永久式近似）。

设 $d=\|S\mathbf{1}_n\|_\infty=o(\sqrt{n})$。固定 $0<B_0<\infty$，任删 $t\le B_0\log n$ 行与 t 列，记 $m=n-t$。对这些选择一致地有

$$\operatorname{per} A[R,T] = e^{-1} D_n(S) \frac{m!}{2^m} \left[1 + O_{B_0}\left(\frac{(d+t+1)^2}{n} \right) \right]. \tag{4.3}$$

更具体地, 固定 $B_0 > 0$ 后, 存在常数 $C_{\mathrm{err}}, \delta > 0$ 和整数 $N_0 \geq 4$, 使下述结论对所有 $n \geq N_0$ 一致成立。设 S 为竞赛符号矩阵, $I, J \subseteq [n]$ 且 $|I| = |J| = t \leq B_0 \log n$; 置 $d = \|S\mathbf{1}_n\|_\infty$、$\eta = (d+t+1)^2/n$。若 $\eta \leq \delta$，则式 (4.3)的相对误差绝对值不超过 $C_{\mathrm{err}}\eta$。这里 $R = [n] \setminus I$、$T = [n] \setminus J$、$m = n - t$，两个删集可独立选取。在引理所述渐近范围内，$\eta \to 0$。

证明。

增大 N_0，使整个对数删除窗口内均有 $2t \leq n$，于是 $m \geq n/2 > 0$。此处不需要成对预缩放。令 $C = 2A/(n-1)$、$X = (n/m)C[R,T]$。全矩阵 C 的行列误差分别为 $s_i/(n-1)$、$-s_i/(n-1)$。因此, 精确质量恒等式式 (4.1)及第 4.3 节的边际公式给出

$$|\kappa| = O(t(d+t)/n), \qquad \varepsilon(X) = O((d+t)/n), \qquad \|g(X)\|_2 = O((d+t)/\sqrt{n}).$$

质量误差满足 $|\kappa| \leq K\eta$。必要时缩小 δ, 便一致保证 $\mathfrak{m}(X) = m + \kappa > 0$。归一化 $\widetilde{X} = mX/\mathfrak{m}(X)$。其稠密度与中心核谱隙固定，局部缩放引理适用。二范数位移和容量估计给出

$$\|B_X - \widetilde{X}\|_F = O((d+t)/n), \qquad 0 \leq \theta_{\widetilde{X}} = O((d+t)^2/n).$$

非单位质量修正随后给出 $|\theta_X| = O((d+t)^2/n)$。又有 $\tau \leq nd^2/(n-1)^2$。有限删除估计、归一化因子和对角缩放的扰动共同给出

$$|\log \mathcal{G}(B_X - P_m) - \log D_n(S)| = O((d+t+1)^2/n).$$

此时不含度差乘积的精确恢复为

$$\operatorname{per} A[R,T] = \left[\frac{m(n-1)}{2n} \right]^m e^{-\theta_X} \operatorname{per} B_X.$$

应用统一永久式定理，并使用 $(1-1/n)^m = e^{-1}\exp(O((t+1)/n))$。所有对数误差均由 $\eta = (d+t+1)^2/n$ 的一个固定倍数控制。将 δ 取得充分小，对这些界取指数，便在前述有限范围内一致得到相对误差绝对值不超过 $C_{\mathrm{err}}\eta$。在 $d = o(\sqrt{n})$、$t \leq B_0 \log n$ 的渐近范围中，$\eta \to 0$。由此得到定理 8.1 所用的短删集子矩阵的一致近似。

因 $|s_i| \leq d$，全矩阵边际绝对误差至多 $d/(n-1)$，删集质量公式给出

$$|\kappa| \leq \frac{n}{m}\left[\frac{2td}{n-1} + \frac{2t^2}{n-1} + \frac{t^2}{n} \right] \leq K\frac{t(d+t)}{n}.$$

保留行的误差至多 $K(d+t)/n$，共 $2m$ 个行列误差，故

$$\|g(X)\|_2 \leq \sqrt{2m}\, K(d+t)/n \leq K'(d+t)/\sqrt{n}.$$

归一化后同阶，容量和位移给出

$$0 \leq \theta_{\widetilde{X}} \leq K(d+t)^2/n, \quad \|B_X - \widetilde{X}\|_F \leq \frac{K}{\sqrt{m}}\frac{d+t}{\sqrt{n}} \leq K'(d+t)/n.$$

因为 $|\kappa|/m \leq 1/2$,

$$\left| m \log \frac{m}{m+\kappa} \right| = m|\log(1+\kappa/m)| \leq 2|\kappa|,$$

所以 $|\theta_X| \le K[(d+t)^2 + t(d+t)]/n \le K'(d+t)^2/n$。若 $d = t = 0$，这些量均为零。
高斯删除给 $K(t+\tau+1)/n$，而

$$\tau = \frac{\sum_i s_i^2}{(n-1)^2} \le \frac{nd^2}{(n-1)^2} \le \frac{4d^2}{n}.$$

中心核位移为 $K(d+t+1)/n$，故全部高斯对数误差至多

$$K\left[\frac{t+1}{n} + \frac{d^2}{n^2} + \frac{d+t+1}{n}\right] \le K'\frac{(d+t+1)^2}{n} = K'\eta.$$

恢复上述因子后，得

$$\frac{\operatorname{per} A[R,T]}{e^{-1}D_n(S)m!/2^m} = e^u(1+v), \qquad |u| \le K\eta, \quad |v| \le K/n \le K\eta.$$

选择固定 $\delta \le 1/(2K)$ 后，

$$|e^u(1+v) - 1| \le |e^u - 1| + e^{|u|}|v| \le e^{K\delta}(|u| + |v|) \le 2Ke^{K\delta}\eta.$$

其中 K, δ, N_0 仅依赖 B_0 及固定的分析参数。
这里没有成对预缩放，$C = J/(n-1) + Y$，$X = (n/m)C[R,T]$，$\widetilde{X} = mX/(m+\kappa)$。所以

$$\widetilde{X} = \frac{n}{m+\kappa}C[R,T], \qquad \Pi_m\widetilde{X}\Pi_m = \frac{n}{m+\kappa}Z.$$

标量偏移为

$$\left|\frac{n}{m+\kappa} - 1\right| = \frac{|t-\kappa|}{|m+\kappa|} \le \frac{4(t+|\kappa|)}{n} \quad (m \ge n/2,\ |\kappa| \le m/2).$$

于是

$$\begin{aligned}\|(B_X - P_m) - Z\|_F &\le \|\Pi_m(B_X - \widetilde{X})\Pi_m\|_F + \left|\frac{n}{m+\kappa} - 1\right| \|Z\|_F \\ &\le K\frac{d+t}{n} + K\frac{t+|\kappa|}{n} \\ &\le K'\left[\frac{d+t}{n} + \frac{t(d+t)}{n^2}\right].\end{aligned}$$

由于 $t/n \le 1/2$，最后一项被 $K(d+t)/n$ 吸收。若 $d = t = 0$，该位移为零。再计入 Y 与 S/n 之间的 $O(n^{-1})$ 误差，得到统一误差界 $O((d+t+1)^2/n)$。

对 $d, t \ge 0$，以下各项分别都不超过 $\eta = (d+t+1)^2/n$ 的固定倍数：

$$\frac{t+1}{n} \le \eta, \quad \frac{d+t}{n} \le \eta, \quad \frac{(d+t)^2}{n} \le \eta, \quad \frac{t(d+t)}{n} \le \eta, \quad \frac{d^2}{n^2} \le \eta.$$

因此，各对数误差均为 $O(\eta)$。由 $|e^u - 1| \le e^{|u|}|u|$，相对误差也为 $O(\eta)$。□

5. 路径卷积与行列式表示

5.1 正路径卷积

引理 5.1（路径卷积）。

对任意竞赛图，

$$H(T)=\sum_{U\subseteq V(T)}\det(I+A[U])\operatorname{per}A[U^c]. \tag{5.1}$$

证明。

邻接矩阵的永久式计算有向圈覆盖数。卷积式 (5.1)把互补顶点集上的圈覆盖数转换成路径数。它是 Irving 与 Omar 的 Proposition 2 [1] 在竞赛图上的特化，其中补邻接矩阵为 $\overline{A}=J-A=I+A^{\mathsf T}$，包含对角元。

也可用生成函数直接核对。令 $X=\operatorname{diag}(z_1,\dots,z_n)$，即对角元依次为 $z_1,\dots,z_n$、其余元素为零的对角矩阵；一般的 $\operatorname{diag}(v)$ 同样由向量 v 的元素组成对角线。每次访问一个顶点即乘上对应变量，则全部游走的生成函数为

$$1+\mathbf{1}^{\mathsf T}(I-XA)^{-1}X\mathbf{1}=\frac{\det(I+X\overline{A})}{\det(I-XA)}.$$

等号来自秩一行列式引理。取 $z_1\cdots z_n$ 的系数，恰选出全部 Hamilton 路径。对分母，形式恒等式 $\det(I-XA)^{-1}=\exp(\sum_{r\ge1}\operatorname{tr}((XA)^r)/r)$ 表明，其无平方因子单项式（每个变量的指数均为零或一）的系数计算不交有向圈覆盖数，因而等于永久式。再结合分子的主子式展开，得到

$$H(T)=\sum_{U}\det\overline{A}[U]\operatorname{per}A[U^c].$$

代入 $\overline{A}[U]=I+A[U]^{\mathsf T}$ 即得结论。

以 $T[U]$ 表示由顶点集 U 诱导的子竞赛图，令 $k=|U|$。矩阵 $I+A[U]$ 的对称部分为正定矩阵 $(I+J)/2$, 故实特征值均为正, 非实特征值共轭成对, 从而行列式为正。各行平方范数为 $1+d_i^+(T[U])$, 平均值为 $(k+1)/2$。由 Hadamard 不等式及算术—几何平均不等式得

$$0<\det(I+A[U])\le h_k,\qquad h_k=\left(\frac{k+1}{2}\right)^{k/2}.$$

以上证明也说明：迹级数中的 $1/r$ 消去有向圈的起点选择，指数展开中的 $1/h!$ 消去互不相交圈的排列；相交圈产生平方变量，不贡献无平方因子系数。□

引理 5.1a（固定矩与统一尾界）。约定 $h_0=1$，并令

$$w_k=\frac{2^k h_k}{k!}.$$

对任意固定 $c>0$ 和非负整数 r，

$$\sum_{k\ge0}(k+1)^r c^k w_k<\infty.$$

证明。 Stirling 公式给出 $\log(c^k w_k)=-(k/2)\log k+O_c(k)$，其中下标 c 表示隐含常数可依赖预先固定的 c。记 $\lceil x\rceil$ 为不小于 x 的最小整数，对充分大 n 取

$$k_n=\left\lceil\frac{4\log n}{\log\log n}\right\rceil,$$

又由连续项比 $cw_{k+1}/w_k = O_c(k^{-1/2})$，尾和由首项的固定倍数控制，故 $\sum_{k>k_n} c^k w_k = n^{-2+o(1)}$。

使用 [2, Lemma 2.1] 所述的 Brégman 界及 [2, Corollary 2.3] 的度数平衡化，再结合 Stirling 公式，给出统一常数 C，使任意 m 阶竞赛图满足

$$\operatorname{per} A_T \le C\sqrt{m+1}\,\frac{m!}{2^m}.$$

增大 C 后也覆盖 $m = 0$。引理 7.2 将证明含方差修正因子的版本。于是路径卷积中 $|U| > k_n$ 的贡献除以 μ_n 后，至多为

$$B_n := \frac{C}{2}\sqrt{n+1}\sum_{k>k_n} w_k = n^{-3/2+o(1)} = o(n^{-1}).$$

常数 C 绝对，故 B_n 只依赖 n，该界对所有竞赛图一致。□

称 $|U| \le k_n$ 的项为短项；路径卷积中的永久式只需在这些项上精确估计。

5.2 谱因子的出现

先设 $d = o(\sqrt{n})$。由引理 4.5，对 $|U| = k \le k_n$ 有

$$\operatorname{per} A[U^c] = e^{-1} D_n(S)\,\frac{(n-k)!}{2^{n-k}}\left(1 + O\left(\frac{(d+k+1)^2}{n}\right)\right).$$

对整数 $0 \le k \le n$，下降阶乘定义为

$$(n)_k = \prod_{h=0}^{k-1}(n-h),$$

故 $(n)_0 = 1$，且此范围内 $(n)_k > 0$。归一化满足 $((n-k)!/2^{n-k})/\mu_n = 2^{k-1}/(n)_k$。因此，将主项代入引理 5.1，所得归一化总和为

$$\frac{e^{-1}D_n(S)}{2}\sum_{|U|\le k_n}\frac{2^{|U|}}{(n)_{|U|}}\det(I + A[U]),$$

这里的相对误差对竞赛图和 $|U| \le k_n$ 一致。将短和中的 $(n)_k$ 换成 n^k，再补入尾项，得到下述主子式恒等式；相应误差将在第 8.1 节估计。

$$\sum_{U}(2/n)^{|U|}\det(I + A[U]) = \det\left(I + \frac{2}{n}(I + A)\right).$$

由 $2A = J - I + S$，秩一项 J 渐近贡献因子二，标量项贡献 e。更确切地，小度差假设给出

$$\det\left(I + \frac{2}{n}(I + A)\right) = 2e\det(I + S/n)\left(1 + O(n^{-1} + d^2/n^2)\right).$$

永久式估计中的 e^{-1} 来自恢复 $(1-1/n)^{n-k}$，对应零对角线的影响；$1/2$ 则来自上述路径归一化。它们与生成行列式中的 $2e$ 抵消，留下 $D_n(S)\det(I + S/n) = \rho_n(S)$。两个行列式各有来源：前者近似圈覆盖数，后者对路径卷积的权重求和。定理 8.1 将完成误差求和，证明

$$\frac{H(T)}{\mu_n} = \rho_n(S) + O((d+1)^2/n) \qquad \text{当} d = o(\sqrt{n}).$$

为得到全体竞赛图的上界，第 7 节另行处理较大的出度离差平方和及极端度数，并在剩余图类中保留度差修正因子。下面的引理则对每个竞赛图控制同一个谱因子。

6. 谱因子的上界与等号

本节的谱比值上界由 Divoux–Wang [12, 命题 7.1] 根据 Fang–Huang [11] 的比较得到。行列式多项式及圆环切换亦见 [12, 第 7 节及引理 9.1]。下面保留详细推导，并追踪固定基图推论所需的等号条件。

6.1 谱半径与统一粗界

引理 6.1（谱上限）。任意 n 阶竞赛符号矩阵满足

$$\|S\|_{\mathrm{op}} \le \cot\frac{\pi}{2n} < \frac{2n}{\pi}, \qquad \rho_n(S) \le \frac{3n-1}{n+1} < 3.$$

证明。 iS 为 Hermitian 矩阵。对任意复向量 z，同时对 S, z 作带符号置换，使非零坐标相位落在 $[0,\pi)$ 且递增。于是 $c_{ij} = \mathrm{Im}(\overline{z}_i z_j) \ge 0$（$i<j$）。若 T_n^0 是上三角全一的传递符号矩阵，则

$$z^* iSz = -2\sum_{i<j} S_{ij}c_{ij} \le 2\sum_{i<j} c_{ij} = z^*(-iT_n^0)z.$$

取 Rayleigh 商得 $\|S\|_{\mathrm{op}} \le \|T_n^0\|_{\mathrm{op}}$。相邻行的特征方程给出 $(\lambda-1)v_i = (\lambda+1)v_{i+1}$，几何比 $r = (\lambda-1)/(\lambda+1)$ 满足 $r^n = -1$。全部特征值因而为 $i\cot((2j-1)\pi/(2n))$，$1 \le j \le n$，得到所述算子界；$n=1$ 直接验证。

令 $x_j = \lambda_j^2/n^2$，则 $\sum_j x_j = (n-1)/(2n)$。函数 $\phi(x) = \log((1+x)/(1-x))$ 满足 $\phi(0)=0$，且 ϕ' 在 $[0,1)$ 递增，故当 $a,b \ge 0$、$a+b<1$ 时，$\phi(a)+\phi(b) \le \phi(a+b)$。迭代即得

$$\log\rho_n(S) = \sum_{j}\phi(x_j) \le \phi\left(\frac{n-1}{2n}\right),$$

取指数得到粗界。它不使用后面的 Fang–Huang 比较。

传递矩阵的同一特征值计算给出全部偶阶主子式为一、奇阶主子式为零（偶阶正频率按互补角配对，其乘积为一）。因此

$$\det(I + zT_n^0) = \sum_{h=0}^{\lfloor n/2\rfloor}\binom{n}{2h}z^{2h} = \frac{(1+z)^n + (1-z)^n}{2}.$$

□

历史说明。早期路径稿以更弱的谱信息得到常数 $C_* = (3\pi^4+4\pi^2-32)/(\pi^4+4\pi^2-32) > L$。本稿的异常点排除只需上述 $\rho_n<3$；最终上界直接使用命题 6.6 的锐比较，不再以 C_* 作为中间主定理。

6.2 乘积比较与等号条件

定理 6.2 (Fang–Huang).

我们使用 Fang–Huang, Corollary 3.4 的以下形式。令比较矩阵 K_d 为

$$(K_d)_{ij} = \begin{cases} 1, & i+j \le d, \\ 0, & i+j = d+1, \\ (-1)^{i+j-d-2}, & i+j \ge d+2. \end{cases}$$

设 $p \ge 1$，$x \in \mathbb{R}^d$，$S_1,\dots,S_p$ 为 d 阶竞赛符号矩阵。用 x^* 表示将 x 的坐标绝对值按降序排列所得的向量，则

$$(S_1 \cdots S_p x)^* \prec_w K_d^p x^*.$$

右端是非负降序向量。弱主序 $u \prec_w v$ 的含义是

$$\sum_{i=1}^{r} u_i \le \sum_{i=1}^{r} v_i \quad (1 \le r \le d).$$

此外，最外层比较取向量等号时，每个后缀乘积的比较也取向量等号。为将这一结论用于矩阵的 Frobenius 范数，我们先说明弱主序下的平方和比较及其取等条件。

引理 6.3 (弱主序的截断和比较).

记 $(a-t)_+ = \max(a-t, 0)$。对于满足 $u \prec_w v$ 的降序非负向量及 $t \ge 0$,

$$\sum_{i=1}^{d} (u_i - t)_+ = \max_{0 \le r \le d} \left(\sum_{i=1}^{r} u_i - rt \right) \le \max_{0 \le r \le d} \left(\sum_{i=1}^{r} v_i - rt \right) = \sum_{i=1}^{d} (v_i - t)_+.$$

证明。

取 $r = \#\{i : u_i > t\}$ 即得第一个等号：加入不大于 t 的坐标或删去大于 t 的坐标，均不能增大该和。又对 $a \ge 0$,

$$2\int_0^\infty (a-t)_+ \, dt = 2\int_0^a (a-t)\, dt = 2[at - t^2/2]_0^a = a^2.$$

逐坐标积分得到

$$\|u\|_2^2 = 2\int_0^\infty \sum_i (u_i - t)_+ \, dt \le 2\int_0^\infty \sum_i (v_i - t)_+ \, dt = \|v\|_2^2.$$

若平方和相等，函数 $g(t) = \sum_i (v_i - t)_+ - \sum_i (u_i - t)_+$ 连续、非负且积分为零。若某处 $g(t_0) > 0$，则在 t_0 的一个正长度邻域内有 $g(t) > g(t_0)/2$，与积分为零矛盾。因此 $g \equiv 0$。以下 $\#U$ 表示有限集 U 的基数，$\mathbf{1}_{\mathcal{E}}$ 表示条件 $\mathcal{E}$ 的指示函数。比较两边的右导数可得

$$\#\{i : u_i > t\} = \#\{i : v_i > t\} =: N(t).$$

对第 j 个坐标,

$$u_j = \int_0^\infty \mathbf{1}_{\{\#\{i : u_i > t\} \ge j\}} \, dt = \int_0^\infty \mathbf{1}_{\{N(t) \ge j\}} \, dt = v_j.$$

因而平方和取等强制 $u = v$。取 $x = e_j$，由于 $e_j^* = e_1$，得到

$$\|S^p e_j\|_2^2 \le \|K_d^p e_1\|_2^2.$$

并且取等时 $(S^p e_j)^* = K_d^p e_1$。

6.3 比较矩阵的矩

记 $\operatorname{tr} M = \sum_j M_{jj}$。

令 T_d 为传递竞赛图的符号矩阵，其上三角元为 1。令 R_0 为反序置换矩阵，$D_0 = \operatorname{diag}(1, -1, \ldots)$。由 K_d 的定义,

$$(D_0K_dR_0)_{ij}=(-1)^{i-1}(K_d)_{i,d+1-j}=\begin{cases}(-1)^{i-1}, & i<j,\\ 0, & i=j,\\ (-1)^{j}, & i>j.\end{cases}$$

这里 $R_0e_j=e_{d+1-j}$，$(D_0)_{jj}=(-1)^{j-1}$。由于 $(K_d)_{ij}$ 只依赖于 $i+j$，有 $K_d^T=K_d$。

把奇指标升序、偶指标降序所得序列记为

$$(\ell_1,\dots,\ell_d)=(1,3,\dots,d,d-1,d-3,\dots,2),\qquad \Lambda e_j=e_{\ell_j}.$$

这些指标各出现一次，所以 $\Lambda^T\Lambda=\Lambda\Lambda^T=I$，而 $\ell_1=1$。

按这一顺序排列行、列。两个奇指标按升序排列，故相应上三角元为 $(-1)^{i-1}=1$；两个偶指标按降序排列，故相应上三角元为 $(-1)^{j}=1$。奇指标总在偶指标之前，此时无论原指标满足 $i<j$ 还是 $i>j$，相应元素分别为 $(-1)^{i-1}$ 或 $(-1)^{j}$，仍等于 1。因此

$$T_d=\Lambda^TD_0K_dR_0\Lambda.$$

置 $U=D_0\Lambda$。由于 $R_0R_0^T=I$、$\Lambda\Lambda^T=I$、$K_d^T=K_d$，矩阵乘积给

$$\begin{aligned}T_dT_d^T&=\Lambda^TD_0K_dR_0\Lambda\Lambda^TR_0^TK_dD_0\Lambda\\&=\Lambda^TD_0K_d^2D_0\Lambda=U^TK_d^2U.\end{aligned}$$

第一项指标是 1，故 $Ue_1=e_1$。又 $T_d^T=-T_d$，所以

$$T_d^2=-U^TK_d^2U,\qquad T_d^{2p}=(-1)^pU^TK_d^{2p}U$$

（相乘时每两个邻接的 UU^T 都等于 I）。于是

$$(-1)^p(T_d^{2p})_{11}=e_1^TK_d^{2p}e_1=(K_d^pe_1)^T(K_d^pe_1)=\|K_d^pe_1\|_2^2.$$

附录 A.2 给出的带符号循环移位 Z 满足 $Z^TT_dZ=T_d$，从而 $Z^TT_d^{2p}Z=T_d^{2p}$。比较对角元，当 $j<d$ 时有 $(T_d^{2p})_{j+1,j+1}=(T_d^{2p})_{jj}$；当 $j=d$ 时，绕回的两个负号抵消，得到 $(T_d^{2p})_{11}=(T_d^{2p})_{dd}$。于是所有对角元相同，且

$$\begin{aligned}\|T_d^p\|_F^2&=\operatorname{tr}((T_d^p)^TT_d^p)=(-1)^p\operatorname{tr}T_d^{2p}\\&=d(-1)^p(T_d^{2p})_{11}=d\|K_d^pe_1\|_2^2.\end{aligned}$$

现在对上一节的 d 个列不等式求和：

$$\|S^p\|_F^2=\sum_{j=1}^{d}\|S^pe_j\|_2^2\le d\|K_d^pe_1\|_2^2=\|T_d^p\|_F^2\qquad(p\ge1).$$

特别地，该不等式对下一节所需的每个奇数 p 都成立。

6.4 谱比值的极值

设 S 为任意 d 阶竞赛符号矩阵，其非零特征值为 $\pm i\lambda_j$，其中 $\lambda_j>0$，并令 $x_j=\lambda_j^2/d^2$。由 $2\sum_j \lambda_j^2=\|S\|_F^2=d(d-1)$，有 $x_j\le (d-1)/(2d)<1/2$。在反对称标准形中，零块对两个行列式均贡献 1，非零二维块分别贡献 $1+x_j$ 和 $1-x_j$。因此

$$\det(I+S/d)=\prod_{j}(1+x_j),\qquad \det(I+iS/d)=\prod_{j}(1-x_j)>0.$$

在 $0\le x<1$ 上，将几何级数积分，

$$\begin{aligned}\log\frac{1+x}{1-x}&=\int_0^x\left(\frac{1}{1+t}+\frac{1}{1-t}\right)dt\\&=2\int_0^x\frac{dt}{1-t^2}=2\sum_{r=0}^{\infty}\int_0^x t^{2r}\,dt=2\sum_{r=0}^{\infty}\frac{x^{2r+1}}{2r+1}.\end{aligned}$$

积分交换可由 $[0,x]$ 上几何级数的一致收敛保证。反对称标准形还给 $\|S^p\|_F^2=2\sum_j\lambda_j^{2p}$。逐项代入，

$$\begin{aligned}\log\rho_d(S)&=2\sum_{j}\sum_{r=0}^{\infty}\frac{\lambda_j^{4r+2}}{(2r+1)d^{4r+2}}\\&=\sum_{r=0}^{\infty}\frac{\|S^{2r+1}\|_F^2}{(2r+1)d^{4r+2}}\le\sum_{r=0}^{\infty}\frac{\|T_d^{2r+1}\|_F^2}{(2r+1)d^{4r+2}}=\log\rho_d(T_d).\end{aligned}$$

令 $r_d=\rho_d(T_d)$。若上述不等式取等，则各项的非负差均为零。取 $r=1$，得到 $\|S^3\|_F^2=\|T_d^3\|_F^2$。又因为这一差等于各列非负差之和，每一列也取等。由第 6.2 节的取等条件及 Fang–Huang 的后缀等号结论，

$$(S^3e_j)^*=K_d^3e_1,\qquad (S^2e_j)^*=K_d^2e_1.$$

对后一式求平方和并按 j 求和，

$$\operatorname{tr}S^4=\|S^2\|_F^2=d\|K_d^2e_1\|_2^2=\|T_d^2\|_F^2=\operatorname{tr}T_d^4.$$

由附录 A.3，四次矩取等当且仅当 $S=\Omega^TT_d\Omega$，其中 Ω 为带符号置换矩阵。反之，由 $\Omega^T\Omega=I$ 可得

$$I+tS=\Omega^T(I+tT_d)\Omega,\qquad \det(I+tS)=(\det\Omega)^2\det(I+tT_d)=\det(I+tT_d).$$

引理 6.4 (谱比值及等号条件).
分别取 $t=1/d$ 和 $t=i/d$，得到 $\rho_d(S)=r_d$。因此

$$\rho_d(S)\le r_d,\quad \text{等号当且仅当}S=\Omega^TT_d\Omega.$$

证明 (正则情形的普通同构分类).
写 $\Omega=D_\varepsilon P$，其中 P 为置换矩阵，$D_\varepsilon=\operatorname{diag}(\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_d)$，$\varepsilon_i\in\{-1,1\}$。记 $\varepsilon=(\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_d)^T$，则

$$S=P^TD_\varepsilon T_dD_\varepsilon P,\qquad PSP^T=D_\varepsilon T_dD_\varepsilon.$$

用 P 重编号后，仍记所得矩阵为 S。正则性给出 $S\mathbf{1}=0$，再由 $D_\varepsilon^2=I$ 得




图 3: 将 Car_5 中集合 $U=\{1,2\}$ 与其补集之间的边全部反向，得到传递次序 $(3,1,4,2,0)$。圈出的顶点属于 U。这一切换对应符号矩阵的共轭 $S\mapsto DSD$，因而保持谱比值；它一般不保持 Hamilton 路径数。

$$D_\varepsilon T_d\varepsilon=0,\qquad T_d\varepsilon=0.$$

第 i 行与第 $i+1$ 行的差只有第 $i,i+1$ 列各为 1，因此

$$0=(T_d\varepsilon)_i-(T_d\varepsilon)_{i+1}=\varepsilon_i+\varepsilon_{i+1}.$$

因此 $\varepsilon_i=(-1)^{i-1}\varepsilon_1$。整体符号 ε_1 在 $D_\varepsilon T_d D_\varepsilon$ 中抵消，所得矩阵恰为交替切换。附录 A.2 证明它与 Car_d 同构，故正则图中仅圆环图取等。

6.5 六次矩的严格间隙

$\binom{n}{k}=n!/(k!(n-k)!)$，$k>n$ 时为 0。

引理 6.5 (六次矩的严格亏损).

若正则 S 不普通同构于圆环，上一节的等号推演给

$$\Delta_3:=\|T_d^3\|_F^2-\|S^3\|_F^2>0.$$

证明。

在模 2 意义下 $S\equiv J+I$，并且 $J^2=dJ$、$J^3=d^2J$，所以

$$S^3\equiv(J+I)^3=I+3J+3dJ+d^2J\equiv I+(1+d+d^2)J\equiv I+J\pmod 2.$$

最后一步使用 $d(d+1)$ 为偶数。又 $(S^3)^T=-S^3$，故其对角为 0、非对角为奇数。若 $z=2k+1$，

$$z^2=4k(k+1)+1\equiv 1\pmod 8.$$

将反对称位置成对求和，

$$\|S^3\|_F^2=2\sum_{i<j}((S^3)_{ij})^2\equiv 2\binom{d}{2}=d(d-1)\pmod{16}.$$

此式也适用于 T_d。因此 Δ_3 是正的 16 的整数倍，$\Delta_3 \ge 16$。在对数级数中只保留 $r=1$ 项，

$$\log \frac{r_d}{\rho_d(S)} \ge \frac{\Delta_3}{3d^6} \ge \frac{16}{3d^6}.$$

两边取指数，再移项，

$$\rho_d(S) \le r_d e^{-16/(3d^6)}, \qquad r_d - \rho_d(S) \ge r_d(1-e^{-16/(3d^6)}) > 0.$$

这个间隙取决于基图阶数 d；相应的块阶阈值将在第 11.7 节由极限比较得到。

6.6 全阶数谱比较

命题 6.6。 对每个 $n \ge 2$ 及每个 n 阶竞赛符号矩阵，$\rho_n(S) \le r_n = L + O(n^{-1})$，其中隐含常数为绝对常数。

证明。

第 6 节的正则等号分类只涉及奇阶图，但在它之前的谱不等式不要求正则性。为使全阶数应用明确，令 $n \ge 2$，将第 6.3 节的排列写为 “全部奇指标递增，再接全部偶指标递减”。奇阶时这是原排列；偶阶时则为 $(1,3,\dots,n-1,n,n-2,\dots,2)$。相应逐元素等式仍给出

$$T_n = \Lambda^T D_0 K_n R_0 \Lambda, \qquad T_n^2 = -U^T K_n^2 U, \qquad U = D_0 \Lambda, \qquad U e_1 = e_1.$$

带负绕回移位满足 $Z^T T_n Z = T_n$，也不依赖奇偶性。因此 T_n^{2p} 的全部对角元相同。对任意整数 $p \ge 1$，Fang–Huang 的逐列比较与这些恒等式给出

$$\|S^p\|_F^2 \le n \|K_n^p e_1\|_2^2 = \|T_n^p\|_F^2.$$

将它代入第 6.4 节绝对收敛的对数级数，即得对每个阶数

$$\log \rho_n(S) = \sum_{r \ge 0} \frac{\|S^{2r+1}\|_F^2}{(2r+1) n^{4r+2}} \le \log \rho_n(T_n).$$

附录 A.1 的行列式多项式对奇偶阶数同样成立，所以

$$\rho_n(S) \le r_n = \frac{(1+1/n)^n + (1-1/n)^n}{(1+i/n)^n + (1-i/n)^n} = L + O(n^{-1}).$$

最后一步可由第 8.2 节的复指数估计直接得到：对 $z \in \{1,-1,i,-i\}$，$n \log(1+z/n) = z + O(n^{-1})$，分母趋于 $2\cos 1 > 0$，故商的误差也是 $O(n^{-1})$。这些估计只含阶数 n，不含图的选择。

□

7. 全体竞赛图的路径上界

使用度数方差记号

$$V_{\deg}(T) = \sum_{i} \left(d_i^+ - \frac{n-1}{2} \right)^2 = \frac{1}{4} \|S\mathbf{1}\|_2^2, \qquad \tau = \frac{4 V_{\deg}(T)}{(n-1)^2}.$$

证明分为三种情形。若 $V_{\deg}(T) \ge 16 n^2 \log n$，Brégman 不等式中的方差修正因子使路径数可以忽略。否则，度数落在 $[(n-1)/20, 19(n-1)/20]$ 之外的顶点至多有 $O(\log n)$ 个。若存在这样的顶点，将它们与其余部分分离后，可得路径数低于随机期望。剩余竞赛图的归一化度差与 ± 1 保持固定距离，且 $\tau = O(\log n)$。对它们，下面的永久式估计保留因子 $e^{-\tau}$，从而将最终误差控制到 $O(n^{-1})$。

本节中的 K 可以在不同位置增大；固定上述度数阈值后，它是绝对常数。第 5.1 节已将长项控制为 $o(n^{-1})\mu_n$，故这里只估计短项 $|U| \le k_n$。

命题 7.1（统一路径上界）。存在绝对常数 K, n_0，使任意 $n \ge n_0$ 及 n 阶竞赛图 T 满足

$$H(T) \le (L + K/n)\mu_n.$$

三类图所需精度不同：高方差类只需 $o(n^{-1})$，异常点类只需低于随机基线 1，剩余类才承担统一的 $L + O(n^{-1})$。以下依次实现这三个目标。

7.1 非主永久式估计的应用

第 4.4 节的非主永久式界适用于不同的行、列删集。以下用它控制异常顶点与核心之间的跨边；当两删集相同时，所得度差乘积将保留在路径卷积之外。

7.2 较大的出度离差平方和

引理 7.2（含方差修正因子的永久式界）。

存在绝对常数 K，使每个 $m \ge 1$ 阶竞赛图 Q，若其出度为 d_i，度数方差为 $V_{\deg}(Q) = \sum_i (d_i - (m-1)/2)^2$，则满足

$$\operatorname{per} A_Q \le K\sqrt{m+1}\,\frac{m!}{2^m}\exp\left(-\frac{V_{\deg}(Q)}{8m^2}\right).$$

证明。

利用行度数因子的凹性，可以加强 Brégman 界 [2]。若某个 $d_i = 0$，上界显然成立。否则，对正整数定义 $f(k) = \log(k!)/k$。直接计算得，对 $k \ge 2$,

$$2f(k) - f(k-1) - f(k+1) = \frac{2[\log k - f(k-1)] - k\log(1+1/k)}{k(k+1)}.$$

对 $1, \dots, k-1$ 使用算术—几何平均不等式, 得到 $\log k - f(k-1) \ge \log 2$。又有 $(1+1/k)^k < e < 3$, 故分子至少为 $\log(4/3) \ge 1/4$。因此，在度数区间 $[1, m-1]$ 上，整数点函数 $f(k) + k^2/(8m^2)$ 的分段线性插值是凹函数。对平均值 $\eta = (m-1)/2$ 使用 Jensen 不等式得

$$\sum_i f(d_i) \le m\widetilde{f}(\eta) - \frac{V_{\deg}(Q)}{8m^2} + \frac{1}{32m},$$

其中 $\widetilde{f}$ 为线性插值。最后一项处理半整数均值；整数均值时可省去。Stirling 公式给出

$$\exp(m\widetilde{f}(\eta)) \le K\sqrt{m+1}\,\frac{m!}{2^m}.$$

结合 Brégman 的行度数上界，即得方差估计。

下面将此界用于每个短删集对应的竞赛图。为此，需要确认删点后方差仍然足够大。

删去大小为 k 的集合 U 后，每个剩余顶点的中心化度数改变至多 $k/2$；被删除的原平方偏差之和至多为 $kn^2/4$。对交叉项使用 Cauchy–Schwarz 不等式，得到

$$V(T-U) \ge V_{\deg}(T) - \frac{kn^2}{4} - k\sqrt{nV_{\deg}(T)}.$$

若 $V_{\deg}(T) \ge 16n^2\log n$，则对所有 $k \le k_n$ 一致有

$$V(T-U) \ge (1 - o(1))V_{\deg}(T).$$

于是每个短永久式的方差修正因子至多为 $n^{-2+o(1)}$；前面的 $\sqrt{n}$ 因子可被吸收。按可求和的行列式权重求和，归一化短项总贡献至多为 $n^{-3/2+o(1)}$。加上长删集尾项，得到对该类图统一成立的结论

$$V_{\deg}(T) \ge 16n^2 \log n \quad \Longrightarrow \quad H(T)/\mu_n = o(1/n).$$

记 $L_k = \log(k!)$，则

$$\begin{aligned} 2f(k) - f(k-1) - f(k+1) &= \frac{2(L_{k-1} + \log k)}{k} - \frac{L_{k-1}}{k-1} - \frac{L_{k-1} + \log k + \log(k+1)}{k+1} \\ &= \frac{2\log k - 2L_{k-1}/(k-1) - k\log(1+1/k)}{k(k+1)}. \end{aligned}$$

AM–GM 给出

$$((k-1)!)^{1/(k-1)} \le \frac{1 + \cdots + (k-1)}{k-1} = k/2,$$

因此 $\log k - f(k-1) \ge \log 2$。又 $k\log(1+1/k) < 1 < \log 3$，以及

$$\log(4/3) = \int_1^{4/3} \frac{du}{u} \ge \frac{1/3}{4/3} = \frac{1}{4}.$$

故二阶差至少为 $1/[4k(k+1)] \ge 1/(4m^2)$。令 $h(k) = f(k) + k^2/(8m^2)$，则

$$2h(k) - h(k-1) - h(k+1) \ge \frac{1}{4m^2} - \frac{2}{8m^2} = 0.$$

若 η 为整数，$\widetilde{h}(\eta) = \widetilde{f}(\eta) + \eta^2/(8m^2)$；若 $\eta = k + 1/2$，则

$$\frac{k^2 + (k+1)^2}{2} = \eta^2 + \frac{1}{4}, \quad \widetilde{h}(\eta) = \widetilde{f}(\eta) + \frac{\eta^2 + 1/4}{8m^2}.$$

因此 Jensen 不等式给出

$$\begin{aligned} \sum_i f(d_i) + \frac{\sum_i d_i^2}{8m^2} = \sum_i h(d_i) &\le m\widetilde{h}(\eta) \\ &\le m\widetilde{f}(\eta) + \frac{m\eta^2}{8m^2} + \frac{1}{32m}, \\ \sum_i f(d_i) &\le m\widetilde{f}(\eta) - \frac{\sum_i (d_i - \eta)^2}{8m^2} + \frac{1}{32m}. \end{aligned}$$

对于 $m = 2r+1$，Stirling 的对数形式给出

$$mf(r) = \frac{2r+1}{r}\left[r\log r - r + \tfrac{1}{2}\log(2\pi r) + O(1/r)\right],$$

$$\log(m!/2^m) = m\log(m/2) - m + \tfrac{1}{2}\log(2\pi m) + O(1/m).$$

相减并用 $r = (m-1)/2$，得到 $\frac{1}{2}\log m + O(1)$。对于 $m = 2r$，$\widetilde{f}(\eta) = [f(r-1) + f(r)]/2$，分别使用同一公式得到相同差值。故指数化后得到 $K\sqrt{m+1}$。有 $d_i = 0$ 时永久式每项均有零因子；$m = 1, 2$ 直接并入常数。

写 $b_i = d_i^+ - (n-1)/2$。对保留顶点，令 e_i 为其指向 U 的边数，则

$$b_i' = d_i^+ - e_i - (n-k-1)/2 = b_i + \delta_i, \qquad \delta_i = k/2 - e_i, \quad |\delta_i| \le k/2.$$

所以

$$\begin{aligned} V(T-U) &= \sum_{i\notin U} (b_i+\delta_i)^2 \\ &\ge V_{\deg}(T) - \sum_{i\in U} b_i^2 - 2\left|\sum_{i\notin U} b_i\delta_i\right| \\ &\ge V_{\deg}(T) - kn^2/4 - k\sum_{i\notin U}|b_i| \\ &\ge V_{\deg}(T) - kn^2/4 - k\sqrt{nV_{\deg}(T)}. \end{aligned}$$

在 $V \ge 16n^2\log n$ 时，相对损失分别至多为

$$\frac{k}{64\log n} = o(1), \qquad k\sqrt{n/V} \le \frac{k}{4\sqrt{n\log n}} = o(1).$$

于是 $V(T-U)/(8(n-k)^2) \ge (2-o(1))\log n$，罚项为 $n^{-2+o(1)}$，再乘 $\sqrt{n}$ 及 $\sum_k w_k < \infty$ 即得 $n^{-3/2+o(1)}$。

为估计方差界中的阶乘因子，使用附录 B.3 的 Stirling 公式。记其中的常数为 c，则

$$f(r) = \log r - 1 + \frac{\log r}{2r} + \frac{c}{r} + O(r^{-2}).$$

先取 $m = 2r+1$，平均出度为整数 r。乘以 m：

$$mf(r) = m\log r - m + \left(1+\frac{1}{2r}\right)\log r + 2c + \frac{c}{r} + O(r^{-1}).$$

自然尺度的对数为

$$\log(m!/2^m) = m\log(m/2) - m + \frac{1}{2}\log m + c + O(m^{-1}).$$

相减后记作 Δ_m：

$$\begin{aligned} \Delta_m &= m\log\frac{2r}{m} + \log r - \frac{1}{2}\log m + c + O(\log m/m) \\ &= m\log(1-1/m) + \frac{1}{2}\log m - \log 2 + \log(1-1/m) + c + O(\log m/m). \end{aligned}$$

$m\log(1-1/m) = -1 + O(1/m)$，其余未含 $\frac{1}{2}\log m$ 的项一致有界，故 $\Delta_m \le \frac{1}{2}\log m + K$。

再取 $m = 2r$、$r \ge 2$，平均为 $r - 1/2$，线性插值得

$$m\widetilde{f}((m-1)/2) = r[f(r-1) + f(r)].$$

逐项代入：

$$\begin{aligned} r[f(r-1)+f(r)] &= r\log(r-1) + r\log r - 2r \\ &\quad + \frac{r}{2(r-1)}\log(r-1) + \frac{1}{2}\log r \\ &\quad + c\frac{r}{r-1} + c + O(r^{-1}). \end{aligned}$$




图 4: 一个永久式项中的有向五圈及其行列匹配。灰色顶点组成异常集 $F = \{f_1, f_2\}$。跨块边占用核心行 $I = \{x_2, x_3\}$ 和核心列 $J = \{x_1, x_3\}$，留下粗边所示的非主子矩阵项 $A[x_1, x_2]$。图中只画出这个永久式项的边。

减去 $\log((2r)!/2^{2r}) = 2r\log r - 2r + \frac{1}{2}\log(2r) + c + O(r^{-1})$，得

$$\Delta_{2r} = r\log(1 - 1/r) + \frac{r}{2(r-1)}\log(r-1) - \frac{1}{2}\log 2 + c\frac{r}{r-1} + O(r^{-1}).$$

第一项不大于零。第二项满足

$$\frac{r}{2(r-1)}\log(r-1) \le \frac{1}{2}\log r + \frac{\log r}{2(r-1)} \le \frac{1}{2}\log r + \frac{1}{2},$$

其中 $\log r \le r - 1$。常数项 $cr/(r-1)$ 绝对值至多 $2|c|$。所以仍有 $\Delta_m \le \frac{1}{2}\log m + K$。两类均指数化得到

$$\exp(m\widetilde{f}((m-1)/2)) \le e^K\sqrt{m}\, m!/2^m.$$

有限个不在展开范围内的 m 由增大同一个 K 覆盖。□

7.3 异常顶点

下面假设 $V_{\deg}(T) < 16n^2\log n$。定义异常集

$$F = \left\{ i : \frac{d_i^+}{n-1} \notin [1/20, 19/20] \right\}, \qquad f = |F|, \qquad M = T - F, \qquad N = n - f.$$

每个异常顶点向 $V_{\deg}(T)$ 贡献至少某个固定正倍数的 n^2，故 $f = O(\log n)$。非异常顶点的原度差绝对值至多为 $0.9(n-1)$；删去 F 改变它至多 f。因此，对所有充分大的 n 一致有

$$\max_i |(S_M\mathbf{1})_i/(N-1)| < 0.95, \qquad \tau_M = O(\log n).$$

对度差平方和，使用 $\|S_M\mathbf{1}\|_2 \le \|S\mathbf{1}\|_2 + f\sqrt{N}$，再除以 $N-1$。进一步删除短核心子集后，同一论证仍然适用。在这些删除中始终保留原异常集 F，因此常数可以统一选取。

先按圈覆盖在 F 与核心 M 之间的连接方式估计 per A_T。异常顶点在某个方向上的邻居很少。圈覆盖需要使用两个方向的边，除非将该顶点匹配到 F 内部；后一种选择会产生 $1/N$ 量级的代价。使用引理 4.4 的核心成对权重 ℓ, r，它们的总偏移满足

$$\sum_{i\in M} |\ell_i - 1| + \sum_{i\in M} |r_i - 1| \le K\sqrt{N\log n}.$$

对 $x \in F$，记 $q_x = N^{-1}|\{j \in M : x \to j\}|$。它到 $[0,1/20]\cup[19/20,1]$ 的距离为 $O(f/n)$。两侧带权跨边邻居之和分别由 $N(q_x+\beta)$ 和 $N(1-q_x+\beta)$ 控制，其中 $\beta = O(\sqrt{\log n/n})$。置

$$u_x = 2(q_x+\beta), \qquad v_x = 2(1-q_x+\beta).$$

可对全部 x 统一选取

$$u_x v_x \le c_n = 19/100 + o(1), \qquad u_x, v_x \le L_n = 2 + o(1).$$

按排列在 F 内部使用的边分解永久式。若内部有 s 条边，其行集 R 和列集 C 均有 s 个点；每个跨边方向恰有 $t = f - s$ 条边。核心行、列删集 I, J 均有 t 个点，但不必相同。精确四块展开为

$$\operatorname{per} A_T = \sum_{s=0}^{f} \sum_{\substack{R,C\subseteq F\\ |R|=|C|=s}} \sum_{\substack{I,J\subseteq M\\ |I|=|J|=f-s}} \operatorname{per} A[R,C]\ \operatorname{per} A[F\setminus R, J]\ \operatorname{per} A[I, F\setminus C]\ \operatorname{per} A[M\setminus I, M\setminus J].$$

每个有贡献的排列被唯一分类。先对核心永久式使用引理 4.4 的一致上界，再分离两个跨边求和。删除核心行产生 ℓ_i，删除核心列产生 r_j。固定 R, C，向外跨边求和精确等于

$$\begin{aligned}&\sum_{\substack{J\subseteq M\\ |J|=t}} \operatorname{per} A[F\setminus R, J] \prod_{j\in J} r_j \\ &= \sum_{\phi: F\setminus R \hookrightarrow M} \prod_{x\in F\setminus R} A_{x,\phi(x)} r_{\phi(x)} \le \prod_{x\in F\setminus R} \sum_{j\in M} A_{xj} r_j.\end{aligned}$$

独立地，向内跨边求和为

$$\begin{aligned}&\sum_{\substack{I\subseteq M\\ |I|=t}} \operatorname{per} A[I, F\setminus C] \prod_{i\in I} \ell_i \\ &= \sum_{\psi: F\setminus C \hookrightarrow M} \prod_{y\in F\setminus C} A_{\psi(y),y} \ell_{\psi(y)} \le \prod_{y\in F\setminus C} \sum_{i\in M} A_{iy}\ell_i.\end{aligned}$$

其中 $\hookrightarrow$ 表示单射。每个单射由其像集及相应永久式项恰好计数一次，没有额外的 $t!$ 因子。像集 I, J 不必相等，也不必不交，因为它们分别属于核心的行、列副本。所有因子非负，故可去掉单射限制。两个上界的乘积为

$$N^{2t}2^{-2t}\left(\prod_{x\notin R} u_x\right)\left(\prod_{y\notin C} v_y\right).$$

异常内部永久式至多为 $s!$。除以 $n!/2^n$ 后，阶乘与二的幂合并为

$$2^s N^{2t}\frac{(N-t)!}{(N+f)!}=\left(\frac{2}{N}\right)^s\exp(O(f^2/N)).$$

这里 $N+f-(N-t)=f+t=2f-s$，故阶乘比贡献 $N^{-(2f-s)}\exp(O(f^2/N))$，再乘 N^{2t} 后恰留下 N^{-s}。

令 $h=|R\cap C|$。成对乘积满足

$$\left(\prod_{x\notin R}u_x\right)\left(\prod_{y\notin C}v_y\right)\le c_n^{f-2s}L_n^{2s}(c_n/L_n^2)^h\le c_n^{f-2s}L_n^{2s}.$$

第一个不等式由分别统计出现两个、一个及零个因子的顶点数得到；即使 $f-2s$ 为负，它仍正确。引理 4.4 的误差在 $t\le f=O(\log n)$ 内统一为 $o(1)$，其因子 $\Gamma\le 1$ 可舍去。由 $\binom{f}{s}^2 s!\le f^{2s}/s!$，求和可得

$$\frac{\operatorname{per}A_T}{n!/2^n}\le(1+o(1))e^{-1}D_N(S_M)c_n^f\exp(O(f^2/N))\exp\left(\frac{2L_n^2f^2}{c_n^2N}\right).$$

其中额外指数均为 $o(1)$。具体地，删除短核心子集 U 后，核心阶数为 $N'=n-f-|U|\sim n$（即 $N'/n\to1$），异常集合仍取原来的 F。核心的归一化度差最终仍不超过 0.95，归一化度差平方和为 $O(\log n)$，而跨边删集大小为 $t\le f=O(\log n)$。因此引理 4.4 中的误差指数为

$$O\left(\frac{(\log n)^{3/2}}{\sqrt{n}}+\frac{(\log n)^2}{n}\right)=o(1),$$

其中常数与 U,I,J 无关。跨边邻点比例相较于原始全图仅改变 $O((f+|U|)/n)$，权重的一范数位移仍为 $O(\sqrt{n\log n})$，故前述跨边求和估计也一致成立。此时核心高斯因子改变为原来的 $\exp(O(|U|/n))$ 倍：对 S_M/N 使用高斯删行列引理，对数损失为 $O(|U|/n)$；将归一化尺度从 N 改为 $N-|U|$ 也产生同阶误差。

在路径卷积中，大小为 k 且与 F 相交的子集占比至多为 fk/n。通用永久式界因而使其全部归一化短项贡献至多为

$$K\frac{f}{\sqrt{n}}\sum_k kw_k=o(1).$$

对包含于核心的子集，恢复下降阶乘后，对正主子式求和。任意核心阶数 $N\le n$ 均满足由秩一行列式恒等式给出的界

$$\det\left(I_N+\frac{2}{n}(I_N+A_M)\right)\le 2e\det(I_N+S_M/N).$$

证明时先提出 $(1+1/n)^N\le e$。剩余全一秩一因子至多为 $1+N/(n+1)<2$，因为 $I+S_M/(n+1)$ 的逆矩阵的实二次型至多为向量范数的平方。最后，反对称频率行列式乘积在尺度从 $1/(n+1)$ 增至 $1/N$ 时单调增大。

短子集的下降阶乘恢复带来 $\exp(O(k_n^2/n))=1+o(1)$。由于最终 $c_n<1/4$，上述统一估计给出

$$\frac{H(T)}{\mu_n}\le(1/4)^f\rho_N(S_M)+o(1)\le 3/4+o(1)<1,\qquad f\ge1.$$

由于 $P(n)\ge\mu_n$，充分大阶数时，含异常顶点的图不能达到最大路径数。还可将上界放宽为 $(10/3)4^{-f}(1+\varepsilon_n)$：这里计入的是删集与 F 不相交的短卷积项；其余短项和长项合计记为 δ_n。于是

$$\frac{H(T)}{\mu_n} \le \frac{10}{3}4^{-f}(1+\varepsilon_n)+\delta_n, \qquad \varepsilon_n,\delta_n \longrightarrow 0. \tag{7.1}$$

两个误差均在上述低方差图类上一致趋于零。取 n 充分大，使 $1+\varepsilon_n \le 21/20$，并使与 F 相交的短项及长项各不超过 $1/25$。当 $f \ge 1$ 时，式 (7.1)给出

$$\frac{10}{3}\cdot\frac{1}{4}\cdot\frac{21}{20}+\frac{1}{25}+\frac{1}{25}=\frac{191}{200}<1.$$

两种选择均不影响最终上界常数。

异常点满足

$$|d_i^+-(n-1)/2|>\frac{9}{20}(n-1), \quad f\frac{81}{400}(n-1)^2 \le V_{\deg}(T)<16n^2\log n,$$

故 $f<(6400/81)(n/(n-1))^2\log n$。对核心，

$$\max_i |s_i^M| \le 0.9(n-1)+f, \quad \frac{0.9(n-1)+f}{n-f-1}\longrightarrow 0.9,$$

$$\tau_M \le \frac{2\|s\|_2^2+2f^2N}{(N-1)^2}=O(\log n)+O((\log n)^2/n)=O(\log n).$$

因为 $|\ell_i-1|\le |a_i|/(1-b)$、$|r_i-1|\le |a_i|/(1-b)$，

$$\sum_i(|\ell_i-1|+|r_i-1|)\le \frac{2}{1-b}\sum_i|a_i|\le \frac{2}{1-b}\sqrt{N\tau_M}=O(\sqrt{N\log n}).$$

这使任意邻居子集的加权计数与普通计数相差至多上述总偏移。具体地，

$$\sum_j A_{xj}r_j \le Nq_x+K\sqrt{N\log n}, \quad \sum_i A_{ix}\ell_i \le N(1-q_x)+K\sqrt{N\log n}.$$

当 $q\in[0,1/20]\cup[19/20,1]$ 时，$4q(1-q)\le 4(1/20)(19/20)=19/100$；邻居比例的 $O(f/n)$ 扰动与 $\beta=o(1)$ 扰动共同给出 $u_xv_x\le 19/100+o(1)$。

四块展开中 $t=f-s$；依次取异常内部 s 条边、异常到核心 t 条边、核心到异常 t 条边、核心内部 $N-t$ 条边，总数

$$s+t+t+(N-t)=N+f=n.$$

永久式展开没有符号，分类后每个排列只出现一次。全部二次幂及阶乘因子为

$$\frac{[(N-t)!/2^{N-t}]\,[N^{2t}/2^{2t}]}{(N+f)!/2^{N+f}}=2^{f-t}N^{2t}\frac{(N-t)!}{(N+f)!}=2^sN^{2t}\frac{(N-t)!}{(N+f)!}.$$

由于

$$\frac{(N-t)!}{(N+f)!}=\prod_{h=-t+1}^{f}\frac{1}{N+h}=N^{-(f+t)}\exp\left(-\sum_{h=-t+1}^{f}\log(1+h/N)\right),$$

且 $\sum|h|/N=O(f^2/N)$，上式变为

$$2^sN^{2t-(f+t)}e^{O(f^2/N)}=(2/N)^se^{O(f^2/N)}.$$

若 $h=|R\cap C|$，同时出现 u,v 两因子的顶点数为 $f-2s+h$，只出现一个因子的顶点数为 $2s-2h$；于是

$$c_n^{f-2s+h}L_n^{2s-2h}=c_n^{f-2s}L_n^{2s}(c_n/L_n^2)^h\le c_n^{f-2s}L_n^{2s}.$$

全部内部边选择的求和为

$$\begin{aligned}\sum_{s=0}^{f}\binom{f}{s}^2 s!(2/N)^s c_n^{f-2s}L_n^{2s}&\le c_n^f\sum_{s=0}^{f}\frac{1}{s!}\left(\frac{2L_n^2f^2}{c_n^2N}\right)^s\\&\le c_n^f\exp\left(\frac{2L_n^2f^2}{c_n^2N}\right).\end{aligned}$$

以下 $\#E$ 与 $|E|$ 均表示有限集合 E 的元素数。$k=0$ 时删集不与异常集相交，所占比例为零；对 $1\le k\le n$，该比例满足

$$\frac{\#\{U:|U|=k,U\cap F\neq\varnothing\}}{\binom{n}{k}}\le\sum_{x\in F}\frac{\binom{n-1}{k-1}}{\binom{n}{k}}=fk/n.$$

乘通用卷积权重 $K\sqrt{n}\,w_k$ 后总和为 $Kf\sum_k kw_k/\sqrt{n}=o(1)$。

令 $Q=S_M/(n+1)$，$v=\mathbf{1}_N$，则

$$\det\left(I_N+\frac{2}{n}(I_N+A_M)\right)=(1+1/n)^N\det(I_N+Q)\left[1+\frac{1}{n+1}v^{\mathsf T}(I_N+Q)^{-1}v\right].$$

利用 $(I+Q)^{-1}=(I-Q)(I-Q^2)^{-1}$ 及反对称二次型为零，

$$v^{\mathsf T}(I+Q)^{-1}v=v^{\mathsf T}(I+Q^{\mathsf T}Q)^{-1}v\le\|v\|_2^2=N.$$

又 $(1+1/n)^N\le e^{N/n}\le e$，并且

$$\det(I+S_M/(n+1))=\prod_j\left(1+\frac{\lambda_j^2}{(n+1)^2}\right)\le\prod_j\left(1+\frac{\lambda_j^2}{N^2}\right).$$

三项分别由 e、$\det(I+S_M/N)$ 和 2 控制。再乘永久式中的 $e^{-1}/2$，得到 $\rho_N(S_M)$。上述异常集估计中的常数满足

$$\frac{10}{3}\frac{1}{4}\frac{21}{20}=\frac{7}{8}=\frac{175}{200},\qquad\frac{1}{25}+\frac{1}{25}=\frac{16}{200},\qquad\frac{175+16}{200}=\frac{191}{200}.$$

设删去异常点和短集后，每个异常点的核心邻居比例距 $[0,1/20]\cup[19/20,1]$ 至多为 ϵ_n，其中 $\epsilon_n=O((f+k_n)/n)$。对 $q\in[0,1]$，函数 $q(1-q)$ 的导数绝对值至多一。因此

$$q_x(1-q_x)\le\frac{19}{400}+\epsilon_n.$$

用同一个非负权重偏移 $\beta_n=O(\sqrt{\log n/n})$，

$$\begin{aligned}u_xv_x&=4(q_x+\beta_n)(1-q_x+\beta_n)\\&=4q_x(1-q_x)+4\beta_n+4\beta_n^2\\&\le\frac{19}{100}+4\epsilon_n+4\beta_n+4\beta_n^2=:c_n.\end{aligned}$$

而 $u_x, v_x \le 2 + 2\beta_n =: L_n$。因 $\epsilon_n, \beta_n \to 0$，可先选统一阈值使

$$4\epsilon_n + 4\beta_n + 4\beta_n^2 < \frac{6}{100}, \qquad c_n < \frac{1}{4}.$$

上述额外指数的每一项也都趋于零：

$$\frac{f^2}{N} = O((\log n)^2/n) \to 0, \quad \frac{2L_n^2 f^2}{c_n^2 N} = O((\log n)^2/n) \to 0.$$

引理 4.4 的误差项在 $\tau \le A\log n, t \le B\log n$ 时分别至多为常数乘

$$\frac{\log n + (\log n)^2}{n}, \quad \frac{(\log n)^{3/2}}{\sqrt{n}}, \quad \sqrt{\frac{\log n}{n}}, \quad \frac{\log n + 1}{n}, \quad \frac{(\log n)^{3/2}}{\sqrt{n}}, \quad \frac{(\log n)^2}{n}.$$

上述常数均与竞赛图及删集无关，故所得 $o(1)$ 误差也是一致的。

7.4 剩余图类中的度差修正因子

命题 7.3（度差敏感的统一计数界）。固定绝对常数 K_0。存在常数 K_1, n_0（只依赖 K_0），使每个 $n \ge n_0$ 及满足 $\|a\|_\infty \le 0.9$、$\tau \le K_0 \log n$ 的竞赛图都有

$$\frac{H(T)}{\mu_n} \le \rho_n(S)\exp(-\tau/2 + K_1/n) + B_n,$$

其中 B_n 是引理 5.1a 中不依赖具体图的尾界，$B_n = o(n^{-1})$。全局应用先固定三类划分所需的 K_0，故其中常数为绝对常数。

证明。剩余竞赛图满足

$$\max_i |a_i| \le 0.9, \qquad a = s/(n-1), \qquad \tau = \sum_i a_i^2 \le K\log n.$$

以下固定一个绝对常数 K_0，使 $\tau \le K_0 \log n$。其成对乘积满足

$$\Gamma = \prod_i (1 - a_i^2) \le e^{-\tau}.$$

现在对整个竞赛图应用引理 4.4。度差乘积是所有短项共有的因子；将它保持在总和之外，可以吸收那些单独看来比 $1/n$ 更大的误差。

对大小为 $k \le k_n$ 的主删集 U，引理 4.4 给出

$$\operatorname{per} A[U^c] \le e^{-1} D_n(S)\Gamma \left(\prod_{i\in U} g_i\right) \frac{(n-k)!}{2^{n-k}} \exp(R_\tau + R_{\tau,k}),$$

$$g_i = (1 - a_i^2)^{-1} \le G := 100/19,$$

$$R_\tau \le K[\mathcal{M}_\tau + \sqrt{\tau/n} + 1/n], \qquad R_{\tau,k} \le K[k\sqrt{\tau/n} + (k + k^2)/n].$$

在累计误差时，必须保留公共因子 Γ。定义非负系数

$$c_k = (2/n)^k \sum_{|U|=k} \det(I + A[U]) \prod_{i\in U} g_i.$$

它们满足 $c_0 = 1$、$c_k \le G^k w_k$。下降阶乘的恢复产生

$$\log \frac{n^k}{(n)_k} = O(k^2/n), \qquad k \le k_n.$$

令 $\delta_n = \sqrt{\tau/n} + 1/n$，$r_k = R_{\tau,k} + \log(n^k/(n)_k)$。将误差上界选为非负值后，对 $\tau \le K_0 \log n$ 一致有 $0 \le r_k \le K\delta_n(k + k^2)$，且 $\max_{k \le k_n} r_k = o(1)$。因此

$$\sum_{k \le k_n} c_k e^{r_k} \le \sum_{k=0}^{n} c_k + K\delta_n \sum_{k \ge 0} G^k w_k (k + k^2) \le \left(\sum_{k=0}^{n} c_k \right) e^{K\delta_n}.$$

最后一步使用 $\sum_k c_k \ge 1$ 以及相应固定矩的收敛性。归一化短路径总和因而至多为

$$\frac{e^{-1} D_n(S) \Gamma}{2} e^{R_\tau + K\delta_n} \det\left(I + \frac{2}{n} \operatorname{diag}(g)(I + A) \right).$$

误差总和由 $G^k w_k$ 的有限矩控制，而非由最大删集大小 k_n 控制。这避免了在最终误差中引入额外的对数因子。

下面去除权重，同时保持度差修正因子。令 $W = I + (2/n)(I + A)$、$\Delta = (2/n)\operatorname{diag}(g - 1)(I + A)$。$W$ 的对称部分至少为 I，故 $\|W^{-1}\|_{\mathrm{op}} \le 1$。由于 $I + A$ 每行的二范数至多为 $\sqrt{n}$，且 $\sum_i (g_i - 1) \le K\tau$，将 Δ 分解为秩一行矩阵之和，可以控制其迹范数，即奇异值之和。由 $\|uv^{\mathsf{T}}\|_* = \|u\|_2 \|v\|_2$，得到

$$\|\Delta\|_* \le K\tau/\sqrt{n}.$$

由行列式不等式 $|\det(I + E)| \le \exp(\|E\|_*)$，可得

$$\det(W + \Delta) \le \det(W) e^{K\tau/\sqrt{n}}.$$

两个行列式均为正：W 的对称部分正定；加权行列式的主子式展开系数为正。第 7.3 节的无权秩一界在 $N = n$ 时为 $\det(W) \le 2e \det(I + S/n)$。

合并上述各因子，最后仅加入引理 5.1a 的长删集尾项，得到保留度差修正因子的一致上界

$$\frac{H(T)}{\mu_n} \le \rho_n(S) \exp\left\{ -\tau + K\left[\frac{1 + \tau + \tau^2}{n} + \frac{\tau^{3/2} + \tau}{\sqrt{n}} + \sqrt{\tau/n} \right] \right\} + B_n. \tag{7.2}$$

当 $\tau \le K_0 \log n$ 时，除常数 $1/n$ 外的多项式误差项，在充分大阶数总共至多消耗 $\tau/4$。剩余平方根项由 Young 不等式控制：

$$K\sqrt{\tau/n} \le \tau/4 + K^2/n.$$

式 (7.2)中的总指数因此至多为 $-\tau/2 + K/n$。这就证明命题 7.3。再由命题 6.6，得到

$$H(T)/\mu_n \le r_n e^{K/n} + B_n = L + O(1/n).$$

□

7.5 完成上界

三类图覆盖全部竞赛图。高方差图的归一化路径数为 $o(1/n)$；低方差但含异常点的图严格低于一；所有剩余图满足刚才的 $L+O(1/n)$ 上界。因此

$$P(n) \le \big(L + O(1/n)\big)\mu_n.$$

三种情形中的起始阶数均不依赖具体竞赛图，因此取一个共同阈值便得到命题 7.1 的上界。

8. 小度差公式与路径下界

定理 8.1（小度差路径近似）。

存在绝对常数 C，具有如下性质：对每个满足 $d(n)/\sqrt{n} \to 0$ 的非负函数 $d = d(n)$，存在阈值 $n_0(d)$，使每个阶数为 $n \ge n_0(d)$ 且 $\|S\mathbf{1}\|_\infty \le d(n)$ 的竞赛图都满足

$$\left| \frac{H(T)}{\mu_n} - \rho_n(S) \right| \le C \frac{(d(n)+1)^2}{n}.$$

8.1 小度差近似的证明

证明。

以下记 $d = d(n)$。对每个主删集 $|U| = k \le k_n$，应用引理 4.5。因 $d + k_n + 1 = o(\sqrt{n})$，其适用性对全部这些子集一致。恢复下降阶乘 $(n)_k$ 后，由正路径卷积得到

$$\frac{H(T)}{\mu_n} = \frac{e^{-1} D_n(S)}{2} \sum_{k \le k_n} \left(\frac{2}{n}\right)^k \sum_{|U|=k} \det(I + A[U]) + O\left(\frac{(d+1)^2}{n}\right).$$

此误差率没有额外对数因子，因为误差至多为固定常数乘上

$$\frac{1}{n} \sum_{k \ge 0} w_k (d + k + 1)^2 = O\left(\frac{(d+1)^2}{n}\right).$$

下降阶乘恢复误差贡献 $O(n^{-1}\sum k^2 w_k)$；大删集对应的项由第 5.1 节控制为 $o(n^{-1})$。将上式短生成和扩展到全部 k 的代价为 $n^{-2+o(1)}$，因为系数被 w_k 控制。于是

$$\frac{H(T)}{\mu_n} = \frac{e^{-1} D_n(S)}{2} \det\left(I + \frac{2}{n}(I + A)\right) + O\left(\frac{(d+1)^2}{n}\right).$$

令 $u = \mathbf{1}/\sqrt{n}$，$Q = S/(n+1)$。秩一行列式引理给出

$$\det\left(I + \frac{2}{n}(I + A)\right) = (1 + 1/n)^n \det(I + Q) \left(1 + \frac{n}{n+1} u^{\mathsf{T}} (I + Q)^{-1} u\right).$$

反对称性给出

$$u^{\mathsf{T}} (I + Q)^{-1} u = u^{\mathsf{T}} (I - Q^2)^{-1} u,$$

该量与一的差的绝对值不超过

$$\|Qu\|_2^2 \le \frac{d^2}{(n+1)^2}.$$

又有 $(1+1/n)^n = e(1+O(n^{-1}))$；将 $S/(n+1)$ 换为 S/n 的对数行列式误差为 $O(n^{-1})$，这是由归一化频率平方的有界总和得到的。因此

$$\det\left(I + \frac{2}{n}(I+A)\right) = 2e\,\det(I+S/n)\left(1+O(n^{-1}+d^2/n^2)\right).$$

代回即得定理。各估计使用同一个绝对常数；只有小度差条件开始成立的阶数依赖函数 d。

对每个 k，由 $d+k+1 \le (d+1)(k+1)$，

$$\frac{1}{n}\sum_{k} w_k (d+k+1)^2 \le \frac{(d+1)^2}{n}\sum_{k} w_k (k+1)^2.$$

因此无需用 k_n 替代 k，也不会产生 $\log n$ 损失。对 $Q^{\mathsf T} = -Q$，

$$(I+Q)^{-1} = (I-Q)(I-Q^2)^{-1}, \qquad Q(I-Q^2)^{-1} \text{ 为反对称矩阵},$$

$$\begin{aligned} 1 - u^{\mathsf T}(I+Q)^{-1}u &= u^{\mathsf T}[I-(I+Q^{\mathsf T}Q)^{-1}]u \\ &= (Qu)^{\mathsf T}(I+QQ^{\mathsf T})^{-1}(Qu) \le \|Qu\|_2^2. \end{aligned}$$

由于 $Qu = s/[(n+1)\sqrt{n}]$，

$$\|Qu\|_2^2 = \frac{\sum_i s_i^2}{n(n+1)^2} \le \frac{d^2}{(n+1)^2}.$$

改变归一化尺度产生的行列式误差满足

$$\begin{aligned} 0 &\le \log\det(I+S/n) - \log\det(I+S/(n+1)) \\ &= \sum_{j} \int_{\lambda_j^2/(n+1)^2}^{\lambda_j^2/n^2} \frac{du}{1+u} \\ &\le \sum_{j} \lambda_j^2 \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2}\right) \\ &= \frac{n(n-1)}{2}\,\frac{2n+1}{n^2(n+1)^2} = O(n^{-1}). \end{aligned}$$

且

$$0 \le 1 - n\log(1+1/n) = n\int_0^{1/n} \frac{u}{1+u}\,du \le \frac{1}{2n}.$$

秩一因子与二的差为

$$\left|1 + \frac{n}{n+1}u^{\mathsf T}(I+Q)^{-1}u - 2\right| \le \frac{1}{n+1} + \frac{d^2}{(n+1)^2}.$$

依次相乘并用 $D_n(S)\det(I+S/n) < 3$，即得到定理 8.1 的绝对误差。□

8.2 圆环竞赛图

推论 8.2（圆环图下界）。

对下面定义的奇阶圆环图及偶阶一点删除构造，

$$H(\mathrm{Car}_n)/\mu_n = L + O(n^{-1}).$$

证明。

对奇数 n，在模 n 的剩余类上定义圆环竞赛图 Car_n：当 $1 \le j \le (n-1)/2$ 时，令 $i \to i+j$。该图正则，故 $d = 0$。对偶数 n，令 Car_n 为 Car_{n+1} 删去一个顶点所得的图，此时 $d = 1$。

奇阶圆环符号矩阵与 T_n^0 带符号置换相似。一个显式构造是：用对角符号 $(-1)^i$，$0 \le i < n$，共轭 T_n^0，再按 $0, 2, \ldots, n-1, 1, 3, \ldots, n-2$ 重排指标；两个指标同奇偶时，切换后的边沿指标递增方向；异奇偶时方向相反。按上述循环顺序读取指标，即得到圆环方向。将逆向的带符号共轭和重排限制到偶阶的一点删除后，变换所得的矩阵为剩余有序指标上的 T_n^0。因此，删除任意一个顶点后，同一带符号谱计算仍然适用，奇偶两类均满足

$$\rho_n(S_{\mathrm{Car}_n}) = r_n := \frac{(n+1)^n + (n-1)^n}{(n+i)^n + (n-i)^n}.$$

分子、分母均除以 n^n，并对四个固定值 $z = 1, -1, i, -i$ 使用 $(1 + z/n)^n$ 的 Taylor 展开，得到

$$r_n = \frac{\cosh 1}{\cos 1} + O(n^{-1}) = L + O(n^{-1}).$$

故奇偶两类都有 $H(\mathrm{Car}_n)/\mu_n = L + O(n^{-1})$，于是

$$P(n) \ge (L - O(n^{-1}))\mu_n.$$

从带符号相似过渡到路径数，使用的是定理 8.1，分别对应 $d = 0$ 和 $d = 1$。设下界与上界的常数和阈值分别为 K_l, N_l 与 K_u, N_u。取 $K = K_l + K_u$、$n_0 = \max(N_l, N_u, 2)$，即得命题 7.1。

写 $n = 2m + 1$，原指标 $i = 0, \ldots, 2m$。令 $D_{ii} = (-1)^i$，则对 $i < j$，

$$(DT_n^0 D)_{ij} = (-1)^{i+j}.$$

取重排 $p_k = 2k \pmod n$（取 $0, \ldots, n-1$ 的代表元），它依次为 $0, 2, \ldots, 2m, 1, 3, \ldots, 2m-1$。若 i, j 同奇偶，正向差为偶数 $2h$，则

$$2^{-1}(j - i) \pmod n = h \in \{1, \ldots, m\}.$$

若异奇偶且 $i < j$，写 $j - i = 2h + 1$，则

$$2^{-1}(j - i) \pmod n = h + m + 1 \in \{m+1, \ldots, 2m\}.$$

所以在新指标下，差 $1, \ldots, m$ 的边顺向，差 $m+1, \ldots, 2m$ 的边逆向，正好是圆环图。删一点时取对应主子矩阵；限制后的 D 仍为符号对角矩阵，而传递矩阵在保留有序指标上的主子矩阵仍为 T_n^0。这证明奇偶构造都具有上述谱，不声称带符号变换保持路径数。

由 $D_n(S) = \det(I + iS/n)^{-1}$ 及主子式多项式，

$$\begin{aligned}\rho_n(S) &= \frac{\det(I + S/n)}{\det(I + iS/n)} \\ &= \frac{(1+1/n)^n + (1-1/n)^n}{(1+i/n)^n + (1-i/n)^n} = r_n.\end{aligned}$$

对 $z\in\{1,-1,i,-i\}$、$n\ge 2$，在主值对数的 $|w|<1$ 级数中，

$$n\log(1+z/n)=z-\frac{z^2}{2n}+R_{n,z},$$
$$|R_{n,z}|\le\sum_{h=3}^{\infty}\frac{1}{hn^{h-1}}\le\frac{1}{3n^2(1-1/n)}\le\frac{2}{3n^2}.$$

指数化得 $(1+z/n)^n=e^z(1-z^2/(2n)+O(n^{-2}))$。分别相加：

$$(1+1/n)^n+(1-1/n)^n=2\cosh 1\,[1-1/(2n)+O(n^{-2})],$$
$$(1+i/n)^n+(1-i/n)^n=2\cos 1\,[1+1/(2n)+O(n^{-2})].$$

因为 $\cos 1>0$，分母对充分大 n 有固定正下界。利用

$$\frac{1}{1+u}=1-u+\frac{u^2}{1+u},$$

得到更精细的谱比值

$$r_n=L[1-1/n+O(n^{-2})].$$

定理 8.1 对路径数本身只给 $O(n^{-1})$ 误差，故这里的 $-L/n$ 只能称为谱比值的修正项，不能直接当作路径数的修正项。最后

$$H(\mathrm{Car}_n)/\mu_n=r_n+O(n^{-1})=L+O(n^{-1}),$$

从而存在固定 K_l 使 $P(n)\ge(L-K_l/n)\mu_n$。□

推论 8.2a（近极值者的度数方差）。令 $\varepsilon_0=(L-1)/2$。存在绝对常数 C,N，使任意 $n\ge N$、$0\le\varepsilon\le\varepsilon_0$ 和满足 $H(T)/\mu_n\ge L-\varepsilon$ 的竞赛图都有

$$\tau(T)\le C(\varepsilon+n^{-1}),\qquad V_{\deg}(T)\le C(\varepsilon n^2+n).$$

特别地，路径计数最大化者满足 $V_{\deg}(T)=O(n)$。

证明。假设给出 $H(T)/\mu_n\ge(L+1)/2>1$，故第 7.2、7.3 节的两类图在统一大阶阈值后均被排除。由命题 7.3 和 6.6,

$$L-\varepsilon-B_n\le(L+K_r/n)e^{-\tau/2+K_1/n}.$$

增大阈值使 $0\le B_n\le 1/n$ 且左端至少为 $(L+1)/4$,取对数并用 $\log(1+x)\le x$ 即得 $\tau\le C(\varepsilon+1/n)$。乘以 $(n-1)^2/4$ 得方差界。对最大化者，使用本节的下界并取 $\varepsilon=K_\ell/n$。□

这个结论控制平均平方度差；它只直接给出最大单点度差 $O(\sqrt{n})$，不推出正则性、圆环同构或编辑距离稳定性，也不自动满足定理 8.1 的 $o(\sqrt{n})$ 假设。

9. 原角函数的 Hessian

9.1 角函数与 Hessian 公式

本节仍用 $I_r,J_r,\mathbf{1}_r$ 表示单位矩阵、全一矩阵和全一列向量，省略下标时阶数由上下文确定。

定义 9.1 (符号矩阵与原始角函数).

令 $d\ge 3$ 为奇数，A 为 d 阶正则竞赛图的邻接矩阵，

$$S = 2A + I - J, \quad S^T = -S, \quad S\mathbf{1} = 0, \qquad C = S/d, \quad P_0 = J/d.$$

以下 $\mathrm{diag}(a_1, \dots, a_r)$ 表示以 $a_1, \dots, a_r$ 为对角元的对角矩阵。
设

$$B(y) = I - (A + \tfrac{1}{2}I)\,\mathrm{diag}(y_1, \dots, y_d), \quad K(y) = \det B(y), \quad z = 2/d.$$

复对数均取下文指定的局部解析分支，并在正实轴上与自然对数一致。
在 $y = z\mathbf{1}$ 附近，由 $K(y) = 0$ 解出 $y_d = h(y_1, \dots, y_{d-1})$。Wormald 考虑的角函数为

$$\widetilde{f}(\theta) = \log h(ze^{i\theta_1}, \dots, ze^{i\theta_{d-1}})$$

e_j 为第 j 个标准基列向量。
记 $\mathbf{H} = \nabla^2 \widetilde{f}(0)$，$\mathcal{H} = \det \mathbf{H}$。这里 $C = S/d$ 始终表示矩阵。
定理 9.2 (Hessian 公式).
函数 h 及上述对数分支在相应点的邻域内解析，且

$$\mathbf{H} = E^T(I + C^2)(I - C^2)^{-1}E, \qquad E = (e_1 - e_d, \dots, e_{d-1} - e_d).$$

因此

$$\mathcal{H} = d\,\frac{\det(I + C^2)}{\det(I - C^2)} > 0, \qquad \sqrt{\frac{d}{\mathcal{H}}} = \frac{\det(I + C)}{\det(I + iC)} =: \rho_d(S).$$

右边是正有理数，因而上述恒等式证明猜想 6。

9.2 谱隙、常数方向与限制行列式

证明。

由竞赛图的定义及正则性,

$$A + A^T = J - I, \qquad A\mathbf{1} = \frac{d-1}{2}\mathbf{1},$$

$$S^T = 2A^T + I - J = 2(J - I - A) + I - J = -S,$$

$$S\mathbf{1} = 2\frac{d-1}{2}\mathbf{1} + \mathbf{1} - d\mathbf{1} = 0.$$

我们先估计 C 的谱半径。
记实向量 $v = (v_1, \dots, v_r)^T$ 的欧氏范数为 $\|v\|_2 = (\sum_{j=1}^r v_j^2)^{1/2}$。
对实矩阵 M，两种范数分别为

$$\|M\|_F^2 = \sum_{j,k} M_{jk}^2, \qquad \|M\|_{\mathrm{op}} = \sup_{v \neq 0} \frac{\|Mv\|_2}{\|v\|_2}.$$

由于 S 的 $d(d-1)$ 个非对角元 s_{ij} 均为 ± 1,

$$\|S\|_F^2 = \sum_{i \neq j} s_{ij}^2 = d(d-1), \qquad \|C\|_F^2 = \frac{d-1}{d}.$$

对归一化的实反对称矩阵 C 作正交基变换。其标准形由零块及二维块

$$J_\lambda = \begin{pmatrix} 0 & \lambda \\ -\lambda & 0 \end{pmatrix}$$

组成。每个二维块对 Frobenius 范数平方贡献 $2\lambda^2$。于是每个频率都满足

$$2\lambda^2 \le \sum_{\text{全部二维块}} 2\lambda_j^2 = \|C\|_F^2 = \frac{d-1}{d},$$

$$\|C\|_{\text{op}}^2 = \max_j \lambda_j^2 \le \frac{d-1}{2d} < \frac{1}{2}.$$

令 $u = \mathbf{1}/\sqrt{d}$，$P_0 = uu^T = J/d$，$\Pi = I - P_0$。于是

$$u^T u = 1, \quad P_0^2 = P_0, \quad \Pi^2 = I - 2P_0 + P_0^2 = \Pi,$$

$$Cu = 0, \qquad u^T C = -(Cu)^T = 0, \qquad CP_0 = (Cu)u^T = 0, \quad P_0 C = u(u^T C) = 0.$$

又有

$$P := \frac{2A + I}{d} = P_0 + C, \qquad Pu = P_0 u + Cu = u.$$

若 $u^T v = 0$，则 $P_0 v = u(u^T v) = 0$，所以 $Pv = Cv$。在展开点，

$$B(z\mathbf{1}) = I - P = \Pi - C, \qquad B(z\mathbf{1})u = 0.$$

$u^\perp$ 是与实向量 u 正交的子空间，$\det_{u^\perp}$ 表示限制到该不变子空间后、在正交单位基中计算的行列式。

在 $u^\perp$ 上，该矩阵是 $I - C$。若 $x \in u^\perp$ 满足 $(I - C)x = 0$，则

$$0 = x^T(I - C)x = \|x\|_2^2 - x^T C x = \|x\|_2^2,$$

其中 $x^T C x = -x^T C x$ 给出 $x^T C x = 0$。故 $x = 0$，限制矩阵可逆。

在二维块上，

$$\det(I - J_\lambda) = \det \begin{pmatrix} 1 & -\lambda \\ \lambda & 1 \end{pmatrix} = 1 + \lambda^2 > 0.$$

$I - C$ 在常数方向上的特征值为 1，所以

$$q := \det_{u^\perp}(I - C) = \det(I - C) = \prod_j (1 + \lambda_j^2) > 0.$$

转置给出

$$\det(I + C) = \det((I + C)^T) = \det(I - C) = q.$$

9.3 对数变量、分块矩阵与 Schur 消元

为计算角函数的导数，先引入原点附近的对数变量 $t \in \mathbb{C}^d$，令 $y_j = ze^{t_j}$。此时

$$\mathcal{B}(t) = B(ze^{t_1}, \dots, ze^{t_d}) = I - P\,\mathrm{diag}(e^{t_1}, \dots, e^{t_d}).$$

取 $u^{\perp}$ 的一组正交单位基作为 V 的列。矩阵 $O = (u, V)$ 满足

$$V^{T}V = I_{d-1}, \quad V^{T}u = 0, \quad VV^{T} = \Pi, \quad O^{T}O = OO^{T} = I_d.$$

在这个基中写成

$$O^{T}\mathcal{B}(t)O = \begin{pmatrix} a(t) & b(t) \\ c(t) & D(t) \end{pmatrix},$$

$$a = u^{T}\mathcal{B}u, \quad b = u^{T}\mathcal{B}V, \quad c = V^{T}\mathcal{B}u, \quad D = V^{T}\mathcal{B}V.$$

其中 a 为标量，b, c 分别为 $1 \times (d-1)$ 和 $(d-1) \times 1$ 矩阵，D 为 $(d-1)$ 阶方阵。由反对称性还得到

$$u^{T}P = u^{T}(P_0 + C) = u^{T}uu^{T} + u^{T}C = u^{T} + 0 = u^{T}.$$

因为 $\det(O)^2 = 1$，这次基变换不改变行列式。在 $t = 0$ 时，

$$a(0) = 0, \quad b(0) = 0, \quad c(0) = 0, \qquad D(0) = V^{T}(I - C)V.$$

由第 9.2 节，$\det D(0) = q > 0$。连续性保证 $D(t)$ 在原点的某个邻域内可逆。

记 $\mathrm{adj}\,D$ 为 D 的伴随矩阵，即 $(\mathrm{adj}\,D)_{ij} = (-1)^{i+j}\det D^{(j|i)}$，其中 $D^{(j|i)}$ 删去第 j 行和第 i 列。行列式展开给出 $D\,\mathrm{adj}\,D = (\det D)I$，从而

$$D(t)^{-1} = \frac{\mathrm{adj}\,D(t)}{\det D(t)}$$

该式同时说明 $D(t)^{-1}$ 的各元素在这个邻域内解析。

作分块消元，

$$\begin{pmatrix} 1 & -bD^{-1} \\ 0 & I \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a & b \\ c & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a - bD^{-1}c & 0 \\ c & D \end{pmatrix}.$$

左乘矩阵的行列式为 1，右端为分块三角矩阵。因此，定义

$$\psi(t) = a(t) - b(t)D(t)^{-1}c(t)$$

后，得到精确恒等式

$$\det \mathcal{B}(t) = \det D(t)\,\psi(t).$$

在上述邻域内，$\det \mathcal{B}(t) = 0$ 与 $\psi(t) = 0$ 等价，因为因子 $\det D(t)$ 不为零。

9.4 一阶和二阶导数

对标量函数 $F(t_1,\dots,t_d)$，下标 F_j, F_{jk} 分别表示 $\partial F/\partial t_j$ 和 $\partial^2 F/(\partial t_j \partial t_k)$；对矩阵或行、列向量逐元求导。若原变量是 y，则写 K_{y_j} 以区分。

$\nabla^2 F$ 表示由 F_{jk} 组成的矩阵。

δ_{jk} 在 $j=k$ 时为 1、否则为 0。

记 $F_j = e_j e_j^T$，$R(t) = D(t)^{-1}$。指数矩阵只在第 j 列依赖 t_j，故在原点

$$\mathcal{B}_j = -PF_j, \qquad \mathcal{B}_{jk} = -\delta_{jk} PF_j.$$

对 $DR = I$ 求导两次，得到

$$D_j R + DR_j = 0, \qquad R_j = -RD_j R,$$

$$R_{jk} = RD_k RD_j R - RD_{jk} R + RD_j RD_k R.$$

这些恒等式在 D 可逆的邻域内成立。

由 $u^T P = u^T$ 及 $e_j^T u = 1/\sqrt{d}$，

$$a_j(0) = -u^T PF_j u = -u_j^2 = -1/d, \qquad a_{jk}(0) = -\delta_{jk}/d.$$

乘积法则给出

$$\partial_j (bRc) = b_j Rc + bR_j c + bRc_j.$$

再对 t_k 求导，

$$\begin{aligned}\partial_k \partial_j (bRc) = {} & b_{jk} Rc + b_j R_k c + b_j Rc_k \\ & + b_k R_j c + bR_{jk} c + bR_j c_k \\ & + b_k Rc_j + bR_k c_j + bRc_{jk}.\end{aligned}$$

在原点处 $b = c = 0$，因而含有未求导因子 b 或 c 的七项均消失，只剩

$$\partial_k \partial_j (bRc)(0) = b_j(0) R(0) c_k(0) + b_k(0) R(0) c_j(0).$$

现在计算这些因子：

$$b_j(0) = -u^T P e_j e_j^T V = -\frac{1}{\sqrt{d}} e_j^T V,$$

$$c_k(0) = -V^T P e_k e_k^T u = -\frac{1}{\sqrt{d}} V^T C e_k,$$

这里由 $V^T u = 0$ 得到 $V^T P = V^T C$。令 $U = (I - C)^{-1}$。因为 C 保持 $u^\perp$，有 $(I-C)V = VD(0)$；在两侧分别乘以 U 和 $R(0)$，并使用 $\Pi C = C$，得到

$$(I - C)V = VD(0), \qquad UV = VR(0),$$

$$UC = U\Pi C = UVV^T C = VR(0)V^T C.$$

因此,

$$VR(0)V^TC = UC.$$

于是两个二次乘积分别为

$$b_jR(0)c_k = \frac{1}{d}e_j^TUCe_k = \frac{(UC)_{jk}}{d},$$

$$b_kR(0)c_j = \frac{1}{d}e_k^TUCe_j = \frac{(UC)_{kj}}{d}.$$

一次乘积导数在原点为 0，因此

$$\psi_j(0) = -1/d, \qquad \psi_{jk}(0) = -\frac{\delta_{jk} + (UC)_{jk} + (UC)_{kj}}{d}.$$

$C(I-C) = (I-C)C$，左右乘逆矩阵可得 $CU = UC$。又

$$(UC)^T = C^TU^T = -C(I+C)^{-1}.$$

两个逆的差逐步化为

$$\begin{aligned}(I-C)^{-1} - (I+C)^{-1} &= (I-C)^{-1}[(I+C) - (I-C)](I+C)^{-1}\\ &= 2C(I-C)^{-1}(I+C)^{-1}\\ &= 2C(I-C^2)^{-1}.\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}I + UC + (UC)^T &= I + C[(I-C)^{-1} - (I+C)^{-1}]\\ &= I + 2C^2(I-C^2)^{-1}\\ &= (I+C^2)(I-C^2)^{-1} =: Q.\end{aligned}$$

综上，ψ 在原点的一、二阶导数为

$$\psi_j(0) = -1/d, \qquad \nabla^2\psi(0) = -Q/d.$$

对行列式乘积求导。由于 $\psi(0) = 0$、$\det D(0) = q$,

$$\begin{aligned}\partial_{t_j}\det\mathcal{B}(0) &= \partial_{t_j}(\det D)(0)\,\psi(0) + \det D(0)\psi_j(0)\\ &= 0 + q(-1/d) = -q/d.\end{aligned}$$

在原点 $\partial y_j/\partial t_j = z$，因此

$$zK_{y_j}(z\mathbf{1}) = -q/d, \qquad K_{y_j}(z\mathbf{1}) = -\frac{q}{dz} = -q/2 \neq 0.$$

特别地，$K_{y_d}(z\mathbf{1}) \neq 0$，可以在这一点附近消去 y_d。

9.5 最后一个变量的消去

记 $y'=(y_1,\dots,y_{d-1})$，$t'=(t_1,\dots,t_{d-1})$。

行列式对第 d 列线性，而这一列关于 y_d 仿射，所以

$$K(y)=K_0(y_1,\dots,y_{d-1})+y_dK_1(y_1,\dots,y_{d-1}).$$

其中

$$K_0(y')=K(y',0),\qquad K_1(y')=K(y',1)-K(y',0)=K_{y_d}(y',y_d).$$

最后一个偏导不依赖 y_d，因为上述表达式关于 y_d 是一次式。

由第 9.4 节的偏导计算，

$$K_1(z,\dots,z)=K_{y_d}(z\mathbf{1})=-q/2\neq 0.$$

在充分小的邻域内 $K_1(y')\neq 0$，故

$$h(y')=-\frac{K_0(y')}{K_1(y')}.$$

因为 $K(z\mathbf{1})=0$，

$$K_0(z,\dots,z)+zK_1(z,\dots,z)=0,\qquad h(z,\dots,z)=z.$$

定义

$$g(t')=\log\left[\frac{h(ze^{t_1},\dots,ze^{t_{d-1}})}{z}\right].$$

由 $h(z,\dots,z)=z>0$ 及连续性，可缩小邻域使 $|h(ze^{t'})/z-1|<1/2$，其中指数按坐标取值。在此圆盘内取满足 $\log 1=0$ 的解析分支，则

$$g(0)=\log 1=0,\qquad t_d=g(t'),\qquad \psi(t',g(t'))=0.$$

这样得到的 g 是解析函数，并在原点附近满足所需的隐式方程。

9.6 隐式微分与角变量

以下 $1\le j,k\le d-1$。先对恒等式 $\psi(t',g(t'))=0$ 求导，再在 $t'=0$ 处代入第 9.4 节的导数值。一次求导给出

$$0=\psi_j+\psi_dg_j,\qquad g_j(0)=-\frac{\psi_j(0)}{\psi_d(0)}=-\frac{-1/d}{-1/d}=-1.$$

对 t_k 再次求导，五项为

$$0=\psi_{jk}+\psi_{jd}g_k+\psi_{dk}g_j+\psi_{dd}g_jg_k+\psi_dg_{jk}.$$

在原点代入第 9.4 节的导数及 $g_j(0)=g_k(0)=-1$，得

$$0=-\frac{Q_{jk}}{d}+\frac{Q_{jd}}{d}+\frac{Q_{dk}}{d}-\frac{Q_{dd}}{d}-\frac{g_{jk}}{d}.$$

两边乘 d，再移项：

$$\begin{aligned} g_{jk}(0) &= -Q_{jk} + Q_{jd} + Q_{dk} - Q_{dd} \\ &= -(e_j - e_d)^T Q (e_k - e_d). \end{aligned}$$

对 $\log h$ 取满足 $\log h(z,\dots,z) = \log z$ 的局部分支。由 g 的定义，Wormald 的角函数满足

$$\widetilde{f}(\theta) = \log z + g(i\theta_1, \dots, i\theta_{d-1}).$$

一次角导数为 $ig_j(i\theta)$，二次角导数为 $i^2 g_{jk}(i\theta)$。因此

$$\mathbf{H}_{jk} = i^2 g_{jk}(0) = -g_{jk}(0) = (e_j - e_d)^T Q (e_k - e_d),$$

$$\mathbf{H} = E^T Q E.$$

9.7 正定性与行列式

$M \succ 0$ 表示 M 实对称且对每个非零实向量 v 都有 $v^T M v > 0$。

在第 9.2 节的每个二维块上，$J_\lambda^2 = -\lambda^2 I_2$，因此

$$(I + J_\lambda^2)(I - J_\lambda^2)^{-1} = \frac{1-\lambda^2}{1+\lambda^2} I_2.$$

由 $\lambda^2 < 1/2$，这个系数为正。零块上的 Q 为单位矩阵，所以 $Q \succ 0$。对 $v \in \mathbb{R}^{d-1}$，

$$Ev = (v_1, \dots, v_{d-1}, -\textstyle\sum_{j=1}^{d-1} v_j)^T.$$

若 $v \neq 0$，前 $d-1$ 个分量不全为 0，故 $Ev \neq 0$，从而

$$v^T \mathbf{H} v = (Ev)^T Q (Ev) > 0.$$

计算 E 的 Gram 行列式。其第 j,k 列的内积为

$$(e_j - e_d)^T (e_k - e_d) = \delta_{jk} + 1.$$

故 $E^T E = I_{d-1} + J_{d-1}$。在全一方向该矩阵的特征值为 $1 + (d-1) = d$，在与全一向量垂直的方向上特征值为 1。因此

$$\det(E^T E) = d \cdot 1^{d-2} = d.$$

写 $E = VL$，其中 V 是 $u^\perp$ 的正交基、L 为可逆方阵：

$$E^T Q E = L^T (V^T Q V) L, \qquad E^T E = L^T L.$$

取行列式分别得到

$$\det(E^T Q E) = \det(L)^2 \det(V^T Q V), \qquad \det(L)^2 = d.$$

由 $Cu = 0$,

$$Qu = (I + C^2)(I - C^2)^{-1} u = u.$$

Q 在第 9.2 节的实正交基中每个块都是实数乘单位矩阵，因此 Q 为实对称矩阵。于是 $u^TQV = (Qu)^TV = u^TV = 0$。故

$$(u,V)^TQ(u,V) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & V^TQV \end{pmatrix}, \qquad \det Q = \det(V^TQV).$$

把两个行列式因子乘回：

$$\mathcal{H} = d\det Q = d\,\frac{\det(I+C^2)}{\det(I-C^2)} > 0.$$

矩阵乘法及转置给出

$$(I+iC)(I-iC) = I+C^2, \qquad \det(I-iC) = \det((I-iC)^T) = \det(I+iC),$$

$$(I+C)(I-C) = I-C^2, \qquad \det(I-C) = \det(I+C).$$

因此

$$\det(I+C^2) = \det(I+iC)^2, \qquad \det(I-C^2) = \det(I+C)^2.$$

在每个反对称二维块上，

$$\det(I+J_\lambda) = 1+\lambda^2 > 0, \qquad \det(I+iJ_\lambda) = 1-\lambda^2 > 0.$$

所以

$$\sqrt{\frac{d}{\mathcal{H}}} = \frac{\det(I+C)}{\det(I+iC)} > 0.$$

记 $[d] = \{1,\dots,d\}$。$M[U]$ 是行列都取自 U 的主子矩阵，约定 $\det M[\varnothing] = 1$。

记 $\lfloor a \rfloor$ 为不超过 a 的最大整数。为证明上述比值有理，按列的多线性展开行列式：每列取单位矩阵的一列或 C 的一列，得到

$$\det(I+tC) = \sum_{U\subseteq[d]} t^{|U|}\det C[U].$$

对奇数阶 $r = |U|$，

$$\det C[U] = \det(C[U]^T) = \det(-C[U]) = (-1)^r\det C[U] = -\det C[U],$$

所以该主子式为 0。C 有理，故

$$\det(I+iC) = \sum_{k=0}^{\lfloor d/2\rfloor} \sum_{\substack{U\subseteq[d] \\ |U|=2k}} (-1)^k \det C[U] \in \mathbb{Q}.$$

$\det(I+C)$ 也为有理数。已经证明分子、分母均正，所以所得比值为正有理数。□

10. 模型极限与圆环常数

10.1 随机模型的计数极限

约定 $0!=1$，$n!=1\cdot 2\cdots n$。

第 j 类顶点指第 j 个基图顶点所对应的 m 个吹胀顶点。

定义 10.1 (随机模型的归一化).

现在将 Hessian 公式代入 Wormald 的 Theorems 1、4、5。固定 d 阶正则基图，令内部块阶数 $m\to\infty$，总阶数为 $N=dm$。各块在允许的有标号竞赛图中独立均匀选取。下标 $\mathcal{T},\mathcal{R}$ 分别表示独立随机内部块与正则内部块模型；$\mathbb{E}C$ 和 $\mathbb{E}H$ 分别表示圈数与路径数的期望。定义

$$\nu_N=\frac{(N-1)!}{2^N},\qquad \mu_N=\frac{N!}{2^{N-1}}.$$

推论 10.2 (四个模型期望极限).

Wormald 的 Theorem 4 在 $\mathcal{H}\neq 0$ 时给出

$$\frac{\mathbb{E}C_{\mathcal{T}}}{\nu_N}\longrightarrow\sqrt{d/\mathcal{H}}.$$

由第 9.7 节，$\mathcal{H}>0$，且上述平方根取正值。因此

$$\lim_{m\to\infty}\frac{\mathbb{E}C_{\mathcal{T}}}{\nu_N}=\sqrt{\frac{d}{d\det(I+C^2)/\det(I-C^2)}}=\rho_d(S).$$

Theorem 5 把 Theorem 4 的圈计数换成路径计数，故

$$\lim_{m\to\infty}\frac{\mathbb{E}H_{\mathcal{T}}}{\mu_N}=\sqrt{d/\mathcal{H}}=\rho_d(S).$$

Theorem 1 给出正则内部块与独立随机内部块的期望之比：

$$\frac{\mathbb{E}C_{\mathcal{R}}}{\mathbb{E}C_{\mathcal{T}}}\longrightarrow e^{1/d}.$$

对足够大的 m，分母为正，因为其归一化极限 $\rho_d(S)>0$。相乘得到

$$\lim_{\substack{m\to\infty\\ m\ \text{奇}}}\frac{\mathbb{E}C_{\mathcal{R}}}{\nu_N}=\lim_{\substack{m\to\infty\\ m\ \text{奇}}}\left(\frac{\mathbb{E}C_{\mathcal{R}}}{\mathbb{E}C_{\mathcal{T}}}\frac{\mathbb{E}C_{\mathcal{T}}}{\nu_N}\right)=e^{1/d}\rho_d(S).$$

Theorem 5 还把 Theorem 1 的计数换成路径，给出

$$\frac{\mathbb{E}H_{\mathcal{R}}}{\mathbb{E}H_{\mathcal{T}}}\longrightarrow e^{1/d}.$$

于是第四个极限为

$$\lim_{\substack{m\to\infty\\ m\ \text{奇}}}\frac{\mathbb{E}H_{\mathcal{R}}}{\mu_N}=\lim_{\substack{m\to\infty\\ m\ \text{奇}}}\left(\frac{\mathbb{E}H_{\mathcal{R}}}{\mathbb{E}H_{\mathcal{T}}}\frac{\mathbb{E}H_{\mathcal{T}}}{\mu_N}\right)=e^{1/d}\rho_d(S).$$

上述极限中 d 固定；正则内部块模型的极限沿奇数 m 取值。

由 Divoux–Wang 公式直接计算模型常数。上述极限还可以从 [12, Proposition 5.1] 得到。这个计算不经过角函数，因而与第 9 节的 Hessian 恒等式有所区别。以下仍固定正则基图阶数 d，令 $N=dm$，并以 J_r 表示 r 阶全一矩阵。

独立随机内部块模型的期望邻接矩阵为

$$W = \frac{J_N - I_N + S \otimes J_m}{2}, \qquad D = \frac{2W}{N-1}, \qquad B = D - \frac{J_N}{N}.$$

Hamilton 圈和路径各自使用的无序顶点对互不相同，故内部随机边的独立性给出

$$\mathbb{E}C_{\mathcal{T}} = \mathrm{cyc}(W), \qquad \mathbb{E}H_{\mathcal{T}} = \mathrm{path}(W).$$

这里 cyc 与 path 分别为边权乘积的圈和、路径和。由 $S\mathbf{1} = 0$，矩阵 D 的各行、各列之和均为 1，且其元素不超过 $2/(N-1)$。

将 $\mathbb{R}^N$ 正交分成全一方向、块常数且总和为零的空间，以及每块内部和均为零的空间。三者上 B 的作用分别为

$$0, \qquad B_0 = \left.\frac{mS - I_d}{N-1}\right|_{\mathbf{1}_d^{\perp}}, \qquad -\frac{I_{N-d}}{N-1}.$$

由 $\|S\|_{\mathrm{op}}^2 \le d(d-1)/2$，有

$$\limsup_{m\to\infty} \|B\|_{\mathrm{op}} \le \sqrt{\frac{d-1}{2d}} < 1.$$

因此 D 满足 Divoux–Wang 的条件，且

$$\frac{N^N \,\mathrm{cyc}(D)}{(N-1)!} = (1+o(1))\frac{\det(I-B)}{\sqrt{\det(I-B^TB)}}.$$

记右边的行列式比值为 R_N。上述正交分解给出

$$R_N = \frac{\det(I-B_0)}{\sqrt{\det(I-B_0^TB_0)}} \frac{\left(1+(N-1)^{-1}\right)^{N-d}}{\left(1-(N-1)^{-2}\right)^{(N-d)/2}}.$$

第二个因子趋于 e。第一个因子作用在固定维数的空间上，$B_0 \to C|_{\mathbf{1}_d^{\perp}}$，其中 $C = S/d$。由于 $C\mathbf{1} = 0$，补回全一方向不改变所需行列式，故

$$R_N \longrightarrow e\,\frac{\det(I-C)}{\sqrt{\det(I+C^2)}} = e\,\frac{\det(I+C)}{\det(I+iC)} = e\rho_d(S).$$

这里平方根取正值；对每对特征值 $\pm i\lambda$，$|\lambda| < 1$，其贡献为 $1-\lambda^2 > 0$。再用圈多项式的齐次性，得到

$$\frac{\mathbb{E}C_{\mathcal{T}}}{\nu_N} = \left(\frac{N-1}{N}\right)^N \frac{N^N \,\mathrm{cyc}(D)}{(N-1)!} \longrightarrow e^{-1}\, e\rho_d(S) = \rho_d(S).$$

路径也可以直接沿用 [12, 第 10 节] 的添点计算。置

$$\widehat{D} = \begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1}_N^T/N \\ \mathbf{1}_N/N & (1-1/N)D \end{pmatrix}.$$

该矩阵双随机，且每条原路径通过新顶点唯一闭合成圈，因此

$$\mathrm{cyc}(\widehat{D}) = N^{-2}(1-1/N)^{N-1}\,\mathrm{path}(D).$$

令 $\widehat{B}=\widehat{D}-J_{N+1}/(N+1)$。有 $\|\widehat{B}-\operatorname{diag}(0,B)\|_F=O(N^{-1})$，且两者的迹都为 -1。由于 $\|B\|_F$ 有界、谱范数与 1 保持距离，[12, 第 10 节] 的行列式比较说明二者在 Proposition 5.1 中的行列式因子之比趋于 1。从而

$$\frac{\operatorname{cyc}(\widehat{D})}{\operatorname{cyc}(D)}=(1+o(1))\left(\frac{N}{N+1}\right)^{N+1},\qquad \operatorname{path}(D)=(1+o(1))N^2\operatorname{cyc}(D).$$

将 $W=(N-1)D/2$ 代回，

$$\frac{\mathbb{E}H_{\mathcal{T}}}{\mu_N}=(1+o(1))\frac{N}{N-1}\frac{\mathbb{E}C_{\mathcal{T}}}{\nu_N}\longrightarrow\rho_d(S).$$

正则内部块的两个极限再由 Wormald [6, 定理 1、5] 乘以 $e^{1/d}$。这样，四个模型常数均为已有计数理论的推论。这个推导没有确定原角函数的 Hessian；其正定性以及整个矩阵的表达式仍由第 9 节的直接求导给出。

10.2 圆环基图的闭式

下面的闭式取自 Divoux–Wang [12, 第 7 节及引理 9.1] 的行列式计算，正则块因子来自 Wormald [6, 定理 1]。

命题 10.3 (圆环模型的闭式).

令 T_d 为传递竞赛图的符号矩阵。圆环图的符号矩阵与 T_d 带符号置换相似，见附录 A.2。又由附录 A.1，T_d 的每个偶阶主子式为 1，每个奇阶主子式为 0。因此

$$\det(I+tT_d)=\frac{(1+t)^d+(1-t)^d}{2}.$$

用图名作为 ρ_d 的自变量时，取该图的符号矩阵；此值在重编号下不变。于是

$$\rho_d(\mathrm{Car}_d)=\frac{(1+1/d)^d+(1-1/d)^d}{(1+i/d)^d+(1-i/d)^d}.$$

该式在前三个奇阶数给出 Wormald 表中的 $2,44/19,3032/1231,\ldots$。正则内部块模型的常数为

$$\mathfrak{r}_d=e^{1/d}r_d,\qquad r_d:=\rho_d(\mathrm{Car}_d).$$

10.3 闭式的实函数形式与严格单调性

一元函数的撇号表示对其自变量求导。

定义 10.4 (实函数与辅助变量).

下文使用的初等函数为

$$\cosh y=\frac{e^y+e^{-y}}{2},\quad \sinh y=\frac{e^y-e^{-y}}{2},\quad \tanh y=\frac{\sinh y}{\cosh y},\quad \operatorname{sech} y=\frac{1}{\cosh y},\quad \sec y=\frac{1}{\cos y}.$$

令 $x=1/d$，在 $0<x\le 1/3$ 上定义

$$\alpha(x)=\frac{\arctan x}{x},\qquad \beta(x)=\frac{\operatorname{artanh} x}{x},\qquad \operatorname{artanh} x=\frac{1}{2}\log\frac{1+x}{1-x}.$$

推论 10.5 (单调性与极限). 沿奇数 $d\ge 3$，序列 $\mathfrak{r}_d$ 严格递增并收敛于 $L=\cosh 1/\cos 1$。

证明：显式谱的比较。 Fang–Huang [11, Lemma 4.2] 给出传递符号矩阵的特征值。对奇数 d，其归一化正频率为

$$a_{j,d} = \frac{1}{d}\cot\frac{(2j-1)\pi}{2d}, \qquad 1 \le j \le \frac{d-1}{2}.$$

Divoux–Wang [12, 第 7 节] 的对数展开以及 $\|T_d\|_F^2 = d(d-1)$ 给出

$$\log r_d = 2\sum_{j=1}^{(d-1)/2}\sum_{r=0}^{\infty}\frac{a_{j,d}^{4r+2}}{2r+1}, \qquad 2\sum_{j=1}^{(d-1)/2} a_{j,d}^{2} = 1 - \frac{1}{d}.$$

故正则块因子恰好补去二次矩中的 $-1/d$：

$$\log \mathfrak{r}_d = 1 + 2\sum_{j=1}^{(d-1)/2}\sum_{r=1}^{\infty}\frac{a_{j,d}^{4r+2}}{2r+1}.$$

固定 j，记 $c_j = (2j-1)\pi/2$。令 $x = c_j/d$，则 $a_{j,d} = x\cot x/c_j$，而

$$\frac{d}{dx}(x\cot x) = \frac{\sin x\cos x - x}{\sin^2 x} < 0 \qquad (0 < x < \pi/2).$$

最后一个严格不等式来自 $\sin(2x) < 2x$。因此，d 增大时，每个已有的 $a_{j,d}$ 都严格增大。从奇数 d 到 $d+2$，上式还增加了一个正频率；收敛级数中的系数均为正，遂得 $\mathfrak{r}_{d+2} > \mathfrak{r}_d$。极限由命题 10.3 的已有闭式直接得到：

$$\mathfrak{r}_d = e^{1/d}\frac{(1+1/d)^d + (1-1/d)^d}{(1+i/d)^d + (1-i/d)^d} \longrightarrow \frac{\cosh 1}{\cos 1}.$$

□

为第 10.4 节的展开保留闭式的实函数形式：在右半平面选取与实对数相容的解析对数，则

$$\mathfrak{r}(x) = e^{p(x)}\frac{\cosh\beta(x)}{\cos\alpha(x)}, \qquad p(x) = x + \frac{\log(1-x^2) - \log(1+x^2)}{2x} = -\sum_{j\ge 1}\frac{x^{4j+1}}{2j+1}.$$

这里 $x = 1/d$，$0 < \alpha(x) \le 1 < \pi/2$，故分母为正。这是命题 10.3 的代数改写；单调性已由上面的谱证明完成。

10.4 圆环常数的渐近展开

以下展开均在 $x = 0$ 附近进行，余项中的常数为绝对常数。代入 $x = 1/d$ 后，相应余项按 $d \to \infty$ 理解。

对 $0 < |x| < 1$，积分几何级数：

$$\frac{\arctan x}{x} = 1 - \frac{x^2}{3} + \frac{x^4}{5} + O(x^6), \qquad \frac{\operatorname{artanh} x}{x} = 1 + \frac{x^2}{3} + \frac{x^4}{5} + O(x^6).$$

例如第二个式子的余项满足

$$\left|\sum_{k=3}^{\infty}\frac{x^{2k}}{2k+1}\right| \le \frac{|x|^6}{7}\sum_{j=0}^{\infty}|x|^{2j} = \frac{|x|^6}{7(1-x^2)}.$$

第一个交错级数的绝对余项也被这同一个正级数控制。第 10.3 节的 p 级数给出

$$p(x) = -x^5/3 + R_p(x), \qquad |R_p(x)| \le \frac{|x|^9}{5(1-|x|^4)}.$$

令 $b = \tanh 1$、$h = \tan 1$、$\delta_\beta = \beta - 1$、$\delta_\alpha = \alpha - 1$。所用的一、二阶导数为

$$(\log\cosh y)' = \tanh y, \quad (\log\cosh y)'' = 1 - \tanh^2 y,$$

$$(-\log\cos y)' = \tan y, \quad (-\log\cos y)'' = 1 + \tan^2 y.$$

再求一次导数,

$$(\log\cosh y)''' = -2\tanh y\ \operatorname{sech}^2 y, \qquad (-\log\cos y)''' = 2\tan y\ \sec^2 y.$$

前者的绝对值不超过 2。后者只需在 α 和 1 之间估计；由于 $0 \le \alpha \le 1$，其绝对值不超过 $2\tan 1\ \sec^2 1$。分别记两式的 Taylor 积分余项为 R_β, R_α，则

$$|R_\beta| \le \frac{2}{6}|\delta_\beta|^3, \qquad |R_\alpha| \le \frac{2\tan 1\ \sec^2 1}{6}|\delta_\alpha|^3.$$

这里系数 $1/6$ 来自 $\frac{1}{2}\int_0^{|\delta|}(|\delta| - t)^2 dt = |\delta|^3/6$。展开为

$$\log\cosh(1+\delta_\beta) - \log\cosh 1 = b\delta_\beta + \frac{1-b^2}{2}\delta_\beta^2 + O(\delta_\beta^3),$$

$$-\log\cos(1+\delta_\alpha) + \log\cos 1 = h\delta_\alpha + \frac{1+h^2}{2}\delta_\alpha^2 + O(\delta_\alpha^3).$$

因为

$$\delta_\beta = x^2/3 + x^4/5 + O(x^6), \quad \delta_\alpha = -x^2/3 + x^4/5 + O(x^6),$$

$$\delta_\beta^2 = x^4/9 + O(x^6), \quad \delta_\alpha^2 = x^4/9 + O(x^6), \quad \delta_\beta^3 = O(x^6), \quad \delta_\alpha^3 = O(x^6),$$

代回得到

$$\log\cosh\beta - \log\cosh 1 = \frac{b}{3}x^2 + \left(\frac{b}{5} + \frac{1-b^2}{18}\right)x^4 + O(x^6),$$

$$-\log\cos\alpha + \log\cos 1 = -\frac{h}{3}x^2 + \left(\frac{h}{5} + \frac{1+h^2}{18}\right)x^4 + O(x^6).$$

再加上 $p(x)$，并记 $L = \cosh 1/\cos 1$：

$$\log\frac{\mathfrak{r}(x)}{L} = a_2 x^2 + \ell_4 x^4 - \frac{x^5}{3} + O(x^6),$$

$$a_2 = \frac{b-h}{3}, \qquad \ell_4 = \frac{b+h}{5} + \frac{2+h^2-b^2}{18}.$$

令上式右边为 $z(x)$。由于 $z = O(x^2)$,

$$e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2} + O(z^3), \qquad \frac{z^2}{2} = \frac{a_2^2}{2}x^4 + O(x^6), \quad z^3 = O(x^6).$$

所以

$$\mathfrak{r}(x) = L\left[1 + a_2x^2 + \left(\ell_4 + \frac{a_2^2}{2}\right)x^4 - \frac{x^5}{3} + O(x^6)\right].$$

定义 $a_4 = \ell_4 + a_2^2/2$，再代入 $x = 1/d$：

$$\mathfrak{r}_d = L\left[1 + \frac{a_2}{d^2} + \frac{a_4}{d^4} - \frac{1}{3d^5} + O(d^{-6})\right].$$

一次项和三次项均为零，五次项为 $-L/(3d^5)$。各常数的数值为

$$La_2 \approx -0.757603347512237, \qquad La_4 \approx 2.035222101370122.$$

这里先固定 d 取 $m \to \infty$ 的块极限，再令 $d \to \infty$；所得展开描述的是基图常数随 d 的变化。

11. 固定基图的唯一期望极值

11.1 随机吹胀模型

定义 11.1 (固定基图的两个吹胀模型).

固定奇数 $d \geq 3$。对任意 d 阶竞赛图 T^*，将每个顶点替换成一个 m 阶随机竞赛图，块间全部边依照 T^*。总阶数 $N = dm$。

内部独立均匀随机的模型记 $\mathcal{T}(T^*, m)$；内部独立均匀正则的模型记 $\mathcal{R}(T^*, m)$，后一模型要求 m 奇。圈、路径期望分别记 $\mathbb{E}C, \mathbb{E}H$，归一化为

$$\nu_N = (N-1)!/2^N, \qquad \mu_N = N!/2^{N-1}.$$

这一推论承接 [12, 命题 7.1 及引理 9.1]、Fang–Huang [11, 定理 1.4 及推论 3.4] 的等号分类，以及 Wormald [6, 定理 1、4、5] 的模型比较。下面补出正则基图的同构判定，并排除非正则基图。

推论 11.2 (唯一期望极值).

对每个固定奇数 $d \geq 3$，存在 M_d，使得 $m \geq M_d$ 时，上述两个模型的圈数和路径数期望都由圆环基图唯一最大化，唯一性按图同构理解。对于 $\mathcal{R}$，m 限于奇数。

在上述已有结果与补充论证下，推论回答 Wormald [6] 的猜想 1，并给出正则内部块和路径数的相应结论。

11.2 正则基图的极限常数

对正则基图，第 9、10 节给出

$$\lim_{m\to\infty} \frac{\mathbb{E}C_{\mathcal{T}}}{\nu_N} = \lim_{m\to\infty} \frac{\mathbb{E}H_{\mathcal{T}}}{\mu_N} = \rho_d(S),$$

$$\lim_{\substack{m\to\infty \\ m\ \text{奇}}} \frac{\mathbb{E}C_{\mathcal{R}}}{\nu_N} = \lim_{\substack{m\to\infty \\ m\ \text{奇}}} \frac{\mathbb{E}H_{\mathcal{R}}}{\mu_N} = e^{1/d}\rho_d(S),$$

$$\rho_d(S) = \frac{\det(I + S/d)}{\det(I + iS/d)}.$$

因此，在正则基图中只需比较行列式比值 $\rho_d(S)$。对非正则基图，模型极限不再由这个公式给出。下面直接估计其圈数和路径数期望，证明归一化后均趋于零。

11.3 非正则度差与指数损失

定义 11.3 (非正则基图的出度参数).

令 d_i 为基图出度，$b_i = d_i + 1/2$，并定义

$$a_i = \frac{2b_i}{d}, \qquad \kappa = \left(\prod_{i=1}^{d} a_i\right)^{1/d}, \qquad s_i = 2d_i - (d-1).$$

记 $s = (s_1, \dots, s_d)^T$，所以 $\|s\|_2^2 = \sum_{i=1}^{d} s_i^2$。每条边恰贡献一个出度，因此

$$\sum_i d_i = \binom{d}{2}, \qquad \sum_i a_i = \frac{2\binom{d}{2} + d}{d} = d, \qquad a_i = 1 + \frac{s_i}{d} \in (0, 2), \qquad \sum_i s_i = 0.$$

函数 $f(a) = a - 1 - \log a$ 满足 $f'(a) = (a-1)/a$，所以在 $a = 1$ 达到唯一最小值 $f(1) = 0$。于是

$$\log \kappa = \frac{1}{d}\sum_i \log a_i \le \frac{1}{d}\sum_i (a_i - 1) = 0.$$

取等要求全部 $a_i = 1$，即全部 $d_i = (d-1)/2$。非正则时 $\kappa < 1$。为了计算损失，使用带积分余项的二阶展开：

$$\log a = (a-1) - (a-1)^2 \int_0^1 \frac{1-t}{[1 + t(a-1)]^2}\, dt.$$

由于 $0 < 1 + t(a-1) < 2$，

$$\int_0^1 \frac{1-t}{[1+t(a-1)]^2}\, dt \ge \frac{1}{4}\int_0^1 (1-t)\, dt = \frac{1}{8}.$$

代入 a_i 并求和，

$$\log \kappa \le \frac{1}{d}\sum_i \left(\frac{s_i}{d} - \frac{s_i^2}{8d^2}\right) = -\frac{\|s\|_2^2}{8d^3}.$$

奇 d 时每个 s_i 为偶数。非正则意味着至少一个 $s_i \neq 0$；零和条件还要求存在相反符号的非零项，各自绝对值至少 2。因此 $\|s\|_2^2 \ge 2^2 + 2^2 = 8$，并有

$$\kappa^N \le \exp[-N\|s\|_2^2/(8d^3)] \le e^{-N/d^3}.$$

在 $\mathcal{T}$ 模型中，令 W 为邻接矩阵的逐元期望。记 $\mathrm{Sym}(N)$ 为 $[N]$ 上的置换群，$\mathcal{C}_N$ 为其中的 N-循环。对非负 N 阶矩阵定义

$$\operatorname{per} W = \sum_{\sigma \in \mathrm{Sym}(N)} \prod_{v=1}^{N} W_{v,\sigma(v)}, \qquad C(W) = \sum_{\sigma \in \mathcal{C}_N} \prod_{v=1}^{N} W_{v,\sigma(v)}.$$

每个有向 Hamilton 圈对应一个 N-循环，且其边涉及不同的无序顶点对。这些内部随机边相互独立，因此圈出现的概率等于对应 W 元素之积。对所有圈求和，得

$$\mathbb{E} C_{\mathcal{T}} = C(W) \le \operatorname{per} W.$$

最后的不等式来自 $\mathcal{C}_N \subseteq \mathrm{Sym}(N)$ 及权重的非负性。这里仅对单循环使用边的独立性；含二循环的一般置换不具有这一性质。

11.4 行和取整与 Brégman 界

$\lceil a \rceil$ 为不小于 a 的最小整数。

定义 11.4 (行和的整数目标).

设 $m \geq 2$；对于正则内部块模型，进一步要求 m 为奇数。在 W 中，第 i 类的每一行之和为

$$r_i = md_i + \frac{m-1}{2} = mb_i - \frac{1}{2}, \qquad R_i = \lceil r_i \rceil.$$

先讨论任意 L 元行 w，其中 $0 \leq w_j \leq 1$，当前行和记为 $r = \sum_{j=1}^{L} w_j$，目标整数行和 R 满足 $r \leq R \leq L$。需要补入 $s_0 = R - r$，可用容量为 $\sum_j (1 - w_j) = L - r \geq s_0$。从 $j = 1$ 开始依次取

$$\delta_j = \min(1 - w_j, s_{j-1}), \qquad s_j = s_{j-1} - \delta_j, \qquad w'_j = w_j + \delta_j.$$

递推的每一步满足

$$s_j = \max(0, s_{j-1} - (1 - w_j)) = \max\left(0, s_0 - \sum_{h=1}^{j} (1 - w_h)\right).$$

第一等式由减去两数的最小值得到；第二等式从 $j = 1$ 开始逐步代入。

递推得到 $s_L = \max(0, s_0 - \sum_j (1 - w_j)) = 0$，所以 $0 \leq w'_j \leq 1$ 且 $\sum_j w'_j = R$。永久式各系数非负，这种逐元增加不使其减少。

固定其他行，将永久式写作 $\sum_j w_j c_j$，其中 c_j 是删去当前行和第 j 列后的永久式，故 $c_j \geq 0$。若两个元素 w_a, w_b 严格介于 0 与 1，重标这两个坐标使 $c_a \geq c_b$，取

$$\eta = \min(1 - w_a, w_b) > 0, \qquad w'_a = w_a + \eta, \qquad w'_b = w_b - \eta.$$

行和保持不变，且

$$\sum_j w'_j c_j - \sum_j w_j c_j = \eta(c_a - c_b) \geq 0.$$

至少一个坐标变成 0 或 1，非整数坐标数减少。至多 $L - 1$ 次后至多剩一个非整数坐标；若其余坐标均为整数且总和 R 为整数，最后一个坐标也是整数。对各行执行此过程，得到 0、1 矩阵 $W^{\sharp}$，每个第 i 类行有 R_i 个 1，而且 $\operatorname{per} W \leq \operatorname{per} W^{\sharp}$。

所得 $W^{\sharp}$ 是具有指定行和的 0、1 矩阵。其对角元可以为 1，这不影响 Brégman 不等式的应用。

现在引用Brégman 不等式（Alon 论文 Lemma 2.1）： 0、1 矩阵的行和为 $q_1, \ldots, q_L > 0$ 时，

$$\operatorname{per} W^{\sharp} \leq \prod_{\ell=1}^{L} (q_\ell!)^{1/q_\ell}.$$

因为 $r_i \geq (m-1)/2 > 0$，有 $R_i \geq 1$。每类恰有 m 行，故

$$\operatorname{per} W \leq \prod_{i=1}^{d} (R_i!)^{m/R_i}.$$

结合 $\operatorname{per} W \leq \operatorname{per} W^{\sharp}$，即得所需的加权矩阵上界。

11.5 圈期望的归一化

永久式为零时，所需上界显然成立。以下设相应永久式为正，以便取对数。令 $m \ge 2$，$N = dm$，并写 $R_i = mb_i + \xi_i$。由取整的定义，$|\xi_i| \le 1/2$，且

$$R_i \ge m/2 - 1/2 \ge m/4, \qquad R_i \le N.$$

事实上，

$$0 \le R_i - r_i < 1, \qquad \xi_i = R_i - mb_i = (R_i - r_i) - \frac{1}{2} \in [-1/2, 1/2).$$

使用整数 $R \ge 1$ 的带余项 Stirling 界

$$\log(R!) = R\log R - R + \frac{1}{2}\log(2\pi R) + \frac{\theta_R}{12R}, \qquad 0 < \theta_R < 1.$$

因此

$$\begin{aligned} m\sum_{i=1}^{d} \frac{\log(R_i!)}{R_i} &\le m\sum_i \log R_i - N + m\sum_i \frac{\log(2\pi R_i)}{2R_i} + m\sum_i \frac{1}{12R_i^2} \\ &\le m\sum_i \log R_i - N + 2d\log(2\pi N) + \frac{4d}{3m}. \end{aligned}$$

最后两项分别使用 $m/(2R_i) \le 2$ 和 $m/(12R_i^2) \le 4/(3m)$。Stirling 下界也给

$$\log(N!/2^N) \ge N\log(N/2) - N.$$

相减后，

$$\log \frac{\operatorname{per} W}{N!/2^N} \le m\sum_i \log \frac{2R_i}{N} + 2d\log(2\pi N) + \frac{4d}{3m}.$$

令 $y_i = \xi_i/(mb_i)$。由于 $b_i \ge 1/2$，$|y_i| \le 1/m \le 1/2$，且

$$\frac{2R_i}{N} = a_i(1 + y_i), \qquad |\log(1+y_i)| = \left|\int_0^{y_i} \frac{dt}{1+t}\right| \le \frac{|y_i|}{1-|y_i|} \le \frac{2}{m}.$$

所以

$$m\sum_i \log \frac{2R_i}{N} \le m\sum_i \log a_i + 2d = N\log\kappa + 2d.$$

再使用 $4d/(3m) \le 2d/3$ 以及 $N!/2^N = N\nu_N$，得到明确上界

$$\frac{\mathbb{E}C_{\mathcal{T}}}{\nu_N} \le e^{8d/3}(2\pi)^{2d} N^{2d+1}\kappa^N.$$

在正则内部块模型中，每个样本的行和都是正整数 $mb_i - 1/2$。对样本 G 的邻接矩阵 A_G，有 $C(G) \le \operatorname{per} A_G$。将 Brégman 界及上述估计用于 A_G，再取期望，得到

$$\frac{\mathbb{E}C_{\mathcal{R}}}{\nu_N} \le e^{8d/3}(2\pi)^{2d} N^{2d+1}\kappa^N.$$

正则模型仅取合法奇 m。非正则基图有 $\kappa < 1$；将右端取对数并除以 N，

$$\frac{\log(e^{8d/3}(2\pi)^{2d}N^{2d+1}\kappa^N)}{N} = \log\kappa + \frac{8d/3 + 2d\log(2\pi) + (2d+1)\log N}{N} \longrightarrow \log\kappa < 0,$$

这里使用了 $\log N/N \to 0$；由积分估计，

$$0 \le \frac{\log N}{N} = \frac{1}{N}\int_1^N \frac{dt}{t} \le \frac{1}{N}\int_1^N \frac{dt}{\sqrt{t}} = \frac{2(\sqrt{N}-1)}{N} \longrightarrow 0.$$

记右端上界为 B_N，令 $c = -\frac{1}{2}\log\kappa > 0$。由于 $\log B_N/N \to -2c$，充分大 N 时有 $B_N \le e^{-cN}$。同理，任意固定次数的多项式乘以 κ^N 均趋于零；下一节的路径估计也将使用这一事实。

故两个归一化圈期望都趋于 0。

11.6 增点构造与路径期望

引理 11.5 (随机增点与路径计数).

固定一个有 $N \ge 2$ 个顶点的竞赛图 G，加入新顶点 v，与旧顶点的边独立公平定向。每条路径 $x_1 \to \cdots \to x_N$ 对应唯一候选圈 $v \to x_1 \to \cdots \to x_N \to v$。由于 $x_1 \ne x_N$，所需的两条新增边不同，其联合概率为 $(1/2)^2 = 1/4$。圈以 v 为规范起点，删除 v 是逆操作。条件 $N \ge 2$ 必不可少：$N = 1$ 时 $H(G) = 1$，但增广竞赛图没有有向二圈。本文固定 $d \ge 3$ 的吹胀应用自动满足该条件。因此

$$\mathbb{E}[C_{\text{aug}} \mid G] = H(G)/4, \qquad 4\nu_{N+1} = \frac{4N!}{2^{N+1}} = \frac{N!}{2^{N-1}} = \mu_N,$$

$$\frac{\mathbb{E}H}{\mu_N} = \frac{\mathbb{E}C_{\text{aug}}}{\nu_{N+1}}.$$

记 G_{aug} 为增点后的随机竞赛图，$C_{\text{aug}} = C(G_{\text{aug}})$。对 $\mathcal{T}$，令 W_{aug} 为增广邻接矩阵的逐元期望；对 $\mathcal{R}$，先固定一个增广样本，记其邻接矩阵为 A_{aug}。分别应用第 11.4 节的行和补齐与取整，得到 $(N+1)$ 阶 0、1 矩阵 $W^{\sharp}_{\text{aug}}$。于是

$$\mathbb{E}C_{\text{aug},\mathcal{T}} = C(W_{\text{aug}}) \le \operatorname{per} W_{\text{aug}} \le \operatorname{per} W^{\sharp}_{\text{aug}},$$

$$C(G_{\text{aug}}) \le \operatorname{per} A_{\text{aug}} \le \operatorname{per} W^{\sharp}_{\text{aug}} \qquad (\mathcal{R} \text{ 的每个样本}).$$

第一行利用内部边的独立性；第二行对每个正则块样本分别成立。

对于 $\mathcal{T}$ 的增广期望矩阵，旧行和为 mb_i；对于 $\mathcal{R}$ 的每个实际增广样本，旧行和不超过 $mb_i + 1/2$。统一选择

$$R'_i = \lceil mb_i + 1/2 \rceil = mb_i + \xi'_i, \qquad \frac{1}{2} \le \xi'_i < \frac{3}{2}.$$

新行的目标行和取 $R_0 = N$。由 $b_i \le d - 1/2$ 和 $m \ge 2$，有 $mb_i + 1/2 \le N - 1/2$，故 $m/2 \le R'_i \le N$。所有目标行和均不超过列数 $N+1$，可以应用第 11.4 节的取整过程。于是 Brégman 界给出

$$\log \operatorname{per} W^{\sharp}_{\text{aug}} \le m \sum_i \frac{\log(R'_i!)}{R'_i} + \frac{\log(N!)}{N}.$$

沿用 $R'_i \ge m/4$、$R'_i \le N+1$ 计算旧行余项，并单列新行，

$$\begin{aligned}\log \operatorname{per} W_{\mathrm{aug}}^{\sharp} &\le m\sum_{i}\log R_i' - N + \log N - 1 \\ &\quad + 2d\log(2\pi(N+1)) + \frac{4d}{3m} + \frac{\log(2\pi N)}{2N} + \frac{1}{12N^2} \\ &\le m\sum_{i}\log R_i' - N + \log N - 1 \\ &\quad + (2d+1)\log(2\pi(N+1)) + \frac{4d}{3m} + \frac{1}{12}.\end{aligned}$$

减去 Stirling 下界 $\log((N+1)!/2^{N+1}) \ge (N+1)\log((N+1)/2) - (N+1)$。其中主项满足

$$\begin{aligned}&m\sum_{i}\log R_i' + \log N - (N+1)\log((N+1)/2) \\ &= m\sum_{i}\log(2R_i'/N) + N\log(N/(N+1)) + \log(2N/(N+1)).\end{aligned}$$

第二项不大于 0，第三项不大于 $\log 2$。而 $\log(1+y) \le y$ 对于 $y \ge 0$ 由积分 $\int_0^y (1+t)^{-1}dt \le y$ 得出，故

$$\begin{aligned}m\sum_{i}\log(2R_i'/N) &= N\log\kappa + m\sum_{i}\log(1+\xi_i'/(mb_i)) \\ &\le N\log\kappa + \sum_{i}\frac{\xi_i'}{b_i} \le N\log\kappa + 3d.\end{aligned}$$

于是，使用 $4d/(3m) \le 2d/3$，

$$\begin{aligned}\log\frac{\operatorname{per} W_{\mathrm{aug}}^{\sharp}}{(N+1)!/2^{N+1}} &\le N\log\kappa + \frac{11d}{3} + \frac{1}{12} + \log 2 \\ &\quad + (2d+1)\log(2\pi(N+1)).\end{aligned}$$

取指数，再将 $(N+1)!/2^{N+1} = (N+1)\nu_{N+1}$ 代入，两个模型分别满足

$$\frac{\mathbb{E}H_{\mathcal{T}}}{\mu_N} \le 2e^{11d/3+1/12}(2\pi)^{2d+1}(N+1)^{2d+2}\kappa^N,$$

$$\frac{\mathbb{E}H_{\mathcal{R}}}{\mu_N} \le 2e^{11d/3+1/12}(2\pi)^{2d+1}(N+1)^{2d+2}\kappa^N.$$

第二个界由逐样本的增广圈数上界取期望得到。固定非正则基图时，任一右端的对数除以 N 都趋于 $\log\kappa < 0$，故两个归一化路径期望均趋于零。

11.7 期望极值与共同阈值

证明。

固定 d 时，有标号基图至多有 $2^{\binom{d}{2}}$ 个，因而只有有限多个同构类。圆环的极限常数为 r_d 或 $e^{1/d}r_d$；由第 6.5 节，其余正则基图的极限严格较小，而非正则基图的归一化期望趋于零。

因此，对每个非圆环基图，充分大的 m 都使其归一化期望严格小于圆环。取这些有限个阈值的最大值，即得定理中的 M_d。

最后，期望在基图同构下不变。若 π 是基图之间的同构，将吹胀顶点记为 (i,a)，则映射

$$(i,a) \longmapsto (\pi(i),a)$$

保持块间方向，并将独立同分布的内部块重新排列，因此保持样本概率。它也给出路径和圈之间的双射，所以对应期望相同。结合上述严格不等式，等号类恰为圆环的同构类。□

12. 定理 1.1 的证明

命题 7.1 已由三类划分和全阶数谱比较证明，对所有竞赛图统一有 $H(T)\le (L+K_u/n)\mu_n$。第 8.2 节用奇阶圆环及偶阶删点构造给出 $P(n)\ge (L-K_\ell/n)\mu_n$；此处由定理 8.1 将谱因子转为实际路径计数，不使用切换保持路径数的错误推断。取三类的统一阈值及下界阈值的最大值，并令 $K=\max(K_u,K_\ell)$，即得定理 1.1。□

A. 辅助代数与模型计算

A.1 传递符号矩阵的行列式多项式

引理 6.1 已由传递矩阵的特征值及偶阶主子式给出

$$\det(I+tT_n^0)=\frac{(1+t)^n+(1-t)^n}{2}.$$

该公式同时覆盖奇阶和偶阶；命题 6.6 与第 8.2 节均使用这一版本。

A.2 交替切换与圆环的普通同构

设 $d=2q+1$。对传递矩阵作交替切换，$\varepsilon_i=(-1)^{i-1}$、$D_\varepsilon=\mathrm{diag}(\varepsilon_i)$。当 $i<j$、$\Delta=j-i$ 时，

$$(D_\varepsilon T_d D_\varepsilon)_{ij}=(-1)^{\Delta}.$$

定义圆环标签映射

$$\phi(i)=(q+1)i \pmod d.$$

因为 $2(q+1)=d+1$，$q+1$ 与 d 互素，故 ϕ 是置换。

若 $\Delta=2r$，则 $1\le r\le q$ 且

$$\phi(j)-\phi(i)\equiv (q+1)2r\equiv r \pmod d.$$

该差在 $\{1,\dots,q\}$，正是圆环中 $\phi(i)\to\phi(j)$ 的条件；切换矩阵此时也为 1。

若 $\Delta=2r+1$，则 $0\le r\le q-1$，且

$$\phi(j)-\phi(i)\equiv q+1+r \pmod d.$$

该差在 $\{q+1,\dots,2q\}$，方向相反；切换矩阵此时为 -1。反对称性处理 $i>j$，对角均为 0，所以这是逐条边的普通同构。

第 6、11 节还用到传递矩阵的幂有相同对角元。令 $Ze_j=e_{j+1}$（$j<d$）、$Ze_d=-e_1$。当 $i,j<d$ 时，

$$(Z^TT_dZ)_{ij}=(T_d)_{i+1,j+1}=(T_d)_{ij}.$$

当 $i<d, j=d$ 时，

$$(Z^TT_dZ)_{i,d}=-(T_d)_{i+1,1}=1=(T_d)_{i,d}.$$

当 $i=d, j<d$ 时，

$$(Z^T T_d Z)_{d,j} = -(T_d)_{1,j+1} = -1 = (T_d)_{d,j}.$$

最后对角元均为 0。因此 $Z^T T_d Z = T_d$，从而对每个整数 $p \geq 0$，

$$Z^T T_d^{2p} Z = T_d^{2p}.$$

取对角元便得到相邻对角相等，绕回时的两个负号抵消。

A.3 四阶行列式与四次矩等号

设 $a,b,c,g,e,f \in \mathbb{R}$，并令

$$M = \begin{pmatrix} 0 & a & b & c \\ -a & 0 & g & e \\ -b & -g & 0 & f \\ -c & -e & -f & 0 \end{pmatrix}.$$

记 M_{1j} 为删去第 1 行、第 j 列后的三阶行列式（不含代数余子式符号）。沿第一行展开，分别计算：

$$\begin{aligned} M_{12} &= \det \begin{pmatrix} -a & g & e \\ -b & 0 & f \\ -c & -f & 0 \end{pmatrix} \\ &= (-a)(0 - f(-f)) - g((-b)0 - f(-c)) + e((-b)(-f) - 0(-c)) \\ &= -af^2 - cgf + bef, \\ M_{13} &= \det \begin{pmatrix} -a & 0 & e \\ -b & -g & f \\ -c & -e & 0 \end{pmatrix} \\ &= (-a)((-g)0 - f(-e)) - 0 + e((-b)(-e) - (-g)(-c)) \\ &= -aef + be^2 - cge, \\ M_{14} &= \det \begin{pmatrix} -a & 0 & g \\ -b & -g & 0 \\ -c & -e & -f \end{pmatrix} \\ &= (-a)((-g)(-f) - 0(-e)) - 0 + g((-b)(-e) - (-g)(-c)) \\ &= -agf + bge - cg^2. \end{aligned}$$

将这些余子式代入第一行的展开，得到

$$\begin{aligned} \det M &= -aM_{12} + bM_{13} - cM_{14} \\ &= (a^2f^2 + acgf - abef) + (-abef + b^2e^2 - bcge) + (acgf - bcge + c^2g^2) \\ &= a^2f^2 + b^2e^2 + c^2g^2 - 2abef + 2acgf - 2bcge \\ &= (af - be + cg)^2. \end{aligned}$$

六个变量均为 ± 1 时，$af - be + cg$ 是三个 ± 1 之和，其值为 ± 1 或 ± 3，故行列式为 1 或 9。设 $D_4(S)$ 为四顶点主子式等于 9 的个数。由行列式的列多线性展开，在每列选择单位列或 tS 的列，得到

$$\det(I+tS)=\sum_{U\subseteq[d]} t^{|U|}\det S[U].$$

奇阶反对称矩阵 B 满足 $\det B=\det B^T=\det(-B)=-\det B$，所以其行列式为 0。二阶主子式均为 1，四阶中有 D_4 个 9，其余为 1。因此

$$\det(I+tS)=1+e_2t^2+e_4t^4+O(t^6),$$

$$e_2=\binom{d}{2},\qquad e_4=(\binom{d}{4}-D_4)+9D_4=\binom{d}{4}+8D_4.$$

下列展开只在 $t=0$ 附近使用。取 $|t|\,\|S\|_{\mathrm{op}}<1/2$，则每个特征值 μ 都满足 $|t\mu|<1/2$，并用在 1 处为 0 的对数级数定义 $\log(1+t\mu)$。有限个特征值求和与幂级数交换合法，且

$$\det(I+tS)=\prod_{\mu}(1+t\mu),\qquad \operatorname{tr}S^k=\sum_{\mu}\mu^k.$$

这里特征值按重数计入；实反对称标准形保证可在复数域对角化，零特征值也包括在内。

每个特征值的对数级数给

$$\log\det(I+tS)=\sum_{k\ge1}\frac{(-1)^{k+1}t^k}{k}\operatorname{tr}S^k=-\frac{t^2}{2}\operatorname{tr}S^2-\frac{t^4}{4}\operatorname{tr}S^4+O(t^6).$$

奇次迹为 0，因为 $\operatorname{tr}S^{2j+1}=\operatorname{tr}(S^{2j+1})^T=-\operatorname{tr}S^{2j+1}$。另一方面，将 $z=e_2t^2+e_4t^4+O(t^6)$ 代入 $\log(1+z)=z-z^2/2+O(z^3)$，其中 $z^2=e_2^2t^4+O(t^6)$、$z^3=O(t^6)$，得到

$$\log\det(I+tS)=e_2t^2+(e_4-e_2^2/2)t^4+O(t^6).$$

比较 t^4 的系数，得

$$-\operatorname{tr}S^4/4=e_4-e_2^2/2,\qquad \operatorname{tr}S^4=2e_2^2-4e_4=2\left(\binom{d}{2}\right)^2-4\binom{d}{4}-32D_4(S).$$

传递矩阵任取四个升序顶点都有 $a=b=c=g=e=f=1$，其行列式为 $(1-1+1)^2=1$，所以 $D_4(T_d)=0$。相减给

$$\operatorname{tr}T_d^4-\operatorname{tr}S^4=32D_4(S).$$

若四次矩取等，则 $D_4(S)=0$。取 $\varepsilon_1=1,\varepsilon_j=s_{1j}$（$j>1$），定义 $D_\varepsilon=\operatorname{diag}(\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_d)$ 和 $S'=D_\varepsilon SD_\varepsilon$。于是 $s'_{1j}=\varepsilon_1s_{1j}\varepsilon_j=s_{1j}^2=1$。各主子式乘以 $(\det D_\varepsilon[U])^2=1$，故 D_4 不变。任取 $i<j<k$ 且都不为 1，

$$\det S'[\{1,i,j,k\}]=(s'_{jk}-s'_{ik}+s'_{ij})^2.$$

若这三点形成有向三圈，则 $s'_{ij}=s'_{jk}=-s'_{ik}$，括号为 $3s'_{ij}$，平方为 9，矛盾。因此剩余顶点无有向三圈。如果 $i\to j$、$j\to k$ 而 $i\not\to k$，则 $k\to i$，会形成三圈；所以方向关系是严格全序，可按该全序排列。第一顶点指向所有剩余点，整个切换图于是为传递图。反过来带符号置换相似保持迹，故四次矩取等。$d=3$ 时切换后剩下两点，按其唯一边方向排列即可。

A.4 行和取整的终止性

定义 A.1 (整数化的终止计数).

为证明第 11.4 节的两坐标取整过程终止，记

$$q(w)=\#\{j:0<w_j<1\},\qquad q(W)=\sum_{\ell=1}^{L}q(W_{\ell,\cdot}).$$

每次两坐标移动不改变整数行和，使至少一个非整数坐标变成整数，且不改变其他整数坐标，所以 $q(w)$ 至少减少 1。最初 $q(w)\le L$，不可能无限下降。若停止时 $q(w)=1$，唯一非整数坐标为

$$w_a=R-\sum_{j\neq a}w_j\in\mathbb{Z},$$

这与 w_a 非整数矛盾，故终止时 $q(w)=0$。每行至多进行 $L-1$ 次移动，且不改变其他行；总移动次数至多为 $L(L-1)$。由第 11.4 节，每次移动使永久式增加 $\eta(c_a-c_b)\ge 0$。

A.5 增点界的归一化因子

我们补充第 11.6 节中归一化因子的计算。由 $md=N$，

$$m\sum_i\log R_i'=m\sum_i\log(2R_i'/N)+N\log(N/2).$$

于是

$$\begin{aligned}&N\log(N/2)+\log N-(N+1)\log((N+1)/2)\\&=N\log N-N\log 2+\log N-(N+1)\log(N+1)+(N+1)\log 2\\&=N[\log N-\log(N+1)]+[\log N+\log 2-\log(N+1)]\\&=N\log(N/(N+1))+\log(2N/(N+1)).\end{aligned}$$

在此后的指数界里，分母先是 $(N+1)!/2^{N+1}$。改成圈期望的分母时，

$$\frac{(N+1)!/2^{N+1}}{\nu_{N+1}}=\frac{(N+1)!}{N!}=N+1.$$

因此多项式次数从 $2d+1$ 变成 $2d+2$。增点恒等式又给

$$\frac{\mathbb{E}H}{\mu_N}=\frac{4\mathbb{E}C_{\text{aug}}}{4\nu_{N+1}}=\frac{\mathbb{E}C_{\text{aug}}}{\nu_{N+1}}.$$

因此，增点前后的归一化路径期望与圈期望相同。

A.6 有限基图的共同阈值

定义 A.2 (同构类上的归一化函数).

令 T 遍历基图的同构类，任取代表构造随机吹胀。由第 11.7 节，其期望与代表的选择无关。固定模型 $\mathcal{M}\in\{\mathcal{T},\mathcal{R}\}$ 及一种计数，定义

$$f_T(m)=\begin{cases}\mathbb{E}C_{\mathcal{M}}(T,m)/\nu_{dm}, & \text{圈},\\ \mathbb{E}H_{\mathcal{M}}(T,m)/\mu_{dm}, & \text{路径},\end{cases}\qquad f_*(m)=f_{\mathrm{Car}_d}(m).$$

记 $\ell_T=\lim_{m\to\infty}f_T(m)$ 及 $\ell_*=\lim_{m\to\infty}f_*(m)$；在 $\mathcal{R}$ 模型中这两个极限都只沿奇 m。

对这一模型和计数，圆环极限为 $\ell_* > 0$，其他同构类均满足 $\ell_T < \ell_*$。非圆环同构类的集合有限且非空：当 $d \geq 3$ 时，传递图非正则，而圆环图正则。因此

$$\delta = \min_{T \ncong \mathrm{Car}_d} (\ell_* - \ell_T) > 0.$$

非正则类的极限是 0；正则非圆环类由严格谱间隙处理。对每个类取 M_T，使 $m \geq M_T$ 时归一化期望 $f_T(m)$ 满足

$$|f_T(m) - \ell_T| < \delta/3.$$

圆环也取相同误差要求。令 M 为这些有限阈值的最大值，则

$$f_*(m) - f_T(m) > (\ell_* - \delta/3) - (\ell_T + \delta/3) \geq \delta/3 > 0.$$

对两种模型、两种计数所得的四个阈值再取最大值，即得统一的 M_d。正则内部块模型中的 m 始终限于奇数。

B. 标准工具的精确形式

这里记录正文使用的标准工具，省略教材式证明；非主删除、非负缩放与行和取整的专门论证仍在正文保留。

B.1 行列式工具

主子式展开、秩一更新和 Hadamard 界分别为

$$\det(I + tM) = \sum_{U \subseteq [n]} t^{|U|} \det M[U], \qquad \det(M + uv^{\mathsf{T}}) = \det M(1 + v^{\mathsf{T}} M^{-1} u),$$

$$|\det M| \leq \prod_i \|M_{i,\cdot}\|_2.$$

秩一公式要求 M 可逆。沿可逆矩阵路径，$d \log\det M = \mathrm{tr}(M^{-1} dM)$；复情形在所用局部对数支上成立。对 Hermitian 矩阵 $H_0, H_1 \leq q^2 I$（$q < 1$），积分此公式给出

$$|\log\det(I - H_1) - \log\det(I - H_0)| \leq \frac{\|H_1 - H_0\|_*}{1 - q^2}.$$

B.2 矩阵范数工具

$\|AB\|_F \leq \|A\|_{\mathrm{op}} \|B\|_F$，$\|AB\|_* \leq \|A\|_F \|B\|_F$，$\|uv^*\|_* = \|u\|_2 \|v\|_2$。因此

$$\|X^*X - Y^*Y\|_* \leq (\|X\|_F + \|Y\|_F) \|X - Y\|_F.$$

与 B.1 合用时，X, Y 须有共同的固定算子谱隙。

B.3 余项与 Stirling 量级

对 $0 \leq x < 1$，$0 \leq -\log(1-x) - x \leq x^2/[2(1-x)]$；对复数 $|z| < 1$，$|\log(1+z) - z| \leq |z|^2/[2(1-|z|)]$。固定有界窗口中 Taylor 余项由下一阶导数的一致界控制。Stirling 公式以 $\log n! = (n + \frac{1}{2}) \log n - n + \frac{1}{2} \log(2\pi) + O(n^{-1})$ 使用，隐含常数绝对。

B.4 凸性工具

Cauchy–Schwarz、Jensen 与算术—几何平均不等式按各自的标准形式使用；加权 Jensen 的权重须非负且和为一。吸收误差时使用 $ab \le \eta a^2 + b^2/(4\eta)$（$\eta > 0$），其中参数在取大阶阈值前固定。

B.5 Brégman 界

对零一方阵及其行和 r_i，$\operatorname{per} A \le \prod_i (r_i!)^{1/r_i}$；若有零行则永久式为零。本文按 [2] 的形式使用此界。分数条目的应用先按第 11.4 节作保行和的逐行舍入，再应用零一版本；舍入后的辅助矩阵允许非零对角元。

B.6 Gram 与行列式扰动

对 Hermitian 矩阵，$H \ge 0$ 指半正定；对缩放矩阵，$X \ge 0$ 则指逐条目非负，两个条件不相同。若 $0 \le H \le q^2 I$、$q < 1$，则 $\|(I-H)^{-1}\|_{\mathrm{op}} \le (1-q^2)^{-1}$。

定义 $\mathcal{G}(Z) = \det(I - Z^*Z)^{-1/2}$（$\|Z\|_{\mathrm{op}} < 1$），取正平方根。交换 Z^*Z 与 ZZ^* 不改变该值。删行投影 P_R 满足

$$Z^*Z - Z^*P_R Z = Z^*(I - P_R)Z \ge 0.$$

结合 B.1 的对数行列式积分，删除 t 行的损失由被删行的平方范数总和控制；在 $|Z_{ij}| \le C/n$、固定谱隙下为 $O(t/n)$。独立行、列删除所需的比较详见第 4.2 节。

最后使用标准迹范数界 $|\det(I+E)| \le \prod_j (1+\sigma_j(E)) \le e^{\|E\|_*}$。若 $(M + M^*)/2 \ge I$，则 $\|Mx\|\|x\| \ge \operatorname{Re}(x^*Mx) \ge \|x\|^2$，从而 M 可逆且 $\|M^{-1}\|_{\mathrm{op}} \le 1$。

作者说明

本文合并两条独立发展的研究主线。路径框架及其 L/C_* 界见固定版本存档 [14]；Wormald 项目与 [13,16] 的关系见引言。叶祥宇完成了早期路径界的配套 Lean 形式化，精确陈述见早期仓库固定版本。

仓库快照 [17] 记录了修订前稿件 30 个编号结果的 Lean 端点，包括尖锐路径界、原角 Hessian、路径卷积、谱比较及固定基图期望极值。固定覆盖表 说明对象、假设、量词和覆盖边界；配套复现说明 给出工具链和审计步骤。

本次修订调整论证组织，并加入明确标出的推论。固定 Lean 工程于 2026 年 11 月 7 日完成 fresh 重建和登记端点审计，实际日志随修订版提供。新增陈述与精炼稿仍待建立新端点映射；历史源码哈希对应原有快照。AI 用于表述和部分证明检查。吹胀期望极值的阈值是固定奇数基阶数下的存在性结论，不包含可计算阈值或对增长基阶数的一致性。

参考文献

[1] John Irving and Mohamed Omar. Revisiting the Rédei-Berge Symmetric Functions via Matrix Algebra. The Electronic Journal of Combinatorics 32(4) (2025), Paper P4.43, 23 pp. DOI: 10.37236/13841.

[2] Noga Alon. The Maximum Number of Hamiltonian Paths in Tournaments. Combinatorica 10(4) (1990), 319–324. DOI: 10.1007/BF02128667.

[3] Yanjun Han and Jonathan Niles-Weed. Approximate independence of permutation mixtures. The Annals of Statistics, to appear（作者发表目录）。arXiv:2408.09341v2（2024 年 9 月 9 日）；正文所引引理编号对应这一版本。

[4] Bo Deng, Xueliang Li, Bryan Shader and Wasin So. On the Maximum Skew Spectral Radius and Minimum Skew Energy of Tournaments. Linear and Multilinear Algebra 66(7) (2018), 1434–1441. DOI: 10.1080/03081087.2017.1357676.

[5] Peter McCullagh. An asymptotic approximation for the permanent of a doubly stochastic matrix. Journal of Statistical Computation and Simulation 84(2) (2014), 404–414. DOI: 10.1080/00949655.2012.712122. arXiv:1205.5723.

[6] N. C. Wormald. Tournaments with many Hamilton cycles. arXiv:2610.16245v1 (2026). Version.

[7] Ehud Friedgut and Jeff Kahn. On the Number of Hamiltonian Cycles in a Tournament. Combinatorics, Probability and Computing 14(5–6) (2005), 769–781. DOI: 10.1017/S0963548305006863.

[8] Eric Li. The Godsil–McKay Asymptotic for Latin Rectangles in the Sublinear Range of Erdős Problem 725. arXiv:2608.01671v1 (2026).

[9] Ilan Adler, Noga Alon and Sheldon M. Ross. On the Maximum Number of Hamiltonian Paths in Tournaments. Random Structures & Algorithms 18(3) (2001), 291–296. DOI: 10.1002/rsa.1010.

[10] Tibor Szele. Kombinatorikai vizsgálatok az irányított teljes gráffal kapcsolatban. Matematikai és Fizikai Lapok 50 (1943), 223–256. Original volume archive.

[11] Yijia Fang and Hao Huang. Maximizing directed cycles in tournaments. arXiv:2608.06238v1 (2026). arXiv version.

[12] Alexander Divoux and Shouda Wang. The maximum number of Hamiltonian cycles in tournaments. arXiv:2610.23755v1 (2026). arXiv version.

[13] Deep Bhattacharjee. *Two conjectures of Wormald on Hamilton cycles in tournaments.* Hexagon preprint 2610.00460v2 (2026). Version.

[14] Xingchen Liu. *Constant-factor bounds for Hamiltonian paths in tournaments*, v1.0 (8 October 2026). Version DOI: 10.5281/zenodo.23233166. Later archive: v1.2, 10.5281/zenodo.23288896.

[15] Xingchen Liu and Xiangyu Ye. Wormald tournament project, manuscript revision `2fd6a2c30260b826feef71049d7d593527fd7a42` (19 October 2026). Fixed manuscript.

[16] Deep Bhattacharjee. *Two conjectures of Wormald on Hamilton cycles in tournaments*, release v1.0.0 (14 October 2026). Release and source archive.

[17] Liu–Ye. *Tournament Hamiltonian counts*: source and formal-coverage snapshot `c678e9ee24fb304cad755a27c99f511c8640f75e`. Fixed repository revision.