

# Bodové a intervalové odhady

---

Supplementum ke cvičení 4ST201 Statistika

Lubomír Štěpánek<sup>1, 2</sup>



<sup>1</sup>Oddělení biomedicínské statistiky  
Ústav biofyziky a informatiky  
1. lékařská fakulta  
Univerzita Karlova, Praha



<sup>2</sup>Katedra biomedicínské informatiky  
Fakulta biomedicínského inženýrství  
České vysoké učení technické v Praze

(2019) Lubomír Štěpánek, CC BY-NC-ND 3.0 (CZ)



Dílo lze dále svobodně šířit, ovšem s uvedením původního autora a s uvedením původní licence. Dílo není možné šířit komerčně ani s ním jakkoliv jinak nakládat pro účely komerčního zisku. Dílo nesmí být jakkoliv upravováno. Autor neručí za správnost informací uvedených kdekoli v předložené práci, přesto vynaložil nezanedbatelné úsilí, aby byla uvedená fakta správná a aktuální, a práci sepsal podle svého nejlepšího vědomí a svých „nejlepších“ znalostí problematiky.

# Obsah

- 1 Opakování
- 2 Úvod do odhadování
- 3 Bodový odhad
- 4 Intervalový odhad
- 5 Literatura

# Příklad

- Pravděpodobnost narození chlapce je 0,515. Jaká je pravděpodobnost, že mezi 10 000 narozenými novorozenci bude
  - (i) více děvčat než chlapců?
  - (ii) relativní četnost chlapců bude v mezích od 0,515 do 0,517?

# Příklad

- Pravděpodobnost narození chlapce je 0,515. Jaká je pravděpodobnost, že mezi 10 000 narozenými novorozenci bude
  - (i) více děvčat než chlapců?
  - (ii) relativní četnost chlapců bude v mezích od 0,515 do 0,517?
- Řešení.
  - (i) 0,00135.
  - (ii) 0,15500.



# Příklad

- Zaměstnanec jezdí do zaměstnání pravidelně tam i zpět metrem. Doba čekání na příjezd soupravy metra se pohybuje rovnoměrně mezi 0 až 3 minutami. Jaká je pravděpodobnost, že celková doba čekání zaměstnance během 23 pracovních dní<sup>1</sup> bude kratší než 80 minut?

---

<sup>1</sup>zaměstnanec jede vždy dvakrát denně – do zaměstnání a zpět

# Příklad

- Zaměstnanec jezdí do zaměstnání pravidelně tam i zpět metrem. Doba čekání na příjezd soupravy metra se pohybuje rovnoměrně mezi 0 až 3 minutami. Jaká je pravděpodobnost, že celková doba čekání zaměstnance během 23 pracovních dní<sup>1</sup> bude kratší než 80 minut?
- Řešení. 0,969. □

---

<sup>1</sup>zaměstnanec jede vždy dvakrát denně – do zaměstnání a zpět

# Motivace

- ve výběru hodnot umíme spočítat výběrové charakteristiky
- obvykle nás ale zajímají *populační* charakteristiky
- pomocí výběrových charakteristik můžeme na populační charakteristiky odhadovat
  - jak se odhady provádí?
  - jaké vlastnosti mají takové odhady, jak jsou „přesné“?



# Pojem *populace*

- **populace** := základní soubor
- úplná množina (statistický soubor) všech prvků (statistických jednotek), které spojuje určitá vlastnost a o kterých se snažíme statisticky něco zjistit
- prvky dány výčtem (je-li rozsah populace konečný), nebo společnou vlastností všech prvků (je-li rozsah populace nekonečný i konečný)
- rozsah konečně velké populace obvykle značíme  $N$  (u nekonečně velké populace  $N \rightarrow \infty$ )
- např. {T. G. Masaryk, E. Beneš, . . . , V. Klaus, M. Zeman}, {všichni dosavadní prezidenti českého státu}, {všichni obyvatelé Evropy}, apod.

# Pojem výběr


- vyšetřit celou populaci v praxi takřka nemožné
- nekonečně velké populace nelze celkově šetřit už z principu
- výběr  $:=$  statistický soubor, obsahuje vybrané prvky z populace; je tedy podmnožinou populace
- výběr pořizujeme metodou náhodného, či záměrného výběru
- cílem získat reprezentativní výběr (vystihuje vlastnosti populace), nikoliv selektivní výběr

# Reprezentativní výběr

- takový výběr, z kterého je indukativními metodami možné usuzovat na vlastnosti „mateřské“ populace
- pořizujeme *záměrným*, či *náhodným* výběrem
  - záměrný výběr – opírá se o expertízu, zatížen subjektivitou
  - náhodný výběr – náhodné, nezávislé vybírání prvků populace do výběru

# Vztah populace a výběru

- z populace je vybírán výběr
- z charakteristik výběru jsou odhadovány charakteristiky populace (!)



# Bodový odhad statistického znaku

- předpokládáme, že charakteristická hodnota výběru (průměr, četnost) odpovídá populační hodnotě
- populační hodnota se pokládá rovna dané charakteristické hodnotě výběru
- např. „je-li četnost hypertoniků mezi 20 náhodnými pacienty právě 7, je i četnost hypertoniků v populaci  $\frac{7}{20} = 0,35 = 35 \%$ “
- s jakou „mírou jistoty“ jsme se „trefili“ do skutečné populační četnosti?
  - přirovnává se k lovu oštěpem

# Intervalový odhad statistického znaku

- (interval spolehlivosti, konfidenční interval)
- interval, ve kterém leží charakteristická hodnota populace s určitou pravděpodobností (spolehlivostí)
- např. např. „je-li četnost hypertoniků mezi 20 náhodnými pacienty právě 7, pak průměrná populační četnost hypertoniků leží s pravděpodobností 95 % intervalu (15; 55) %“
- s jakou „mírou jistoty“ jsme se „trefili“ do skutečné populační četnosti?
  - přirovnává se k lovu sítí

# Bodový odhad

- výběrová statistika  $T$  je odhadem charakteristiky  $\Theta$  základního souboru (populace), tedy

$$T = \hat{\Theta}$$

- vlastnosti bodového odhadu
  - (*nezkreslenost*) systematicky nenadhodnocuje ani nepodhodnocuje populační charakteristiku, tedy při opakovaných výběrech

$$|\mathbb{E}(T) - \Theta| = 0$$

- (*konzistentnost*) pro rostoucí velikost výběru  $n$  se odhad  $T$  blíží populačnímu protějšku, tedy pro libovolné  $\varepsilon > 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|T - \Theta| < \varepsilon) = 1$$

- (*vydatnost*) rozptyl odhadu  $T$  je co nejmenší, tedy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \text{var}(T) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}((T - \mathbb{E}(T))^2) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}((T - \Theta)^2) = 0$$

# Vybrané bodové odhady

- bodovým odhadem střední hodnoty je výběrový průměr výběru  $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ , tedy

$$\hat{\mu} = \bar{x} = \sum_{i=1}^n x_i$$

- bodovým odhadem pravděpodobnosti (našeho zájmu) je relativní četnost, tedy

$$\hat{p} = \frac{m}{n},$$

kde  $m$  je počet objektů našeho zájmu  $n$  je rozsah souboru



# Intervalový odhad

- narozdíl od bodového lze určit míru jeho „spolehlivosti“
- $100(1 - \alpha)$  % intervalový odhad charakteristiky  $\Theta$  je

$$P(\Theta_{\text{dolní mez}} < \Theta < \Theta_{\text{horní mez}}) = 1 - \alpha,$$

kde  $\Theta_{\text{dolní mez}}$  a  $\Theta_{\text{horní mez}}$  jsou náhodné veličiny a  $\alpha$  se volí obvykle  $\alpha \equiv 0,05$  nebo  $\alpha \equiv 0,01$

- existují i jednostranné varianty

# Výběrové rozdělení



- předpokládejme, že výběr  $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$  je konkrétní realizací vektoru náhodných veličin  $(X_1, X_2, \dots, X_n)$  a že  $\forall i \in \{1, 2, \dots, n\}$  je  $X_i \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$
- pak pro odhad střední hodnoty výběrového průměru platí

$$\mathbb{E}(\bar{X}) = \mathbb{E}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(X_i) = \frac{1}{n} \cdot n\mu = \mu$$

- a pro odhad rozptylu výběrového průměru platí

$$\text{var}(\bar{X}) = \text{var}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{var}(X_i) = \frac{1}{n^2} \cdot n\sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}$$

# Literatura

-  Hindls, Richard, Stanislava Hronová, Jan Seger a Jakub Fischer. *Statistika pro ekonomy*. Praha: Professional Publishing, 2007. ISBN: 978-80-86946-43-6.
-  Marek, Luboš. *Statistika v příkladech*. Praha: Professional Publishing, 2015. ISBN: 978-80-7431-153-6.

Děkuji za pozornost!

lubomir.stepanek@vse.cz

lubomir.stepanek@lf1.cuni.cz

lubomir.stepanek@fbmi.cvut.cz

[https://github.com/LStepanek/4ST201\\_Statistika](https://github.com/LStepanek/4ST201_Statistika)