

# Spojité náhodné veličiny a jejich charakteristiky, normální rozdělení

—  
Supplementum ke cvičení 4ST210 Statistika pro finance

Lubomír Štěpánek<sup>1, 2</sup>



<sup>1</sup>Oddělení biomedicínské statistiky  
Ústav biofyziky a informatiky  
1. lékařská fakulta  
Univerzita Karlova, Praha



<sup>2</sup>Katedra biomedicínské informatiky  
Fakulta biomedicínského inženýrství  
České vysoké učení technické v Praze

17. března 2020

(2020) Lubomír Štěpánek, CC BY-NC-ND 3.0 (CZ)



Dílo lze dále svobodně šířit, ovšem s uvedením původního autora a s uvedením původní licence. Dílo není možné šířit komerčně ani s ním jakkoliv jinak nakládat pro účely komerčního zisku. Dílo nesmí být jakkoliv upravováno. Autor neručí za správnost informací uvedených kdekoli v předložené práci, přesto vynaložil nezanedbatelné úsilí, aby byla uvedená fakta správná a aktuální, a práci sepsal podle svého nejlepšího vědomí a svých „nejlepších“ znalostí problematiky.

# Obsah

- 1 Opakování
- 2 Náhodná veličina
- 3 Spojité náhodná veličina
- 4 Normální rozdělení
- 5 Limitní věty
- 6 Literatura

# Příklad

- Na katederní schůzi, kde bylo původně šestnáct lidí, přišlo několik doktorandů pozdě. Jejich příchodem kleslo průměrné IQ v místnosti ze 140 na 137. Průměrné IQ ve skupince pozdě příchozích doktorandů bylo 125. Určete, kolik bylo doktorandů bylo ve skupince pozdě příchozích.

# Příklad

- V souboru deseti čísel je aritmetický průměr roven 12 a rozptyl 4. Do souboru přidáme hodnotu 23. Jak se změní průměr a rozptyl souboru?

# Příklad

- V souboru deseti čísel je aritmetický průměr roven 12 a rozptyl 4. Do souboru přidáme hodnotu 23. Jak se změní průměr a rozptyl souboru?
- *Řešení.*  $\bar{x}_{\text{nový}} = 13$ ,  $s^2_{x,\text{nový}} = 13\frac{7}{11}$  □

# Příklad

- Lod' pluje z říčního přístavu k ústí řeky rychlostí  $v_1 > 0$ , poté se vrací stejnou trasou zpět do přístavu rychlostí  $v_2 > 0$ . Určete průměrnou rychlost lodi na celkové trase z říčního přístavu k ústí řeky a zpět.

# Příklad

- Průměrná cena letenky kanadských vnitrostátních letů vzrostla o 20 %, zatímco rozptyl cen kanadských vnitrostátních letů vzrostl o 21 %. Jak se změnil variační koeficient cen letenek kanadských vnitrostátních letů?



# Příklad

- V urně je deset bílých a třicet černých koulí. S jakou pravděpodobností budou mezi šesti náhodně vytaženými koulemi právě čtyři černé, pokud
  - (i) každou kouli po vytažení vždy vrátíme zpět do urny?
  - (ii) koule po vytažení do urny zpět nevracíme?

# Příklad

- V malé nemocnici zaznamenají vždy od pondělí do neděle průměrně 35 porodů.
  - (i) Kolik porodů můžeme v dané nemocnici očekávat následující den?
  - (ii) Kolik porodů můžeme v dané nemocnici očekávat během následujících tří dní?
  - (iii) Jaký je očekávaný rozptyl počtu porodů v dané nemocnici během následujících tří dní?
  - (iv) S jakou pravděpodobností dojde v dané nemocnici během následujících tří dní právě k 12 porodům?
  - (v) S jakou pravděpodobností dojde v dané nemocnici během následujícího dne k nejvýše dvěma porodům?
  - (vi) S jakou pravděpodobností dojde v dané nemocnici během následujícího dne k alespoň jednomu porodu?
  - (vii) S jakou pravděpodobností dojde v dané nemocnici během následujícího dne právě ke čtyřem, pěti nebo šesti porodům?

# Příklad

- Určitá léčba je úspěšná průměrně u 80 % pacientů. S jakou pravděpodobností bude v kohortě deseti pacientů léčba neúspěšná nejvýše u jednoho z pacientů?

# Příklad

- Házíme desetkrát nespravedlivou (biasovanou) mincí, na které padne hlava s pravděpodobností 0,6.
  - (i) S jakou pravděpodobností padne ve všech deseti hodech desetkrát hlava?
  - (ii) S jakou pravděpodobností padne mezi deseti hody právě čtyřikrát hlava?
  - (iii) S jakou pravděpodobností padne mezi deseti hody alespoň osmkrát hlava?
  - (iv) Jaký počet padnutí hlavy je mezi deseti hody nejpravděpodobnější?

# Náhodná veličina

- je popsána číselným (nebo symbolickým) výsledkem náhodného pokusu
  - např. příjem náhodně vybrané domácnosti, doba do poruchy přístroje, počet dětí v rodině, počet porodů za noc v dané porodnici apod.
- náhodné veličiny se obvykle značí velkými písmeny z konce abecedy, tedy  $X, Y, Z, \dots$ , jejich konkrétní číselné realizace pak malými písmeny  $x, y, z, \dots$ 
  - např. je-li  $X$  počet porodů za noc v dané porodnici, pak  $x = 6$  značí, že zde došlo k  $X = x = 6$  porodům za noc
  - $X, Y, Z, \dots$ , mají tedy charakter proměnných, zatímco  $x, y, z, \dots$ , mají charakter konkrétních čísel (konstant)
- náhodné veličiny mohou být diskrétní, či spojité

# Rozdělení náhodné veličiny

- dáno *zákonem rozdělení náhodné veličiny*
  - tj. že náhodná veličina nabude konkrétní hodnoty nebo hodnoty z nějakého intervalu s určitou pravděpodobností
- lze postupně popsat
  - řadou rozdělení
  - distribuční funkcí
  - pravděpodobnostní funkcí, resp. hustotou
  - momentovou funkcí, resp. charakteristickou funkcí
- vhodnými ukazateli jsou pak střední hodnota a variabilita náhodné veličiny

# Spojité náhodné veličiny

- je popsána spojitým číselným výsledkem náhodného pokusu
  - např. příjem náhodně vybrané domácnosti, doba do poruchy přístroje, hmotnost náhodně vybraného balení kilogramové mouky apod.
- spojitá náhodná veličina  $X$  tedy může nabýt každé libovolné hodnoty z intervalu možných hodnot
- spojitá náhodná veličina  $X$  nabývá těchto hodnot s určitou „pravděpodobností“, kterou však nelze smysluplně popsat pro konkrétní (jednu) hodnotu
  - např. pohybuje-li se doba životnosti přístroje mezi 1000 až 1200 hodinami, pak pravděpodobnost, že pro náhodně vybraný přístroj bude životnost 1158,5 hodin je dle definice geometrické pravděpodobnosti rovna  $\frac{S}{\Omega} = \frac{\text{bod odpovídající 1158,5}}{\text{úsečka mezi body 1000 až 1200}} = \frac{0}{\infty} = 0$

# Rozdělení spojité náhodné veličiny

- není (!) možné popsat tabulkou typu

$x_1$	$x_2$	$\dots$	$x_k$
$P(x_1)$	$P(x_2)$	$\dots$	$P(x_k)$

neboť

- hodnota  $k$  roste nade všechny meze
- hodnot  $1, 2, \dots, k$  je nespočetně mnoho, tedy není smysluplně možné rozdělit interval možných hodnot spojité náhodné veličiny  $X$  na dílčí hodnoty  $x_1, x_2, \dots, x_k$
- jednotlivé pravděpodobnosti  $P(x_i)$  pro  $\forall i \in \{1, 2, 3, \dots\}$  jsou nulové<sup>1</sup>

<sup>1</sup>pravděpodobnost typu „bod ku úsečce“, neboli  $\frac{0}{\infty}$ , což vyplývá z geometrické definice pravděpodobnosti



# Rozdělení spojité náhodné veličiny

- proto je vhodné pro spojitou náhodnou veličinu  $X$  popsat pravděpodobnost jejího výskytu v *intervalu* možných hodnot, nikoliv pouze pro bodovou hodnotu

# Hustota pravděpodobnosti spojitě náhodné veličiny

- je funkce typu  $f_X : \mathbb{R} \rightarrow \langle 0, +\infty \rangle$
- nemá (!) rozměr ani vlastnosti pravděpodobnosti<sup>2</sup>
- přesto však platí, že  $\forall x \in \mathbb{R}$  je  $f_X(x) \geq 0$  a dále že

$$f_X(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{P(x - \Delta x \leq X \leq x + \Delta x)}{\Delta x}$$

- méně přesně tak lze pro velmi malé kladné  $\Delta x \approx 0$  psát, že

$$P(X = x) \approx \Delta x \cdot f_X(x)$$

- dále platí

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = 1$$

<sup>2</sup>běžně tedy může být např.  $f_X(x) > 1$

# Hustota pravděpodobnosti spojité náhodné veličiny

- pro spojitou náhodnou veličinu  $X$  vracející náhodné reálné číslo z intervalu  $\langle -1, 1 \rangle$  tak, že každé z takových čísel je vráceno stejně „pravděpodobně“, platí

$$f_X(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ \frac{1}{2}, & x \in \langle -1, 1 \rangle \\ 0, & x > 1 \end{cases}$$


# Hustota pravděpodobnosti spojitě náhodné veličiny

- stále uvažujeme spojitou náhodnou veličinu  $X$  vracející náhodné reálné číslo z intervalu  $\langle -1, 1 \rangle$  tak, že každé z takových čísel je vráceno stejně „pravděpodobně“
- snadno ověříme, že platí  $\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = 1$ , neboť

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx &= \int_{-\infty}^{-1} f_X(x) dx + \int_{-1}^{+1} f_X(x) dx + \int_{+1}^{+\infty} f_X(x) dx = \\ &= \int_{-\infty}^{-1} 0 \, dx + \int_{-1}^{+1} \frac{1}{2} dx + \int_{+1}^{+\infty} 0 \, dx = 0 + \left[ \frac{1}{2} x \right]_{-1}^{+1} + 0 = \\ &= \frac{1}{2} (1 - (-1)) = \frac{1}{2} \cdot 2 = \\ &= \boxed{1} \end{aligned}$$

# Hustota pravděpodobnosti spojitě náhodné veličiny

- pro náhodnou veličinu  $X$  vracející náhodné reálné číslo z intervalu  $\langle -1, 1 \rangle$  takovou, že každé číslo je vráceno stejně „pravděpodobně“



# Distribuční funkce (spojité) náhodné veličiny

- je funkce typu  $F_X : \mathbb{R} \rightarrow \langle 0, 1 \rangle$ , konkrétněji  $F_X : x \rightarrow P(X \leq x)$
- vrací tedy pro libovolnou hodnotu  $x \in \mathbb{R}$  pravděpodobnost  $P(X \leq x)$ , s jakou (spojitá) náhodná veličina  $X$  nepřevýší reálné číslo  $x$
- píšeme tedy  $F_X(x) = P(X \leq x)$
- dále je rovněž

$$P(X \leq x) = F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(\tau) d\tau$$

- a obdobně

$$f_X(x) = \frac{dF_X(x)}{dx}$$

# Distribuční funkce (spojité) náhodné veličiny

- také platí

$$\begin{aligned} P(x_1 \leq X \leq x_2) &= P(X \in \langle x_1, x_2 \rangle) = \\ &= \underbrace{P(X \leq x_1) + P(X \in \langle x_1, x_2 \rangle)}_{P(X \leq x_2)} - P(X \leq x_1) = \\ &= F_X(x_2) - F_X(x_1) = \\ &= \int_{-\infty}^{x_2} f_X(\tau) d\tau - \int_{-\infty}^{x_1} f_X(\tau) d\tau = \\ &= \int_{x_1}^{x_2} f_X(\tau) d\tau + \int_{-\infty}^{x_1} f_X(\tau) d\tau - \int_{-\infty}^{x_1} f_X(\tau) d\tau = \\ &= \int_{x_1}^{x_2} f_X(\tau) d\tau \end{aligned}$$

# Vlastnosti distribuční funkce (spojité) náhodné veličiny

$$\forall x \in \mathbb{R} \text{ je } 0 \leq F_X(x) \leq 1$$

$\forall x \in \mathbb{R}$  je  $F_X(x) = P(X \leq x)$  a nabývá tedy pouze hodnot z intervalu  $\langle 0, 1 \rangle$  □

$F_X(x)$  je neklesající funkce

$\forall a, b \in \mathbb{R} : a < b$  je  $F_X(a) = P(X \leq a)$  a  $F_X(b) = P(X \leq b) = P(X \leq a \cup X \in \langle a, b \rangle) = P(X \leq a) + P(X \in \langle a, b \rangle) \geq P(X \leq a) = F_X(a)$ , tedy  $F_X(x)$  je neklesající □

Platí, že  $P(a \leq X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$

$\forall a, b \in \mathbb{R} : a < b$  je  $F_X(a) = P(X \leq a)$  a  $F_X(b) = P(X \leq b) = P(X \leq a \cup X \in \langle a, b \rangle) = P(X \leq a) + P(X \in \langle a, b \rangle)$ , tedy  $F_X(b) - F_X(a) = P(X \leq a) + P(X \in \langle a, b \rangle) - P(X \leq a) = P(X \in \langle a, b \rangle)$ , tudíž je  $P(a \leq X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$  □



# Distribuční funkce spojité náhodné veličiny

- pro spojitou náhodnou veličinu  $X$  vracející náhodné reálné číslo z intervalu  $\langle -1, 1 \rangle$  tak, že každé z takových čísel je vráceno stejně „pravděpodobně“, platí


$$f_X(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ \frac{1}{2}, & x \in \langle -1, 1 \rangle \\ 0, & x > 1 \end{cases}$$

- protože  $\int \frac{1}{2} dx = \frac{1}{2}x + c$  a  $\int 0 dx = d_{1,2}$  pro vhodná  $c, d_{1,2} \in \mathbb{R}$ , je

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}, & x \in \langle -1, 1 \rangle \\ 1, & x > 1 \end{cases}$$

# Distribuční funkce spojité náhodné veličiny

- pro náhodnou veličinu  $X$  vracející náhodné reálné číslo z intervalu  $\langle -1, 1 \rangle$  takovou, že každé číslo je vráceno stejně „pravděpodobně“



# Střední hodnota spojitě náhodné veličiny

- ať je spojitá náhodná veličina  $X$  popsána svou hustotou pravděpodobnosti  $f_X(x)$
- pak střední hodnota  $\mathbb{E}(X)$  spojitě náhodné veličiny  $X$  je

$$\mathbb{E}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f_X(x) dx$$

- zřejmě dále platí
  - pro  $a, b \in \mathbb{R}$  je  $\mathbb{E}(aX + b) = a\mathbb{E}(X) + b$
  - pro libovolné náhodné veličiny  $X_1, X_2, \dots, X_p$  je  $\mathbb{E}(X_1 + X_2 + \dots + X_p) = \mathbb{E}(X_1) + \mathbb{E}(X_2) + \dots + \mathbb{E}(X_p)$
  - pro nezávislé náhodné veličiny  $X_1, X_2, \dots, X_p$  je  $\mathbb{E}(X_1 \cdot X_2 \cdot \dots \cdot X_p) = \mathbb{E}(X_1) \cdot \mathbb{E}(X_2) \cdot \dots \cdot \mathbb{E}(X_p)$

# Střední hodnota spojité náhodné veličiny

- pro náhodnou veličinu  $X$  vracející náhodné reálné číslo z intervalu  $\langle -1, 1 \rangle$  takovou, že každé číslo je vráceno stejně „pravděpodobně“, platí

$$f_X(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ \frac{1}{2}, & x \in \langle -1, 1 \rangle \\ 0, & x > 1 \end{cases}$$

- a proto

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx = \\ &= \int_{-\infty}^{-1} x f_X(x) dx + \int_{-1}^{+1} x f_X(x) dx + \int_{+1}^{+\infty} x f_X(x) dx = \end{aligned}$$

# Střední hodnota spojité náhodné veličiny

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X) &= \int_{-\infty}^{-1} x f_X(x) \, dx + \int_{-1}^{+1} x f_X(x) \, dx + \int_{+1}^{+\infty} x f_X(x) \, dx = \\ &= \int_{-\infty}^{-1} x \cdot 0 \, dx + \int_{-1}^{+1} x \cdot \frac{1}{2} \, dx + \int_{+1}^{+\infty} x \cdot 0 \, dx = \\ &= 0 + \left[ \frac{1}{2} \cdot \frac{x^2}{2} \right]_{-1}^{+1} + 0 = \\ &= \left[ \frac{1}{2} \cdot \frac{x^2}{2} \right]_{-1}^{+1} = \\ &= \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \right) = \\ &= \frac{1}{2} \cdot 0 = \boxed{0}\end{aligned}$$

# Rozptyl spojité náhodné veličiny

- ať je spojitá náhodná veličina  $X$  popsána svou hustotou pravděpodobnosti  $f_X(x)$
- pak rozptyl  $\text{var}(X)$  spojité náhodné veličiny  $X$  je

$$\begin{aligned}\text{var}(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mathbb{E}(X))^2 f_X(x) dx = \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_X(x) dx - \left( \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx \right)^2\end{aligned}$$

- zřejmě dále platí
  - pro  $a, b \in \mathbb{R}$  je  $\text{var}(aX + b) = a^2 \text{var}(X)$
  - pro nezávislé náhodné veličiny  $X_1, X_2, \dots, X_p$  je
$$\text{var}(X_1 + X_2 + \dots + X_p) = \text{var}(X_1) + \text{var}(X_2) + \dots + \text{var}(X_p)$$

# Rozptyl spojité náhodné veličiny

- pro náhodnou veličinu  $X$  vracející náhodné reálné číslo z intervalu  $\langle -1, 1 \rangle$  takovou, že každé číslo je vráceno stejně „pravděpodobně“, platí

$$f_X(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ \frac{1}{2}, & x \in \langle -1, 1 \rangle \\ 0, & x > 1 \end{cases}$$

- a proto

$$\begin{aligned} \text{var}(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_X(x) dx - \left( \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx \right)^2 = \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_X(x) dx - (\mathbb{E}(X))^2 = \end{aligned}$$

# Rozptyl spojité náhodné veličiny

$$\begin{aligned}\text{var}(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_X(x) dx - (\mathbb{E}(X))^2 = \\&= \int_{-\infty}^{-1} x^2 f_X(x) dx + \int_{-1}^{+1} x^2 f_X(x) dx + \int_{+1}^{+\infty} x^2 f_X(x) dx \\&\quad - (\mathbb{E}(X))^2 = \\&= \int_{-\infty}^{-1} x^2 \cdot 0 dx + \int_{-1}^{+1} x^2 \cdot \frac{1}{2} dx + \int_{+1}^{+\infty} x^2 \cdot 0 dx - (\mathbb{E}(X))^2 = \\&= 0 + \left[ \frac{1}{2} \cdot \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^{+1} + 0 - (\mathbb{E}(X))^2 = \left[ \frac{1}{2} \cdot \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^{+1} - (\mathbb{E}(X))^2 = \\&= \frac{1}{2} \left( \frac{1}{3} - \left( -\frac{1}{3} \right) \right) - 0^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} - 0 = \boxed{\frac{1}{3}}\end{aligned}$$



# Kvantily spojité náhodné veličiny

- ať je spojitá náhodná veličina  $X$  popsána svou hustotou pravděpodobnosti  $f_X(x)$  a distribuční funkcí  $F_X(x)$
- pak  $100p\%$  kvantil náhodné veličiny  $X$  je číslo  $x_p$  takové, že náhodná veličina  $X$  nabývá hodnoty nepřevyšující  $x_p$  s pravděpodobností  $0 \leq p \leq 1$
- formálně tedy

$$P(X \leq x_p) = F_X(x_p) = \int_{-\infty}^{x_p} f_X(\tau) d\tau = p$$

# Normální rozdělení

- náhodná veličina  $X$  sleduje normální rozdělení, tedy  $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$  o parametrech  $\mu \in \mathbb{R}$  a  $\sigma \in \mathbb{R} : \sigma \geq 0$ , pokud pro její pravděpodobnostní hustotu  $f_X(x)$  a pro libovolné  $x \in \mathbb{R}$  platí

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$


- platí, že

$$\mathbb{E}(X) = \mu$$

$$\text{var}(X) = \sigma^2$$

- náhodná veličina  $X$  sledující normální rozdělení obvykle vhodně popisuje fenomény založené na vzájemném působení mnoha drobných nezávislých, eventuálně navzájem se rušících vlivů
  - např. veličina  $X$  může popsat distribuci náhodných chyb, tělesné výšky dané populace, inteligenčního kvocientu, sytost barvy vlasů (šedotónové pixely) dané populace a mnoho dalšího

# Pravděpodobnostní hustota a distribuční funkce normálního rozdělení



# Distribuční funkce normálního rozdělení

- ať náhodná veličina  $X$  sleduje normální rozdělení, tedy  $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$  o parametrech  $\mu \in \mathbb{R}$  a  $\sigma \in \mathbb{R} : \sigma \geq 0$
- její distribuční funkce  $F_X(x)$  má tvar

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(\tau) d\tau = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\tau-\mu)^2}{2\sigma^2}} d\tau$$

- takový výraz ale nelze běžně integrovat, navíc numerické řešení integrálu by bylo nutné tabelizovat pro všechny kombinace  $(x, \mu, \sigma)$ , což není možné, proto zavádíme odvozenou náhodnou veličinu  $U \equiv \frac{X-\mu}{\sigma}$ , která sleduje standardní normální rozdělení  $U \sim \mathcal{N}(0, 1^2)$

# Standardní normální rozdělení

- ať náhodná veličina  $X$  sleduje normální rozdělení, tedy  $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$  o parametrech  $\mu \in \mathbb{R}$  a  $\sigma \in \mathbb{R} : \sigma \geq 0$
- náhodná veličinu  $U \equiv \frac{X-\mu}{\sigma}$ , sleduje standardní normální rozdělení  $U \sim \mathcal{N}(0, 1^2)$  s pravděpodobnostní hustotou

$$f_U(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}},$$

distribuční funkcí

$$F_U(x) = \int_{-\infty}^x f_U(\tau) d\tau = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{\tau^2}{2}} d\tau$$

a charakteristikami

$$\mathbb{E}(U) = 0$$

$$\text{var}(U) = 1$$

# Distribuční funkce standardního normálního rozdělení

- ať náhodná veličinu  $U \equiv \frac{X-\mu}{\sigma}$ , sleduje standardní normální rozdělení  $U \sim \mathcal{N}(0, 1^2)$  a má distribuční funkci

$$F_U(x) = \int_{-\infty}^x f_U(\tau) d\tau = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{\tau^2}{2}} d\tau$$

- takový výraz je stále nepraktický pro rutinní výpočty, ale díky standardizaci již lze smysluplně tabelizovat
- běžně píšeme

$$F_U(x) = P(U \leq x) = \Phi(x)$$

a pro malé hodnoty  $x \geq 0$  hodnoty  $\Phi(x)$  tabelizujeme

- díky sudosti pravděpodobnostní hustoty  $f_U(x)$  je  $P(U \leq x) = 1 - P(U \leq -x)$ , lze pro hodnoty  $x < 0$  využít vztah

$$\Phi(-x) = P(X \leq -x) = 1 - P(X \leq x) = 1 - \Phi(x)$$

# Příklad

- Pomocí úvahy nebo tabulek distribuční funkce standardního normálního rozdělení
  - (i) najděte  $\Phi(0)$ .
  - (ii) najděte  $x \in \mathbb{R}$  takové, aby  $\Phi(x) = 0,5$ .
  - (iii) najděte  $x \in \mathbb{R}$  takové, aby  $\Phi(x) = \Phi(-x)$ .
  - (iv) najděte  $\Phi(1,96)$ .
  - (v) najděte  $\Phi(-1,96)$ .
  - (vi) najděte  $x \in \mathbb{R}$  takové, aby  $\Phi(x) = 0,025$ .
  - (vii) najděte  $x \in \mathbb{R}$  takové, aby  $\Phi(x) = 1$ .
  - (viii) najděte  $x \in \mathbb{R}$  takové, aby  $\Phi(x) \leq 2$ .
  - (ix) najděte  $x \in \mathbb{R}$  takové, aby  $\Phi(x) = 0$ .
  - (x) najděte  $x \in \mathbb{R}$  takové, aby  $\Phi(x) = +\infty$ .
  - (xi) najděte  $\Phi(+\infty)$ .
  - (xii) najděte  $\Phi(-\infty)$ .
  - (xiii) najděte  $x \in \mathbb{R}$  takové, aby  $\Phi(x) - \Phi(-x) = 0,5$ .
  - (xiv) najděte  $x \in \mathbb{R}$  takové, aby  $P(|U| \leq x) = 0,95$ .

# Příklad

- Náhodná veličina  $X$  sleduje normální rozdělení  $\mathcal{N}(20, 16)$ . Jaká je pravděpodobnost, že nabude hodnoty
  - (i) menší než 16?
  - (ii) větší než 20?
  - (iii) v rozmezí mezi 12 a 28?
  - (iv) menší než 12 nebo větší než 28?



# Příklad

- Náhodná veličina  $X$  sleduje normální rozdělení  $\mathcal{N}(20, 16)$ . Jaká je pravděpodobnost, že nabude hodnoty
  - (i) menší než 16?
  - (ii) větší než 20?
  - (iii) v rozmezí mezi 12 a 28?
  - (iv) menší než 12 nebo větší než 28?
- Řešení.
  - (i) 0,158.
  - (ii) 0,500.
  - (iii) 0,955.
  - (iv) 0,046.



# Příklad

- Náhodná veličina  $X$  vrací hodnotu chyby měření určitým přístrojem a sleduje normální rozdělení se střední hodnotu  $\mu = 0,20$  a rozptylem  $\sigma^2 = 0,64$ .
  - (i) Jaká je pravděpodobnost, že absolutní hodnota chyby měření bude menší než 1,0?
  - (ii) Jaká je horní hranice chyby měření, které se může přístroj dopustit s pravděpodobností 0,95?

# Příklad

- Náhodná veličina  $X$  vrací hodnotu chyby měření určitým přístrojem a sleduje normální rozdělení se střední hodnotu  $\mu = 0,20$  a rozptylem  $\sigma^2 = 0,64$ .
  - (i) Jaká je pravděpodobnost, že absolutní hodnota chyby měření bude menší než 1,0?
  - (ii) Jaká je horní hranice chyby měření, které se může přístroj dopustit s pravděpodobností 0,95?
- Řešení.
  - (i) 0,775.
  - (ii) 1,516.



# Moivreova-Laplaceova centrální limitní věta

- buď  $X$  náhodná veličina daná součtem  $n$  vzájemně nezávislých náhodných veličin, z nichž každá sleduje alternativní rozdělení  $\mathcal{A}(\pi)$
- pak jistě náhodná veličina  $X$  sleduje binomické rozdělení o parametrech  $n$  a  $\pi$  a střední hodnotě  $n\pi$  a rozptylu  $n\pi(1 - \pi)$ , tedy  $X \sim \text{binom}(n, \pi)$
- dle Moivreovy-Laplaceovy centrální limitní věty platí

$$U \equiv \frac{X - n\pi}{\sqrt{n\pi(1 - \pi)}} \sim \mathcal{N}(0, 1^2)$$

- pro dostatečně velká  $n$  tedy binomické rozdělení konverguje k normálnímu

# Příklad

- Pravděpodobnost narození chlapce je 0,515. Jaká je pravděpodobnost, že mezi 10 000 narozenými novorozenci bude
  - (i) více děvčat než chlapců?
  - (ii) relativní četnost chlapců bude v mezích od 0,515 do 0,517?

# Příklad

- Pravděpodobnost narození chlapce je 0,515. Jaká je pravděpodobnost, že mezi 10 000 narozenými novorozenci bude
  - (i) více děvčat než chlapců?
  - (ii) relativní četnost chlapců bude v mezích od 0,515 do 0,517?
- Řešení.
  - (i) 0,00135.
  - (ii) 0,15500.



# Lindebergova-Lévyho centrální limitní věta

- buď  $X$  náhodná veličina daná součtem  $n$  vzájemně nezávislých náhodných veličin  $X_i$  pro  $\forall i \in \{1, 2, \dots, n\}$ , z nichž každá sleduje pro  $\forall i \in \{1, 2, \dots, n\}$  stejné rozdělení s konečnou střední hodnotou  $\mathbb{E}(X_i) = \mu < \infty$  a konečným rozptylem  $\text{var}(X_i) = \sigma^2 < \infty$
- pak jistě náhodná veličina  $X$  má střední hodnotu  $\mathbb{E}(X) = n\mu$  a rozptyl  $n\sigma^2$
- dle Lindebergovy-Lévyho centrální limitní věty platí

$$U \equiv \frac{X - n\mu}{\sqrt{n\sigma^2}} \sim \mathcal{N}(0, 1^2)$$

# Příklad

- Zaměstnanec jezdí do zaměstnání pravidelně tam i zpět metrem. Doba čekání na příjezd soupravy metra se pohybuje rovnoměrně mezi 0 až 3 minutami. Jaká je pravděpodobnost, že celková doba čekání zaměstnance během 23 pracovních dní<sup>3</sup> bude kratší než 80 minut?

---

<sup>3</sup>zaměstnanec jede vždy dvakrát denně – do zaměstnání a zpět



# Příklad

- Zaměstnanec jezdí do zaměstnání pravidelně tam i zpět metrem. Doba čekání na příjezd soupravy metra se pohybuje rovnoměrně mezi 0 až 3 minutami. Jaká je pravděpodobnost, že celková doba čekání zaměstnance během 23 pracovních dní<sup>3</sup> bude kratší než 80 minut?
- Řešení. 0,969. □

---



<sup>3</sup>zaměstnanec jede vždy dvakrát denně – do zaměstnání a zpět

# Ljapunova centrální limitní věta

- buď  $X$  náhodná veličina daná součtem  $n$  vzájemně nezávislých náhodných veličin  $X_i$  pro  $\forall i \in \{1, 2, \dots, n\}$ , z nichž každá sleduje pro  $\forall i \in \{1, 2, \dots, n\}$  (ne nutně shodné) rozdělení s konečnou střední hodnotou  $\mathbb{E}(X_i) < \infty$  a konečným rozptylem  $\text{var}(X_i) < \infty$
- dle Ljapunovy centrální limitní věty platí

$$U \equiv \frac{X - \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(X_i)}{\sqrt{\sum_{i=1}^n \text{var}(X_i)}} \sim \mathcal{N}(0, 1^2)$$

# Literatura

-  Hindls, Richard, Stanislava Hronová, Jan Seger a Jakub Fischer. *Statistika pro ekonomy*. Praha: Professional Publishing, 2007. ISBN: 978-80-86946-43-6.
-  Marek, Luboš. *Statistika v příkladech*. Praha: Professional Publishing, 2015. ISBN: 978-80-7431-153-6.

Děkuji za pozornost!

lubomir.stepanek@vse.cz

lubomir.stepanek@lf1.cuni.cz

lubomir.stepanek@fbmi.cvut.cz

[https://github.com/LStepanek/4ST210\\_Statistika\\_pro\\_finance](https://github.com/LStepanek/4ST210_Statistika_pro_finance)