

2024 年普通高等学校招生全国统一考试

上海 数学试卷

一、填空题：(本大题共有 12 题，满分 54 分，第 1~6 题每题 4 分，第 7~12 题每题 5 分)

1. 已知集合 $A = \{1, 2, 4\}$ ，集合 $B = \{1, 3\}$ ，则 $A \cup B =$ _____.
2. i 为虚数单位，复数 $z_1 = 1 + i$ ， $z_2 = 2 - i$ ，则 $z_1 z_2 =$ _____.
3. 已知随机变量 X 服从二项分布 $B(5, 0.2)$ ，则 $D[X]$ 的值为_____.
4. 不等式 $\frac{5x+3}{x-1} \leq 3$ 的解集为_____.
5. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A 、 B 、 C 对应的边长分别为 a 、 b 、 c ，已知 $b = 2$ ， $c = \sqrt{2}$ ， $B = 45^\circ$ ，
则 $A =$ _____.
6. 函数 $f(x) = x^3 - \frac{1}{x}$ 的导函数 $y = f'(x)$ 的最小值为_____.
7. 某校高三 (7) 班有 42 名学生，学号为 01 到 42，现采用随机数表法从该班抽取 7 名学生
参与有关学生平均睡眠时间的问卷调查，已知随机数表中第 2 行到第 4 行的各数如下：

07 34 65 52 68 12 60 35 77 73 87 88 08 17 98
12 74 19 65 40 58 61 42 71 98 44 87 66 36 19
90 11 03 67 94 01 67 10 54 76 45 14 31 01 67

若从随机数表的第 2 行第 3 列的数开始向右读，则抽取到的学生学号的极差是_____.
8. 定义：圆柱的中心为圆柱上下底面圆心连线的中点. 已知某圆锥和某圆柱的母线长相等，
且圆锥的底面与圆柱的下底面完全重合，若圆锥的顶点恰好是圆柱的中心，则该圆锥侧面展开图的圆心角为_____.
9. 已知 $|\vec{a} \cdot \vec{b}| = 1$ ，且 $\vec{b}(\vec{a} + \vec{b}) = 3$ ，那么 \vec{a} 在 \vec{b} 上的投影为_____.
10. 设 $(x-2)^n = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-2} x^2 + a_{n-1} x + a_n$ ($a_0, a_1, \dots, a_{n-2}, a_{n-1}, a_n \in R$)
若 $a_{n-2} + a_n = 2048$ ($n \geq 3$ 且 $n \in N$)，则 n 的值为_____.
11. 现有 2 个老师与 6 个学生去中共一大会址、宋庆龄故居、淞沪抗战纪念馆和龙华烈士陵园 4 个红色基地参观，8 人平均分为 4 组每组 2 人，每组随机去一个红色基地，设 A 事件
对应“2 个老师去不同的红色基地”， B 事件对应“去中共一大会址的不全是老师”，
那么 $P(A|B)$ 的值为_____.
12. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知圆 A 与 x 轴切于点 $(1, 0)$ ，直线 l 在两坐标轴截距的绝对值
相等. 当直线 l 截圆 A 所得弦长为 1 且将圆 A 分成面积比为 1:3 的两部分时，称直线 l 与圆 A
为一组“线圆对”. 则不同的“线圆对”的组数为_____.


二、选择题（本大题共有 4 题，满分 18 分，第 13~14 题每题 4 分，第 15~16 题每题 5 分）

13. 双曲线 $\Gamma: x^2 - y^2 = 1$ 的离心率为 ().
 A. $\sqrt{2}$ B. 2 C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$
14. 与三条两两异面的直线 a 、 b 、 c 均相交的直线 ().
 A. 一定不存在 B. 可能存在也可能不存在
 C. 有且仅有一条 D. 有无数条
15. 实数 $n > m$ ，奇函数 $y = f(x)$ 的定义域为 R ，且满足 $f(1) = -1$ ，若不等式 $f(x) > 0$ 的解集为 (m, n) ，则 $f(mn + n - m)$ 的值和 0 的大小关系为 ().
 A. $f(mn + n - m) > 0$ B. $f(mn + n - m) = 0$
 C. $f(mn + n - m) < 0$ D. $f(mn + n - m)$ 的值和 0 的大小关系不确定
16. 记无穷等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q ，前 n 项和为 S_n ， p 为常数， a_i 为数列 $\{a_n\}$ 的某一项，且 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 存在，则对于下列两个说法，判断正确的是 ().
 ① 任取 $p > 0$ ，在区间 $(p, +\infty)$ 中都存在无数个 i 满足对于每个给定的 i 都存在 $\{a_n\}$ 使得等式 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = a_i$ 成立
 ② 任取 $p \in (0, 1)$ ，在区间 $(-1, -p)$ 中都存在无数个 q 满足对每个给定的 q 存在唯一的 i 使等式 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = a_i$ 成立
 A. ①②均正确 B. ①正确②错误 C. ①错误②正确 D. ①②均错误

三、解答题（本大题共有 5 题，满分 78 分）

17. (本题满分 14 分，第 1 小题满分 7 分，第 2 小题满分 7 分)

如图，三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的侧棱长为 2， $AB = BC = 3$ ， $AA_1 \perp A_1B_1$ 且三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的某个侧面是正方形，点 M 为边 B_1C_1 的中点，点 N 在棱 AC 上且 $AN = 1$.



- (1) 求三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的体积，并证明直线 $MN \parallel$ 平面 ABB_1A_1 ；
 (2) 求直线 B_1C 和平面 A_1MN 的夹角（结果用反三角函数值表示）.

18. (本题满分 14 分，第 1 小题满分 7 分，第 2 小题满分 7 分)

已知函数 $f(x) = \sin x \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) + \sin^2(x + \pi)$ ， $x \in R$.

- (1) 求函数 $f(x)$ 的最小正周期和严格单调递减区间；
 (2) w 为大于 0 的实数，若函数 $f(wx)$ 在 $[0, \pi]$ 内恰有 2024 个零点，求 w 的取值范围.

19. (本题满分 14 分，第 1 小题满分 6 分，第 2 小题满分 8 分)

为确定群体中的个体是否感染新冠病毒，通常可采用单管或混管的方式进行核酸检测. 单管，即一人一管，每人使用一个采样管单独采样，检测结果可直接说明被检测者是否感染新冠病毒. 混管，是指将多个人的采集拭子的混合样本放入到一个采样管中，若样本呈现阴性，则可确定所有被检测者均未感染新冠病毒；若样本呈现阳性，则需对样本中的所有被检

测者重新采集单管,从而确定每个个体是否感染新冠病毒. 已知 A 城市总人口数为 3000 万, 现需对 A 城市内所有人进行核酸检测以确定哪些人感染了新冠病毒. 已知采样单价与检测方式之间满足下表关系:

检测方式	单管	混管 (5 人一管)	混管 (10 人一管)	混管 (20 人一管)
采样单价 (元/人)	16	5.5	4	3.5

(1) 设检测方式为 n 人一管, 采样单价为 y 元/人, 建立数学模型, 求解 y 关于 n 的回归方程, 并估计 A 城市采用 50 人一管的采样方式时所有采样管的采样总价 (数据均精确到小数点后一位, 参考公式: 一个采样管的采样总价 = 采样单价 \times 单个采样管中被检测者的数量);


(2) 在以下两条模型假设的基础上额外补充一条模型假设, 建立数学模型求解此次检测使用采样管总数的最小值.

模型假设: ①假设 A 城市每个人感染新冠病毒的概率均为 0.001, 且人与人之间的感染概率互不影响;

②单个采样管中的被检测者相同, 为不超过 100 的正整数.

20. (本题满分 18 分, 第 1 小题满分 4 分, 第 2 小题满分 6 分, 第 3 小题满分 8 分)

如图, 椭圆 $\Gamma: \frac{y^2}{3} + \frac{x^2}{2} = 1$ 的右顶点为 M , 焦点为 F 的抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 与 Γ 交于 Q 、 R 两点.



- (1) 当点 M 与点 F 重合时, 求实数 p 的值;
- (2) 当 $\angle QFR = 120^\circ$ 时, 求 $|QR|$ 的长;
- (3) 设过点 F 的直线 l 与 Γ 交于 S 、 T 两点, 点 J 既在直线 l 上, 又在抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 上, 若 $|TJ| = |JF| = |FS| > 0$, 求直线 l 的方程.

21. (本题满分 18 分, 第 1 小题满分 4 分, 第 2 小题满分 6 分, 第 3 小题满分 8 分)

设函数 $y = f(x)$, $x \in D$, 定义: 若对于任意的 $x_0 \in D$, 函数 $f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线与函数 $y = f(x)$, $x \in D$ 的图像有且仅有一个公共点, 则称函数 $f(x)$ 为 “孤独函数”.

(1) 判断下列两个函数是否是 “孤独函数”? (直接写出答案)

- ① $f(x) = \tan x$;
- ② $f(x) = \begin{cases} x^2 & 0 < x < 1; \\ e^{x-1} & x > 1; \end{cases}$

(2) 实数 $a \neq 0$, 求证: 函数 $f(x) = x \ln(ax)$ 是 “孤独函数”;

(3) 判断定义域为 $(0, +\infty)$ 的三次函数 $f(x)$ 是否是孤独函数, 并证明你的结论.

2024 年普通高等学校招生全国统一考试

上海 数学试卷

答案要点及评分标准

说明

1. 本解答列出试题的解法, 如果考生的解法与所列解法不同, 可参照解答中评分标准的精神进行评分.

2. 评阅试卷, 应坚持每题评阅到底, 不要因为考生的解答中出现错误而中断对该题的评阅. 当考生的解答在某一步出现错误, 影响了后继部分, 但该步以后的解答未改变这一题的内容与难度时, 可视影响程度决定后面部分的给分, 这时原则上不应超过后面部分应给分数之半, 如果有较严重的概念性错误, 就不给分.

解答

一、(第 1 题至第 12 题)

1. $\{1, 2, 3, 4\}$ 2. $3 + i$ 3. 0.8 4. $[-3, 1)$ 5. 105° 6. $2\sqrt{3}$
7. 32 8. $\sqrt{3}\pi$ 9. $\frac{1}{2}\vec{b}$ 或 $-\frac{1}{4}\vec{b}$ 10. 8 11. $\frac{8}{9}$ 12. 12

二、(第 13 题至第 16 题)

题 号	13	14	15	16
代 号	A	D	B	A

三、(第 17 题至第 21 题)

17. [解] (1) 三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的 3 个侧面中 ABB_1A_1 和 CBB_1C_1 为长为 3, 宽为 2 的平行四边形, 一定不为正方形, 故侧面 ACC_1A_1 为正方形,1 分
从而 $AA_1 \perp A_1C_1$, 由 $AA_1 \perp A_1C_1$, $AA_1 \perp A_1B_1$, $A_1C_1 \cap A_1B_1 = A_1$ 得 $AA_1 \perp$ 平面 $A_1B_1C_1$,
则三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 为直三棱柱, AA_1 为三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的高.2 分
 $AC = CC_1 = 2$, 由 $AN = 1$ 得点 N 为边 AC 中点, $BN \perp AC$, 由勾股定理 $BN = 2\sqrt{2}$, 从而
 $\triangle ABC$ 的面积为 $2\sqrt{2}$3 分
则三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的体积 $V_{ABC - A_1B_1C_1} = S_{\triangle ABC} h = 4\sqrt{2}$4 分
如图 1, 取 AB 边中点 D , 联结 DN , DN 为 $\triangle ABC$ 中位线, $DN \parallel BC$ 且 $DN = \frac{1}{2}BC$5 分
由 $BC \parallel MB_1$ 且 $MB_1 = \frac{1}{2}BC$ 得 $DN \parallel MB_1$ 且 $DN = MB_1$. 因为 $DN \parallel MB_1$ 可得
点 D 、 N 、 M 、 B_1 共面, 进而四边形 $DNMB_1$ 为平行四边形, 故 $MN \parallel DB_1$6 分
由直线 MN 不在平面 ABB_1A_1 上, 直线 DB_1 在平面 ABB_1A_1 上由直线和平面平行的判定定理可得 $MN \parallel$ 平面 ABB_1A_17 分
(2) 如图 2, 以点 A_1 为坐标原点, 垂直 $\overrightarrow{A_1C_1}$ 向外、 $\overrightarrow{A_1C_1}$ 、 $\overrightarrow{A_1A}$ 为 x 、 y 、 z 轴正方向
建立空间直角坐标系,8 分
则 $A_1(0, 0, 0)$, $B_1(-2\sqrt{2}, 1, 0)$, $C(0, 2, 2)$, $M(-\sqrt{2}, \frac{3}{2}, 0)$, $N(0, 1, 2)$,
 $\overrightarrow{B_1C} = (2\sqrt{2}, 1, 2)$,9 分


$$\overrightarrow{A_1N} = (0, 1, 2), \overrightarrow{A_1M} = (-\sqrt{2}, \frac{3}{2}, 0), \dots\dots 10 \text{ 分}$$

$$\text{设平面 } A_1MN \text{ 的法向量为 } \vec{n} = (a, b, c), \text{ 则 } \begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{A_1M} = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{A_1N} = 0 \end{cases} \text{ 即 } \begin{cases} b + 2c = 0 \\ -\sqrt{2}a + \frac{3}{2}b = 0 \end{cases}, \dots\dots 11 \text{ 分}$$


取 $a = 4, b = -2, c = 3\sqrt{2}$, 则 $(3\sqrt{2}, 4, -2)$ 是平面 A_1MN 的一个法向量. $\dots\dots 12 \text{ 分}$

$$\text{设直线 } B_1C \text{ 和平面 } A_1MN \text{ 的夹角为 } \theta \in [0, \frac{\pi}{2}], \sin \theta = \left| \cos \langle \overrightarrow{B_1C}, \vec{n} \rangle \right| = \frac{6}{247} \sqrt{494},$$

$$\text{故直线 } B_1C \text{ 和平面 } A_1MN \text{ 的夹角为 } \arcsin \frac{6}{247} \sqrt{494}. \dots\dots 14 \text{ 分}$$



(图 1)



(图 2)

- 注: 1. 本题第 (1) 小题也可使用空间向量证明, 证明满分 3 分;
 2. 第 (2) 小题若考生采用几何法可按解答完成度相应赋分;
 3. 第 (2) 小题采用空间向量计算 (即标答方法) 答案分 2 分, 若未设出直线 B_1C 和平面 A_1MN 的夹角 $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 并写出公式 $\sin \theta = \left| \cos \langle \overrightarrow{B_1C}, \vec{n} \rangle \right|$ 酌情扣 1 分答案分;
 4. 本题考生若未证明垂直关系直接使用空间向量 (1) (2) 小题各扣一分 (2、8 得分点).

$$\begin{aligned} 18. \text{ [解] (1) } f(x) &= \sin x \cos x + \sin^2 x, && \dots\dots 1 \text{ 分} \\ &= \frac{1}{2} \sin 2x - \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{2}, && \dots\dots 2 \text{ 分} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \sin \left(2x - \frac{\pi}{4} \right) + \frac{1}{2}, && \dots\dots 3 \text{ 分} \end{aligned}$$

从而 $y = f(x)$ 的最小正周期为 π . $\dots\dots 4 \text{ 分}$

$$\text{函数 } y = f(x) \text{ 严格递减时 } 2k\pi + \frac{1}{2}\pi \leq 2x - \frac{\pi}{4} \leq 2k\pi + \frac{3}{2}\pi, \dots\dots 5 \text{ 分}$$

解得 $k\pi + \frac{3}{8}\pi \leq x \leq k\pi + \frac{7}{8}\pi$, 即 $y = f(x)$ 的严格单调递减区间为


$$\left[k\pi + \frac{3}{8}\pi, k\pi + \frac{7}{8}\pi \right] (k \in \mathbb{Z}). \dots\dots 7 \text{ 分}$$

$$(2) f(wx) = 0 \text{ 即 } \frac{\sqrt{2}}{2} \sin \left(2wx - \frac{\pi}{4} \right) + \frac{1}{2} = 0, \text{ 即 } \sin \left(2wx - \frac{\pi}{4} \right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \dots\dots 8 \text{ 分}$$

$$\text{解得 } 2wx - \frac{\pi}{4} = 2k\pi - \frac{\pi}{4} \text{ 或 } 2k\pi - \frac{3}{4}\pi, \dots\dots 9 \text{ 分}$$

由 $w > 0$ 得 $x = \frac{k\pi}{w}$ 或 $\frac{k\pi - \frac{\pi}{4}}{w} (k \in \mathbb{Z})$, 由于 $x \in [0, \pi]$, 解得 $k \in [0, w]$ 或 $k \in [\frac{1}{4}, w + \frac{1}{4}]$, 原题即问 $[0, w]$ 和 $[\frac{1}{4}, w + \frac{1}{4}]$ 中共有 2024 个整数 k 时 w 的取值范围. $\dots\dots 10 \text{ 分}$

画出数轴:



若不存在整数 m 满足 $w < m \leq w + \frac{1}{4}$, 则 $[\frac{1}{4}, w + \frac{1}{4}]$ 中的整数为 1, $\dots\dots, Z$; $[0, w]$ 中的整数为 0, 1, $\dots\dots, Z$ (Z 为不大于 w 的最大整数), 和必为奇数个, 与共有 2024 个零点矛盾, 故存在整数 m 满足 $w < m \leq w + \frac{1}{4}$, $\dots\dots 12 \text{ 分}$

则 $[\frac{1}{4}, w + \frac{1}{4}]$ 中的整数为 1, $\dots\dots, m$; $[0, w]$ 中的整数为 0, $\dots\dots, m-1$, 由 1, $\dots\dots, m$ 共有 1012 个数, $m = 1012$, $\dots\dots 13 \text{ 分}$

由 $w < m \leq w + \frac{1}{4}$ 得 $w \in [\frac{4047}{4}, 1012)$, 故实数 w 的取值范围为 $[\frac{4047}{4}, 1012)$. $\dots\dots 14 \text{ 分}$

注：本题后 5 分得分点若考生与标答思路不同，按以下标准评分：

1. 答案分 2 分（若答案端点正确但区间开闭错误可得 1 分），过程分 3 分；
2. 解答过程中若考生从小到大逐一列举 x （或 $2wx - \frac{\pi}{4}$ ）的可能值，如 $0, \frac{3\pi}{w}, \frac{4\pi}{w}, \frac{\pi}{w}, \frac{7\pi}{w}, \dots$ ，过程分 1 分起评，若第 2024、2025 个值均列举正确过程分评 2 分，正确列出不等式则给全过程分 3 分；分两类情况列举的，若不说明大小关系，酌情扣 1 分；直接代入 k 的值的，过程分不超过 1 分。

19. [解] (1) 计算一个采样管的采样总价 ny （元）并列表：

单个采样管中被检测者的数量 n （人）	1	5	10	201 分
一个采样管的采样总价 ny （元）	16	27.5	40	70	

可得线性回归方程为 $ny = 2.8n + 12.9$ ，即 $y = 2.8 + \frac{12.9}{n}$ 2 分

相关系数 $r \approx 0.9994$ ，可断定一个采样管的采样总价 ny 与单个采样管中被检测者的数量 n 线性正相关，回归方程信度高.3 分

当 $n = 50$ 时，可得采样单价 y 为 3.058 元，4 分

A 城市总人口数为 3000 万，则 3.058×3000 万 $=9.174 \times 10^7$ 元，5 分

[答] (1) $y = 2.8 + \frac{12.9}{n}$ ；当 $n = 50$ 时，所有采样管的采样总价约为 9.2×10^7 元.

.....6 分

(2) 模型假设：假设感染者结果必显阳性，不考虑样本稀释问题；不考虑所计算出混管数量不为整数的情况，忽略微小误差等.（写出一条合理的即可）7 分

不妨假设为检测出单个人阳性或阴性所花的总次数为随机变量 X ，A 市总人数为 M ， $M = 3 \times 10^7$ ，原题即求 $ME[X]$ 的最小值，由于 M 为定值，即求 $E[X]$ 的最小值.

设一个人阳性的概率为 $p = 0.001$ ，假设采样方式为 n 混一，

情况①： $n = 1$ 即单管检测，此时 $E[X] = 1$ ， $ME[X] = 3 \times 10^7$ ；8 分

情况②： $n \in [2, 200] \cap N$ ，类似伯努利实验，单个人采样管呈阴性的可能性为 $1 - p$ ， n 个人采样管呈阴性的可能性为 $(1 - p)^n$ ，此时不需要额外检测； n 个人采样管呈阳性的可能性为 $1 - (1 - p)^n$ ，此时需要额外检测 n 次，共检测 $(n + 1)$ 次，9 分
故 n 个人的总检测次数 nX 服从以下分布：

$$\begin{pmatrix} 1 & n+1 \\ (1-p)^n & 1 - (1-p)^n \end{pmatrix}$$

数学期望 $E[nX] = (1 - p)^n + n + 1 - (n + 1)(1 - p)^n = n + 1 - n(1 - 0.001)^n$ ，

由数学期望的线性性质 $E[nX] = nE[X]$ 可得 $E[X] = 1 + \frac{1}{n} - 0.999^n$10 分



设 $f(n) = E[X] = 1 + \frac{1}{n} - 0.999^n$ ， $f'(n) = -\frac{1}{n^2} - 0.999^n \ln 0.999$ ， $\ln 0.999 < 0$ ，

$f'(n) = \frac{0.999^n n^2 (-\ln 0.999) - 1}{n^2}$ ，设 $g(n) = 0.999^n n^2$ ， $g'(n) = n \cdot 0.999^n (2 + \ln 0.999)$ ，

由 $n \in [2, 100] \cap N$ ， $n > 0$ ， $0.999^n > 0$ ， $2 + \ln 0.999 > 2 + 100 \ln 0.999 > 0$ ，

$g'(n) > 0$ ， $g(n) = 0.999^n n^2$ 严格单调增，11 分

设 $0.999^{n_0} n_0^2 (-\ln 0.999) - 1 = 0$ ，则 $y = f(n)$ 单调性可如下列表：

n	$(2, n_0)$	n_0	$(n_0, +\infty)$
$f'(n)$	—	0	+
$f(n)$		极小值 $f(n_0)$	

而 $n = 32$ 时， $f'(n) < 0$ ； $n = 33$ 时 $f'(n) > 0$ ，故由零点存在性定理 $n_0 \in (32, 33)$.

.....12 分

计算得 $f(32) < f(33)$ ，故 $n = 32$ 时 $E[X]$ 的最小值为 $1 + \frac{1}{32} - 0.999^{32}$ ，

.....13 分

$ME[X] \approx 1882768$ 管 < 3000000 管，故采样管最小值为 1882768.

.....14 分

[答] (2) 当采用 32 人一管的采样方式时此次检测使用采样管总数最小，约 1882768 管.

注：本题第 (1) 小题计算 y 与 $\frac{1}{n}$ 线性回归关系的也可得分；第 (2) 小题不分析单调性直接写出结果扣 2 分.

20. [解] (1) 点 M 、点 F 坐标为 $(\sqrt{2}, 0)$2 分

由抛物线焦点定义 $\frac{p}{2} = \sqrt{2}$ ，得实数 p 的值为 $2\sqrt{2}$4 分

(2) Q 、 R 对称，不妨计算 Q 在第一象限的情况，由对称性 QR 与 x 轴垂直，

设 QR 与 x 轴交于点 H ， $\angle QFR = 120^\circ$ 则 $\angle QFH = 60^\circ$. 由抛物线定义 $QF = x_Q + \frac{p}{2}$. 在

$\triangle QFH$ 中， $QH = \frac{\sqrt{3}}{2} QF = \frac{\sqrt{3}}{2} \left(x_Q + \frac{p}{2}\right)$ ， $HF = \frac{1}{2} QF = \frac{1}{2} \left(x_Q + \frac{p}{2}\right)$5 分

情况①：点 F 在点 H 右侧，此时 $x_Q = x_H = x_F - HF = \frac{p}{2} - \frac{1}{2} \left(x_Q + \frac{p}{2}\right)$ ，可解得 $x_Q = \frac{p}{6}$ ，

.....6 分

代入椭圆方程中，结合 $p > 0$ 解得 $p = 2\sqrt{2}$7 分

$Q\left(\frac{\sqrt{2}}{3}, \frac{2}{3}\sqrt{6}\right)$ ，则 $QR = 2y_Q = \frac{4}{3}\sqrt{6}$8 分


情况②：点 F 在点 H 左侧，此时 $x_Q = x_H = x_F + HF = \frac{p}{2} + \frac{1}{2} \left(x_Q + \frac{p}{2}\right)$ ，可解得 $x_Q = \frac{3}{2}p$ ，

.....9 分


$QH = y_Q = \sqrt{3}p$ ， $Q\left(\frac{3}{2}p, \sqrt{3}p\right)$ ，代入椭圆方程中，由 $p > 0$ 解得 $p = \frac{2}{17}\sqrt{34}$ ，

$Q\left(\frac{3}{17}\sqrt{34}, \frac{2}{17}\sqrt{102}\right)$ ， $QR = 2y_Q = \frac{4}{17}\sqrt{102}$10 分

综上， QR 的长为 $\frac{4}{3}\sqrt{6}$ 或 $\frac{4}{17}\sqrt{102}$.



(情况①)



(情况②)

(3) 若直线 l 的斜率不存在, 则 $|TF| = |FS| = |TJ| = |JF| = |FS|$, 不成立, 舍去;

.....11 分

设直线 l 的方程为 $y = k(x - \frac{p}{2})$, 与椭圆 $\Gamma: \frac{y^2}{3} + \frac{x^2}{2} = 1$ 联立, $\begin{cases} y = k(x - \frac{p}{2}) \\ 3x^2 + 2y^2 = 6 \end{cases}$ 化简得


$$(2k^2 + 3)x^2 - 2pk^2x + \frac{p^2k^2 - 12}{2} = 0, \text{ 判别式 } \Delta = 4p^2k^4 - 2(2k^2 + 3)(p^2k^2 - 12) > 0,$$

$$\text{得 } 8 + \frac{12}{k^2} > p^2. \text{ 由韦达定理, } x_T + x_S = \frac{2pk^2}{2k^2 + 3}. \text{12 分}$$

由于 $|TJ| = |JF| = |FS|$, 点 S 、 T 、 J 、 F 两两不重合,

且 S 、 T 、 J 、 F 均在直线 l 上, 故其相对位置只能如右

图两种情况所示, 则 S 、 T 、 J 、 F 四点的横纵坐标均



成等差数列, 则由 $x_T + x_S = x_F + x_J = x_J + \frac{p}{2}$ 可得 $x_J = \frac{2pk^2}{2k^2 + 3} - \frac{p}{2} = \frac{p(2k^2 - 3)}{2(2k^2 + 3)}$.

由点 J 在直线 $y = k(x - \frac{p}{2})$ 上可得 $y_J = \frac{pk}{2}(\frac{2k^2 - 3}{2k^2 + 3} - 1) = -\frac{3pk}{2k^2 + 3}$, 则 $J(\frac{p(2k^2 - 3)}{2(2k^2 + 3)}, -\frac{3pk}{2k^2 + 3})$.

.....13 分

把点 J 代入抛物线 $y^2 = 2px(p > 0)$, 得 $\frac{9p^2k^2}{(2k^2 + 3)^2} = \frac{p^2(2k^2 - 3)}{2k^2 + 3}$, 化简得 $4k^4 - 9k^2 - 9 = 0$,

即 $(k^2 - 3)(4k^2 + 3) = 0$, 因为 $k^2 \geq 0$, 故 $k^2 = 3$, $k = \pm\sqrt{3}$14 分

代回判别式, 得 $p^2 < 12$, $x_T + x_S = \frac{2}{3}p$, $x_J = \frac{p}{6}$. 由 x_T 、 x_S 、 x_F 、 x_J 成等差数列可得

$$x_S = 2x_F - x_J = \frac{5}{6}p, y_S = k(x_S - \frac{p}{2}) = \frac{k}{3}p, S(\frac{5}{6}p, \frac{k}{3}p) \text{15 分}$$

将点 S 代入 $\frac{y^2}{3} + \frac{x^2}{2} = 1$ 中, 结合 $k^2 = 3$ 可得 $p^2 = \frac{24}{11} < 12$ (判别式检验),16 分

因为 $p > 0$, 所以 $p = \frac{2}{11}\sqrt{66}$17 分

因此, 直线 l 的方程为 $y = \sqrt{3}x - \frac{3}{11}\sqrt{22}$ 或 $y = -\sqrt{3}x + \frac{3}{11}\sqrt{22}$18 分

注: 1. 第(2)小题评分标准: 完整解答出任意一种情况的得4分, 有利用抛物线准线用 p 表示其余坐标思想的给1分, 得出 x_Q 和 p 关系的给2分, 解对 p 的给3分, 得出一个正确 QR 长的给4分; 另一种情况满分2分, 得出 x_Q 和 p 关系的给1分, 得出正确 QR 长的给2分.

2. 第(3)小题答案分1分, k 漏一解的不扣过程分但不给答案分(总扣1分), 若用求根公式表示坐标或使用其他方法的, 解对斜率的给4分, p 的值3分.

21. [解] (1) ①是;2分

②不是;4分



(2) 任取 $x_0 \in D$, $y = f(x)$ 在 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线方程为

$$y - x_0 \ln(ax_0) = (\ln(ax_0) + 1)(x - x_0), \quad \text{.....5分}$$

与 $y = f(x)$ 联立, 得 $x \ln(ax) - x_0 \ln(ax_0) = (\ln(ax_0) + 1)(x - x_0)$, 可化简为

$$x \ln(ax) - (\ln(ax_0) + 1)x + x_0 = 0, \quad \text{.....6分}$$

设 $g(x) = x \ln(ax) - (\ln(ax_0) + 1)x + x_0$, $g'(x) = \ln(ax) - \ln(ax_0) = \ln \frac{x}{x_0}$,7分

x	$x < x_0$	x_0	$x > x_0$8分
$g'(x)$	-	0	+	
$g(x)$		极小值 $g(x_0)$	9分

故 $g(x) \geq g(x_0) = 0$, 当 $x < x_0$ 时, $y = g(x)$ 严格递减, $g(x) > g(x_0) = 0$; 当 $x > x_0$ 时, $y = g(x)$ 严格递增, $g(x) > g(x_0) = 0$; 故 $g(x) = 0$ 仅有一根 x_0 即切线与 $y = f(x)$ 仅有一个交点 $(x_0, f(x_0))$, 由于 x_0 的任意性, 函数 $f(x) = x \ln(ax)$ 是“孤独函数”.

.....10分

(3) 设 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d (a \neq 0)$, 任取 $x_0 \in (0, +\infty)$, $y = f(x)$ 在 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线方程为 $y - (ax_0^3 + bx_0^2 + cx_0 + d) = (3ax_0^2 + 2bx_0 + c)(x - x_0)$,11分

$$\text{与 } y = f(x) \text{ 联立, 得 } ax^3 + bx^2 + cx + d - (ax_0^3 + bx_0^2 + cx_0 + d) = (3ax_0^2 + 2bx_0 + c)(x - x_0),$$

$$\text{可化简为 } ax^3 + bx^2 - (ax_0^3 + bx_0^2) = (3ax_0^2 + 2bx_0)(x - x_0),$$

$$\text{而 } ax^3 + bx^2 - (ax_0^3 + bx_0^2) = (x - x_0)(ax^2 + (ax_0 + b)x + (ax_0^2 + bx_0)),$$

$$\text{得 } (x - x_0)(ax^2 + (ax_0 + b)x - (2ax_0^2 + bx_0)) = 0, \quad \text{.....12分}$$

$$\text{即 } (x - x_0)^2(ax + 2ax_0 + b) = 0, \text{ 从而 } x = x_0 \text{ 或 } x = -\frac{b}{a} - 2x_0. \quad \text{.....13分}$$

$$\text{情况①: 当 } ab \geq 0 \text{ 时, } -\frac{b}{a} - 2x_0 \leq -2x_0 < 0, \quad \text{.....14分}$$

方程仅有 x_0 一根即在 $(0, +\infty)$ 切线与 $y = f(x)$ 仅有一个交点 $(x_0, f(x_0))$, 由于 x_0 的任意性, $(0, +\infty)$ 中的所有数均满足上述性质, 即三次函数 $f(x)$ 是“孤独函数”15分

$$\text{情况②: 当 } ab < 0 \text{ 时, } -\frac{b}{a} - 2x_0 > -2x_0,$$

若 $-\frac{b}{a} - 2x_0 \leq 0$ 即 $x_0 \geq -\frac{b}{2a}$, 同情况①方程仅有 x_0 一根, 故 $[-\frac{b}{2a}, +\infty)$ 中所有数均满足切线与 $y = f(x)$ 仅有一个交点 $(x_0, f(x_0))$;16分

$$\text{若 } -\frac{b}{a} - 2x_0 > 0 \text{ 即 } x_0 < -\frac{b}{2a},$$

$$\text{当 } x_0 = -\frac{b}{a} - 2x_0 \text{ 即 } x_0 = -\frac{b}{3a} \text{ 时切线与 } y = f(x) \text{ 仅有 } x_0 \text{ 一根,} \quad \text{.....17分}$$

任取 $x_0 \in \left(0, -\frac{b}{3a}\right) \cup \left(-\frac{b}{3a}, -\frac{b}{2a}\right)$, 函数 $f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线与函数 $y = f(x)$, $x \in D$ 的图像有 $(x_0, f(x_0))$ 、 $\left(-\frac{b}{a} - 2x_0, f\left(-\frac{b}{a} - 2x_0\right)\right)$ 两个公共点, 故三次函数 $f(x)$ 不是孤独函数.18 分

综上, 当三次函数 $f(x)$ 的三次项系数和二次项系数乘积非负时, 函数 $f(x)$ 是“孤独函数”, 当三次函数 $f(x)$ 的三次项系数和二次项系数乘积为正值时, 函数 $f(x)$ 不是“孤独函数”.

注: 1. 第 (2) 小题由于 $D = \begin{cases} (0, +\infty) & a > 0 \\ (-\infty, 0) & a < 0 \end{cases}$ 列表第一行 (第 8 得分点) 处若不讨论直接写不正确的具体区间则扣 1 分;

2. 第 (3) 小题评分时分为 2 个部分: 解出方程两根 x_0 、 $-\frac{b}{a} - 2x_0$ 满分 3 分, 写出切线通式 1 分, 联立、求解满分 2 分 (若求导酌情给分); 后续讨论满分 5 分, 具体评分规则如下:
 ①若使用几何法给分不超过 3 分, 不进行分类不得分, 情况①结论正确得 1 分, 情况②结论正确给 1 分, 如能指出 x_0 的具体范围 (除去对称中心 $-\frac{b}{3a}$) 并指出其范围有上界可再给 1 分;
 ②若有解出方程两根 x_0 、 $-\frac{b}{a} - 2x_0$ 的基础并进行代数求解, 分类正确 1 分, 对 $-\frac{b}{a} - 2x_0$ 不在 D 的范围内的讨论共 2 分, 特殊情况 $x_0 = -\frac{b}{3a}$ 及具体范围 $\left(0, -\frac{b}{3a}\right) \cup \left(-\frac{b}{3a}, -\frac{b}{2a}\right)$ 各 1 分.