

A
Tumour vs normal (unpaired)
DESeq2 log□FC = -4.07
FDR = 2.2×10□⁶⁶
Wilcoxon P = 4.1×10□²²
GLP2R expression (VST)
Normal (n=33)
Tumor (n=591)
B
Matched pairs (sensitivity)
lower in tumour: 32/32 pairs
paired DESeq2 log□FC = -3.82
FDR = 2.9×10□⁶¹
GLP2R expression (VST)
Normal (n=32)
Tumor (n=32)
C
Genome-wide differential expression
Down 3,939
Up 6,294
GLP2R
PRKG2
GCG
GLP1R
− log10 FDR
log□ fold change (tumour / normal)
D
AJCC stage
Kruskal–Wallis P = 0.146
Spearman ρ = 0.05 (P = 0.311)
GLP2R expression (VST)
I (n=91)
II (n=184)
III (n=144)
IV (n=61)
E
MSI status
Wilcoxon P = 3.5×10□¹⁷
AUC (MSI-H > MSS) = 0.19
GLP2R expression (VST)
MSS/MSI-L (n=502)
MSI-H (n=73)
F
Tumour site
Wilcoxon P = 6.9×10□⁴
GLP2R expression (VST)
COAD (n=431)
READ (n=160)
G
GLP1R vs GLP2R (tumours)
Spearman ρ = 0.12, P = 0.003
GLP1R baseMean = 4.3
(near detection limit)
GLP1R (VST)
GLP2R (VST)
H
Candidate GLP-signalling genes (n = 48 tested; 2 not testable owing to filtering)
Expressed, FDR < 0.05
Expressed, n.s.
Low expression (baseMean < 10 or filtered)
log□FC (tumour / normal)
GCG GLP2R PRKG2 ADCY5 ADCY2 PRKACB VIPR2 SCTR PIK3CG VIPR1 ADCY9 IL10 PRKG1 AKT3 PIK3CD GCGR LAG3 MAPK3 ADCY6 TNF PRKACA TIGIT MAPK1 PIK3CA PIK3CB NFKB1 GLP1R GIPR HAVCR2 ADCY7 CREB1 RELB CD274 DPP4 PDCD1 AKT1 ADCY10 RELA ADCY4 AKT2 GNAS SCT NFKB2 ADCY1 CTLA4 IL6 ADCY3 ADCY8