

A
OS, colon (COAD) (n = 413, 90 events)
Overall survival
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
HR (high vs low) = 0.71 (0.46–1.09)
Log-rank P = 0.117
Low (n=224)
High (n=189)
Low 224 104 36 19 11 6
High 189 90 22 9 3 2
0 24 48 72 96 120
Months
B
OS, rectum (READ) (n = 153, 24 events)
Overall survival
HR (high vs low) = 0.55 (0.24–1.25)
Log-rank P = 0.148
Low (n=59)
High (n=94)
Low 59 30 7 2 2 2
High 94 40 10 3 1 0
Months
C
Progression-free interval (n = 564, 142 events)
Progression-free interval
HR (high vs low) = 1.01 (0.73–1.41)
Log-rank P = 0.951
Low (n=282)
High (n=282)
Low 282 118 35 16 12 7
High 282 110 24 9 4 2
Months
D
Robustness of the adjusted association
HR (95% CI); P
Primary model M2 (OS)
0.86 (0.69–1.07); P = 0.18
Follow-up truncated at 60 months
0.83 (0.66–1.05); P = 0.11
Stratified by stage
0.87 (0.69–1.08); P = 0.21
log□CPM instead of VST
0.84 (0.66–1.07); P = 0.16
MSS/MSI-L only (n = 393)
0.84 (0.67–1.06); P = 0.14
Multiple imputation (n = 566)
0.85 (0.70–1.03); P = 0.10
PFI, adjusted (n = 451)
0.95 (0.76–1.21); P = 0.70
High vs low GLP2R (binary)
0.73 (0.45–1.19); P = 0.20
0.5 0.75 1 1.25
Hazard ratio for GLP2R (per SD unless stated; 95% CI)