

《微分几何入门与广义相对论》(上册)

习题解答

第 1 章 “拓扑空间简介” 习题	1
第 2 章 “流形和张量场” 习题	7
第 3 章 “黎曼 (内禀) 曲率张量” 习题	23
第 4 章 “李导数、 Killing 场和超曲面” 习题	46
第 5 章 “微分形式及其积分” 习题	58
第 6 章 “狭义相对论” 习题	83
第 7 章 “广义相对论基础” 习题	100
第 8 章 “爱因斯坦方程的求解” 习题	119
第 9 章 “施瓦西时空” 习题	138
第 10 章 “宇宙论” 习题	153
(Dis)claimer	167

第 1 章 “拓扑空间简介” 习题

~1. 试证 $A - B = A \cap (X - B)$, $\forall A, B \subset X$.

证 只须证明等式两边互为包含.

(A) 设 $x \in A - B$, 则 $x \in A$, $x \notin B$. 前者 $x \in A$ 与 $A \subset X$ 结合得 $x \in X$. 再与后者 $x \notin B$ 结合得 $x \in X - B$. 结合前者 $x \in A$ 知 $x \in A \cap (X - B)$. 于是属于 $A - B$ 的元素都属于 $A \cap (X - B)$, 因而 $A - B \subset A \cap (X - B)$.

(B) 设 $x \in A \cap (X - B)$, 则 $x \in A$, $x \in X - B$. 后者导致 $x \in X$, $x \notin B$. $x \notin B$ 与前者 $x \in A$ 结合得 $x \in A - B$. 于是属于 $A \cap (X - B)$ 的元素必定属于 $A - B$, 因而 $A \cap (X - B) \subset A - B$.

~2. 试证 $X - (B - A) = (X - B) \cup A$, $\forall A, B \subset X$.

证 只须证明等式两边互为包含.

(A) 设 $x \in X - (B - A)$, 则 $x \in X$, $x \notin B - A$. 后者导致 $x \notin B$ 或 $x \in A$. $x \notin B$ 与前者 $x \in X$ 结合得 $x \in X - B$. 现在是 $x \in A$ 或 $x \in X - B$, 即 $x \in (X - B) \cup A$. 于是属于 $X - (B - A)$ 的元素都属于 $(X - B) \cup A$, 因而 $X - (B - A) \subset (X - B) \cup A$.

(B) 设 $x \in (X - B) \cup A$, 则 $x \in X - B$ 或 $x \in A$. 前者导致 $x \in X$, $x \notin B$. $x \notin B$ 与后者 $x \in A$ 或的结合, 即 $x \in A$ 或 $x \notin B$ 给出 $x \notin B - A$. 因此 $x \in X - (B - A)$. 于是属于 $(X - B) \cup A$ 的元素都属于 $X - (B - A)$, 因而 $(X - B) \cup A \subset X - (B - A)$.

~3. 用 “对” 或 “错” 在下表中填空:

$f: RR \rightarrow RR$	是一一的	是到上的
$f(x) = x^3$	(对)	(对)
$f(x) = x^2$	(错, 正的 $f(x)$ 有两个逆像)	(错, 负的 $f(x)$ 没有逆像)
$f(x) = e^x$	(对)	(错, 0 和负的 $f(x)$ 没有逆像)
$f(x) = \cos x$	(错, $ f(x) \in [0, 1]$ 有无数个逆像)	(错, $ f(x) \in (1, \infty)$ 没有逆像)
$f(x) = 5, \forall x \in RR$	(错, 有无数个逆像)	(错, 除了 $f(x) = 5$ 没有逆像)

~4. 判断下列说法的是非并简述理由:

(a) 正切函数是 RR 到 RR 的映射;

答 不对. 因为 $x = n\pi + \frac{\pi}{2}$ (n 为整数) 没有像 $\tan x$.

(b) 对数函数是 RR 到 RR 的映射;

答 不对. 因为 $x \in (-\infty, 0)$ 没有像 $\log x$.

(c) $(a, b] \subset RR$ 用 \mathcal{T}_u 衡量是开集;

答 不对. 因为 \mathcal{T}_u 的元素为 RR 的开区间或开区间之并, 故 $(a, b] \notin \mathcal{T}_u$. 只有 \mathcal{T}_u 的元素才是开集, 所以 $(a, b]$ 用 \mathcal{T}_u 衡量不是开集.

(d) $[a, b] \subset RR$ 用 \mathcal{T}_u 衡量是闭集;

答 对. 因为 $[a, b] \subset RR$, $-[a, b] = RR - [a, b] = (-\infty, a) \cup (b, \infty) \in \mathcal{T}_u$, 所以根据定义 6 知道用 \mathcal{T}_u 衡量 $[a, b]$ 是闭集.

[由 (c) 的结果和 (d) 的推理过程可以知道用通常拓扑 \mathcal{T}_u 衡量, $(a, b]$ 既不是开集也不是闭集!]

~5. 举一反例证明命题 “ (RR, \mathcal{T}_u) 的无限个开子集之交为开” 不真.

解 设开区间族 $O_n = (0, 1/n) \in \mathcal{T}_u$, $(n = 1, 2, \dots)$. 可知 $\bigcap_{n=1}^{\infty} O_n = \{0\}$. 而单点集 (区间) 不是开区间, 即 $\{0\} \notin \mathcal{T}_u$, 故 “无限个开子集之交为开” 不真. 事实上 $\{0\}$ 为闭集, 因为 $-\{0\} = RR - \{0\} = (-\infty, 0) \cup (0, \infty) \stackrel{\text{定义 1(c)}}{\in} \mathcal{T}_u$, 故根据 §1.2 定义 6 单点集 $\{0\}$ 是闭集.

~6. 试证 §1.2 例 5 中定义的诱导拓扑满足定义 1 的 3 个条件.

证 诱导拓扑的定义是 (1-2-2) 式: $\mathcal{S} := \{V \subset A \mid \exists O \in \mathcal{T} \text{ 使 } V = A \cap O\}$.

条件 1: 必须 存在 $O \supset A$, 这时 $V = A \cap O = A$, 即 A 是 \mathcal{S} 的元素. 另外如果取 $O = \emptyset$, 则 $V = A \cap \emptyset = \emptyset$ 也是 \mathcal{S} 的元素.

条件 2: 如果 $V_i = A \cap O_i \in \mathcal{S}$, 因为 $\bigcap_i V_i = \bigcap_i (A \cap O_i) \stackrel{\text{结合律}}{=} A \cap (\bigcap_i O_i)$, 显然有 $\bigcap_i V_i \subset A$. 另外由 §1.2 定义 1(b), $\bigcap_i O_i \in \mathcal{T}$, 故由诱导拓扑的定义知 $\bigcap_i V_i$ 也是 \mathcal{S} 的元素.

条件 3: 如果 $V_\alpha = A \cap O_\alpha \in \mathcal{S} \forall \alpha$, 首先我们根据分配律证明 $\bigcup_\alpha V_\alpha = \bigcup_\alpha (A \cap O_\alpha) = A \cap (\bigcup_\alpha O_\alpha)$. 注意到 $(A \cap O_1) \cup (A \cap O_2) = A \cap (O_1 \cup O_2)$, 所以有 $(A \cap O_1) \cup (A \cap O_2) \cup (A \cap O_3) = [A \cap (O_1 \cup O_2)] \cup (A \cap O_3) = A \cap [(O_1 \cup O_2) \cup O_3] \stackrel{\text{结合律}}{=} A \cap [O_1 \cup O_2 \cup O_3]$. 推广得 $\bigcup_\alpha (A \cap O_\alpha) = A \cap (\bigcup_\alpha O_\alpha)$. 于是 $\bigcup_\alpha V_\alpha = A \cap (\bigcup_\alpha O_\alpha)$, 有 $\bigcup_\alpha V_\alpha \subset A$. 另外由 §1.2 定义 1(c), $\bigcup_\alpha O_\alpha \in \mathcal{T}$, 故由诱导拓扑的定义知 $\bigcup_\alpha V_\alpha$ 也是 \mathcal{S} 的元素.

7. 举例说明 (RR^3, \mathcal{T}_u) 中存在不开不闭的子集.

答 定义空间的某块内部的所有点以及部分表面点属于该子集 A , 那么 A 既不开也不闭. 不开是因为它不属于 \mathcal{T}_u , 即它不能通过有限的开球之交和无限的开球之并得到. 不闭是因为 $-A = RR^3 - A$ 也不属于 \mathcal{T}_u , 只有当 $-A \in \mathcal{T}_u$ 为开时, A 才是闭的.

~8. 常值映射 $f: (X, \mathcal{T}) \rightarrow (Y, \mathcal{S})$ 是否连续? 为什么?

答 连续. 所谓常值映射 (§1.1 定义 7) 是指 $\forall x \in X, x \mapsto f(x) = y_0 \in Y$, 只是 Y 的一个元素 (一点). 对 $\forall O \in \mathcal{S}$, 根据 §1.1 注 5(2) ②, 要么 $f^{-1}[O] = \emptyset$ (当 $y_0 \notin O \in \mathcal{S}$), 要么 $f^{-1}[O] = X$ (当 $y_0 \in O$). 而 \emptyset 和 X 都是 \mathcal{T} 的元素, 所以 $f^{-1}[O] \in \mathcal{T}$. 根据 §1.2 定义 3a, 这一映射连续.

~9. 设 \mathcal{T} 为集 X 上的离散拓扑, \mathcal{S} 为集 Y 上的凝聚拓扑,

(a) 找出从 (X, \mathcal{T}) 到 (Y, \mathcal{S}) 的全部连续映射;

(b) 找出从 (Y, \mathcal{S}) 到 (X, \mathcal{T}) 的全部连续映射.

解 (X, \mathcal{T}) 为离散拓扑空间 (§1.2 例 1), \mathcal{T} 的元素为 X 的所有子集; (Y, \mathcal{S}) 为凝聚拓扑空间 (§1.2 例 2), \mathcal{S} 的元素只有 2 个 — \emptyset 和 Y . (如果 $X = Y = \mathbb{R}$, 则 \mathcal{T} 的元素为 \mathbb{R} 的所有区间的集合, 无论开闭; 而 \mathcal{S} 的元素也只有 2 个 — \emptyset 和 \mathbb{R} .)

(a) 从 (X, \mathcal{T}) 到 (Y, \mathcal{S}) 的任何映射都是连续的. 因为只要是映射, 就有逆像, 而逆像的集合一定是 X 的子集, 又 X 的子集一定是离散拓扑 \mathcal{T} 的元素. 因此根据 §1.2 定义 3a, 这一映射是连续的. 注意因为 \mathcal{S} 为凝聚拓扑, 定义 3a 中现在的 O 只可能有两个: 一是 $O = \emptyset \in \mathcal{S}$, 则 $f^{-1}[\emptyset] = \emptyset \in \mathcal{T}$; 二是 $O = Y \in \mathcal{S}$, 则 $f^{-1}[Y] = X \in \mathcal{T}$. 由此推理过程可以看出, 只要 (X, \mathcal{T}) 是离散拓扑空间, (Y, \mathcal{S}) 可以是任何拓扑空间, 这一结论仍然成立. (如果 $X = Y = \mathbb{R}$, 就是说逆像的点的集合构成的区间无论开闭都是 \mathbb{R} 的子集, 也就是 \mathcal{T} 的元素.)

(b) 从 (Y, \mathcal{S}) 到 (X, \mathcal{T}) 只有常值映射是连续的. 常值映射的连续性从习题 8 的结论可以直接看出, 下面要证明其他任何映射都不是连续的. 如果不是常值映射, 则至少有两个像 $x_1, x_2 \in X, x_1 \neq x_2$. 现在考虑 X 的单元子集 $O_1 = \{x_1\}$ 和 $O_2 = \{x_2\}$. 因为 \mathcal{T} 是离散拓扑, X 的所有子集都是它的元素, 所以 $O_1, O_2 \in \mathcal{T}$. 下面看它们的逆像 $f^{-1}[O_1] = f^{-1}[\{x_1\}]$ 和 $f^{-1}[O_2] = f^{-1}[\{x_2\}]$, 当然它们是 Y 的 非空 子集 (不然的话不会有像 x_1 和 x_2). 首先注意到 $f^{-1}[O_1] \cap f^{-1}[O_2] = \emptyset$, 因为否则的话必存在原像点 $y \in f^{-1}[O_1] \cap f^{-1}[O_2]$, 它有两个不同的像 x_1 和 x_2 , 这与 §1.1 映射的定义 5 不符. 如果这一映射是连续的, 根据定义 3a, 要求 $f^{-1}[O_1], f^{-1}[O_2] \in \mathcal{S}$. 而 \mathcal{S} 是凝聚拓扑, 非空元素只有 Y , 连续映射要求 $f^{-1}[O_1] = f^{-1}[O_2] = Y$, 这显然与它们的不相交性矛盾. 因此, 任何多于一个像的映射在此情形下都是不连续的. 与前面一样, 只要 (Y, \mathcal{S}) 是凝聚拓扑空间, (X, \mathcal{T}) 可以是任何拓扑空间, 这一结论仍然成立.

~10. 试证 §1.2 定义 3a 与 3b 的等价性.

证 (A) 从 3a 到 3b, 即要证明如果用 3a 定义的映射连续, 则用 3b 定义的任意点都连续; (B) 从 3b 到 3a, 即要证明如果用 3b 定义的任意点都连续, 则用 3a 定义的映射连续.

(A) 考虑任意一点的映射 $x \mapsto f(x)$. 在拓扑 \mathcal{S} 中任意取两个元素 G' 和 G'' , 使满足 $f(x) \in G'' \subset G'$. 因为映射是连续的, 很据定义 3a 有 $G \equiv f^{-1}[G''] \in \mathcal{T}$, 当然 $x \in G$. 所以现在 $\exists G \in \mathcal{T}$ 使 $x \in G$ 且 $f[G] = G'' \subset G'$. 根据定义 3b, 映射在点 x 处连续. $x \in X$ 是任意的.

(B) 考虑任意的一个开集 $O \in \mathcal{S}$, 设它的元素为 y_α , 即 $\forall \alpha, y_\alpha \in O$. 如果 y_α 有逆像 $x_\alpha = f^{-1}(y_\alpha)$ 且映射是连续的, 则根据定义 3b, 一定存在开集 $G_\alpha \in \mathcal{T}$ 使 $x_\alpha \in G_\alpha$ 且 $f[G_\alpha] \subset O$. 可以证明 $\cup_\alpha G_\alpha = f^{-1}[O]$, 由定义 1(c) 知 $f^{-1}[O] \in \mathcal{T}$. 于是根据定义 3a, 映射连续. 最后我们证明 $\cup_\alpha G_\alpha = f^{-1}[O]$, 分两步骤: (i) 所有属于 $\cup_\alpha G_\alpha$ 的元素必属于 $f^{-1}[O]$; (ii) 所有不属于 $\cup_\alpha G_\alpha$ 的元素必不属于 $f^{-1}[O]$. (i) 设 $x \in \cup_\alpha G_\alpha$, 而 $f[\cup_\alpha G_\alpha] = \cup_\alpha f[G_\alpha] \stackrel{f[G_\alpha] \subset O}{\subset} O$, 有 $f(x) \in f[\cup_\alpha G_\alpha] \subset O$, 即 $f(x) \in O$. 根据注 5 ②的定义: $f^{-1}[O] = \{x \in X \mid f(x) \in O\}$, 所以这时 $x \in f^{-1}[O]$. (ii) 设 $x \notin \cup_\alpha G_\alpha$, 则 $x \in \cap_\alpha (X - G_\alpha) = \cap_\alpha (-G_\alpha)$, 有 $f(x) \in f[\cap_\alpha (-G_\alpha)] = \cap_\alpha f[-G_\alpha]$. 这时 x 必不属于 $f^{-1}[O]$, 因为否则的话有 $f(x) \in O$, 这会与 $f(x) \in \cap_\alpha f[-G_\alpha]$ 矛盾. 最后只要证明如下命题: $\forall \alpha, f[G_\alpha] \subset O$, 则 $O \cap (\cap_\alpha f[-G_\alpha]) = \emptyset$. 注意到 $f[-G_\alpha] = f[X - G_\alpha] = Y - f[G_\alpha]$, 有 $\cap_\alpha f[-G_\alpha] = \cap_\alpha (Y - f[G_\alpha]) \stackrel{\text{DM律}}{=} Y - \cup_\alpha f[G_\alpha] = Y - \cup_\alpha f[G_\alpha]$. 令 $A_\alpha \equiv f[G_\alpha]$, 即要证明 $\forall \alpha, A_\alpha \subset O$, 有 $O \cap (-\cup_\alpha A_\alpha) = \emptyset$, 但是显然这一结论不成立!

根据定义 3b 似乎可以得到如下定理: 如果在所有点 $x \in X$ 上连续, 则对 \forall 满足 $f(x) \in G'$ 的 $G' \in \mathcal{S}$, $\exists G \in \mathcal{T}$ 使 $x \in G$ 且 $f[G] = G'$. 与定义的区别在于 $f[G] = G'$ 而不是 $f[G] \subset G'$. 现在考虑任意的一个开集 $O \in \mathcal{S}$, 设它的元素为 y_α , 即 $\forall \alpha, y_\alpha \in O$. 如果 y_α 有逆像 $x_\alpha = f^{-1}(y_\alpha)$ 且映射是连续的, 则根据由定义 3b 推出的此定理, 一定存在开集 $G_\alpha \in \mathcal{T}$ 使 $x_\alpha \in G_\alpha$ 且 $f[G_\alpha] = O$. 于是 $f^{-1}[O] = \cup_\alpha G_\alpha \in \mathcal{T}$, 于是根据定义 3a, 映射连续.

11. 试证任一开区间 $(a, b) \subset \mathbb{R}\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{R}\mathbb{R}$ 同胚.

证 注意到映射 $f: x \mapsto \tan x$ 是 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \rightarrow (-\infty, \infty) = \mathbb{R}\mathbb{R}$ 的一一到上映射. 令 $y = \alpha x + \beta$, 我们解 $\begin{cases} -\frac{\pi}{2} = \alpha a + \beta \\ \frac{\pi}{2} = \alpha b + \beta \end{cases}$ 得 $\begin{cases} \alpha = \frac{\pi}{b-a} \\ \beta = -\frac{\pi}{2} \frac{a+b}{b-a} \end{cases}$, 于是 $y = \frac{\pi}{b-a}x - \frac{\pi}{2} \frac{a+b}{b-a} = \frac{\pi}{b-a}(x - \frac{a+b}{2})$.

构造映射 $f: x \mapsto \tan[\frac{\pi}{b-a}(x - \frac{a+b}{2})]$, 它是 $(a, b) \rightarrow \mathbb{R}\mathbb{R}$ 的一一到上映射. 下面证明 f 对 $((a, b), \mathcal{T}'_u) \rightarrow (\mathbb{R}\mathbb{R}, \mathcal{T}_u)$ 连续以及 f^{-1} 对 $(\mathbb{R}\mathbb{R}, \mathcal{T}_u) \rightarrow ((a, b), \mathcal{T}'_u)$ 连续, 其中 \mathcal{T}'_u 为 \mathcal{T}_u 的诱导拓扑. 根据 §1.2 定义 3a, 从图像上看这一结论是不证自明的. 因此根据 §1.2 定义 4, 这是同胚映射, 拓扑子空间 $((a, b), \mathcal{T}'_u)$ 与拓扑空间 $(\mathbb{R}\mathbb{R}, \mathcal{T}_u)$ 同胚.

12. 设 X_1 和 X_2 是 $\mathbb{R}\mathbb{R}$ 的子集, $X_1 \equiv (1, 2) \cup (2, 3)$, $X_2 \equiv (1, 2) \cup [2, 3)$. 以 \mathcal{T}_1 和 \mathcal{T}_2 分别代表由 $\mathbb{R}\mathbb{R}$ 的通常拓扑在 X_1 和 X_2 上的诱导拓扑. 拓扑空间 (X_1, \mathcal{T}_1)

和 (X_2, \mathcal{T}_2) 是否连通?

解 从直观图像我们可以知道 (X_1, \mathcal{T}_1) 不连通而 (X_2, \mathcal{T}_2) 连通, 下面我们证明这一结论. 首先根据诱导拓扑的定义 [§1.1 例 5 式 (1-2-2)] 知道 \mathcal{T}_1 和 \mathcal{T}_2 分别是包含于 X_1 和 X_2 的所有开区间以及开区间之并的集合.

(A) (X_1, \mathcal{T}_1) 的不连通性. 首先 $(1, 2)$ 和 $(2, 3)$ 都是开区间, 所以它们都是 \mathcal{T}_1 的元素, 所以是开的. 其次, 因 $-(1, 2) = X_1 - (1, 2) = (2, 3) \in \mathcal{T}_1$ 是开的, 所以根据 §1.2 定义 6, $(1, 2)$ 是闭的. 同样可以说明 $(2, 3)$ 也是闭的. 因此拓扑空间 (X_1, \mathcal{T}_1) (至少) 有 4 个既开又闭的子集 \emptyset 、 X_1 、 $(1, 2)$ 和 $(2, 3)$, 所以根据 §1.2 定义 7, 它是不连通的. 当然, 这正是 §1.2 例 9 的一个特例. 下面说明除了这 4 个, 没有其他的既开又闭的子空间. 属于 X_1 的子空间 (子区间、子集) 只有 4 种类型, 如 (a) $(1.6, 1.7)$ 、(b) $[1.6, 1.7]$ 、(c) $(1.6, 1.7]$ 和 (d) $[1.6, 1.7]$. 很容易看出, 其中 (a) 是开而不闭的 (本身属于 \mathcal{T}_1 而补集不属于 \mathcal{T}_1), (b) 是闭而不开的 (补集属于 \mathcal{T}_1 而本身不属于 \mathcal{T}_1), (c) 和 (d) 是既不开也不闭的 (本身不属于 \mathcal{T}_1 而补集也不属于 \mathcal{T}_1). 因此没有其他的既开又闭的子集 (本身和补集都属于 \mathcal{T}_1).

(B) (X_2, \mathcal{T}_2) 的连通性. 首先注意到 $(1, 2)$ 是开的而 $[2, 3)$ 不是开的 (其实是闭的, 见下). $[2, 3)$ 的不开性是因为: 根据诱导拓扑的定义, 现在找不到 $O \in \mathcal{T}_u$, 能使 $[2, 3) = X_2 \cap O = [(1, 2) \cup [2, 3)] \cap O$, 所以 $[2, 3) \notin \mathcal{T}_2$. 其次, 因 $-(1, 2) = X_2 - (1, 2) = [2, 3) \notin \mathcal{T}_2$, 不是开的, 所以根据 §1.2 定义 6, $(1, 2)$ 不是闭的. 而 $-[2, 3) = X_2 - [2, 3) = (1, 2) \in \mathcal{T}_2$, 所以根据定义 6, $[2, 3)$ 是闭的. 也就是说 $(1, 2)$ 是开而不闭的, 而 $[2, 3)$ 是闭而不开的. 再根据 (A) 中最后的讨论, 可知除了 \emptyset 和 X_2 , 没有其他的既开又闭的子集 (子区间), 因此根据 §1.2 定义 7, 它是连通的.

13. 任意集合 X 配以离散拓扑 \mathcal{T} 所得的拓扑空间是否连通?

解 不连通, 证明如下: 所谓离散拓扑是指 X 的所有子集都是 \mathcal{T} 的元素 (§1.2 例 1). 此时对任意的 $A \subset X$, 有 $-A = X - A \in \mathcal{T}$. 根据 §1.2 定义 6, A 是闭的. 也就是说 X 的任何子集都是既开又闭的. 所以根据 §1.2 定义 7, 离散拓扑空间不连通, 这也正是 “离散” 的由来.

由此也可以看出凝聚拓扑 \mathcal{T} 一定是连通的, 因为它只有两个元素 \emptyset 和 X , 其后果是对任何其他的 $A \subset X$, 有 $A \notin \mathcal{T}$ 及 $-A = X - A \notin \mathcal{T}$. 根据定义 6, A 既不是开的也不是闭的. 只有 \emptyset 和 X 是既开又闭的, 根据定义 7, 故而连通. 也是 “凝聚” 的由来.

~14. 设 $A \subset B$, 试证 (a) $\bar{A} \subset \bar{B}$; 提示: $A \subset B$ 表明 \bar{B} 是含 A 的闭集. (b) $i(A) \subset i(B)$.

证 这两个结论从图像上来看是显然的.

(a) 由 §1.2 定理 1-2-3(a) ②, $B \subset \bar{B}$, 故 $A \subset B \subset \bar{B}$. 根据 §1.2 定义 8, 闭包 \bar{A} 是包含 A 的最小闭集, 也就是包含 A 的所有闭集的交集. 既然现在 $A \subset \bar{B}$, 而根据 §1.2 定理 1-2-3(a) ①, \bar{B} 是闭集, 所以 \bar{B} 也是定义 8 中的 C_α 之一. 又 $\bar{A} \subset C_\alpha \forall \alpha$, 故有 $\bar{A} \subset \bar{B}$. 还可以利用习题 15 的结果证明: $\forall x \in \bar{A}$, 取 x 的邻域 N , 根据 \Rightarrow , 知 $N \cap A$ 非空. 而 $A \subset B$, 如果 $N \cap A$ 非空, 必有 $N \cap B$ 非空. 然后利用 \Leftarrow , 有 $x \in \bar{B}$. 于是属于 \bar{A} 的元素必属于 \bar{B} , 根据 §1.1 的定义 1, $\bar{A} \subset \bar{B}$.

(b) 由 §1.2 定理 1-2-3(b) ②, $i(A) \subset A$, 故 $i(A) \subset A \subset B$. 根据 §1.2 定义 9, 内部 $i(B)$ 是包含于 B 的最大开集, 也就是包含于 B 的所有开集的并集. 既然现在 $i(A) \subset B$, 而根据 §1.2 定理 1-2-3(b) ①, $i(A)$ 是开集, 所以 $i(A)$ 也是定义 9 中的 O_α 之一. 又 $O_\alpha \subset i(B) \forall \alpha$, 故有 $i(A) \subset i(B)$.

~15. 试证 $x \in \bar{A} \Leftrightarrow x$ 的任一邻域与 A 之交集非空. 对 \Rightarrow 证明的提示: 设 $O \in \mathcal{T}$ 且 $O \cap A = \emptyset$, 先证 $A \subset X - O$, 再证 (利用闭包定义) $\bar{A} \subset X - O$.

证 这两个方向我们都通过等价的逆否命题来证明. \Rightarrow 的逆否命题表述为: 如果存在 x 的邻域, 它与 A 的交集为空, 则 $x \notin \bar{A}$; \Leftarrow 的逆否命题表述为: 如果 $x \notin \bar{A}$, 则一定存在 x 的邻域, 它与 A 的交集为空.

\Rightarrow : 首先, 如果 $O \cap A = \emptyset$, 那么当 $x \in A$ 时, 必有 $x \notin O$. 当然 $x \in X$, 根据差集的定义 (§1.1 定义 2) 知这时必有 $x \in X - O$. 因此若 $O \cap A = \emptyset$, 则 $A \subset X - O$. 现在设 $O \in \mathcal{T}$ 为任一开集, 则 $X - (X - O) \stackrel{\text{习题 2}}{=} (X - X) \cup O = \emptyset \cup O = O \in \mathcal{T}$. 根据 §1.2 定义 6 知 $X - O$ 是闭集. 既然 $A \subset X - O$, 而 $X - O$ 是闭集, 根据 §1.2 闭包的定义 8: \bar{A} 是所有包含 A 的闭集的交集, 自然 $X - O$ 是定义中的 C_α 之一, 所以 $\bar{A} \subset X - O$. 至此我们证明了: 对任一开集 $O \in \mathcal{T}$, 如果 $O \cap A = \emptyset$, 则有 $\bar{A} \subset X - O$. 下面我们令 O 是 x 的邻域, 即 $x \in O$. 与 $\bar{A} \subset X - O$ 结合立即知道 $x \notin \bar{A}$. 因为如果 $x \in \bar{A}$ 的话, 由 $\bar{A} \subset X - O$ 有 $x \in X - O$, 即有 $x \notin O$, 这与 $x \in O$ 矛盾. 于是我们证明了: 如果 x 存在某个开邻域 O , 它与 A 的交集为空, 则 $x \notin \bar{A}$. 这就是 \Rightarrow 的逆否命题. 当然如果 O 非开的话, 结论依然成立, 因为非开的比开的要“大”, 如果非开的与 A 的交集为空, 则开的肯定与 A 的交集为空. 换句话说非开的至少带有部分边界, 它如果与 A 不相交, 那么它比开的要距离 A 更远. (但是证明过程中为何要用到 O 为开?)

\Leftarrow : 如果 $x \notin \bar{A}$, 根据 §1.2 定理 1-2-3(a) ② $A \subset \bar{A}$ 有 $x \notin A$. 这时必定存在 x 的某个邻域 N , $x \in N$, 使得 $N \cap A = \emptyset$. 证明如下: 因为 $x \notin A$, 所以有 $x \in X - A$. 现在在 $X - A$ 内取 x 的某个邻域, 即 $x \in N \subset X - A$. 这样得到的 N 必满足 $N \cap A = \emptyset$, 因为 $N \subset X - A$ 表明 N 的元素必不属于 A [属于 N 的元素必属于 $X - A$ (§1.1 定义 1), 属于 $X - A$ 的元素必不属于 A (§1.1 定义 2)], 因此 N 与 A 不相交. 命题得证.

16. 试证 RR 不是紧致的.

证 以 NN 代表自然数集, 则 $\{(-n, n) | n \in NN\}$ 是 RR 的开覆盖, 它没有有限子覆盖.

附. 设 C 是拓扑空间 (X, T) 的紧致子集, $A \subset C$ 且 A 是 (X, T) 的闭子集, 则 A 必紧致.

证 因 $C \subset X$, 如果 $C = X$, 则 X 为紧致, 回到了定理 1-3-3 的情形. 结论成立. 下面设 C 是 X 的真子集, 于是总可以找到 (?) 开子集 B 使满足 $C \subset B \subset X$. 首先证明 $B - A$ 为开集: 考虑 $X - (B - A) \stackrel{\text{习题 2}}{=} (X - B) \cup A$. 因 B 为开, 故 $X - B$ 为闭. 而 A 为闭, 故由 §1.2 定理 1-2-2(b) 知 $(X - B) \cup A$ 为闭. 从而 $X - (B - A)$ 为闭, $B - A$ 为开. 然后设 $\{O_\alpha\}$ 为 A 的任一开覆盖, 则用 $\{O_\alpha, B - A\}$ 可以开覆盖 $A \cup (B - A) = B$, 即用 $\{O_\alpha\}$ 覆盖 A , 用 $B - A$ 覆盖 $B - A$. 又注意到 $C \subset B$, 故而 $\{O_\alpha, B - A\}$ 也是 C 的一个开覆盖. 因 C 是紧致的, 它的任何开覆盖都存在有限子覆盖, 设为 $\{O_{\alpha_1}, \dots, O_{\alpha_n}; B - A\}$. 因 $A \cap (B - A) = \emptyset$, 所以 $B - A$ 覆盖不到 A , 它只能覆盖 $C - A$. 也就是说 $\{O_{\alpha_1}, \dots, O_{\alpha_n}\}$ 是 A 的开覆盖. 因 $\{O_\alpha\}$ 为 A 的任一开覆盖, 都有有限子覆盖 $\{O_{\alpha_1}, \dots, O_{\alpha_n}\}$, 故根据 §1.3 定义 1 知 A 是紧致的.

第 2 章 “流形和张量场” 习题

~1. 试证 §2.1 例 2 定义的拓扑同胚映射 ψ_i^\pm 在 O_i^\pm 的所有交叠区上满足相容性条件, 从而证实 S^1 确是 1 维流形.

证 设 (x, y) 是 RR^2 的自然坐标, 定义开半圆周 (不包含两 endpoint) 如下: $O_i^+ := \{(x, y) \in S^1 | x^i > 0\}$, $O_i^- := \{(x, y) \in S^1 | x^i < 0\}$, $i = x, y$, 分别对应左右和上下开半圆. 定义 O_i^\pm 到 RR 的单位开区间 $V = (-1, 1)$ 的同胚映射 ψ_i^\pm 为如下的投影映射: $\psi_x^\pm(x, y) = y$, $\psi_y^\pm(x, y) = x$. 下面证明开半圆交叠区满足相容性条件. 我们就以第一象限的交叠区为例, 它是 O_x^+ 和 O_y^+ 的交叠, 即 $O_x^+ \cap O_y^+ \neq \emptyset$. 相应的映射为:

$$O_x^+ \rightarrow V_x^+ = \psi_x^+[O_x^+]:$$

$$\psi_x^+ : (x, y) \mapsto x^1 = y,$$

即为

$$x^1 = \psi_x^+(x, y) = \psi_x^+(\sqrt{1 - y^2}, y) = y,$$

其逆映射为 $V_x^+ \rightarrow O_x^+ = (\psi_x^+)^{-1}[V_x^+]:$

$$(\psi_x^+)^{-1} : x^1 \mapsto (x, y) = (\sqrt{1 - (x^1)^2}, x^1),$$

即为

$$(x, y) = (\psi_x^+)^{-1}(x^1) = \left(\sqrt{1 - (x^1)^2}, x^1\right);$$

$$O_y^+ \rightarrow V_y^+ = \psi_y^+[O_y^+]:$$

$$\psi_y^+ : (x, y) \mapsto x'^1 = x,$$

即为

$$x'^1 = \psi_y^+(x, y) = \psi_y^+(x, \sqrt{1 - x^2}) = x.$$

于是复合映射 $\psi_y^+ \circ (\psi_x^+)^{-1}$ 为 $V_x^+ \rightarrow \psi_x^+ \cap \psi_y^+ \rightarrow V_y^+$. 根据 §1.1 定义 8 知 $\psi_y^+ \circ (\psi_x^+)^{-1} : x^1 \mapsto x'^1$ 给出复合函数:

$$\begin{aligned} x'^1 &= (\psi_y^+ \circ (\psi_x^+)^{-1})(x^1) = \psi_y^+\left((\psi_x^+)^{-1}(x^1)\right) \\ &= \psi_y^+\left(\sqrt{1 - (x^1)^2}, x^1\right) = \sqrt{1 - (x^1)^2}. \end{aligned}$$

于是我们知道复合映射 $\psi_y^+ \circ (\psi_x^+)^{-1}$ 的 1 个 1 元函数为:

$$x'^1 = \phi^1(x^1) = \sqrt{1 - (x^1)^2},$$

显然在单位线段内 ($|x^1| < 1$) 无限可微并连续, 即是 C^∞ 的, 因此光滑. 同样可以证明其他的复合映射 $\psi_\beta \circ \psi_\alpha^{-1}$ 也都是光滑的, 于是图 (O_1^-, ψ_1^-) 与图 (O_2^+, ψ_2^+) 相交相容 (第二象限), 图 (O_1^-, ψ_1^-) 与图 (O_2^-, ψ_2^-) 相交相容 (第三象限), 图 (O_1^+, ψ_1^+) 与图 (O_2^-, ψ_2^-) 相交相容 (第四象限).

用同样方法可以证明例 3 的 S^2 是 2 维流形. 设 (x, y, z) 是 RR^3 的自然坐标, 定义开半球面 (不包含圆周边界) 如下: $O_i^+ := \{(x, y, z) \in S^2 \mid x^i > 0\}$, $O_i^- := \{(x, y, z) \in S^2 \mid x^i < 0\}$, $i = x, y, z$, 分别对应左右、前后、上下开半球面. 定义 O_i^\pm 到 RR^2 的单位开圆盘 $D = \{(x, y) \in RR^2 \mid \sqrt{x^2 + y^2} < 1\}$ 的同胚映射 ψ_i^\pm 为如下的投影映射: $\psi_x^\pm(x, y, z) = (y, z)$, $\psi_y^\pm(x, y, z) = (x, z)$, $\psi_z^\pm(x, y, z) = (x, y)$. 下面证明开半球面交叠区满足相容性条件. 我们就以第一卦限的交叠区为例, 它是 O_x^+ 、 O_y^+ 和 O_z^+ 的交叠. 注意现在有 3 块坐标域交叠, 要分别证明它们两两相容. 下面以 $O_x^+ \cap O_y^+$ 为例. 相应的映射为:

$$O_x^+ \rightarrow D_x^+ = \psi_x^+[O_x^+]:$$

$$\psi_x^+ : (x, y, z) \mapsto (x^1, x^2) = (y, z),$$

即为

$$(x^1, x^2) = \psi_x^+(x, y, z) = \psi_x^+\left(\sqrt{1 - y^2 - z^2}, y, z\right) = (y, z),$$

其逆映射为 $D_x^+ \rightarrow O_x^+ = (\psi_x^+)^{-1}[D_x^+]:$

$$(\psi_x^+)^{-1} : (x^1, x^2) \mapsto (x, y, z) = \left(\sqrt{1 - (x^1)^2 - (x^2)^2}, x^1, x^2\right),$$

即为

$$(x, y, z) = (\psi_x^+)^{-1}(x^1, x^2) = \left(\sqrt{1 - (x^1)^2 - (x^2)^2}, x^1, x^2\right);$$

$$O_y^+ \rightarrow D_y^+ = \psi_y^+[O_y^+]:$$

$$\psi_y^+ : (x, y, z) \mapsto (x'^1, x'^2) = (x, z),$$

即为

$$(x'^1, x'^2) = \psi_y^+(x, y, z) = \psi_y^+\left(x, \sqrt{1-x^2-z^2}, z\right) = (x, z).$$

于是复合映射 $\psi_y^+ \circ (\psi_x^+)^{-1}$ 为 $D_x^+ \rightarrow \psi_x^+ \cap \psi_y^+ \rightarrow D_y^+$. 根据 §1.1 定义 8 知 $\psi_y^+ \circ (\psi_x^+)^{-1} : (x^1, x^2) \mapsto (x'^1, x'^2)$ 给出复合函数:

$$\begin{aligned} (x'^1, x'^2) &= (\psi_y^+ \circ (\psi_x^+)^{-1})(x^1, x^2) = \psi_y^+\left((\psi_x^+)^{-1}(x^1, x^2)\right) \\ &= \psi_y^+\left(\sqrt{1-(x^1)^2-(x^2)^2}, x^1, x^2\right) = \left(\sqrt{1-(x^1)^2-(x^2)^2}, x^2\right). \end{aligned}$$

于是我们知道复合映射 $\psi_y^+ \circ (\psi_x^+)^{-1}$ 的 2 个 2 元函数为:

$$\begin{cases} x'^1 = \phi^1(x^1, x^2) = \sqrt{1-(x^1)^2-(x^2)^2}, \\ x'^2 = \phi^2(x^1, x^2) = x^2, \end{cases}$$

显然在单位圆盘内无限可微并连续, 因此光滑.

2. 说明 n 维向量空间可看作 n 维平庸流形.

答 因为 n 维向量空间是能用一个坐标域覆盖的流形, 所以是平庸流形.

3. 设 X 和 Y 是拓扑空间, $f: X \rightarrow Y$ 是同胚. 若 X 还是个流形, 试给 Y 定义一个微分结构使 $f: X \rightarrow Y$ 升格为微分同胚.

答 根据 §1.2 定义 4, 如果 f 是拓扑空间之间的同胚映射, 那么它是一一到上的, 存在逆映射 $f^{-1}: Y \rightarrow X$, 且 f 和 f^{-1} 都连续. 现在 X 是个流形, 那么 Y 可以通过 X 获得微分结构: 对 X 用映射 ψ 获取坐标 $\psi: X \rightarrow \mathbb{R}^n$, 则对 Y 可通过映射 $\psi \circ f^{-1}: Y \rightarrow \mathbb{R}^n$ 获取坐标.

4. 设 $\{x, y\}$ 为 \mathbb{R}^2 的自然坐标, $C(t)$ 是曲线, 参数表达式为 $x = \cos t, y = \sin t, t \in (0, \pi)$. 若 $p = C(\pi/3)$, 写出曲线在 p 的切矢在自然坐标基的分量, 并画图表出该曲线及该切矢.

解 在自然坐标下, $C(t) = (x(t), y(t)) = (\cos t, \sin t)$, 有 $\frac{d}{dt}C(t) = (\sin t, -\cos t)$. 在 p 点的切矢为 $v(p) = \frac{d}{dt}C(t)|_p = \frac{d}{dt}C(t)|_{t=\pi/3} = (\sin \frac{\pi}{3}, -\cos \frac{\pi}{3}) = (\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2})$, 即 p 点的切矢在自然坐标基的分量为 $v_x = \frac{\sqrt{3}}{2}, v_y = -\frac{1}{2}$.

5. 设曲线 $C(t)$ 和 $C'(t) \equiv C(2t_0 - t)$ 在 $C(t_0) = C'(t_0)$ 点的切矢分别为 v 和 v' , 试证 $v + v' = 0$.

证 因 $C'(t) = C(2t_0 - t)$, 根据定义, 曲线 $C'(t')$ 的切矢为 $v'(t') = \frac{d}{dt'}C'(t') = -C^{(1)}(2t_0 - t')$, 这里 $C^{(1)}(x)$ 代表 $C(x)$ 的一阶导数. 于是在 $t' = t_0$ 点, $v'(t_0) = -C^{(1)}(t_0)$. 另一方面, 曲线 $C(t)$ 的切矢为 $v(t) = \frac{d}{dt}C(t) = C^{(1)}(t)$. 于是在 $t = t_0$ 点, $v(t_0) = C^{(1)}(t_0)$. 故在这一点上有 $C(t_0) = C'(t_0), v(t_0) + v'(t_0) = 0$.

6. 设 O 为坐标系 $\{x^\mu\}$ 的坐标域, $p \in O, v \in V_p, v^\mu$ 是 v 的坐标分量, 把坐标 x^μ 看作 O 上的 C^∞ 函数, 试证 $v^\mu = v(x^\mu)$. 提示: 用 $v = v^\nu X_\nu$ 两边作用于函数 x^μ .

证 把坐标 x^μ 看作 O 上的 C^∞ 函数, 即 (2-2-1') 式中的 f , 以矢量式 $v = v^\nu X_\nu$ 作用上去后得到实数 ($V_p \rightarrow \mathbb{R}$): $v(x^\mu) = v^\nu X_\nu(x^\mu)$. 这里 $v \in V_p$ 是 p 点的矢量, $v(x^\mu) \in \mathbb{R}$ 是个实数; p 点的坐标基矢 $X_\nu \in V_p$ 也是矢量, 而 $X_\nu(x^\mu) \in \mathbb{R}$ 也是个实数; $v^\nu \in \mathbb{R}$ 是个实数代表 v 的坐标分量. 然后再利用定义式 (2-2-1'), $X_\nu(x^\mu) = \frac{\partial}{\partial x^\nu} x^\mu = \delta_\nu^\mu = \delta^\mu_\nu = \delta^\mu_\nu$, 即有 $v(x^\mu) = v^\nu \delta^\mu_\nu = v^\mu$.

7. 设 M 是 2 维流形, (O, ψ) 和 (O', ψ') 是 M 上的两个坐标系, 坐标分别为 $\{x, y\}$ 和 $\{x', y'\}$, 在 $O \cap O'$ 上的坐标变换为 $x' = x, y' = y - \Omega x$ ($\Omega = \text{常数}$), 试分别写出坐标基矢 $\partial/\partial x, \partial/\partial y$ 用坐标基矢 $\partial/\partial x', \partial/\partial y'$ 的展开式.

解 坐标基矢 $X_\mu = \frac{\partial}{\partial x^\mu}$ 的变换关系为 (2-2-5) 式: $X_\mu = \frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\mu} X'_\nu$. 所以现在

$$\begin{aligned} X_x &= \frac{\partial x'}{\partial x} X'_x + \frac{\partial y'}{\partial x} X'_y = X'_x - \Omega X'_y, \\ X_y &= \frac{\partial x'}{\partial y} X'_x + \frac{\partial y'}{\partial y} X'_y = X'_y, \end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x'} - \Omega \frac{\partial}{\partial y'}, \\ \frac{\partial}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y'}. \end{aligned}$$

也可以这样得到: 因 $f(x, y) = f'(x', y')$, 故有

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x}(f) &= \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial x'}{\partial x} \frac{\partial f'}{\partial x'} + \frac{\partial y'}{\partial x} \frac{\partial f'}{\partial y'} = \frac{\partial f'}{\partial x'} - \Omega \frac{\partial f'}{\partial y'} \\ &= \left(\frac{\partial}{\partial x'} - \Omega \frac{\partial}{\partial y'} \right)(f), \end{aligned}$$

此即上面的第一个关系.

8. (a) 试证式 (2-2-9) 的 $[u, v]$ 在每点满足矢量定义 (§2.2 定义 2) 的两条件, 从而的确是矢量场. (b) 设 u, v, w 为流形 M 上的光滑矢量场, 试证

$$[[u, v], w] + [[w, u], v] + [[v, w], u] = 0 \quad (\text{此式称为 雅可比恒等式}).$$

证 (a) $[u, v]$ 满足 §2.2 定义 2(a):

$$\begin{aligned} [u, v](\alpha f + \beta g) &\stackrel{(2-2-9)}{=} u(v(\alpha f + \beta g)) - v(u(\alpha f + \beta g)) \\ &\stackrel{\text{定义} 2(a)}{=} u(\alpha v(f) + \beta v(g)) - v(\alpha u(f) + \beta u(g)) \\ &\stackrel{\text{定义} 2(a)}{=} \alpha u(v(f)) + \beta u(v(g)) - \alpha v(u(f)) - \beta v(u(g)) \\ &= \alpha[u(v(f)) - v(u(f))] + \beta[u(v(g)) - v(u(g))] \\ &\stackrel{(2-2-9)}{=} \alpha[u, v](f) + \beta[u, v](g). \end{aligned}$$

$[u, v]$ 满足 §2.2 定义 2(b):

$$\begin{aligned}
 [u, v](fg) &\stackrel{(2-2-9)}{=} u(v(fg)) - v(u(fg)) \\
 &\stackrel{\text{定}\Sigma^{2(b)}}{=} u(f|_p v(g) + g|_p v(f)) - v(f|_p u(g) + g|_p u(f)) \\
 &\stackrel{\text{定}\Sigma^{2(a)}}{=} f|_p u(v(g)) + g|_p u(v(f)) - f|_p v(u(g)) - g|_p v(u(f)) \\
 &= f|_p [u(v(g)) - v(u(g))] + g|_p [u(v(f)) - v(u(f))] \\
 &\stackrel{(2-2-9)}{=} f|_p [u, v](g) + g|_p [u, v](f) .
 \end{aligned}$$

(b) 雅可比恒等式:

$$\begin{aligned}
 &[[u, v], w] + [[w, u], v] + [[v, w], u] \\
 &= [uv - vu, w] + [wu - uw, v] + [vw - wv, u] \\
 &= (uv - vu)w - w(uv - vu) + (wu - uw)v - v(wu - uw) \\
 &\quad + (vw - wv)u - u(vw - wv) \\
 &= uvw - vuw - wuv + wvu + wuv - uwv - vwu + vuw \\
 &\quad + vwu - wvu - uvw + uwv \\
 &= 0 .
 \end{aligned}$$

~9. 设 $\{r, \varphi\}$ 为 RR^2 中某开集 (坐标域) 上的极坐标, $\{x, y\}$ 为自然坐标,

(a) 写出极坐标系的坐标基矢 $\partial/\partial r$ 和 $\partial/\partial \varphi$ (作为坐标域上的矢量场) 用 $\partial/\partial x, \partial/\partial y$ 展开的表达式.

(b) 求矢量场 $[\partial/\partial r, \partial/\partial x]$ 用 $\partial/\partial x, \partial/\partial y$ 展开的表达式.

(c) 令 $\hat{e}_r \equiv \partial/\partial r, \hat{e}_\varphi \equiv r^{-1}\partial/\partial \varphi$, 求 $[\hat{e}_r, \hat{e}_\varphi]$ 用 $\partial/\partial x, \partial/\partial y$ 展开的表达式.

解 (a) 因 $x = r \cos \varphi, y = r \sin \varphi$, 有 $r = \sqrt{x^2 + y^2}, \tan \varphi = \frac{y}{x}$ 和 $\cos \varphi = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \sin \varphi = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$. 利用基矢的变换关系 (2-2-5) $e_\mu = \frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\mu} e'_\nu$, 有

$$\begin{aligned}
 e_r &= \frac{\partial x}{\partial r} e_x + \frac{\partial y}{\partial r} e_y = \cos \varphi e_x + \sin \varphi e_y , \\
 e_\varphi &= \frac{\partial x}{\partial \varphi} e_x + \frac{\partial y}{\partial \varphi} e_y = -r \sin \varphi e_x + r \cos \varphi e_y ,
 \end{aligned}$$

即为

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial}{\partial r} &= \cos \varphi \frac{\partial}{\partial x} + \sin \varphi \frac{\partial}{\partial y} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \frac{\partial}{\partial y} , \\
 \frac{\partial}{\partial \varphi} &= -r \sin \varphi \frac{\partial}{\partial x} + r \cos \varphi \frac{\partial}{\partial y} = -y \frac{\partial}{\partial x} + x \frac{\partial}{\partial y} .
 \end{aligned}$$

也可如下推出：因 $f_{r\varphi}(r, \varphi) = f_{xy}(x, y)$, 故有

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial r}(f) &= \frac{\partial f_{r\varphi}(r, \varphi)}{\partial r} = \frac{\partial f_{xy}(x, y)}{\partial r} = \frac{\partial x}{\partial r} \frac{\partial f_{xy}(x, y)}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial r} \frac{\partial f_{xy}(x, y)}{\partial y} \\ &= \left(\cos \varphi \frac{\partial}{\partial x} + \sin \varphi \frac{\partial}{\partial y} \right)(f), \\ \frac{\partial}{\partial \varphi}(f) &= \frac{\partial f_{r\varphi}(r, \varphi)}{\partial \varphi} = \frac{\partial f_{xy}(x, y)}{\partial \varphi} = \frac{\partial x}{\partial \varphi} \frac{\partial f_{xy}(x, y)}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial \varphi} \frac{\partial f_{xy}(x, y)}{\partial y} \\ &= \left(-r \sin \varphi \frac{\partial}{\partial x} + r \cos \varphi \frac{\partial}{\partial y} \right)(f),\end{aligned}$$

于是有前面同样的结果.

(b) 利用 (a) 的结果, 有

$$\begin{aligned}\left[\frac{\partial}{\partial r}, \frac{\partial}{\partial x} \right] &= \left[\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial x} \right] \\ &= \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \frac{\partial}{\partial y} \right) \frac{\partial}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \frac{\partial}{\partial y} \right) \\ &= -\frac{\frac{\partial}{\partial x} \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}}{\frac{\partial}{\partial x}} \frac{\partial}{\partial x} - \frac{\frac{\partial}{\partial x} \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}}{\frac{\partial}{\partial x}} \frac{\partial}{\partial y} \\ &= -\frac{y^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{xy}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \frac{\partial}{\partial y}.\end{aligned}$$

(c) 利用 (a) 的结果, 有

$$\begin{aligned}\hat{e}_r &\equiv e_r = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \frac{\partial}{\partial y}, \\ \hat{e}_\varphi &\equiv \frac{1}{r} e_\varphi = -\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \frac{\partial}{\partial y}.\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}[\hat{e}_r, \hat{e}_\varphi] &= \left[\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \frac{\partial}{\partial y}, -\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \frac{\partial}{\partial y} \right] \\ &= \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \frac{\partial}{\partial y} \right) \left(-\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \frac{\partial}{\partial y} \right) \\ &\quad - \left(-\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \frac{\partial}{\partial y} \right) \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \frac{\partial}{\partial y} \right) \\ &= \left[-\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \frac{\partial}{\partial x} \frac{\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}}{\frac{\partial}{\partial x}} - \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \frac{\partial}{\partial y} \frac{\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}}{\frac{\partial}{\partial y}} \right] \left(\frac{\partial}{\partial x} \right) \\ &\quad + \left[\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \frac{\partial}{\partial x} \frac{\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}}{\frac{\partial}{\partial x}} + \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \frac{\partial}{\partial y} \frac{\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}}{\frac{\partial}{\partial y}} \right] \left(\frac{\partial}{\partial y} \right) \\ &\quad - \left[-\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \frac{\partial}{\partial x} \frac{\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}}{\frac{\partial}{\partial x}} + \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \frac{\partial}{\partial y} \frac{\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}}{\frac{\partial}{\partial y}} \right] \left(\frac{\partial}{\partial x} \right)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& - \left[-\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \frac{\partial \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}}{\partial x} + \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \frac{\partial \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}}{\partial y} \right] \left(\frac{\partial}{\partial y} \right) \\
& = \left[\frac{x^2 y}{(x^2+y^2)^2} - \frac{x^2 y}{(x^2+y^2)^2} \right] \left(\frac{\partial}{\partial x} \right) \\
& \quad + \left[\frac{xy^2}{(x^2+y^2)^2} - \frac{xy^2}{(x^2+y^2)^2} \right] \left(\frac{\partial}{\partial y} \right) \\
& \quad - \left[-\frac{y^3}{(x^2+y^2)^2} - \frac{x^2 y}{(x^2+y^2)^2} \right] \left(\frac{\partial}{\partial x} \right) \\
& \quad - \left[\frac{xy^2}{(x^2+y^2)^2} + \frac{x^3}{(x^2+y^2)^2} \right] \left(\frac{\partial}{\partial y} \right) \\
& = \frac{y}{x^2+y^2} \frac{\partial}{\partial x} - \frac{x}{x^2+y^2} \frac{\partial}{\partial y} \\
& = \frac{y}{x^2+y^2} \hat{e}_x - \frac{x}{x^2+y^2} \hat{e}_y .
\end{aligned}$$

此等式也可利用下题的结果获得.

~10. 设 u, v 为 M 上的矢量场, 试证 $[u, v]$ 在任何坐标基底的分量满足

$$[u, v]^\mu = u^\nu \partial v^\mu / \partial x^\nu - v^\nu \partial u^\mu / \partial x^\nu . \quad \text{提示: 用式 (2-2-3') 和 (2-2-3).}$$

证 由 (2-2-3'), 矢量 $[u, v]$ 的第 μ 分量 $[u, v]^\mu$ 为矢量 $[u, v]$ 作用到函数 x^μ 上的值, 即

$$\begin{aligned}
[u, v]^\mu &= [u, v](x^\mu) \stackrel{(2-2-9')}{=} u(v(x^\mu)) - v(u(x^\mu)) \\
&\stackrel{(2-2-3')}{=} u(v^\mu) - v(u^\mu) \stackrel{(2-2-3)}{=} u^\nu X_\nu(v^\mu) - v^\nu X_\nu(u^\mu) \\
&\stackrel{(2-2-1')}{=} u^\nu \frac{\partial v^\mu}{\partial x^\nu} - v^\nu \frac{\partial u^\mu}{\partial x^\nu} .
\end{aligned}$$

[根据此式可得上题 (b) 和 (c) 的结果. (b) 因 $\frac{\partial}{\partial r} = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \frac{\partial}{\partial y}$, $\frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}$, 于是

$$\begin{aligned}
\left[\frac{\partial}{\partial r}, \frac{\partial}{\partial x} \right]^x &= \left(\frac{\partial}{\partial r} \right)^x \frac{\partial \left(\frac{\partial}{\partial x} \right)^x}{\partial x} + \left(\frac{\partial}{\partial r} \right)^y \frac{\partial \left(\frac{\partial}{\partial x} \right)^x}{\partial y} - \left(\frac{\partial}{\partial x} \right)^x \frac{\partial \left(\frac{\partial}{\partial r} \right)^x}{\partial x} - \left(\frac{\partial}{\partial x} \right)^y \frac{\partial \left(\frac{\partial}{\partial r} \right)^x}{\partial y} \\
&= \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \frac{\partial 1}{\partial x} + \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \frac{\partial 1}{\partial y} - 1 \frac{\partial \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}}{\partial x} - 0 \frac{\partial \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}}{\partial y} \\
&= -\frac{y^2}{(x^2+y^2)^{3/2}} , \\
\left[\frac{\partial}{\partial r}, \frac{\partial}{\partial x} \right]^y &= \left(\frac{\partial}{\partial r} \right)^x \frac{\partial \left(\frac{\partial}{\partial x} \right)^y}{\partial x} + \left(\frac{\partial}{\partial r} \right)^y \frac{\partial \left(\frac{\partial}{\partial x} \right)^y}{\partial y} - \left(\frac{\partial}{\partial x} \right)^x \frac{\partial \left(\frac{\partial}{\partial r} \right)^y}{\partial x} - \left(\frac{\partial}{\partial x} \right)^y \frac{\partial \left(\frac{\partial}{\partial r} \right)^y}{\partial y} \\
&= \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \frac{\partial 0}{\partial x} + \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \frac{\partial 0}{\partial y} - 1 \frac{\partial \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}}{\partial x} - 0 \frac{\partial \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}}{\partial y} \\
&= \frac{xy}{(x^2+y^2)^{3/2}} ,
\end{aligned}$$

即为 (b) 的结果

$$\left[\frac{\partial}{\partial r}, \frac{\partial}{\partial x} \right] = -\frac{y^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{xy}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \frac{\partial}{\partial y}.$$

(c) 因 $\hat{e}_r = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} e_x + \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} e_y$, $\hat{e}_\varphi = -\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} e_x + \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} e_y$, 于是

$$\begin{aligned} [\hat{e}_r, \hat{e}_\varphi]^x &= (\hat{e}_r)^x \frac{\partial(\hat{e}_\varphi)^x}{\partial x} + (\hat{e}_r)^y \frac{\partial(\hat{e}_\varphi)^x}{\partial y} - (\hat{e}_\varphi)^x \frac{\partial(\hat{e}_r)^x}{\partial x} - (\hat{e}_\varphi)^y \frac{\partial(\hat{e}_r)^x}{\partial y} \\ &= \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \frac{\partial\left(-\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)}{\partial x} + \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \frac{\partial\left(-\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)}{\partial y} \\ &\quad + \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \frac{\partial\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)}{\partial x} - \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \frac{\partial\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)}{\partial y} \\ &= \frac{x^2 y}{(x^2 + y^2)^2} - \frac{x^2 y}{(x^2 + y^2)^2} + \frac{y^3}{(x^2 + y^2)^2} + \frac{x^2 y}{(x^2 + y^2)^2} \\ &= \frac{y}{x^2 + y^2}, \\ [\hat{e}_r, \hat{e}_\varphi]^y &= (\hat{e}_r)^x \frac{\partial(\hat{e}_\varphi)^y}{\partial x} + (\hat{e}_r)^y \frac{\partial(\hat{e}_\varphi)^y}{\partial y} - (\hat{e}_\varphi)^x \frac{\partial(\hat{e}_r)^y}{\partial x} - (\hat{e}_\varphi)^y \frac{\partial(\hat{e}_r)^y}{\partial y} \\ &= \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \frac{\partial\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)}{\partial x} + \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \frac{\partial\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)}{\partial y} \\ &\quad + \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \frac{\partial\left(\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)}{\partial x} - \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \frac{\partial\left(\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)}{\partial y} \\ &= \frac{xy^2}{(x^2 + y^2)^2} - \frac{xy^2}{(x^2 + y^2)^2} - \frac{xy^2}{(x^2 + y^2)^2} - \frac{x^3}{(x^2 + y^2)^2} \\ &= -\frac{x}{x^2 + y^2}, \end{aligned}$$

即为 (c) 的结果

$$[\hat{e}_r, \hat{e}_\varphi] = \frac{y}{x^2 + y^2} \hat{e}_x - \frac{x}{x^2 + y^2} \hat{e}_y.$$

另外注意对 $e_r \equiv \frac{\partial}{\partial r} = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} e_x + \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} e_y$, $e_\varphi \equiv \frac{\partial}{\partial \varphi} = -y e_x + x e_y$, 其结果为

$$\begin{aligned} [e_r, e_\varphi]^x &= (e_r)^x \frac{\partial(e_\varphi)^x}{\partial x} + (e_r)^y \frac{\partial(e_\varphi)^x}{\partial y} - (e_\varphi)^x \frac{\partial(e_r)^x}{\partial x} - (e_\varphi)^y \frac{\partial(e_r)^x}{\partial y} \\ &= \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \frac{\partial(-y)}{\partial x} + \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \frac{\partial(-y)}{\partial y} + y \frac{\partial\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)}{\partial x} - x \frac{\partial\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)}{\partial y} \\ &= 0 - \frac{y}{(x^2 + y^2)^{1/2}} + \frac{y^3}{(x^2 + y^2)^{3/2}} + \frac{x^2 y}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \\ &= 0, \\ [e_r, e_\varphi]^y &= (e_r)^x \frac{\partial(e_\varphi)^y}{\partial x} + (e_r)^y \frac{\partial(e_\varphi)^y}{\partial y} - (e_\varphi)^x \frac{\partial(e_r)^y}{\partial x} - (e_\varphi)^y \frac{\partial(e_r)^y}{\partial y} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \frac{\partial(x)}{\partial x} + \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \frac{\partial(x)}{\partial y} + y \frac{\partial\left(\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)}{\partial x} - x \frac{\partial\left(\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)}{\partial y} \\
&= \frac{x}{(x^2+y^2)^{1/2}} + 0 - \frac{xy^2}{(x^2+y^2)^{3/2}} - \frac{x^3}{(x^2+y^2)^{3/2}} \\
&= 0,
\end{aligned}$$

这正是定理 2-2-7 所保证的.]

~11. 设 $\{e_\mu\}$ 为 V 的基底, $\{e^{\mu*}\}$ 为其对偶基底, $v \in V, \omega \in V^*$, 试证

$$\omega = \omega(e_\mu)e^{\mu*}, \quad v = e^{\mu*}(v)e_\mu.$$

证 将 $\omega = \omega(e_\mu)e^{\mu*}$ 作用于 V 的任一基矢 e_ν , 注意这里的 $\omega, e^{\mu*} \in V^*$ 是对偶矢量和对偶矢量的基矢, 它们都作用在 矢量 上而得到实数! $\omega(e_\mu) \in RR$ 是实数. 有

$$\begin{aligned}
\text{左边} &= \omega(e_\nu) \stackrel{(2-3-3)}{=} \omega_\nu, \\
\text{右边} &= \omega(e_\mu)e^{\mu*}(e_\nu) \stackrel{(2-3-2)}{=} \omega(e_\mu)\delta^\mu_\nu = \omega(e_\nu),
\end{aligned}$$

即 ω 和 $\omega(e_\mu)e^{\mu*}$ 作用到矢量 (任一基矢 e_ν) 都得到实数 $\omega_\nu \equiv \omega(e_\nu)$.

将对偶矢量 (任一对偶矢量的基矢) $e^{\nu*}$ 作用到矢量 $v = e^{\mu*}(v)e_\mu$, 这里 $e^{\mu*}(v) \in RR$ 是实数, $v, e_\mu \in V$ 是矢量和矢量的基矢, 有

$$\begin{aligned}
\text{左边} &= e^{\nu*}(v), \\
\text{右边} &= e^{\mu*}(v)e^{\nu*}(e_\mu) \stackrel{(2-3-2)}{=} e^{\mu*}(v)\delta^\nu_\mu = e^{\nu*}(v),
\end{aligned}$$

即对偶矢量的任一基矢作用到矢量 v 和 $e^{\mu*}(v)e_\mu$ 得到同一个实数 $e^{\nu*}(v)$.

~12. 试证 $\omega'_\nu = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x'^\nu} \omega_\mu$ (定理 2-3-4).

证 根据矢量基矢的变换关系 (2-2-5) 式有 $e_\mu = \frac{\partial x'^\nu}{\partial x'^\mu} e'_\nu$ 和 $e'_\mu = \frac{\partial x^\nu}{\partial x'^\mu} e_\nu$. 以对偶矢量 ω 作用到这两个矢量式, 得到 $\omega(e_\mu) = \frac{\partial x'^\nu}{\partial x'^\mu} \omega(e'_\nu)$ 和 $\omega(e'_\mu) = \frac{\partial x^\nu}{\partial x'^\mu} \omega(e_\nu)$, 利用定义 (2-3-3), 即为 $\omega_\mu = \frac{\partial x'^\nu}{\partial x'^\mu} \omega'_\nu$ 和 $\omega'_\mu = \frac{\partial x^\nu}{\partial x'^\mu} \omega_\nu$.

~13. 试证由式 (2-3-5) 定义的映射 $v \mapsto v^{**}$ 是同构映射. 提示: 可利用线性代数的结论, 即同维矢量空间之间的一一线性映射必到上.

证 如果 (2-3-5) 式 $v^{**}(\omega) = \omega(v)$ 成立, 设 $v = v^\mu e_\mu$, 则有

$$\omega(v) = \omega(v^\mu e_\mu) = v^\mu \omega(e_\mu) \stackrel{(2-3-3)}{=} v^\mu \omega_\mu,$$

其中 $v, e_\mu \in V, \omega \in V^*, v^\mu, \omega_\mu \in RR$. 另一方面, 因 $\omega \stackrel{(2-3-4)}{=} \omega_\mu e^{\mu*}$, 有

$$v^{**}(\omega) = v^{**}(\omega_\mu e^{\mu*}) = \omega_\mu v^{**}(e^{\mu*}) = \omega_\mu v^{**\mu},$$

其中令 $v^{**}(e^{\mu*}) \equiv v^{**\mu} \in RR$, $\omega, e^{\mu*} \in V^*$, $v^{**} \in V^{**}$. 因为 ω 是任意的, 即 n 个实数 ω_μ 是任意的, 欲使该等式 $\omega_\mu v^{**\mu} = v^{**\mu} \omega_\mu = v^\mu \omega_\mu$ 成立, 必有 $v^{**\mu} = v^\mu$, 这时这两个自然同构的矢量空间重合 $V^{**} = V$.

其实两个同维矢量空间之间的线性映射如果是一一的, 那么必定是到上的. 存在一一到上的线性映射, 就保证了它们之间同构.

- ~14. 设 $C_1^1 T$ 和 $(C_1^1 T)'$ 分别是 $(2, 1)$ 型张量 T 借两个基底 $\{e_\mu\}$ 和 $\{e'_\mu\}$ 定义的缩并, 试证 $(C_1^1 T)' = C_1^1 T$.

证

$$\begin{aligned} (C_1^1 T)' &\stackrel{\text{定义}}{=} T(e'^{\mu*}, \bullet; e'_\mu) \stackrel{\text{定理 2-3-2}}{=} T((A^{-1})^\mu{}_\rho e^{\rho*}, \bullet; A^\nu{}_\mu e_\nu) \\ &\stackrel{\text{线性性}}{=} A^\nu{}_\mu (A^{-1})^\mu{}_\rho T(e^{\rho*}, \bullet; e_\nu) \stackrel{\text{矩阵相乘}}{=} (AA^{-1})^\nu{}_\rho T(e^{\rho*}, \bullet; e_\nu) \\ &= \delta^\nu{}_\rho T(e^{\rho*}, \bullet; e_\nu) = T(e^{\nu*}, \bullet; e_\nu) \stackrel{\text{定义}}{=} C_1^1 T. \end{aligned}$$

注意: 考虑到 $C_1^1 T$ 是个 $(1, 0)$ 型张量, 即是矢量 $C_1^1 T \in V$, 故它按矢量方式变换, 而不是不变的. 换句话说, 如果上式中 \bullet 填入了相应的量, 等式并不成立!

- *~15. 设 g 为 V 的度规, 试证 $g: V \rightarrow V^*$ 是同构映射 (可参见第 13 题的提示).

证 度规 g 为 $(0, 2)$ 型张量 $g(\bullet, \bullet)$, 对矢量 $v \in V$ 的作用给出 $g(v, \bullet)$ 或 $g(\bullet, v)$, 都是对偶矢量, 因为它们再作用于矢量 $u \in V$ 后给出实数 $g(v, u)$ 或 $g(u, v)$, 于是 $g(v, \bullet)$ 和 $g(\bullet, v)$ 都属于 V^* . 因此可以将 g 看成是把一个矢量变成一个对偶矢量的映射 $g: V \rightarrow V^*$, 而且是线性映射. 另一方面, 由于 g 是非退化的, 这样的映射必定是一一的. 也就是说, 对于任一像点 $\omega \in V^*$, 只有唯一的原像点 v , 满足 $g(v, \bullet) = \omega$ (或 $g(\bullet, v) = \omega$). 否则的话会与 g 的非退化性矛盾: 如果有 $g(v, \bullet) = \omega$ 和 $g(v', \bullet) = \omega$, 且 $v \neq v'$, 根据 g 的线性性, 两式相减有 $g(v - v', \bullet) = 0$, g 退化. 最后根据线性代数, 两个同维矢量空间的一一映射必定到上, 而一一到上的线性映射保证这是同构映射.

- ~16. 试证线长与曲线的参数化无关.

证 设曲线 $C(t)$ 的重参数化曲线为 $C'(t')$, 即 $C(t) = C'(t')$, 而 $t' = \alpha(t)$ (见 §2.2.1 注 4). 考虑在 C 上 t_1 到 t_2 段的线长: $l = \int_{t_1}^{t_2} \frac{dC(\tau)}{d\tau} d\tau = C(t_2) - C(t_1)$, 那么在 C' 上的相应长度为 $l' = C'(t'_2) - C'(t'_1) = C(t_2) - C(t_1) = l$.

17. 设 $\{x, y\}$ 是 2 维欧氏空间的笛卡尔坐标系, 试证由式 (2-5-14) 定义的 $\{x', y'\}$ 也是笛卡尔系.

证 由于 (其实就是张量变换关系定理 2-4-2)

$$\delta\left(\frac{\partial}{\partial x'^\alpha}, \frac{\partial}{\partial x'^\beta}\right) = \delta\left(\frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\alpha} \frac{\partial}{\partial x^\mu}, \frac{\partial x^\nu}{\partial x'^\beta} \frac{\partial}{\partial x^\nu}\right) = \frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\alpha} \frac{\partial x^\nu}{\partial x'^\beta} \delta\left(\frac{\partial}{\partial x^\mu}, \frac{\partial}{\partial x^\nu}\right),$$

如果 $\{x^\mu\}$ 是笛卡尔系, 则 $\delta(\frac{\partial}{\partial x^\mu}, \frac{\partial}{\partial x^\nu}) \stackrel{(2-5-12)}{=} \delta_{\mu\nu}$, 有 $\delta(\frac{\partial}{\partial x'^\alpha}, \frac{\partial}{\partial x'^\beta}) = \frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\alpha} \frac{\partial x^\nu}{\partial x'^\beta}$. (注意笛卡尔系没有对求和 (缩并) 有上下标的要求!) 现在, (2-5-14) 式的反变换为: $x = x' \cos \alpha - y' \sin \alpha$, $y = x' \sin \alpha + y' \cos \alpha$, 有 $\frac{\partial x}{\partial x'} = \cos \alpha$, $\frac{\partial x}{\partial y'} = -\sin \alpha$, $\frac{\partial y}{\partial x'} = \sin \alpha$, $\frac{\partial y}{\partial y'} = \cos \alpha$. 因此

$$\begin{aligned}\delta\left(\frac{\partial}{\partial x'}, \frac{\partial}{\partial x'}\right) &= \frac{\partial x}{\partial x'} \frac{\partial x}{\partial x'} + \frac{\partial y}{\partial x'} \frac{\partial y}{\partial x'} = (\cos \alpha)(\cos \alpha) + (\sin \alpha)(\sin \alpha) = 1, \\ \delta\left(\frac{\partial}{\partial x'}, \frac{\partial}{\partial y'}\right) &= \frac{\partial x}{\partial x'} \frac{\partial x}{\partial y'} + \frac{\partial y}{\partial x'} \frac{\partial y}{\partial y'} = (\cos \alpha)(-\sin \alpha) + (\sin \alpha)(\cos \alpha) = 0, \\ \delta\left(\frac{\partial}{\partial y'}, \frac{\partial}{\partial x'}\right) &= \frac{\partial x}{\partial y'} \frac{\partial x}{\partial x'} + \frac{\partial y}{\partial y'} \frac{\partial y}{\partial x'} = (-\sin \alpha)(\cos \alpha) + (\cos \alpha)(\sin \alpha) = 0, \\ \delta\left(\frac{\partial}{\partial y'}, \frac{\partial}{\partial y'}\right) &= \frac{\partial x}{\partial y'} \frac{\partial x}{\partial y'} + \frac{\partial y}{\partial y'} \frac{\partial y}{\partial y'} = (-\sin \alpha)(-\sin \alpha) + (\cos \alpha)(\cos \alpha) = 1,\end{aligned}$$

即 $\delta(\frac{\partial}{\partial x'^\alpha}, \frac{\partial}{\partial x'^\beta}) = \delta_{\alpha\beta}$. 于是 $\{x', y'\}$ 也是笛卡尔系.

其实这一结论可以推广到任意 n 维笛卡尔系: 设 $\{x^\mu\}$ 是笛卡尔系, 通过正交变换与此系相联系的另一坐标系 $x'^\alpha = A^\alpha_\mu x^\mu$ 也必为笛卡尔系. 这里 A 是 n 维正交矩阵, 具有性质 $A^{-1} = \tilde{A}$, 即 $(A^{-1})^\mu_\alpha = \tilde{A}^\mu_\alpha = A^\alpha_\mu$. 因逆变换为 $x^\mu = (A^{-1})^\mu_\alpha x'^\alpha = A^\alpha_\mu x'^\alpha$, 有 $\frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\alpha} = (A^{-1})^\mu_\alpha = A^\alpha_\mu$, 于是由上面的结果

$$\delta\left(\frac{\partial}{\partial x'^\alpha}, \frac{\partial}{\partial x'^\beta}\right) = \frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\alpha} \frac{\partial x^\nu}{\partial x'^\beta} = A^\alpha_\mu A^\beta_\nu = A^\alpha_\mu (A^{-1})^\mu_\beta = \delta^\alpha_\beta = \delta_{\alpha\beta}.$$

可见度规张量 δ 对 $\{x'^\mu\}$ 满足 (2-5-12) 式, 故它也是笛卡尔系.

18. 设 $\{t, x\}$ 是 2 维闵氏空间的洛伦兹坐标系, 试证由式 (2-5-20) 定义的 $\{t', x'\}$ 也是洛伦兹系.

证 由于 (其实就是张量变换关系定理 2-4-2)

$$\eta\left(\frac{\partial}{\partial x'^\alpha}, \frac{\partial}{\partial x'^\beta}\right) = \eta\left(\frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\alpha} \frac{\partial}{\partial x^\mu}, \frac{\partial x^\nu}{\partial x'^\beta} \frac{\partial}{\partial x^\nu}\right) = \frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\alpha} \frac{\partial x^\nu}{\partial x'^\beta} \eta\left(\frac{\partial}{\partial x^\mu}, \frac{\partial}{\partial x^\nu}\right),$$

如果 $\{x^\mu\}$ 是洛伦兹系, 则 $\eta(\frac{\partial}{\partial x^\mu}, \frac{\partial}{\partial x^\nu}) = \eta_{\mu\nu}$, 有 $\eta(\frac{\partial}{\partial x'^\alpha}, \frac{\partial}{\partial x'^\beta}) = \eta_{\mu\nu} \frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\alpha} \frac{\partial x^\nu}{\partial x'^\beta}$. 对于 2 维闵氏空间, 有 $\eta_{xx} = -\eta_{tt} = +1$, $\eta_{tx} = \eta_{xt} = 0$. 现在, (2-5-20) 式的反变换为: $t = t' \cosh \lambda - x' \sinh \lambda$, $x = -t' \sinh \lambda + x' \cosh \lambda$, 有 $\frac{\partial t}{\partial t'} = \cosh \lambda$, $\frac{\partial t}{\partial x'} = -\sinh \lambda$, $\frac{\partial x}{\partial t'} = -\sinh \lambda$, $\frac{\partial x}{\partial x'} = \cosh \lambda$. 因此

$$\begin{aligned}\eta\left(\frac{\partial}{\partial t'}, \frac{\partial}{\partial t'}\right) &= \eta_{tt} \frac{\partial t}{\partial t'} \frac{\partial t}{\partial t'} + \eta_{xx} \frac{\partial x}{\partial t'} \frac{\partial x}{\partial t'} \\ &= (-1)(\cosh \lambda)(\cosh \lambda) + (+1)(-\sinh \lambda)(-\sinh \lambda) = -1, \\ \eta\left(\frac{\partial}{\partial t'}, \frac{\partial}{\partial x'}\right) &= \eta_{tt} \frac{\partial t}{\partial t'} \frac{\partial t}{\partial x'} + \eta_{xx} \frac{\partial x}{\partial t'} \frac{\partial x}{\partial x'} \\ &= (-1)(\cosh \lambda)(-\sinh \lambda) + (+1)(-\sinh \lambda)(\cosh \lambda) = 0, \\ \eta\left(\frac{\partial}{\partial x'}, \frac{\partial}{\partial t'}\right) &= \eta_{tt} \frac{\partial t}{\partial x'} \frac{\partial t}{\partial t'} + \eta_{xx} \frac{\partial x}{\partial x'} \frac{\partial x}{\partial t'} \\ &= (-1)(-\sinh \lambda)(\cosh \lambda) + (+1)(\cosh \lambda)(-\sinh \lambda) = 0,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\eta\left(\frac{\partial}{\partial x'}, \frac{\partial}{\partial x'}\right) &= \eta_{tt} \frac{\partial t}{\partial x'} \frac{\partial t}{\partial x'} + \eta_{xx} \frac{\partial x}{\partial x'} \frac{\partial x}{\partial x'} \\ &= (-1)(-\sinh \lambda)(-\sinh \lambda) + (+1)(\cosh \lambda)(\cosh \lambda) = +1,\end{aligned}$$

即 $\eta_{x'x'} = -\eta_{t't'} = +1$, $\eta_{t'x'} = \eta_{x't'} = 0$. 于是 $\{t', x'\}$ 也是 2 维洛伦兹系.

其实这一结论可以推广到任意 n 维笛卡尔系: 设 $\{x^\mu\}$ 是洛伦兹系, 通过洛伦兹变换与此系相联系的另一坐标系 $x'^\alpha = \Lambda^\alpha_\mu x^\mu$ 也必为洛伦兹系. 这里 Λ 是 n 维洛伦兹变换矩阵, 具有性质 $\eta_{\alpha\beta} \Lambda^\alpha_\mu \Lambda^\beta_\nu = \eta_{\mu\nu}$, $\eta^{\mu\nu} \Lambda^\alpha_\mu \Lambda^\beta_\nu = \eta^{\alpha\beta}$, 以及 $(\Lambda^{-1})^\mu_\alpha = \Lambda^\mu_\alpha = \eta_{\alpha\beta} \eta^{\mu\nu} \Lambda^\beta_\nu$. 因逆变换为 $x^\mu = (\Lambda^{-1})^\mu_\alpha x'^\alpha = \eta_{\alpha\beta} \eta^{\mu\nu} \Lambda^\beta_\nu x'^\alpha$, 有 $\frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\alpha} = \eta_{\alpha\beta} \eta^{\mu\nu} \Lambda^\beta_\nu$, 于是由上面的结果

$$\begin{aligned}\eta\left(\frac{\partial}{\partial x'^\alpha}, \frac{\partial}{\partial x'^\beta}\right) &= \eta_{\mu\nu} \frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\alpha} \frac{\partial x^\nu}{\partial x'^\beta} = \eta_{\mu\nu} (\eta_{\alpha\gamma} \eta^{\mu\rho} \Lambda^\gamma_\rho) (\eta_{\beta\delta} \eta^{\nu\sigma} \Lambda^\delta_\sigma) \\ &= (\eta_{\mu\nu} \eta^{\mu\rho}) \eta_{\alpha\gamma} \eta_{\beta\delta} \eta^{\nu\sigma} \Lambda^\gamma_\rho \Lambda^\delta_\sigma = \delta^\rho_\nu \eta_{\alpha\gamma} \eta_{\beta\delta} \eta^{\nu\sigma} \Lambda^\gamma_\rho \Lambda^\delta_\sigma \\ &= \eta_{\alpha\gamma} \eta_{\beta\delta} (\eta^{\nu\sigma} \Lambda^\gamma_\nu \Lambda^\delta_\sigma) = \eta_{\alpha\gamma} (\eta_{\beta\delta} \eta^{\gamma\delta}) = \eta_{\alpha\gamma} \delta^\gamma_\beta \\ &= \eta_{\alpha\beta}.\end{aligned}$$

可见度规张量 η 对 $\{x'^\mu\}$ 满足 (2-5-18) 式, 故它也是洛伦兹系.

- ~19. (a) 用张量变换律求出 3 维欧氏度规在球坐标系中的全分量 $g'_{\mu\nu}$. (b) 已知 4 维闵氏度规 g 在洛伦兹系中的线元表达式为 $ds^2 = -dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2$, 求 g 及其逆 g^{-1} 在新坐标系 $\{t', x', y', z'\}$ 的全分量 $g'_{\mu\nu}$ 及 $g'^{\mu\nu}$, 该新坐标系定义如下:

$$t' = t, \quad z' = z, \quad x' = (x^2 + y^2)^{1/2} \cos(\varphi - \omega t),$$

$$y' = (x^2 + y^2)^{1/2} \sin(\varphi - \omega t), \quad \omega = \text{常数},$$

其中 φ 满足 $\cos \varphi = y(x^2 + y^2)^{-1/2}$, $\sin \varphi = x(x^2 + y^2)^{-1/2}$. 提示: 先求 $g'^{\mu\nu}$ 再求 $g'_{\mu\nu}$.

解 (a) 球坐标与直角坐标的关系 $x = r \cos \theta \cos \varphi$, $y = r \cos \theta \sin \varphi$, $z = r \sin \theta$. 由张量变换律, 定理 2-4-2, $g'_{\mu\nu} = \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu} \frac{\partial x^\beta}{\partial x'^\nu} g_{\alpha\beta} = \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu} \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\nu}$, 于是有

$$\begin{aligned}g'_{rr} &= \frac{\partial x}{\partial r} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial y}{\partial r} \frac{\partial y}{\partial r} + \frac{\partial z}{\partial r} \frac{\partial z}{\partial r} \\ &= (\cos \theta \cos \varphi)^2 + (\cos \theta \sin \varphi)^2 + (\sin \theta)^2 \\ &= 1, \\ g'_{\theta\theta} &= \frac{\partial x}{\partial \theta} \frac{\partial x}{\partial \theta} + \frac{\partial y}{\partial \theta} \frac{\partial y}{\partial \theta} + \frac{\partial z}{\partial \theta} \frac{\partial z}{\partial \theta} \\ &= (-r \sin \theta \cos \varphi)^2 + (-r \sin \theta \sin \varphi)^2 + (r \cos \theta)^2 \\ &= r^2, \\ g'_{\varphi\varphi} &= \frac{\partial x}{\partial \varphi} \frac{\partial x}{\partial \varphi} + \frac{\partial y}{\partial \varphi} \frac{\partial y}{\partial \varphi} + \frac{\partial z}{\partial \varphi} \frac{\partial z}{\partial \varphi}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= (-r \cos \theta \sin \varphi)^2 + (r \cos \theta \cos \varphi)^2 + (0)^2 \\
&= r^2 \sin^2 \theta , \\
g'_{r\theta} &= \frac{\partial x}{\partial r} \frac{\partial x}{\partial \theta} + \frac{\partial y}{\partial r} \frac{\partial y}{\partial \theta} + \frac{\partial z}{\partial r} \frac{\partial z}{\partial \theta} \\
&= (\cos \theta \cos \varphi)(-r \sin \theta \cos \varphi) + (\cos \theta \sin \varphi)(-r \sin \theta \sin \varphi) + (\sin \theta)(r \cos \theta) \\
&= 0 , \\
g'_{r\varphi} &= \frac{\partial x}{\partial r} \frac{\partial x}{\partial \varphi} + \frac{\partial y}{\partial r} \frac{\partial y}{\partial \varphi} + \frac{\partial z}{\partial r} \frac{\partial z}{\partial \varphi} \\
&= (\cos \theta \cos \varphi)(-r \cos \theta \sin \varphi) + (\cos \theta \sin \varphi)(r \cos \theta \cos \varphi) + (\sin \theta)(0) \\
&= 0 , \\
g'_{\theta\varphi} &= \frac{\partial x}{\partial \theta} \frac{\partial x}{\partial \varphi} + \frac{\partial y}{\partial \theta} \frac{\partial y}{\partial \varphi} + \frac{\partial z}{\partial \theta} \frac{\partial z}{\partial \varphi} \\
&= (-r \sin \theta \cos \varphi)(-r \cos \theta \sin \varphi) + (-r \sin \theta \sin \varphi)(r \cos \theta \cos \varphi) + (r \cos \theta)(0) \\
&= 0 .
\end{aligned}$$

因此求得 $g'_{rr} = 1$, $g'_{\theta\theta} = r^2$, $g'_{\varphi\varphi} = r^2 \sin^2 \theta$, 非对角元都为零.

(b) 令 $r \equiv (x^2 + y^2)^{1/2}$, $\Phi \equiv \varphi - \omega t$. 因 $\cos \varphi = \frac{y}{r}$, we have $-\sin \varphi \frac{\partial \varphi}{\partial x} = -\frac{xy}{r^3} \Rightarrow \frac{x}{r} \frac{\partial \varphi}{\partial x} = \frac{xy}{r^3} \Rightarrow \frac{\partial \varphi}{\partial x} = \frac{y}{r^2}$. 类似可得 $\frac{\partial \varphi}{\partial y} = -\frac{x}{r^2}$. 于是有

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \cos \Phi}{\partial x} &= -\sin \Phi \frac{\partial \varphi}{\partial x} = -\frac{y}{r^2} \sin \Phi , \\
\frac{\partial \cos \Phi}{\partial y} &= -\sin \Phi \frac{\partial \varphi}{\partial y} = \frac{x}{r^2} \sin \Phi , \\
\frac{\partial \sin \Phi}{\partial x} &= \cos \Phi \frac{\partial \varphi}{\partial x} = \frac{y}{r^2} \cos \Phi , \\
\frac{\partial \sin \Phi}{\partial y} &= \cos \Phi \frac{\partial \varphi}{\partial y} = -\frac{x}{r^2} \cos \Phi .
\end{aligned}$$

下面需要用到

$$\begin{aligned}
\frac{\partial t'}{\partial t} &= 1 , \\
\frac{\partial t'}{\partial x} &= \frac{\partial t'}{\partial y} = \frac{\partial t'}{\partial z} = 0 ; \\
\frac{\partial x'}{\partial t} &= (-r \sin \Phi)(-\omega) = r\omega \sin \Phi , \\
\frac{\partial x'}{\partial x} &= \frac{x}{r} \cos \Phi + r \frac{\partial \cos \Phi}{\partial x} = \frac{x}{r} \cos \Phi + r \left(-\frac{y}{r^2} \sin \Phi \right) \\
&= \sin \varphi \cos \Phi - \cos \varphi \sin \Phi = \sin(\varphi - \Phi) = \sin \omega t , \\
\frac{\partial x'}{\partial y} &= \frac{y}{r} \cos \Phi + r \frac{\partial \cos \Phi}{\partial y} = \frac{y}{r} \cos \Phi + r \left(\frac{x}{r^2} \sin \Phi \right) \\
&= \cos \varphi \cos \Phi + \sin \varphi \sin \Phi = \cos(\varphi - \Phi) = \cos \omega t , \\
\frac{\partial x'}{\partial z} &= 0 ; \\
\frac{\partial y'}{\partial t} &= (r \cos \Phi)(-\omega) = -r\omega \cos \Phi ,
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\frac{\partial y'}{\partial x} &= \frac{x}{r} \sin \Phi + r \frac{\partial \sin \Phi}{\partial x} = \frac{x}{r} \sin \Phi + r \left(\frac{y}{r^2} \cos \Phi \right) \\
&= \sin \varphi \sin \Phi + \cos \varphi \cos \Phi = \cos(\varphi - \Phi) = \cos \omega t, \\
\frac{\partial y'}{\partial y} &= \frac{y}{r} \sin \Phi + r \frac{\partial \sin \Phi}{\partial y} = \frac{y}{r} \sin \Phi + r \left(-\frac{x}{r^2} \cos \Phi \right) \\
&= \cos \varphi \sin \Phi - \sin \varphi \cos \Phi = -\sin(\varphi - \Phi) = -\sin \omega t, \\
\frac{\partial y'}{\partial z} &= 0; \\
\frac{\partial z'}{\partial t} &= \frac{\partial z'}{\partial x} = \frac{\partial z'}{\partial y} = 0, \\
\frac{\partial z'}{\partial z} &= 1.
\end{aligned}$$

由张量变换律, 定理 2-4-2, $g'^{\mu\nu} = \frac{\partial x'^{\mu}}{\partial x^{\alpha}} \frac{\partial x'^{\nu}}{\partial x^{\beta}} g^{\alpha\beta}$ 得

$$\begin{aligned}
g'^{tt} &= -\frac{\partial t'}{\partial t} \frac{\partial t'}{\partial t} + \frac{\partial t'}{\partial x} \frac{\partial t'}{\partial x} + \frac{\partial t'}{\partial y} \frac{\partial t'}{\partial y} + \frac{\partial t'}{\partial z} \frac{\partial t'}{\partial z} \\
&= -(1)^2 + (0)^2 + (0)^2 + (0)^2 = -1, \\
g'^{xx} &= -\frac{\partial x'}{\partial t} \frac{\partial x'}{\partial t} + \frac{\partial x'}{\partial x} \frac{\partial x'}{\partial x} + \frac{\partial x'}{\partial y} \frac{\partial x'}{\partial y} + \frac{\partial x'}{\partial z} \frac{\partial x'}{\partial z} \\
&= -(r\omega \sin \Phi)^2 + (\sin \omega t)^2 + (\cos \omega t)^2 + (0)^2 \\
&= 1 - r^2 \omega^2 \sin^2 \Phi = 1 - (x^2 + y^2) \omega^2 \sin^2(\varphi - \omega t), \\
g'^{yy} &= -\frac{\partial y'}{\partial t} \frac{\partial y'}{\partial t} + \frac{\partial y'}{\partial x} \frac{\partial y'}{\partial x} + \frac{\partial y'}{\partial y} \frac{\partial y'}{\partial y} + \frac{\partial y'}{\partial z} \frac{\partial y'}{\partial z} \\
&= -(-r\omega \cos \Phi)^2 + (\cos \omega t)^2 + (-\sin \omega t)^2 + (0)^2 \\
&= 1 - r^2 \omega^2 \cos^2 \Phi = 1 - (x^2 + y^2) \omega^2 \cos^2(\varphi - \omega t), \\
g'^{zz} &= -\frac{\partial z'}{\partial t} \frac{\partial z'}{\partial t} + \frac{\partial z'}{\partial x} \frac{\partial z'}{\partial x} + \frac{\partial z'}{\partial y} \frac{\partial z'}{\partial y} + \frac{\partial z'}{\partial z} \frac{\partial z'}{\partial z} \\
&= -(0)^2 + (0)^2 + (0)^2 + (1)^2 = 1; \\
g'^{tx} &= -\frac{\partial t'}{\partial t} \frac{\partial x'}{\partial t} + \frac{\partial t'}{\partial x} \frac{\partial x'}{\partial x} + \frac{\partial t'}{\partial y} \frac{\partial x'}{\partial y} + \frac{\partial t'}{\partial z} \frac{\partial x'}{\partial z} \\
&= -(1)(r\omega \sin \Phi) + (0)(\sin \omega t) + (0)(\cos \omega t) + (0)(0) \\
&= -r\omega \sin \Phi = -(x^2 + y^2)^{1/2} \omega \sin(\varphi - \omega t), \\
g'^{ty} &= -\frac{\partial t'}{\partial t} \frac{\partial y'}{\partial t} + \frac{\partial t'}{\partial x} \frac{\partial y'}{\partial x} + \frac{\partial t'}{\partial y} \frac{\partial y'}{\partial y} + \frac{\partial t'}{\partial z} \frac{\partial y'}{\partial z} \\
&= -(1)(-r\omega \cos \Phi) + (0)(\cos \omega t) + (0)(-\sin \omega t) + (0)(0) \\
&= r\omega \cos \Phi = (x^2 + y^2)^{1/2} \omega \cos(\varphi - \omega t), \\
g'^{tz} &= -\frac{\partial t'}{\partial t} \frac{\partial z'}{\partial t} + \frac{\partial t'}{\partial x} \frac{\partial z'}{\partial x} + \frac{\partial t'}{\partial y} \frac{\partial z'}{\partial y} + \frac{\partial t'}{\partial z} \frac{\partial z'}{\partial z} \\
&= -(1)(0) + (0)(0) + (0)(0) + (0)(1) \\
&= 0; \\
g'^{xy} &= -\frac{\partial x'}{\partial t} \frac{\partial y'}{\partial t} + \frac{\partial x'}{\partial x} \frac{\partial y'}{\partial x} + \frac{\partial x'}{\partial y} \frac{\partial y'}{\partial y} + \frac{\partial x'}{\partial z} \frac{\partial y'}{\partial z} \\
&= -(r\omega \sin \Phi)(-r\omega \cos \Phi) + (\sin \omega t)(\cos \omega t) + (\cos \omega t)(-\sin \omega t) + (0)(0)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= r^2 \omega^2 \sin \Phi \cos \Phi = (x^2 + y^2) \omega^2 \sin(\varphi - \omega t) \cos(\varphi - \omega t), \\
g'^{xz} &= -\frac{\partial x'}{\partial t} \frac{\partial z'}{\partial t} + \frac{\partial x'}{\partial x} \frac{\partial z'}{\partial x} + \frac{\partial x'}{\partial y} \frac{\partial z'}{\partial y} + \frac{\partial x'}{\partial z} \frac{\partial z'}{\partial z} \\
&= -(r\omega \sin \Phi)(0) + (\sin \omega t)(0) + (\cos \omega t)(0) + (0)(1) \\
&= 0; \\
g'^{yz} &= -\frac{\partial y'}{\partial t} \frac{\partial z'}{\partial t} + \frac{\partial y'}{\partial x} \frac{\partial z'}{\partial x} + \frac{\partial y'}{\partial y} \frac{\partial z'}{\partial y} + \frac{\partial y'}{\partial z} \frac{\partial z'}{\partial z} \\
&= -(-r\omega \cos \Phi)(0) + (\cos \omega t)(0) + (-\sin \omega t)(0) + (0)(1) \\
&= 0.
\end{aligned}$$

因此我们求得分量矩阵

$$g'^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} -1 & -r\omega \sin \Phi & r\omega \cos \Phi & 0 \\ -r\omega \sin \Phi & 1 - r^2 \omega^2 \sin^2 \Phi & r^2 \omega^2 \sin \Phi \cos \Phi & 0 \\ r\omega \cos \Phi & r^2 \omega^2 \sin \Phi \cos \Phi & 1 - r^2 \omega^2 \cos^2 \Phi & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

因为 $g'_{\mu\nu} g'^{\nu\rho} = \delta_{\mu}^{\rho}$, 所以 $g'_{\mu\nu}$ 的分量矩阵是以上矩阵的逆矩阵:

$$g'_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} -1 + r^2 \omega^2 & -r\omega \sin \Phi & r\omega \cos \Phi & 0 \\ -r\omega \sin \Phi & 1 & 0 & 0 \\ r\omega \cos \Phi & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

其中 $r = (x^2 + y^2)^{1/2}$, $\Phi = \varphi - \omega t$.

~20. 试证 3 维欧氏空间中球坐标基矢 $\partial/\partial r$, $\partial/\partial \theta$, $\partial/\partial \varphi$ 的长度依次为 1 , r , $r \sin \theta$.

证 上题 (a) 中我们已经求得球坐标的 $g_{rr} = 1$, $g_{\theta\theta} = r^2$, $g_{\varphi\varphi} = r^2 \sin^2 \theta$, 因此球坐标基矢的长度依次为 1 , r , $r \sin \theta$.

~21. 用抽象指标记号证明 $T'^{\mu}_{\nu} = \frac{\partial x'^{\mu}}{\partial x^{\rho}} \frac{\partial x^{\sigma}}{\partial x'^{\nu}} T^{\rho}_{\sigma}$.

证 利用抽象指标记号, 张量式为 $T^a_b = T^{\mu}_{\nu} (e_{\mu})^a (e^{\nu})_b$ [见 (2-6-1) 式], 分量式为 $T^{\mu}_{\nu} = T^a_b (e^{\mu})_a (e_{\nu})^b$ [见 (2-6-2) 式], 于是

$$\begin{aligned}
T'^{\mu}_{\nu} &= T^a_b (e'^{\mu})_a (e'_{\nu})^b = T^{\rho}_{\sigma} (e_{\rho})^a (e^{\sigma})_b (e'^{\mu})_a (e'_{\nu})^b \\
&= T^{\rho}_{\sigma} (e_{\rho})^a (e'^{\mu})_a (e^{\sigma})_b (e'_{\nu})^b.
\end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}
(e_{\rho})^a (e'^{\mu})_a &= \left(\frac{\partial}{\partial x^{\rho}} \right)^a (dx'^{\mu})_a = \frac{\partial x'^{\mu}}{\partial x^{\rho}}, \\
(e^{\sigma})_b (e'_{\nu})^b &= (dx^{\sigma})_b \left(\frac{\partial}{\partial x'^{\nu}} \right)^b = \frac{\partial x^{\sigma}}{\partial x'^{\nu}}.
\end{aligned}$$

因此得

$$T'^{\mu}_{\nu} = \frac{\partial x'^{\mu}}{\partial x^{\rho}} \frac{\partial x^{\sigma}}{\partial x'^{\nu}} T^{\rho}_{\sigma}.$$

22. 以 g 和 g' 分别代表度规 g_{ab} 在坐标系 $\{x^\mu\}$ 和 $\{x'^\mu\}$ 的分量 $g_{\mu\nu}$ 和 $g'_{\mu\nu}$ 组成的两个 $n \times n$ 矩阵行列式, 试证 $g' = |\partial x^\rho / \partial x'^\sigma|^2 g$, 其中 $|\partial x^\rho / \partial x'^\sigma|$ 是坐标变换 $\{x^\mu\} \mapsto \{x'^\mu\}$ 的雅可比行列式, 即由 $\partial x^\rho / \partial x'^\sigma$ 组成的 $n \times n$ 行列式. 注: 本题表明度规的行列式在坐标变换下不是不变量. 提示: 取等式 $g'_{\rho\sigma} = (\partial x^\mu / \partial x'^\rho)(\partial x^\nu / \partial x'^\sigma)g_{\mu\nu}$ 的行列式.

证 将 $(0, 2)$ 型张量的分量 $g_{\mu\nu}$ 和 $g'_{\mu\nu}$ 看成矩阵元, 其中 μ 和 ν 分别是行和列指标. 同样, 将 $(1, 1)$ 型张量的分量 $A_{\rho\sigma} \equiv \partial x^\rho / \partial x'^\sigma$ 也看成矩阵元, 其中 ρ 和 σ 分别是行和列指标. 于是, 变换关系 $g'_{\rho\sigma} = (\partial x^\mu / \partial x'^\rho)(\partial x^\nu / \partial x'^\sigma)g_{\mu\nu}$ 可以写成 $g'_{\rho\sigma} = A_{\mu\rho}A_{\nu\sigma}g_{\mu\nu} = \tilde{A}_{\rho\mu}g_{\mu\nu}A_{\nu\sigma} = (\tilde{A}gA)_{\rho\sigma}$, 其中 \tilde{A} 是 A 的转置矩阵, 相应的矩阵等式为 $g' = \tilde{A}gA$. 两边取行列式则有 $\det g' = \det \tilde{A} \det g \det A = (\det A)^2 \det g = |\partial x^\rho / \partial x'^\sigma|^2 \det g$, 这正是要证的关系. 以直角坐标到球坐标为例, 在前两题中我们已经知道行列式 $|\partial x^\rho / \partial x'^\sigma| = r^2 \sin \theta$, 故 $\det g_{\text{球坐标}} = r^4 \sin^2 \theta \det g_{\text{直角坐标}} = r^4 \sin^2 \theta$, 因为 $\det g_{\text{直角坐标}} = 1$.

- ~23. 设 $\{x^\mu\}$ 是流形上的任一局域坐标系, 试判断下列等式的是非:

- (1) $(\partial / \partial x^\mu)^a (\partial / \partial x^\nu)_a = g_{\mu\nu}$, 其中 $(\partial / \partial x^\nu)_a \equiv g_{ab}(\partial / \partial x^\nu)^b$;
- (2) $(dx^\mu)^a (dx^\nu)_a = g^{\mu\nu}$, 其中 $(dx^\mu)^a \equiv g^{ab}(dx^\mu)_b$;
- (3) $(\partial / \partial x^\mu)_a = (dx^\mu)_a$;
- (4) $(dx^\mu)^a = (\partial / \partial x^\mu)^a$;
- (5) $v^\mu \omega_\mu = v_\mu \omega^\mu$;
- (6) $g_{\mu\nu} T^{\nu\rho} S_\rho{}^\sigma = T_{\mu\rho} S^{\rho\sigma}$;
- (7) $v^a u^b = v^b u^a$;
- (8) $v^a u^b = u^b v^a$.

答 (1) 是; (2) 是; (3) 非; (4) 非; (5) 是; (6) 是; (7) 非; (8) 是.

如其中 (6) 式: $g_{\mu\nu} T^{\nu\rho} S_\rho{}^\sigma = T_\mu{}^\rho S_\rho{}^\sigma = T_{\mu\tau} g^{\rho\tau} S_\rho{}^\sigma = T_{\mu\tau} S^{\tau\sigma} = T_{\mu\rho} S^{\rho\sigma}$.

24. 设 T_{ab} 是矢量空间 V 上的 $(0, 2)$ 型张量, 试证 $T_{ab}v^a v^b = 0, \forall v^a \in V \Rightarrow T_{ab} = T_{[ab]}$. 提示: 把 v^a 表为任意两个矢量 u^a 和 w^a 之和 【有什么用?】.

证 我们证与其等价的分量式的命题: 如果 $T_{\mu\nu}v^\mu v^\nu = 0 \quad \forall v^\mu$, 则 $T_{\mu\nu} = T_{[\mu\nu]}$, 这里 $\mu, \nu = 1, \dots, n$. 首先, 取 $v^\mu = (v, 0, \dots, 0)$, 即 $v^1 = v \in \mathbb{R}$, 其他 $\mu \neq 1$ 的分量都为零. 等式变为 $T_{11}v^2 = 0 \Rightarrow T_{11} = 0$. 同样可以知道所有对角元素 $T_{\mu\mu} = 0$. 下面取 $v^\mu = (v, v, 0, \dots, 0)$, 即 $v^1 = v^2 = v$, 其他 $\mu \neq 1$ 和 2 的分量都为零. 这时等式变为 $(T_{11} + T_{22} + T_{12} + T_{21})v^2 = 0$. 已知 $T_{11} = T_{22} = 0$, 所以必有 $T_{12} + T_{21} = 0$. 类似可证当 $\mu \neq \nu$ 时, $T_{\mu\nu} + T_{\nu\mu} = 0$, 因此有 $T_{\mu\nu} = -T_{\nu\mu} = T_{[\mu\nu]}$, 命题得证.

25. 试证 $T_{abcd} = T_{a[bc]d} = T_{ab[cd]} \Rightarrow T_{abcd} = T_{a[bcd]}$.

注 (1) 推广至一般的结论是

$$T_{\dots a \dots b \dots c \dots} = T_{\dots [a \dots b] \dots c \dots} = T_{\dots a \dots [b \dots c] \dots} \Rightarrow T_{\dots a \dots b \dots c \dots} = T_{\dots [a \dots b \dots c] \dots}.$$

上式的前提中只有两个等号, 关键是 $T_{\dots [a \dots b] \dots c \dots}$ 和 $T_{\dots a \dots [b \dots c] \dots}$ 中的指标 b 都在方括号内.

(2) 把前提和结论中的方括号改为圆括号, 则推广前后的命题仍成立.

证 如果 $T_{abcd} = T_{a[bc]d} = \frac{1}{2}(T_{abcd} - T_{acbd})$ 和 $T_{abcd} = T_{ab[cd]} = \frac{1}{2}(T_{abcd} - T_{abdc})$, 则有 $T_{acbd} = -T_{abcd}$ 和 $T_{abdc} = -T_{abcd}$, 即交换中间两个指标和交换最后两个指标都会附加一负号. 于是

$$\begin{aligned} T_{a[bcd]} &= \frac{1}{6}(T_{abcd} - T_{abdc} + T_{acdb} - T_{acbd} + T_{adb c} - T_{adcb}) \\ &= \frac{1}{6}T_{abcd}[1 - (-1) + (-1)^2 - (-1) + (-1)^2 - (-1)^3] \\ &= T_{abcd}. \end{aligned}$$

这一结论很容易推广, 因为 $[a \dots b]$ 和 $[b \dots c]$ 内的反称化会导致 $[a \dots b \dots c]$ 内的反称化.

第 3 章 “黎曼 (内禀) 曲率张量” 习题

~1. 放弃 ∇_a 定义中的无挠性条件 (e),

(1) 试证存在张量 T^c_{ab} (叫 **挠率张量**) 使

$$\nabla_a \nabla_b f - \nabla_b \nabla_a f = -T^c_{ab} \nabla_c f, \quad \forall f \in \mathcal{F}.$$

提示: 令 $\tilde{\nabla}_a$ 为无挠算符, 模仿定理 3-1-4 证明中的推导.

(2) 试证 $T^c_{ab} u^a v^b = u^a \nabla_a v^c - v^a \nabla_a u^c - [u, v]^c \quad \forall u^a, v^a \in \mathcal{F}(1, 0)$.

证 (1) 因 (3-1-2), 可以令 $\omega_b = \nabla_b f = \tilde{\nabla}_b f$, 其中 $\tilde{\nabla}_b$ 为无挠导数算符. 根据定理 3-1-3 式 (3-1-6): $\nabla_a \omega_b = \tilde{\nabla}_a \omega_b - C^c_{ab} \omega_c$, 有 $\nabla_a \nabla_b f = \tilde{\nabla}_a \tilde{\nabla}_b f - C^c_{ab} \nabla_c f$. 交换指标得 $\nabla_b \nabla_a f = \tilde{\nabla}_b \tilde{\nabla}_a f - C^c_{ba} \nabla_c f$. 两式相减并利用 $\tilde{\nabla}_a$ 的无挠性, 有 $\nabla_a \nabla_b f - \nabla_b \nabla_a f = -(C^c_{ab} - C^c_{ba}) \nabla_c f = -T^c_{ab} \nabla_c f$, 其中已令 $C^c_{ab} - C^c_{ba} \equiv T^c_{ab}$ 为挠率张量.

(2) 将对易子作用于标量场 $f \in \mathcal{F}_M(0, 0)$

$$[u, v](f) \stackrel{(2-2-9)}{=} u(v(f)) - v(u(f)) \stackrel{\text{定义}^{1(d)}}{=} u^a \nabla_a (v^b \nabla_b f) - v^a \nabla_a (u^b \nabla_b f)$$

$$\begin{aligned}
&= u^a(\nabla_a v^b)(\nabla_b f) + u^a v^b(\nabla_a \nabla_b f) - v^a(\nabla_a u^b)(\nabla_b f) - v^a u^b(\nabla_a \nabla_b f) \\
&= [u^a(\nabla_a v^b) - v^a(\nabla_a u^b)](\nabla_b f) + u^a v^b[\nabla_a \nabla_b f - \nabla_b \nabla_a f] \\
&= [u^a \nabla_a v^c - v^a \nabla_a u^c](\nabla_c f) + u^a v^b[-T^c_{ab} \nabla_c f] \\
&= (u^a \nabla_a v^c - v^a \nabla_a u^c - T^c_{ab} u^a v^b) \nabla_c f.
\end{aligned}$$

另一方面, $[u, v] \in \mathcal{F}_M(1, 0)$ 本身是矢量场, 作用于 f 根据定义 1(d) 有 $[u, v](f) = [u, v]^c \nabla_c f$, 因此得

$$u^a \nabla_a v^c - v^a \nabla_a u^c - T^c_{ab} u^a v^b = [u, v]^c$$

2. 设 v^a 为矢量场, v^ν 和 v'^ν 为 v^a 在坐标系 $\{x^\nu\}$ 和 $\{x'^\nu\}$ 的分量, $A^\nu_\mu \equiv \partial v^\nu / \partial x^\mu$, $A'^\nu_\mu \equiv \partial v'^\nu / \partial x'^\mu$, 试证 A^ν_μ 和 A'^ν_μ 的关系一般而言不满足张量分量变换律. 提示: 利用 v^ν 与 v'^ν 之间的变换规律.

证 矢量场 v^a 和 (1,1) 型张量场 T^a_b 在坐标系变换下满足的变换关系分别为:

$$\begin{aligned}
v'^\mu &= v^a (e'^\mu)_a = v^\rho (e_\rho)^a (e'^\mu)_a = v^\rho (\partial / \partial x^\rho)^a (dx'^\mu)_a \\
&= v^\rho \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\rho}, \\
T'^\mu_\nu &= T^a_b (e'^\mu)_a (e'_\nu)^b = T^\rho_\sigma (e_\rho)^a (e'_\nu)^b (e'^\mu)_a (e'_\nu)^b \\
&= T^\rho_\sigma (\partial / \partial x^\rho)^a (dx'^\mu)_a (dx^\sigma)_b (\partial / \partial x'^\nu)^b \\
&= T^\rho_\sigma \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\rho} \frac{\partial x^\sigma}{\partial x'^\nu},
\end{aligned}$$

即定理 2-4-2 的变换律. 现在根据定义

$$\begin{aligned}
A'^\mu_\nu &= \frac{\partial}{\partial x'^\nu} v'^\mu = \frac{\partial x^\sigma}{\partial x'^\nu} \frac{\partial}{\partial x^\sigma} \left(v^\rho \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\rho} \right) \\
&= \frac{\partial x^\sigma}{\partial x'^\nu} \left[\frac{\partial v^\rho}{\partial x^\sigma} \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\rho} + v^\rho \left(\frac{\partial^2 x'^\mu}{\partial x^\sigma \partial x^\rho} \right) \right] \\
&= A^\rho_\sigma \frac{\partial x^\sigma}{\partial x'^\nu} \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\rho} + v^\rho \frac{\partial x^\sigma}{\partial x'^\nu} \frac{\partial^2 x'^\mu}{\partial x^\sigma \partial x^\rho},
\end{aligned}$$

与张量的变换式比较, 显然右边第二项破坏了张量变换律. [但如果变换是线性的 (如洛伦兹变换), 那么第二项仍为零!]

3. 试证定理 3-1-7.

证 由定理 3-1-5 式 (3-1-7) 和定义 2: $\nabla_a v^b = \partial_a v^b + \Gamma^b_{ac} v^c$, 而

$$\begin{aligned}
v^\nu_{;\mu} &= \nabla_a v^b (e^\nu)_b (e_\mu)^a = (\partial_a v^b + \Gamma^b_{ac} v^c) (e^\nu)_b (e_\mu)^a \\
&= \partial_a v^b (e^\nu)_b (e_\mu)^a + \Gamma^b_{ac} v^c (e^\nu)_b (e_\mu)^a \\
&= \frac{\partial v^\nu}{\partial x^\mu} + \Gamma^\nu_{\mu\sigma} v^\sigma = v^\nu_{,\mu} + \Gamma^\nu_{\mu\sigma} v^\sigma.
\end{aligned}$$

由定理 3-1-3 式 (3-1-6) 和定义 2: $\nabla_a \omega_b = \partial_a \omega_b - \Gamma^c_{ab} \omega_c$, 而

$$\begin{aligned}\omega_{\nu;\mu} &= \nabla_a \omega_b (e_\nu)^b (e_\mu)^a = (\partial_a \omega_b - \Gamma^c_{ab} \omega_c) (e_\nu)^b (e_\mu)^a \\ &= \partial_a \omega_b (e_\nu)^b (e_\mu)^a - \Gamma^c_{ab} \omega_c (e_\nu)^b (e_\mu)^a \\ &= \frac{\partial \omega_\nu}{\partial x^\mu} - \Gamma^\sigma_{\mu\nu} \omega_\sigma = \omega_{\nu,\mu} - \Gamma^\sigma_{\mu\nu} \omega_\sigma.\end{aligned}$$

即为定理 3-1-7 的 (3-1-11) 中的两式.

4. 用下式定义 $\Gamma^\sigma_{\mu\nu}$: $(\frac{\partial}{\partial x^\nu})^b \nabla_b (\frac{\partial}{\partial x^\mu})^a = \Gamma^\sigma_{\mu\nu} (\frac{\partial}{\partial x^\sigma})^a$, 试证

(a) $\Gamma^\sigma_{\mu\nu} = \Gamma^\sigma_{\nu\mu}$ (提示: 利用 ∇_a 的无挠性和坐标基矢间的对易性.);

(b) $v^\nu_{;\mu} = v^\nu_{,\mu} + \Gamma^\nu_{\mu\beta} v^\beta$ (注: 这其实是克氏符的等价定义.).

证 为简洁起见, 以下都用基矢符号表示坐标基底的基矢, 即矢量的基矢 $(\frac{\partial}{\partial x^\mu})^a \equiv (e_\mu)^a$, 对偶矢量的基矢 $(dx^\mu)_a \equiv (e^\mu)_a$. 于是定义式为:

$$(e_\nu)^b \nabla_b (e_\mu)^a = \Gamma^\sigma_{\mu\nu} (e_\sigma)^a.$$

(a) 根据定理 3-1-9 式 (3-1-13), 对于无挠微分算符 ∇_a 成立

$$[u, v]^a = u^b \nabla_b v^a - v^b \nabla_b u^a.$$

而对于坐标基底的基矢 $\{(e_\mu)^a\}$, 它们互相对易, 因此有

$$0 = [e_\mu, e_\nu]^a = (e_\mu)^b \nabla_b (e_\nu)^a - (e_\nu)^b \nabla_b (e_\mu)^a,$$

即 $(e_\mu)^b \nabla_b (e_\nu)^a = (e_\nu)^b \nabla_b (e_\mu)^a$. 以对偶基矢 $(e^\rho)_a$ 作用定义式:

$$(e^\rho)_a (e_\nu)^b \nabla_b (e_\mu)^a = \Gamma^\sigma_{\mu\nu} (e^\rho)_a (e_\sigma)^a = \Gamma^\sigma_{\mu\nu} \delta^\rho_\sigma = \Gamma^\rho_{\mu\nu}.$$

利用对易关系, 于是有

$$\Gamma^\rho_{\mu\nu} = (e^\rho)_a (e_\nu)^b \nabla_b (e_\mu)^a = (e^\rho)_a (e_\mu)^b \nabla_b (e_\nu)^a = \Gamma^\rho_{\nu\mu}$$

(b) 两边作用 $(e^\nu)_c$ 于定义式: $(e^\nu)_c (e_\nu)^b [\nabla_b (e_\mu)^a] = \delta^b_c [\nabla_b (e_\mu)^a] = \nabla_c (e_\mu)^a = (e^\nu)_c \Gamma^\sigma_{\mu\nu} (e_\sigma)^a$, 即为

$$\nabla_a (e_\mu)^b = \Gamma^\sigma_{\mu\nu} (e^\nu)_a (e_\sigma)^b$$

$$\begin{aligned}v^\nu_{;\mu} &= (e_\mu)^a (e^\nu)_b \nabla_a v^b = (e_\mu)^a (e^\nu)_b \nabla_a [v^\rho (e_\rho)^b] \\ &= (e_\mu)^a (e^\nu)_b \left\{ (\nabla_a v^\rho) (e_\rho)^b + v^\rho [\nabla_a (e_\rho)^b] \right\} \\ &\stackrel{(3-1-1)}{=} (e_\mu)^a (e^\nu)_b \left\{ (dv^\rho)_a (e_\rho)^b + v^\rho [\Gamma^\sigma_{\rho\lambda} (e^\lambda)_a (e_\sigma)^b] \right\} \\ &= (e_\mu)^a (dv^\rho)_a (e^\nu)_b (e_\rho)^b + v^\rho \Gamma^\sigma_{\rho\lambda} (e_\mu)^a (e^\lambda)_a (e^\nu)_b (e_\sigma)^b \\ &= (e_\mu)^a (dv^\rho)_a \delta^\nu_\rho + v^\rho \Gamma^\sigma_{\rho\lambda} \delta^\lambda_\mu \delta^\nu_\sigma \\ &= (e_\mu)^a (dv^\nu)_a + v^\rho \Gamma^\nu_{\rho\mu}\end{aligned}$$

其中 $(e_\mu)^a (dv^\nu)_a = dv^\nu(e_\mu) = dv^\nu(\frac{\partial}{\partial x^\mu}) = \frac{\partial v^\nu}{\partial x^\mu} = v^\nu_{;\mu}$. 再利用 (a) 的结果得

$$v^\nu_{;\mu} = v^\nu_{,\mu} + \Gamma^\nu_{\mu\rho} v^\rho.$$

~5. 判断是非:

(1) $\nabla_a(dx^\mu)_b = 0$;

(2) $v^\nu_{;\mu} = (\nabla_a v^b)(\partial/\partial x^\mu)^a (dx^\nu)_b$;

(3) $v^\nu_{;\mu} = (\partial_a v^b)(\partial/\partial x^\mu)^a (dx^\nu)_b$;

(4) $v^\nu_{;\mu} = (\partial/\partial x^\mu)^a \nabla_a v^\nu$;

(5) $v^\nu_{;\mu} = (\partial/\partial x^\mu)^a \nabla_a v^\nu$.

答 (1) 错. 见上题 (a) 中的结果, 对无挠导数算符有 $\nabla_a(dx^\mu)_b = \nabla_b(dx^\mu)_a$.

(2) 对. 为定义式.

(3) 对. 也为定义式.

(4) 错. 因为 $\nabla_a v^\nu = \nabla_a[v^b(dx^\nu)_b] = (\nabla_a v^b)(dx^\nu)_b + v^b[\nabla_a(dx^\nu)_b]$, 所以此式右边为 $(\partial/\partial x^\mu)^a (\nabla_a v^b)(dx^\nu)_b + (\partial/\partial x^\mu)^a v^b [\nabla_a(dx^\nu)_b] = v^\nu_{;\mu} + (\partial/\partial x^\mu)^a v^b [\nabla_a(dx^\nu)_b] \neq v^\nu_{;\mu}$. 另外从 (5) 的结果知右边其实是 $v^\nu_{;\mu}$, 它一般不等于 $v^\nu_{;\mu}$.

(5) 对. 因为如果把分量 v^μ 看成标量函数, 则由 (3-1-2) 式知 $\nabla_a v^\nu = \partial_a v^\nu = (dv^\nu)_a$. 于是 $(\partial/\partial x^\mu)^a \nabla_a v^\nu = (\partial/\partial x^\mu)^a \partial_a v^\nu = (\partial/\partial x^\mu)^a (dv^\nu)_a = (dv^\nu)(\partial/\partial x^\mu)^a \stackrel{(2-3-7)}{=} \partial v^\nu / \partial x^\mu = v^\nu_{;\mu}$. 也可以这样看: 因 $\nabla_a v^\nu = \partial_a v^\nu = \partial_a[v^b(dx^\nu)_b] = (\partial_a v^b)(dx^\nu)_b + v^b[\partial_a(dx^\nu)_b] \stackrel{(3-1-10)}{=} (\partial_a v^b)(dx^\nu)_b$, 于是右边 $(\partial/\partial x^\mu)^a \nabla_a v^\nu = (\partial/\partial x^\mu)^a (\partial_a v^b)(dx^\nu)_b$, 根据定义它就是 $v^\nu_{;\mu}$ [见 (3)].

~6. 设 $C(t)$ 是 $\{x^\mu\}$ 的坐标域内的曲线, $x^\mu(t)$ 是 $C(t)$ 在该系的参数表达式, v^a 是 $C(t)$ 上的矢量场, 令 $Dv^\mu/dt \equiv (dx^\mu)_a (\partial/\partial t)^b \nabla_b v^a$, 试证

$$Dv^\mu/dt \equiv dv^\mu/dt + \Gamma^\mu_{\nu\sigma} v^\sigma dx^\nu(t)/dt.$$

证 由定义

$$\begin{aligned} \frac{Dv^\mu}{dt} &= (dx^\mu)_a \frac{Dv^a}{dt} \stackrel{(3-2-13)}{=} (dx^\mu)_a T^b \nabla_b v^a = (dx^\mu)_a \left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^b \nabla_b v^a \\ &\stackrel{(3-1-7)}{=} (dx^\mu)_a \left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^b (\partial_b v^a + \Gamma^a_{bc} v^c) \\ &\stackrel{(3-1-10)}{=} \left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^b \left(\partial_b [(dx^\mu)_a v^a] + (dx^\mu)_a \Gamma^a_{bc} v^c \right) \\ &= \left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^b \left(\partial_b [v^\mu] + \Gamma^\mu_{b\sigma} v^\sigma \right) \\ &= \left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^\nu \left(\partial_\nu v^\mu + \Gamma^\mu_{\nu\sigma} v^\sigma \right), \end{aligned}$$

其中 $(\frac{\partial}{\partial t})^\nu$ 为曲线的切矢 $(\frac{\partial}{\partial t})^b$ 的坐标分量 $(\frac{\partial}{\partial t})^\nu \stackrel{(2-2-7)}{=} \frac{dx^\nu(t)}{dt}$, 或者 $(\frac{\partial}{\partial t})^\nu = (\frac{\partial}{\partial t})^a (dx^\nu)_a = dx^\nu (\frac{\partial}{\partial t}) \stackrel{(2-3-7)}{=} \frac{\partial x^\nu}{\partial t}$. 于是

$$\begin{aligned} \frac{Dv^\mu}{dt} &= \frac{dx^\nu(t)}{dt} \left(\frac{\partial v^\mu}{\partial x^\nu} + \Gamma^\mu_{\nu\sigma} v^\sigma \right) \\ &= \frac{dv^\mu}{dt} + \Gamma^\mu_{\nu\sigma} v^\sigma \frac{dx^\nu(t)}{dt}. \end{aligned}$$

~7. 求出 3 维欧氏空间中球坐标系的全部非零 $\Gamma^\sigma_{\mu\nu}$.

证 根据 (3-2-10') 式 $\Gamma^\sigma_{\mu\nu} = \frac{1}{2}g^{\sigma\rho}(g_{\rho\mu,\nu} + g_{\rho\nu,\mu} - g_{\mu\nu,\rho})$. 对于求坐标, 只有 [见前一章习题 19(a)]

$$g_{rr} = 1, \quad g_{\theta\theta} = r^2, \quad g_{\varphi\varphi} = r^2 \sin^2 \theta.$$

所以有

$$g^{rr} = 1, \quad g^{\theta\theta} = r^{-2}, \quad g^{\varphi\varphi} = r^{-2} \sin^{-2} \theta.$$

求导后得

$$\begin{aligned} g_{rr,r} &= g_{rr,\theta} = g_{rr,\varphi} = 0; \\ g_{\theta\theta,r} &= 2r, \quad g_{\theta\theta,\theta} = g_{\theta\theta,\varphi} = 0; \\ g_{\varphi\varphi,r} &= 2r \sin^2 \theta, \quad g_{\varphi\varphi,\theta} = r^2 \sin 2\theta, \quad g_{\varphi\varphi,\varphi} = 0. \end{aligned}$$

代入公式得到

$$\begin{aligned} \Gamma^\sigma_{rr} &= \frac{1}{2}g^{\sigma\rho}(g_{\rho r,r} + g_{\rho r,r} - g_{rr,\rho}) = \frac{1}{2}g^{\sigma r}(g_{rr,r} + g_{rr,r} - g_{rr,r}) \\ &= 0, \\ \Gamma^\sigma_{r\theta} &= \frac{1}{2}g^{\sigma\rho}(g_{\rho r,\theta} + g_{\rho\theta,r} - g_{r\theta,\rho}) = \frac{1}{2}g^{\sigma\theta}g_{\theta\theta,r} = \frac{1}{2}(\delta^{\sigma\theta}r^{-2})(2r) \\ &= \delta^{\sigma\theta}r^{-1}, \\ \Gamma^\sigma_{r\varphi} &= \frac{1}{2}g^{\sigma\rho}(g_{\rho r,\varphi} + g_{\rho\varphi,r} - g_{r\varphi,\rho}) = \frac{1}{2}g^{\sigma\varphi}g_{\varphi\varphi,r} = \frac{1}{2}(\delta^{\sigma\varphi}r^{-2}\sin^{-2}\theta)(2r\sin^2\theta) \\ &= \delta^{\sigma\varphi}r^{-1}; \\ \Gamma^\sigma_{\theta\theta} &= \frac{1}{2}g^{\sigma\rho}(g_{\rho\theta,\theta} + g_{\rho\theta,\theta} - g_{\theta\theta,\rho}) = -\frac{1}{2}g^{\sigma r}g_{\theta\theta,r} = -\frac{1}{2}(\delta^{\sigma r})(2r) \\ &= -\delta^{\sigma r}r, \\ \Gamma^\sigma_{\theta\varphi} &= \frac{1}{2}g^{\sigma\rho}(g_{\rho\theta,\varphi} + g_{\rho\varphi,\theta} - g_{\theta\varphi,\rho}) = \frac{1}{2}g^{\sigma\varphi}g_{\varphi\varphi,\theta} = \frac{1}{2}(\delta^{\sigma\varphi}r^{-2}\sin^{-2}\theta)(r^2\sin 2\theta) \\ &= \delta^{\sigma\varphi}\sin^{-1}\theta\cos\theta = \delta^{\sigma\varphi}\cot\theta; \\ \Gamma^\sigma_{\varphi\varphi} &= \frac{1}{2}g^{\sigma\rho}(g_{\rho\varphi,\varphi} + g_{\rho\varphi,\varphi} - g_{\varphi\varphi,\rho}) = -\frac{1}{2}g^{\sigma r}g_{\varphi\varphi,r} - \frac{1}{2}g^{\sigma\theta}g_{\varphi\varphi,\theta} \\ &= -\frac{1}{2}(\delta^{\sigma r})(2r\sin^2\theta) - \frac{1}{2}(\delta^{\sigma\theta}r^{-2})(r^2\sin 2\theta) \\ &= -\delta^{\sigma r}r\sin^2\theta - \delta^{\sigma\theta}\sin\theta\cos\theta. \end{aligned}$$

因此求得 3 维欧氏空间球坐标系的非零克氏符如下:

$$\begin{aligned}\Gamma_{r\theta}^\theta &= \Gamma_{\theta r}^\theta = r^{-1}, \\ \Gamma_{r\varphi}^\varphi &= \Gamma_{\varphi r}^\varphi = r^{-1}, \\ \Gamma_{\theta\theta}^r &= -r, \\ \Gamma_{\theta\varphi}^\varphi &= \Gamma_{\varphi\theta}^\varphi = \cot\theta = \frac{\cos\theta}{\sin\theta}, \\ \Gamma_{\varphi\varphi}^r &= -r\sin^2\theta, \\ \Gamma_{\varphi\varphi}^\theta &= -\sin\theta\cos\theta.\end{aligned}$$

8. 设 I 是 RR 的一个区间, $C: I \rightarrow M$ 是 (M, ∇_a) 中的曲线, 试证 $\forall s, t \in I$, 平移映射 $\psi: V_{C(s)} \rightarrow V_{C(t)}$ (见图 3-2) 是同构映射.

证 因 $C(s) \rightarrow C(t)$ 是一一到上的线性映射, 所以从 $v^a(s)$ 平移到 $\tilde{v}^a(t)$ 也是一一到上的线性映射, 故而 $\psi: V_{C(s)} \rightarrow V_{C(t)}$ 是同构映射.

9. 试证定理 3-3-2、3-3-3 和 3-3-5.

证 (1) 定理 3-3-2 的证明. 设 T'^a 是重参数化曲线 $\gamma'(t') [= \gamma(t)]$ 的切矢, 有关系

$$T'^a = \left(\frac{\partial}{\partial t'}\right)^a = \frac{dt}{dt'} \left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^a = \frac{dt}{dt'} T^a.$$

要求 $\gamma'(t')$ 为测地线, T'^a 必须满足

$$\begin{aligned}0 &= T'^b \nabla_b T'^a = \frac{dt}{dt'} T^b \nabla_b \left(\frac{dt}{dt'} T^a\right) \\ &= \frac{dt}{dt'} T^a T^b \nabla_b \left(\frac{dt}{dt'}\right) + \left(\frac{dt}{dt'}\right)^2 T^b \nabla_b T^a \\ &= \frac{dt}{dt'} T^a \left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^b \left[d\left(\frac{dt}{dt'}\right)\right]_b + \left(\frac{dt}{dt'}\right)^2 \alpha T^a \\ &= \left[\frac{dt}{dt'} \frac{d}{dt} \left(\frac{dt}{dt'}\right) + \alpha \left(\frac{dt}{dt'}\right)^2\right] T^a \\ &= \left[\frac{d^2 t}{dt'^2} + \alpha \left(\frac{dt}{dt'}\right)^2\right] T^a,\end{aligned}$$

于是要求

$$\frac{d^2 t}{dt'^2} + \alpha \left(\frac{dt}{dt'}\right)^2 = 0.$$

这是对 t 的微分方程, 可以化为对 t' 的微分方程, 因为

$$\begin{aligned}\frac{d^2 t}{dt'^2} &= \frac{d}{dt'} \left(\frac{dt}{dt'}\right) = \frac{dt}{dt'} \frac{d}{dt} \left(\frac{dt'}{dt}\right)^{-1} \\ &= -\left(\frac{dt'}{dt}\right)^{-1} \left(\frac{dt'}{dt}\right)^{-2} \frac{d^2 t'}{dt^2} = -\left(\frac{dt'}{dt}\right)^{-3} \frac{d^2 t'}{dt^2},\end{aligned}$$

故有

$$-\left(\frac{dt'}{dt}\right)^{-3} \frac{d^2 t'}{dt^2} + \alpha \left(\frac{dt'}{dt}\right)^{-2} = 0,$$

即

$$\frac{d^2 t'}{dt^2} = \alpha(t) \left(\frac{dt'}{dt} \right).$$

这就是 $t' = t'(t)$ 满足的微分方程, 解出 t' , 那么就找到了测地线 $\gamma'(t') [= \gamma(t)]$.

(2) 定理 3-3-3 的证明. ①必要性: 若 t 是测地线 $\gamma(t)$ 的仿射参数, 则定理 3-3-2 中的 $\alpha = 0$, 这时 t' 满足的方程蜕化为 $\frac{d^2 t'}{dt^2} = 0$, 其通解必为 $t' = at + b$. 这时 t' 是同一根测地线 $\gamma'(t')$ 的仿射参数. ②充分性: 若 $t' = at + b$ 是测地线 $\gamma'(t')$ 的仿射参数, 那么定理 3-3-2 中的 $\alpha(t) = \left(\frac{dt'}{dt}\right)^{-1} \frac{d^2 t'}{dt^2} = 0$, 于是 $T^b \nabla_b T^a = 0$, 即 t 是测地线 $\gamma(t) [= \gamma'(t')]$ 的仿射参数.

(3) 定理 3-3-5 的证明. 设 $\gamma(t)$ 为以仿射参数 t 为参数的测地线, 沿 $\gamma(t)$ 的切矢为 $T^a(t) \equiv T^a(\gamma(t))$, 其长度 (的平方) 为 $T^2 = g(T, T) = T^a T^b g_{ab}$. 因为 T^a 是测地线的切矢, 所以满足 $T^c \nabla_c T^a = 0$, 另一方面因度规 g_{ab} 与导数算符 ∇_a 相适配, 有 $\nabla_c g_{ab} = 0$. 于是 $T^c \nabla_c T^2 = T^c \nabla_c (T^a T^b g_{ab}) = g_{ab} T^b T^c \nabla_c T^a + g_{ab} T^a T^c \nabla_c T^b + T^a T^b T^c \nabla_c g_{ab} = 0$, 测地线切矢的长度沿测地线为常数: $|T| = C$. 测地线的线长由式 (2-5-3) 给出: $l = \int_{t_0}^t |T(t')| dt' = C(t - t_0)$. 那么这同一根测地线也可用重参数化后的 $\gamma'(l)$ 描述, l 是线长参数. 最后根据定理 3-3-3 的结果, 如果 t 是 $\gamma(t)$ 的仿射参数, 那么 l 必为 $\gamma'(l) [= \gamma(t)]$ 的仿射参数.

- ~10. (a) 写出球面度规 $ds^2 = R^2(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2)$ (R 为常数) 的测地线方程; (b) 验证任一大圆弧 (配以适当参数) 满足测地线方程. 提示: 选球面坐标系 $\{\theta, \varphi\}$ 使所给大圆弧为赤道的一部分, 并以 φ 为仿射参数.

证 (a) 球面的度规张量为 $g_{\theta\theta} = R^2$, $g_{\varphi\varphi} = R^2 \sin^2 \theta$. 利用习题 7 中求得的球坐标系的非零克氏符, 那么现在只有 $\Gamma^\theta_{\varphi\varphi} = -\sin \theta \cos \theta$ 和 $\Gamma^\varphi_{\varphi\theta} = \Gamma^\varphi_{\theta\varphi} = \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$. 于是测地线的参数方程 (3-3-1) 为

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{d^2 \theta}{dt^2} + \Gamma^\theta_{\varphi\varphi} \frac{d\varphi}{dt} \frac{d\varphi}{dt} = \frac{d^2 \theta}{dt^2} - \sin \theta \cos \theta \left(\frac{d\varphi}{dt} \right)^2, \\ 0 &= \frac{d^2 \varphi}{dt^2} + \Gamma^\varphi_{\varphi\theta} \frac{d\varphi}{dt} \frac{d\theta}{dt} + \Gamma^\varphi_{\theta\varphi} \frac{d\theta}{dt} \frac{d\varphi}{dt} = \frac{d^2 \varphi}{dt^2} + \frac{2 \cos \theta}{\sin \theta} \frac{d\theta}{dt} \frac{d\varphi}{dt}, \end{aligned}$$

即测地线方程为

$$\begin{aligned} \theta_{,tt} - \sin \theta \cos \theta \varphi_{,t}^2 &= 0, \\ \varphi_{,tt} + 2 \cot \theta \varphi_{,t} \theta_{,t} &= 0. \end{aligned}$$

(b) 先做球坐标系的旋转变换. 第一步, 绕 O 系的 x 轴旋转 α 角度得 O' 系, 这两系之间的坐标关系为

$$\begin{cases} x' = x, \\ y' = y \cos \alpha + z \sin \alpha, \\ z' = -y \sin \alpha + z \cos \alpha. \end{cases} \quad \begin{cases} x = x', \\ y = y' \cos \alpha - z' \sin \alpha, \\ z = y' \sin \alpha + z' \cos \alpha. \end{cases}$$

然后绕 O' 系的 z' 轴旋转 β 角度得 O'' 系, 这两系之间的坐标关系为

$$\begin{cases} x'' = x' \cos \beta + y' \sin \beta, \\ y'' = -x' \sin \beta + y' \cos \beta, \\ z'' = z'. \end{cases} \quad \begin{cases} x' = x'' \cos \beta - y'' \sin \beta, \\ y' = x'' \sin \beta + y'' \cos \beta, \\ z' = z''. \end{cases}$$

由此可得 O 系与 O'' 系的坐标关系:

$$\begin{aligned} \mathbf{x}'' = \begin{bmatrix} x'' \\ y'' \\ z'' \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \cos \beta & \cos \alpha \sin \beta & \sin \alpha \sin \beta \\ -\sin \beta & \cos \alpha \cos \beta & \sin \alpha \cos \beta \\ 0 & -\sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = R \mathbf{x}. \\ \mathbf{x} = R^{-1} \mathbf{x}'' = R^T \mathbf{x}'' &= \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \beta & -\sin \beta & 0 \\ \cos \alpha \sin \beta & \cos \alpha \cos \beta & -\sin \alpha \\ \sin \alpha \sin \beta & \sin \alpha \cos \beta & \cos \alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x'' \\ y'' \\ z'' \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \cos \beta & -\sin \beta & 0 \\ \cos \alpha \sin \beta & \cos \alpha \cos \beta & -\sin \alpha \\ \sin \alpha \sin \beta & \sin \alpha \cos \beta & \cos \alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \sin \theta'' \cos \varphi'' \\ R \sin \theta'' \sin \varphi'' \\ R \cos \theta'' \end{bmatrix} \\ &= R \begin{bmatrix} \sin \theta \cos \varphi \\ \sin \theta \sin \varphi \\ \cos \theta \end{bmatrix} = R \begin{bmatrix} \sin \theta'' \cos(\varphi'' + \beta) \\ \sin \theta'' \sin(\varphi'' + \beta) \cos \alpha - \cos \theta'' \sin \alpha \\ \sin \theta'' \sin(\varphi'' + \beta) \sin \alpha + \cos \theta'' \cos \alpha \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} \cos \theta &= \sin \theta'' \sin(\varphi'' + \beta) \sin \alpha + \cos \theta'' \cos \alpha, \\ \tan \varphi &= \tan(\varphi'' + \beta) \cos \alpha - \frac{\cot \theta'' \sin \alpha}{\cos(\varphi'' + \beta)}. \end{aligned}$$

O 系的任何大圆弧 (段) 都可用 O'' 系的 (i) 赤道线 (段) 或 (ii) 经线 (段) 描述. 赤道线 (段) 为 $\theta'' = \frac{\pi}{2}$, $\phi'' = at + b$; 经线 (段) 为 $\theta'' = at + b$, $\phi'' = c$.

(i) 如果用 O'' 的赤道线 (段), $\theta'' = \frac{\pi}{2}$, $\phi'' = at + b$:

$$\begin{aligned} \cos \theta &= \sin(at + b + \beta) \sin \alpha = \sin \alpha \sin \phi(t), \\ \tan \varphi &= \tan(at + b + \beta) \cos \alpha = \cos \alpha \tan \phi(t), \end{aligned}$$

其中 $\phi(t) = at + b + \beta$, 即

$$\begin{aligned} \theta(t) &= \arccos[\sin \alpha \sin \phi(t)], \\ \varphi(t) &= \arctan[\cos \alpha \tan \phi(t)]. \end{aligned}$$

这时对 t 求导后得

$$\begin{aligned}
\theta_{,t} &= -a \sin \alpha \cos \phi (1 - \sin^2 \alpha \sin^2 \phi)^{-1/2} \\
&= -\frac{a \sin \alpha \cos \phi}{(1 - \sin^2 \alpha \sin^2 \phi)^{1/2}}, \\
\theta_{,tt} &= a^2 \sin \alpha \sin \phi (1 - \sin^2 \alpha \sin^2 \phi)^{-1/2} \\
&\quad -a \sin \alpha \cos \phi \left\{ -\frac{1}{2}(1 - \sin^2 \alpha \sin^2 \phi)^{-3/2}[-2a \sin^2 \alpha \sin \phi \cos \phi] \right\} \\
&= a^2 \sin \alpha \sin \phi (1 - \sin^2 \alpha \sin^2 \phi)^{-1/2} \\
&\quad -a^2 \sin^3 \alpha \cos^2 \phi \sin \phi (1 - \sin^2 \alpha \sin^2 \phi)^{-3/2} \\
&= a^2 \sin \alpha \sin \phi (1 - \sin^2 \alpha \sin^2 \phi)^{-3/2} \left[(1 - \sin^2 \alpha \sin^2 \phi) - \sin^2 \alpha \cos^2 \phi \right] \\
&= a^2 \sin \alpha \sin \phi (1 - \sin^2 \alpha \sin^2 \phi)^{-3/2} [1 - \sin^2 \alpha] \\
&= a^2 \cos^2 \alpha \sin \alpha \sin \phi (1 - \sin^2 \alpha \sin^2 \phi)^{-3/2} \\
&= \frac{a^2 \cos^2 \alpha \sin \alpha \sin \phi}{(1 - \sin^2 \alpha \sin^2 \phi)^{3/2}}; \\
\varphi_{,t} &= a \cos \alpha \sec^2 \phi (1 + \cos^2 \alpha \tan^2 \phi)^{-1} \\
&= \frac{a \cos \alpha \sec^2 \phi}{1 + \cos^2 \alpha \tan^2 \phi}, \\
\varphi_{,tt} &= a \cos \alpha 2a \sec^2 \phi \tan \phi (1 + \cos^2 \alpha \tan^2 \phi)^{-1} \\
&\quad -a \cos \alpha \sec^2 \phi (1 + \cos^2 \alpha \tan^2 \phi)^{-2} \cos^2 \alpha 2a \tan \phi \sec^2 \phi \\
&= 2a^2 \cos \alpha \sec^2 \phi \tan \phi (1 + \cos^2 \alpha \tan^2 \phi)^{-1} \\
&\quad -2a^2 \cos^3 \alpha \sec^4 \phi \tan \phi (1 + \cos^2 \alpha \tan^2 \phi)^{-2} \\
&= 2a^2 \cos \alpha \sec^2 \phi \tan \phi (1 + \cos^2 \alpha \tan^2 \phi)^{-2} \\
&\quad \times \left[(1 + \cos^2 \alpha \tan^2 \phi) - \cos^2 \alpha \sec^2 \phi \right] \\
&= 2a^2 \cos \alpha \sec^2 \phi \tan \phi (1 + \cos^2 \alpha \tan^2 \phi)^{-2} [1 - \cos^2 \alpha] \\
&= \frac{2a^2 \cos \alpha \sin^2 \alpha \sec^2 \phi \tan \phi}{(1 + \cos^2 \alpha \tan^2 \phi)^2}.
\end{aligned}$$

测地线方程为:

$$\begin{aligned}
\theta_{,tt} - \sin \theta \cos \theta \varphi_{,t}^2 &= 0, \\
\varphi_{,tt} + 2 \cot \theta \varphi_{,t} \theta_{,t} &= 0.
\end{aligned}$$

代入验证, 第一个方程:

$$\begin{aligned}
&\theta_{,tt} - \sin \theta \cos \theta \varphi_{,t}^2 \\
&= \frac{a^2 \cos^2 \alpha \sin \alpha \sin \phi}{(1 - \sin^2 \alpha \sin^2 \phi)^{3/2}} - \sin \theta \cos \theta \left(\frac{a \cos \alpha \sec^2 \phi}{1 + \cos^2 \alpha \tan^2 \phi} \right)^2 \\
&= \frac{a^2 \cos^2 \alpha \sin \alpha \sin \phi}{(1 - \sin^2 \alpha \sin^2 \phi)^{3/2}} - (1 - \sin^2 \alpha \sin^2 \phi)^{1/2} \sin \alpha \sin \phi \frac{a^2 \cos^2 \alpha \sec^4 \phi}{(1 + \cos^2 \alpha \tan^2 \phi)^2}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{a^2 \cos^2 \alpha \sin \alpha \sin \phi}{(1 - \sin^2 \alpha \sin^2 \phi)^{3/2}} - (1 - \sin^2 \alpha \sin^2 \phi)^{1/2} \frac{a^2 \cos^2 \alpha \sin \alpha \sin \phi \sec^4 \phi}{(1 + \cos^2 \alpha \tan^2 \phi)^2} \\
&= \frac{a^2 \cos^2 \alpha \sin \alpha \sin \phi}{(1 - \sin^2 \alpha \sin^2 \phi)^{3/2}} \left[1 - \frac{(1 - \sin^2 \alpha \sin^2 \phi)^2 \sec^4 \phi}{(1 + \cos^2 \alpha \tan^2 \phi)^2} \right],
\end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}
&\frac{(1 - \sin^2 \alpha \sin^2 \phi) \sec^2 \phi}{(1 + \cos^2 \alpha \tan^2 \phi)} = \frac{\sec^2 \phi - \sin^2 \alpha \tan^2 \phi}{1 + \cos^2 \alpha \tan^2 \phi} \\
&= \frac{\sec^2 \phi - \tan^2 \phi + \cos^2 \alpha \tan^2 \phi}{1 + \cos^2 \alpha \tan^2 \phi} = 1,
\end{aligned}$$

故第一个方程成立. 第二个方程:

$$\begin{aligned}
&\varphi_{,tt} + 2 \cot \theta \varphi_{,t} \theta_{,t} \\
&= \frac{2a^2 \cos \alpha \sin^2 \alpha \sec^2 \phi \tan \phi}{(1 + \cos^2 \alpha \tan^2 \phi)^2} \\
&\quad + 2 \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \left(\frac{a \cos \alpha \sec^2 \phi}{1 + \cos^2 \alpha \tan^2 \phi} \right) \left(- \frac{a \sin \alpha \cos \phi}{(1 - \sin^2 \alpha \sin^2 \phi)^{1/2}} \right) \\
&= \frac{2a^2 \cos \alpha \sin^2 \alpha \sec^2 \phi \tan \phi}{(1 + \cos^2 \alpha \tan^2 \phi)^2} \\
&\quad - \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \frac{2a^2 \cos \alpha \sin \alpha \sec \phi}{(1 + \cos^2 \alpha \tan^2 \phi)(1 - \sin^2 \alpha \sin^2 \phi)^{1/2}} \\
&= \frac{2a^2 \cos \alpha \sin^2 \alpha \sec^2 \phi \tan \phi}{(1 + \cos^2 \alpha \tan^2 \phi)^2} \\
&\quad - \frac{\sin \alpha \sin \phi}{(1 - \sin^2 \alpha \sin^2 \phi)^{1/2}} \frac{2a^2 \cos \alpha \sin \alpha \sec \phi}{(1 + \cos^2 \alpha \tan^2 \phi)(1 - \sin^2 \alpha \sin^2 \phi)^{1/2}} \\
&= \frac{2a^2 \cos \alpha \sin^2 \alpha \sin \phi \sec^3 \phi}{(1 + \cos^2 \alpha \tan^2 \phi)^2} - \frac{2a^2 \cos \alpha \sin^2 \alpha \sin \phi \sec \phi}{(1 + \cos^2 \alpha \tan^2 \phi)(1 - \sin^2 \alpha \sin^2 \phi)} \\
&= \frac{2a^2 \cos \alpha \sin^2 \alpha \sin \phi \sec^3 \phi}{(1 + \cos^2 \alpha \tan^2 \phi)^2} \left[1 - \frac{(1 + \cos^2 \alpha \tan^2 \phi) \cos^2 \phi}{(1 - \sin^2 \alpha \sin^2 \phi)} \right],
\end{aligned}$$

其中

$$\frac{(1 + \cos^2 \alpha \tan^2 \phi) \cos^2 \phi}{(1 - \sin^2 \alpha \sin^2 \phi)} = \frac{\cos^2 \phi + \cos^2 \alpha \sin^2 \phi}{1 - \sin^2 \alpha \sin^2 \phi} = 1,$$

故第二个方程也成立.

(ii) 如果用 O'' 的经线 (段), $\theta'' = at + b$, $\phi'' = c$:

$$\begin{aligned}
\cos \theta &= \sin(at + b) \sin(c + \beta) \sin \alpha + \cos(at + b) \cos \alpha, \\
\tan \varphi &= \tan(c + \beta) \cos \alpha - \frac{\cot(at + b) \sin \alpha}{\cos(c + \beta)}.
\end{aligned}$$

令 $\phi(t) \equiv at + b$, $A \equiv \sin(c + \beta)$, $B \equiv \sin \alpha$, 则有

$$\begin{aligned}
\cos \theta &= AB \sin \phi(t) + \sqrt{1 - B^2} \cos \phi(t), \\
\tan \varphi &= \frac{A\sqrt{1 - B^2}}{\sqrt{1 - A^2}} - \frac{B}{\sqrt{1 - A^2}} \cot \phi(t).
\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}\theta(t) &= \arccos \left[AB \sin \phi(t) + \sqrt{1-B^2} \cos \phi(t) \right], \\ \varphi(t) &= \arctan \left[\frac{A\sqrt{1-B^2}}{\sqrt{1-A^2}} - \frac{B}{\sqrt{1-A^2}} \cot \phi(t) \right].\end{aligned}$$

可以用 Mathematica 直接验证, 这两个参数表达式也满足测地线方程

$$\begin{aligned}\theta_{,tt} - \sin \theta \cos \theta \varphi_{,t}^2 &= 0, \\ \varphi_{,tt} + 2 \cot \theta \varphi_{,t} \theta_{,t} &= 0.\end{aligned}$$

*11. 试证定理 3-4-2. 设 $\omega_c, \omega'_c \in \mathcal{F}(0, 1)$ 且 $\omega'_c|_p = \omega_c|_p$, 则

$$[(\nabla_a \nabla_b - \nabla_b \nabla_a) \omega'_c]|_p = [(\nabla_a \nabla_b - \nabla_b \nabla_a) \omega_c]|_p.$$

证 选坐标系 $\{x^\mu\}$ 使其坐标域含 p 点, 以该坐标系的对偶基底展开:

$$\omega_c = \omega_\mu (dx^\mu)_c, \quad \omega'_c = \omega'_\mu (dx^\mu)_c.$$

于是

$$\begin{aligned}[(\nabla_a \nabla_b - \nabla_b \nabla_a) \omega_c]|_p &= \left\{ (\nabla_a \nabla_b - \nabla_b \nabla_a) [\omega_\mu (dx^\mu)_c] \right\} \Big|_p \\ &= \left\{ \omega_\mu (\nabla_a \nabla_b - \nabla_b \nabla_a) (dx^\mu)_c \right\} \Big|_p \\ &= \omega_\mu|_p [(\nabla_a \nabla_b - \nabla_b \nabla_a) (dx^\mu)_c]|_p, \\ [(\nabla_a \nabla_b - \nabla_b \nabla_a) \omega'_c]|_p &= \omega'_\mu|_p [(\nabla_a \nabla_b - \nabla_b \nabla_a) (dx^\mu)_c]|_p.\end{aligned}$$

这里用到了定理 3-4-1 [把 ω_μ 和 ω'_μ 看作 f , $(dx^\mu)_c$ 看作 ω_c]. 而 $\omega'_c|_p = \omega_c|_p$ 保证 $\omega'_\mu|_p = \omega_\mu|_p$, 故命题得证.

*12. 试证式 (3-4-10).

证 根据黎曼曲率张量的循环恒等式性质 (3-4-7) 式有

$$\begin{aligned}0 = R_{[abc]}{}^e &\stackrel{(2-6-14)}{=} \frac{1}{6} (R_{abc}{}^e + R_{bca}{}^e + R_{cab}{}^e - R_{bac}{}^e - R_{acb}{}^e - R_{cba}{}^e) \\ &\stackrel{(3-4-6)}{=} \frac{1}{3} (R_{abc}{}^e + R_{bca}{}^e + R_{cab}{}^e).\end{aligned}$$

以 g_{de} 作用上式, 由定义 $R_{abcd} = g_{de} R_{abc}{}^e$ 得

$$\frac{1}{3} (R_{abcd} + R_{bcad} + R_{cabd}) = 0.$$

当然这就是 $R_{[abc]d} = 0$. 循环这四个指标并相加得

$$0 = 3(R_{[abc]d} + R_{[bcd]a} + R_{[cda]b} + R_{[dab]c})$$

$$\begin{aligned}
&= (R_{abcd} + R_{bcad} + R_{cabd}) + (R_{bcd a} + R_{cd b a} + R_{db c a}) \\
&\quad + (R_{cd ab} + R_{da cb} + R_{ac db}) + (R_{da bc} + R_{ab dc} + R_{bd ac}) \\
&= (R_{abcd} + R_{bcad} - R_{acbd}) + (-R_{bcad} - R_{cdab} + R_{bdac}) \\
&\quad + (R_{cdab} + R_{adbc} - R_{acbd}) + (-R_{adbc} - R_{abcd} + R_{bdac}) \\
&= -2R_{acbd} + 2R_{bdac} ,
\end{aligned}$$

其中用到了性质 (3-4-6) 和 (3-4-9). 因此有 $R_{acbd} = R_{bdac}$, 此即具有对互换对称性 (pair interchange symmetry) 的 (3-4-10) 式

$$R_{abcd} = R_{cdab} .$$

~13. 求出球面度规 (见题 10) 的黎曼张量在坐标系 $\{\theta, \varphi\}$ 的全部分量.

解 球面的度规张量为

$$g_{\theta\theta} = R^2, \quad g_{\varphi\varphi} = R^2 \sin^2 \theta; \quad g^{\theta\theta} = R^{-2}, \quad g^{\varphi\varphi} = R^{-2} \sin^{-2} \theta .$$

利用习题 7 中求得的球坐标系的非零克氏符, 那么现在只有

$$\Gamma_{\varphi\varphi}^{\theta} = -\sin \theta \cos \theta, \quad \Gamma_{\varphi\theta}^{\varphi} = \Gamma_{\theta\varphi}^{\varphi} = \frac{\cos \theta}{\sin \theta};$$

以及

$$\begin{aligned}
\Gamma_{\varphi\varphi,\theta}^{\theta} &= \sin^2 \theta - \cos^2 \theta = -\cos 2\theta, \\
\Gamma_{\varphi\theta,\theta}^{\varphi} &= \Gamma_{\theta\varphi,\theta}^{\varphi} = -\sin^{-2} \theta = -\frac{1}{\sin^2 \theta}.
\end{aligned}$$

利用计算黎曼曲率张量的公式为 (3-4-20'):

$$R_{\mu\nu\sigma}{}^{\rho} = \Gamma_{\mu\sigma,\nu}^{\rho} - \Gamma_{\nu\sigma,\mu}^{\rho} + \Gamma_{\sigma\mu}^{\lambda} \Gamma_{\nu\lambda}^{\rho} - \Gamma_{\sigma\nu}^{\lambda} \Gamma_{\mu\lambda}^{\rho} .$$

因为对前两个指标反对称, 所以只须算 $\mu \neq \nu$ 情形, 即

$$\begin{aligned}
R_{\theta\varphi\sigma}{}^{\rho} &= -\Gamma_{\varphi\sigma,\theta}^{\rho} + \Gamma_{\sigma\theta}^{\lambda} \Gamma_{\varphi\lambda}^{\rho} - \Gamma_{\sigma\varphi}^{\lambda} \Gamma_{\theta\lambda}^{\rho} \\
&= -\Gamma_{\varphi\sigma,\theta}^{\rho} + \Gamma_{\sigma\theta}^{\lambda} \Gamma_{\varphi\lambda}^{\rho} - \Gamma_{\sigma\varphi}^{\lambda} \Gamma_{\theta\lambda}^{\rho} .
\end{aligned}$$

于是有

$$\begin{aligned}
R_{\theta\varphi\theta}{}^{\theta} &= -\Gamma_{\varphi\theta,\theta}^{\theta} + \Gamma_{\theta\theta}^{\lambda} \Gamma_{\varphi\lambda}^{\theta} - \Gamma_{\theta\varphi}^{\lambda} \Gamma_{\theta\lambda}^{\theta} \\
&= -0 + 0 - \Gamma_{\theta\varphi}^{\varphi} \Gamma_{\theta\varphi}^{\theta} \\
&= 0, \\
R_{\theta\varphi\theta}{}^{\varphi} &= -\Gamma_{\varphi\theta,\theta}^{\varphi} + \Gamma_{\theta\theta}^{\lambda} \Gamma_{\varphi\lambda}^{\varphi} - \Gamma_{\theta\varphi}^{\lambda} \Gamma_{\theta\lambda}^{\varphi} \\
&= -\Gamma_{\varphi\theta,\theta}^{\varphi} + 0 - \Gamma_{\theta\varphi}^{\varphi} \Gamma_{\theta\varphi}^{\varphi}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= -\left(-\frac{1}{\sin^2 \theta}\right) - \left(\frac{\cos \theta}{\sin \theta}\right)^2 \\
&= 1, \\
R_{\theta\varphi\varphi}{}^\theta &= -\Gamma_{\varphi\varphi,\theta}^\theta + \Gamma_{\varphi\theta}^\lambda \Gamma_{\varphi\lambda}^\theta - \Gamma_{\varphi\varphi}^\lambda \Gamma_{\theta\lambda}^\theta \\
&= -\Gamma_{\varphi\varphi,\theta}^\theta + \Gamma_{\varphi\theta}^\varphi \Gamma_{\varphi\varphi}^\theta - 0 \\
&= -(-\cos 2\theta) + \left(\frac{\cos \theta}{\sin \theta}\right)(-\sin \theta \cos \theta) \\
&= -\sin^2 \theta, \\
R_{\theta\varphi\varphi}{}^\varphi &= -\Gamma_{\varphi\varphi,\theta}^\varphi + \Gamma_{\varphi\theta}^\lambda \Gamma_{\varphi\lambda}^\varphi - \Gamma_{\varphi\varphi}^\lambda \Gamma_{\theta\lambda}^\varphi \\
&= -0 + \Gamma_{\varphi\theta}^\varphi \Gamma_{\varphi\varphi}^\varphi - \Gamma_{\varphi\varphi}^\theta \Gamma_{\theta\theta}^\varphi \\
&= 0.
\end{aligned}$$

因此求得的非零黎曼曲率张量为

$$R_{\theta\varphi\theta}{}^\varphi = -R_{\varphi\theta\theta}{}^\varphi = 1, \quad R_{\theta\varphi\varphi}{}^\theta = -R_{\varphi\theta\varphi}{}^\theta = -\sin^2 \theta.$$

注意到

$$\begin{aligned}
R_{\theta\varphi\theta}{}^\varphi &= g^{\varphi\varphi} R_{\theta\varphi\theta\varphi} \stackrel{(3-4-9)}{=} -g^{\varphi\varphi} R_{\theta\varphi\varphi\theta} = -g^{\varphi\varphi} g_{\theta\theta} R_{\theta\varphi\varphi}{}^\theta \\
&= -(R^{-2})(\sin^{-2} \theta R^2) R_{\theta\varphi\varphi}{}^\theta = -\sin^{-2} \theta R_{\theta\varphi\varphi}{}^\theta,
\end{aligned}$$

显然上面的结果满足这一关系. 事实上, 由于

$$\begin{aligned}
R_{\theta\varphi\theta\varphi} &= g_{\varphi\varphi} R_{\theta\varphi\theta}{}^\varphi = (R^2 \sin^2 \theta)(+1) = R^2 \sin^2 \theta, \\
R_{\theta\varphi\varphi\theta} &= g_{\theta\theta} R_{\theta\varphi\varphi}{}^\theta = (R^2)(-\sin^2 \theta) = -R^2 \sin^2 \theta,
\end{aligned}$$

我们有

$$R_{\theta\varphi\theta\varphi} = -R_{\varphi\theta\theta\varphi} = -R_{\theta\varphi\varphi\theta} = R_{\varphi\theta\varphi\theta} = R^2 \sin^2 \theta,$$

可以看出它们满足 (3-4-9) 和 (3-4-10) 的关系. 现在 $n = \dim M = 2$, 故 $R_{abc}{}^d$ 的独立分量的个数为 $N = n^2(n^2 - 1)/12 = 1$.

14. 求度规 $ds^2 = \Omega^2(t, x)(-dt^2 + dx^2)$ 的黎曼张量在 $\{t, x\}$ 系的全部分量 (在结果中以 $\dot{\Omega}$ 和 Ω' 分别代表函数 Ω 对 t 和 x 的偏导数).

解 非归一的坐标基底的度规张量分量为

$$g_{tt} = -\Omega^2, \quad g_{xx} = \Omega^2; \quad g^{tt} = -\Omega^{-2}, \quad g^{xx} = \Omega^{-2}.$$

于是

$$g_{tt,t} = -2\Omega\dot{\Omega}, \quad g_{tt,x} = -2\Omega\Omega'; \quad g_{xx,t} = 2\Omega\dot{\Omega}, \quad g_{xx,x} = 2\Omega\Omega'.$$

先利用公式 (3-2-10')

$$\Gamma^\sigma{}_{\mu\nu} = \frac{1}{2}g^{\sigma\rho}(g_{\rho\mu,\nu} + g_{\rho\nu,\mu} - g_{\mu\nu,\rho}),$$

计算克氏符:

$$\begin{aligned}
\Gamma^t_{tt} &= \frac{1}{2}g^{tt}(g_{tt,t} + g_{tt,t} - g_{tt,t}) = \frac{1}{2}(-\Omega^{-2})(-2\Omega\dot{\Omega}) = \Omega^{-1}\dot{\Omega} \equiv A, \\
\Gamma^x_{xx} &= \frac{1}{2}g^{xx}(g_{xx,x} + g_{xx,x} - g_{xx,x}) = \frac{1}{2}(\Omega^{-2})(2\Omega\Omega') = \Omega^{-1}\Omega' \equiv B, \\
\Gamma^x_{tt} &= \frac{1}{2}g^{xx}(g_{xt,t} + g_{xt,t} - g_{tt,x}) = \frac{1}{2}(\Omega^{-2})(2\Omega\Omega') = \Omega^{-1}\Omega' = B, \\
\Gamma^t_{xx} &= \frac{1}{2}g^{tt}(g_{tx,x} + g_{tx,x} - g_{xx,t}) = \frac{1}{2}(-\Omega^{-2})(-2\Omega\dot{\Omega}) = \Omega^{-1}\dot{\Omega} = A; \\
\Gamma^t_{tx} = \Gamma^t_{xt} &= \frac{1}{2}g^{tt}(g_{tt,x} + g_{tx,t} - g_{tx,t}) = \frac{1}{2}(-\Omega^{-2})(-2\Omega\Omega') = \Omega^{-1}\Omega' = B, \\
\Gamma^x_{tx} = \Gamma^x_{xt} &= \frac{1}{2}g^{xx}(g_{xt,x} + g_{xx,t} - g_{tx,x}) = \frac{1}{2}(\Omega^{-2})(2\Omega\dot{\Omega}) = \Omega^{-1}\dot{\Omega} = A.
\end{aligned}$$

相应的导数:

$$\begin{aligned}
\Gamma^t_{tt,t} &= A_{,t} = \Omega^{-1}\ddot{\Omega} - \Omega^{-2}\dot{\Omega}^2 \equiv T, \\
\Gamma^t_{tt,x} &= A_{,x} = \Omega^{-1}\dot{\Omega}' - \Omega^{-2}\dot{\Omega}\Omega' \equiv U, \\
\Gamma^x_{xx,t} &= B_{,t} = \Omega^{-1}\dot{\Omega}' - \Omega^{-2}\dot{\Omega}\Omega' = U, \\
\Gamma^x_{xx,x} &= B_{,x} = \Omega^{-1}\Omega'' - \Omega^{-2}\Omega'^2 \equiv X; \\
\Gamma^x_{tt,t} &= B_{,t} = U, \\
\Gamma^x_{tt,x} &= B_{,x} = X, \\
\Gamma^t_{xx,t} &= A_{,t} = T, \\
\Gamma^t_{xx,x} &= A_{,x} = U; \\
\Gamma^t_{tx,t} = \Gamma^t_{xt,t} &= B_{,t} = U, \\
\Gamma^t_{tx,x} = \Gamma^t_{xt,x} &= B_{,x} = X, \\
\Gamma^x_{tx,t} = \Gamma^x_{xt,t} &= A_{,t} = T, \\
\Gamma^x_{tx,x} = \Gamma^x_{xt,x} &= A_{,x} = U.
\end{aligned}$$

然后利用公式 (3-4-20')

$$R_{\mu\nu\sigma}{}^\rho = \Gamma^\rho_{\mu\sigma,\nu} - \Gamma^\rho_{\nu\sigma,\mu} + \Gamma^\lambda_{\sigma\mu}\Gamma^\rho_{\nu\lambda} - \Gamma^\lambda_{\sigma\nu}\Gamma^\rho_{\mu\lambda}$$

计算黎曼曲率张量. 因为对前两个指标反对称, 所以只须算 $\mu \neq \nu$ 情形, 即

$$R_{tx\sigma}{}^\rho = \Gamma^\rho_{t\sigma,x} - \Gamma^\rho_{x\sigma,t} + \Gamma^\lambda_{\sigma t}\Gamma^\rho_{x\lambda} - \Gamma^\lambda_{\sigma x}\Gamma^\rho_{t\lambda}.$$

于是

$$\begin{aligned}
R_{tx}{}^t &= \Gamma^t_{tt,x} - \Gamma^t_{xt,t} + \Gamma^\lambda_{tt}\Gamma^t_{x\lambda} - \Gamma^\lambda_{tx}\Gamma^t_{t\lambda} \\
&= \Gamma^t_{tt,x} - \Gamma^t_{xt,t} + \Gamma^t_{tt}\Gamma^t_{xt} + \Gamma^x_{tt}\Gamma^t_{xx} - \Gamma^t_{tx}\Gamma^t_{tt} - \Gamma^x_{tx}\Gamma^t_{tx} \\
&= U - U + AB + BA - BA - AB
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 0, \\
R_{txt}^x &= \Gamma_{tt,x}^x - \Gamma_{xt,t}^x + \Gamma_{tt}^\lambda \Gamma_{x\lambda}^x - \Gamma_{tx}^\lambda \Gamma_{t\lambda}^x \\
&= \Gamma_{tt,x}^x - \Gamma_{xt,t}^x + \Gamma_{tt}^t \Gamma_{xt}^x + \Gamma_{tt}^x \Gamma_{xx}^x - \Gamma_{tx}^t \Gamma_{tt}^x - \Gamma_{tx}^x \Gamma_{tx}^x \\
&= X - T + AA + BB - BB - AA \\
&= X - T, \\
R_{txx}^t &= \Gamma_{tx,x}^t - \Gamma_{xx,t}^t + \Gamma_{xt}^\lambda \Gamma_{x\lambda}^t - \Gamma_{xx}^\lambda \Gamma_{t\lambda}^t \\
&= \Gamma_{tx,x}^t - \Gamma_{xx,t}^t + \Gamma_{xt}^t \Gamma_{xt}^t + \Gamma_{xt}^x \Gamma_{xx}^t - \Gamma_{xx}^t \Gamma_{tt}^t - \Gamma_{xx}^x \Gamma_{tx}^t \\
&= X - T + BB + AA - AA - BB \\
&= X - T, \\
R_{txx}^x &= \Gamma_{tx,x}^x - \Gamma_{xx,t}^x + \Gamma_{xt}^\lambda \Gamma_{x\lambda}^x - \Gamma_{xx}^\lambda \Gamma_{t\lambda}^x \\
&= \Gamma_{tx,x}^x - \Gamma_{xx,t}^x + \Gamma_{xt}^t \Gamma_{xt}^x + \Gamma_{xt}^x \Gamma_{xx}^x - \Gamma_{xx}^t \Gamma_{tt}^x - \Gamma_{xx}^x \Gamma_{tx}^x \\
&= U - U + BA + AB - AB - BA \\
&= 0.
\end{aligned}$$

因此我们求得非零的黎曼曲率张量:

$$\begin{aligned}
R_{txt}^x &= -R_{xtt}^x = R_{txx}^t = -R_{xtx}^t \\
&= X - T = \Omega^{-1} \Omega'' - \Omega^{-2} \Omega'^2 - \Omega^{-1} \ddot{\Omega} + \Omega^{-2} \dot{\Omega}^2 \\
&= \frac{\Omega'' - \ddot{\Omega}}{\Omega} + \frac{\dot{\Omega}^2 - \Omega'^2}{\Omega^2}.
\end{aligned}$$

现在 $n = \dim M = 2$, 故 R_{abc}^d 的独立分量的个数为 $N = n^2(n^2 - 1)/12 = 1$. 另外因

$$\begin{aligned}
R_{txtx} &= g_{xx} R_{txt}^x = \Omega^2 (X - T), \\
R_{txxt} &= g_{tt} R_{txx}^t = -\Omega^2 (X - T),
\end{aligned}$$

我们有

$$\begin{aligned}
R_{txtx} &= -R_{xttx} = -R_{txxt} = R_{xtxt} \\
&= \Omega^2 (X - T) = (\Omega'' - \ddot{\Omega}) \Omega + \dot{\Omega}^2 - \Omega'^2,
\end{aligned}$$

可见它们满足 (3-4-9) 和 (3-4-10) 的关系.

15. 求度规 $ds^2 = z^{-1/2}(-dt^2 + dz^2) + z(dx^2 + dy^2)$ 的黎曼张量在 $\{t, x, y, z\}$ 系的全分量.

解 非归一的坐标基底的度规张量分量为

$$\begin{aligned}
g_{tt} &= -g_{zz} = -z^{-1/2}, & g_{xx} &= g_{yy} = z; \\
g^{tt} &= -g^{zz} = -z^{1/2}, & g^{xx} &= g^{yy} = z^{-1}.
\end{aligned}$$

于是

$$g_{tt,z} = -g_{zz,z} = z^{-3/2}/2, \quad g_{xx,z} = g_{yy,z} = 1.$$

先利用公式 (3-2-10')

$$\Gamma^\sigma_{\mu\nu} = \frac{1}{2}g^{\sigma\rho}(g_{\rho\mu,\nu} + g_{\rho\nu,\mu} - g_{\mu\nu,\rho}),$$

计算克氏符 (注意 μ, ν, ρ 中必须有 z 才为非零):

$$\begin{aligned} \Gamma^t_{\mu\nu} &= \frac{1}{2}g^{tt}(g_{t\mu,\nu} + g_{t\nu,\mu} - g_{\mu\nu,t}) = \frac{1}{2}g^{tt}(g_{t\mu,\nu} + g_{t\nu,\mu}) \Rightarrow \\ \Gamma^t_{tz} = \Gamma^t_{zt} &= \frac{1}{2}g^{tt}(g_{tt,z}) = \frac{1}{2}(-z^{1/2})(z^{-3/2}/2) = -\frac{1}{4z}; \\ \Gamma^z_{\mu\nu} &= \frac{1}{2}g^{zz}(g_{z\mu,\nu} + g_{z\nu,\mu} - g_{\mu\nu,z}) \Rightarrow \\ \Gamma^z_{tt} &= \frac{1}{2}g^{zz}(-g_{tt,z}) = \frac{1}{2}(z^{1/2})(-z^{-3/2}/2) = -\frac{1}{4z}, \\ \Gamma^z_{zz} &= \frac{1}{2}g^{zz}(g_{zz,z}) = \frac{1}{2}(z^{1/2})(-z^{-3/2}/2) = -\frac{1}{4z}, \\ \Gamma^z_{xx} &= \frac{1}{2}g^{zz}(-g_{xx,z}) = \frac{1}{2}(z^{1/2})(-1) = -\frac{z^{1/2}}{2} = \Gamma^z_{yy}; \\ \Gamma^x_{\mu\nu} &= \frac{1}{2}g^{xx}(g_{x\mu,\nu} + g_{x\nu,\mu} - g_{\mu\nu,x}) = \frac{1}{2}g^{xx}(g_{x\mu,\nu} + g_{x\nu,\mu}) \Rightarrow \\ \Gamma^x_{xz} = \Gamma^x_{zx} &= \frac{1}{2}g^{xx}(g_{xx,z}) = \frac{1}{2}(z^{-1})(1) = \frac{1}{2z} = \Gamma^y_{yz} = \Gamma^y_{zy}. \end{aligned}$$

总结非零克氏符如下:

$$\begin{aligned} \Gamma^t_{tz} = \Gamma^t_{zt} = \Gamma^z_{tt} = \Gamma^z_{zz} &= -\frac{1}{4z}, \\ \Gamma^z_{xx} = \Gamma^z_{yy} &= -\frac{z^{1/2}}{2}, \\ \Gamma^x_{xz} = \Gamma^x_{zx} = \Gamma^y_{yz} = \Gamma^y_{zy} &= \frac{1}{2z}. \end{aligned}$$

因此求导后有:

$$\begin{aligned} \Gamma^t_{tz,z} = \Gamma^t_{zt,z} = \Gamma^z_{tt,z} = \Gamma^z_{zz,z} &= \frac{1}{4z^2}, \\ \Gamma^z_{xx,z} = \Gamma^z_{yy,z} &= -\frac{1}{4z^{1/2}}, \\ \Gamma^x_{xz,z} = \Gamma^x_{zx,z} = \Gamma^y_{yz,z} = \Gamma^y_{zy,z} &= -\frac{1}{2z^2}. \end{aligned}$$

最后利用公式 (3-4-20)

$$R_{\mu\nu\sigma}{}^\rho = \Gamma^\rho_{\mu\sigma,\nu} - \Gamma^\rho_{\nu\sigma,\mu} + \Gamma^\lambda_{\sigma\mu}\Gamma^\rho_{\nu\lambda} - \Gamma^\lambda_{\sigma\nu}\Gamma^\rho_{\mu\lambda}$$

计算黎曼曲率张量. 因为对前两个指标反对称, 所以只须计算 $\mu \neq \nu$ 的情形. 以下按 t, z, x, y 的次序计算, 而且注意 x 和 y 是对称的:

$$\begin{aligned}
R_{tz\sigma}{}^\rho &= \Gamma^\rho_{t\sigma,z} - \Gamma^\rho_{z\sigma,t} + \Gamma^\lambda_{\sigma t} \Gamma^\rho_{z\lambda} - \Gamma^\lambda_{\sigma z} \Gamma^\rho_{t\lambda} \\
&= \Gamma^\rho_{t\sigma,z} + \Gamma^\lambda_{\sigma t} \Gamma^\rho_{z\lambda} - \Gamma^\lambda_{\sigma z} \Gamma^\rho_{t\lambda}, \\
R_{tx\sigma}{}^\rho &= \Gamma^\rho_{t\sigma,x} - \Gamma^\rho_{x\sigma,t} + \Gamma^\lambda_{\sigma t} \Gamma^\rho_{x\lambda} - \Gamma^\lambda_{\sigma x} \Gamma^\rho_{t\lambda} \\
&= \Gamma^\lambda_{\sigma t} \Gamma^\rho_{x\lambda} - \Gamma^\lambda_{\sigma x} \Gamma^\rho_{t\lambda} = R_{ty\sigma}{}^\rho, \\
R_{zx\sigma}{}^\rho &= \Gamma^\rho_{z\sigma,x} - \Gamma^\rho_{x\sigma,z} + \Gamma^\lambda_{\sigma z} \Gamma^\rho_{x\lambda} - \Gamma^\lambda_{\sigma x} \Gamma^\rho_{z\lambda} \\
&= -\Gamma^\rho_{x\sigma,z} + \Gamma^\lambda_{\sigma z} \Gamma^\rho_{x\lambda} - \Gamma^\lambda_{\sigma x} \Gamma^\rho_{z\lambda} = R_{zy\sigma}{}^\rho, \\
R_{xy\sigma}{}^\rho &= \Gamma^\rho_{x\sigma,y} - \Gamma^\rho_{y\sigma,x} + \Gamma^\lambda_{\sigma x} \Gamma^\rho_{y\lambda} - \Gamma^\lambda_{\sigma y} \Gamma^\rho_{x\lambda} \\
&= \Gamma^\lambda_{\sigma x} \Gamma^\rho_{y\lambda} - \Gamma^\lambda_{\sigma y} \Gamma^\rho_{x\lambda} = -R_{yx\sigma}{}^\rho.
\end{aligned}$$

注意虽然 x 和 y 对 t 和 z 来说是对称的, 并不意味着没有 $R_{xy\sigma}{}^\rho$. 于是

$$\begin{aligned}
R_{tzt}{}^\rho &= \Gamma^\rho_{tt,z} + \Gamma^\lambda_{tt} \Gamma^\rho_{z\lambda} - \Gamma^\lambda_{tz} \Gamma^\rho_{t\lambda} \quad \Rightarrow \\
R_{tzt}{}^t &= \Gamma^t_{tt,z} + \Gamma^\lambda_{tt} \Gamma^t_{z\lambda} - \Gamma^\lambda_{tz} \Gamma^t_{t\lambda} \\
&= 0, \\
R_{tzt}{}^z &= \Gamma^z_{tt,z} + \Gamma^\lambda_{tt} \Gamma^z_{z\lambda} - \Gamma^\lambda_{tz} \Gamma^z_{t\lambda} \\
&= \Gamma^z_{tt,z} + \Gamma^z_{tt} \Gamma^z_{zz} - \Gamma^t_{tz} \Gamma^z_{tt} \\
&= \frac{1}{4z^2} + \left(-\frac{1}{4z}\right)\left(-\frac{1}{4z}\right) - \left(-\frac{1}{4z}\right)\left(-\frac{1}{4z}\right) \\
&= \frac{1}{4z^2}, \\
R_{tzt}{}^x &= \Gamma^x_{tt,z} + \Gamma^\lambda_{tt} \Gamma^x_{z\lambda} - \Gamma^\lambda_{tz} \Gamma^x_{t\lambda} \\
&= 0 = R_{tzt}{}^y; \\
R_{tzz}{}^\rho &= \Gamma^\rho_{tz,z} + \Gamma^\lambda_{zt} \Gamma^\rho_{z\lambda} - \Gamma^\lambda_{zz} \Gamma^\rho_{t\lambda} \quad \Rightarrow \\
R_{tzz}{}^t &= \Gamma^t_{tz,z} + \Gamma^\lambda_{zt} \Gamma^t_{z\lambda} - \Gamma^\lambda_{zz} \Gamma^t_{t\lambda} \\
&= \Gamma^t_{tz,z} + \Gamma^t_{zt} \Gamma^t_{zt} - \Gamma^z_{zz} \Gamma^t_{tz} \\
&= \frac{1}{4z^2} + \left(-\frac{1}{4z}\right)\left(-\frac{1}{4z}\right) - \left(-\frac{1}{4z}\right)\left(-\frac{1}{4z}\right) \\
&= \frac{1}{4z^2}, \\
R_{tzz}{}^z &= \Gamma^z_{tz,z} + \Gamma^\lambda_{zt} \Gamma^z_{z\lambda} - \Gamma^\lambda_{zz} \Gamma^z_{t\lambda} \\
&= 0, \\
R_{tzz}{}^x &= \Gamma^x_{tz,z} + \Gamma^\lambda_{zt} \Gamma^x_{z\lambda} - \Gamma^\lambda_{zz} \Gamma^x_{t\lambda} \\
&= 0 = R_{tzz}{}^y; \\
R_{tzz}{}^\rho &= \Gamma^\rho_{tx,z} + \Gamma^\lambda_{xt} \Gamma^\rho_{z\lambda} - \Gamma^\lambda_{xz} \Gamma^\rho_{t\lambda} \\
&= 0 = R_{tzy}{}^\rho.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
R_{txt}{}^\rho &= \Gamma^\lambda{}_{tt}\Gamma^\rho{}_{x\lambda} - \Gamma^\lambda{}_{tx}\Gamma^\rho{}_{t\lambda} = \Gamma^\lambda{}_{tt}\Gamma^\rho{}_{x\lambda} \quad \Rightarrow \\
R_{txt}{}^t &= \Gamma^\lambda{}_{tt}\Gamma^t{}_{x\lambda} \\
&= 0 = R_{tyt}{}^t, \\
R_{txt}{}^z &= \Gamma^\lambda{}_{tt}\Gamma^z{}_{x\lambda} \\
&= 0 = R_{tyt}{}^z, \\
R_{txt}{}^x &= \Gamma^\lambda{}_{tt}\Gamma^x{}_{x\lambda} = \Gamma^z{}_{tt}\Gamma^x{}_{xz} \\
&= \left(-\frac{1}{4z}\right)\left(\frac{1}{2z}\right) \\
&= -\frac{1}{8z^2} = R_{tyt}{}^y, \\
R_{txt}{}^y &= \Gamma^\lambda{}_{tt}\Gamma^y{}_{x\lambda} \\
&= 0 = R_{tyt}{}^x; \\
R_{txz}{}^\rho &= \Gamma^\lambda{}_{zt}\Gamma^\rho{}_{x\lambda} - \Gamma^\lambda{}_{zx}\Gamma^\rho{}_{t\lambda} \\
&= 0 = R_{tyz}{}^\rho; \\
R_{txx}{}^\rho &= \Gamma^\lambda{}_{xt}\Gamma^\rho{}_{x\lambda} - \Gamma^\lambda{}_{xx}\Gamma^\rho{}_{t\lambda} = -\Gamma^\lambda{}_{xx}\Gamma^\rho{}_{t\lambda} = -\Gamma^z{}_{xx}\Gamma^\rho{}_{tz} \quad \Rightarrow \\
R_{txx}{}^t &= -\Gamma^z{}_{xx}\Gamma^t{}_{tz} \\
&= -\left(-\frac{z^{1/2}}{2}\right)\left(-\frac{1}{4z}\right) \\
&= -\frac{1}{8z^{1/2}} = R_{tyy}{}^t; \\
R_{txy}{}^\rho &= \Gamma^\lambda{}_{yt}\Gamma^\rho{}_{x\lambda} - \Gamma^\lambda{}_{yx}\Gamma^\rho{}_{t\lambda} \\
&= 0 = R_{tyx}{}^\rho. \\
R_{zxt}{}^\rho &= -\Gamma^\rho{}_{xt,z} + \Gamma^\lambda{}_{tz}\Gamma^\rho{}_{x\lambda} - \Gamma^\lambda{}_{tx}\Gamma^\rho{}_{z\lambda} \\
&= 0 = R_{zyt}{}^\rho, \\
R_{zxx}{}^\rho &= -\Gamma^\rho{}_{xz,z} + \Gamma^\lambda{}_{zz}\Gamma^\rho{}_{x\lambda} - \Gamma^\lambda{}_{zx}\Gamma^\rho{}_{z\lambda} \quad \Rightarrow \\
R_{zxx}{}^t &= -\Gamma^t{}_{xz,z} + \Gamma^\lambda{}_{zz}\Gamma^t{}_{x\lambda} - \Gamma^\lambda{}_{zx}\Gamma^t{}_{z\lambda} \\
&= 0 = R_{zyz}{}^t, \\
R_{zxx}{}^z &= -\Gamma^z{}_{xz,z} + \Gamma^\lambda{}_{zz}\Gamma^z{}_{x\lambda} - \Gamma^\lambda{}_{zx}\Gamma^z{}_{z\lambda} \\
&= \Gamma^z{}_{zz}\Gamma^z{}_{xz} - \Gamma^x{}_{zx}\Gamma^z{}_{zx} \\
&= 0 = R_{zyz}{}^z, \\
R_{zxx}{}^x &= -\Gamma^x{}_{xz,z} + \Gamma^\lambda{}_{zz}\Gamma^x{}_{x\lambda} - \Gamma^\lambda{}_{zx}\Gamma^x{}_{z\lambda} \\
&= -\Gamma^x{}_{xz,z} + \Gamma^z{}_{zz}\Gamma^x{}_{xz} - \Gamma^x{}_{zx}\Gamma^x{}_{zx} \\
&= -\left(-\frac{1}{2z^2}\right) + \left(-\frac{1}{4z}\right)\left(\frac{1}{2z}\right) - \left(\frac{1}{2z}\right)\left(\frac{1}{2z}\right) \\
&= \frac{1}{8z^2} = R_{zyz}{}^y, \\
R_{zxx}{}^y &= -\Gamma^y{}_{xz,z} + \Gamma^\lambda{}_{zz}\Gamma^y{}_{x\lambda} - \Gamma^\lambda{}_{zx}\Gamma^y{}_{z\lambda}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 0 = R_{zyz}{}^x ; \\
R_{zxx}{}^\rho &= -\Gamma^\rho_{xx,z} + \Gamma^\lambda_{xz}\Gamma^\rho_{x\lambda} - \Gamma^\lambda_{xx}\Gamma^\rho_{z\lambda} \quad \Rightarrow \\
R_{zxx}{}^t &= -\Gamma^t_{xx,z} + \Gamma^\lambda_{xz}\Gamma^t_{x\lambda} - \Gamma^\lambda_{xx}\Gamma^t_{z\lambda} \\
&= \Gamma^x_{xz}\Gamma^t_{xx} - \Gamma^z_{xx}\Gamma^t_{zz} \\
&= 0 = R_{zyy}{}^t , \\
R_{zxx}{}^z &= -\Gamma^z_{xx,z} + \Gamma^\lambda_{xz}\Gamma^z_{x\lambda} - \Gamma^\lambda_{xx}\Gamma^z_{z\lambda} \\
&= -\Gamma^z_{xx,z} + \Gamma^x_{xz}\Gamma^z_{xx} - \Gamma^z_{xx}\Gamma^z_{zz} \\
&= -\left(-\frac{1}{4z^{1/2}}\right) + \left(\frac{1}{2z}\right)\left(-\frac{z^{1/2}}{2}\right) - \left(-\frac{z^{1/2}}{2}\right)\left(-\frac{1}{4z}\right) \\
&= -\frac{1}{8z^{1/2}} = R_{zyy}{}^z , \\
R_{zxx}{}^x &= -\Gamma^x_{xx,z} + \Gamma^\lambda_{xz}\Gamma^x_{x\lambda} - \Gamma^\lambda_{xx}\Gamma^x_{z\lambda} \\
&= \Gamma^x_{xz}\Gamma^x_{xx} - \Gamma^z_{xx}\Gamma^x_{zz} \\
&= 0 = R_{zyy}{}^y , \\
R_{zxx}{}^y &= -\Gamma^y_{xx,z} + \Gamma^\lambda_{xz}\Gamma^y_{x\lambda} - \Gamma^\lambda_{xx}\Gamma^y_{z\lambda} \\
&= \Gamma^x_{xz}\Gamma^y_{xx} - \Gamma^z_{xx}\Gamma^y_{zz} \\
&= 0 = R_{zyy}{}^x ; \\
R_{zxy}{}^\rho &= -\Gamma^\rho_{xy,z} + \Gamma^\lambda_{yz}\Gamma^\rho_{x\lambda} - \Gamma^\lambda_{yx}\Gamma^\rho_{z\lambda} \\
&= \Gamma^y_{yz}\Gamma^\rho_{xy} \\
&= 0 = R_{zyx}{}^\rho ; \\
R_{xyx}{}^y &= \Gamma^\lambda_{xx}\Gamma^y_{y\lambda} - \Gamma^\lambda_{xy}\Gamma^y_{x\lambda} = \Gamma^z_{xx}\Gamma^y_{yz} \\
&= \left(-\frac{z^{1/2}}{2}\right)\left(\frac{1}{2z}\right) = -\frac{1}{4z^{1/2}} = -R_{yxx}{}^y , \\
R_{xyy}{}^x &= \Gamma^\lambda_{yx}\Gamma^x_{y\lambda} - \Gamma^\lambda_{yy}\Gamma^x_{x\lambda} = -\Gamma^z_{yy}\Gamma^x_{xz} \\
&= -\left(-\frac{z^{1/2}}{2}\right)\left(\frac{1}{2z}\right) = \frac{1}{4z^{1/2}} = -R_{yxy}{}^x .
\end{aligned}$$

我们最终求得非零的黎曼曲率张量为

$$\begin{aligned}
R_{tzt}{}^z &= -R_{ztt}{}^z = R_{tzz}{}^t = -R_{ztz}{}^t = \frac{1}{4z^2} , \\
R_{xtt}{}^x &= -R_{txt}{}^x = R_{ytt}{}^y = -R_{yty}{}^y = R_{zxx}{}^x = -R_{xzz}{}^x = R_{zyz}{}^y = -R_{yzz}{}^y = \frac{1}{8z^2} , \\
R_{xtx}{}^t &= -R_{txx}{}^t = R_{yty}{}^t = -R_{tyy}{}^t = R_{xzx}{}^z = -R_{zxx}{}^z = R_{yzy}{}^z = -R_{zyy}{}^z = \frac{1}{8z^{1/2}} , \\
R_{xyy}{}^x &= -R_{yxy}{}^x = -R_{xyx}{}^y = R_{yxx}{}^y = \frac{1}{4z^{1/2}} .
\end{aligned}$$

因为

$$R_{tztz} = g_{zz}R_{tzt}{}^z = z^{-1/2}\frac{1}{4z^2} = \frac{1}{4z^{5/2}} ,$$

$$\begin{aligned}
R_{tzzt} &= g_{tt}R_{tzz}{}^t = -z^{-1/2}\frac{1}{4z^2} = -\frac{1}{4z^{5/2}}; \\
R_{xttx} &= g_{xx}R_{xtt}{}^x = z\frac{1}{8z^2} = \frac{1}{8z}, \\
R_{zxzx} &= g_{xx}R_{zxz}{}^x = z\frac{1}{8z^2} = \frac{1}{8z}; \\
R_{xtxt} &= g_{tt}R_{xtx}{}^t = -z^{-1/2}\frac{1}{8z^{1/2}} = -\frac{1}{8z}, \\
R_{xzzx} &= g_{zz}R_{xzx}{}^z = z^{-1/2}\frac{1}{8z^{1/2}} = \frac{1}{8z}; \\
R_{xyyx} &= g_{xx}R_{xyy}{}^x = z\frac{1}{4z^{1/2}} = \frac{z^{1/2}}{4}.
\end{aligned}$$

所以黎曼张量又可写为

$$\begin{aligned}
\frac{1}{4z^{5/2}} &= R_{tztz} = -R_{ztzz} = -R_{tzzt} = R_{ztzt}, \\
\frac{1}{8z} &= R_{xttx} = -R_{xttx} = R_{ytty} = -R_{tyty} = R_{zxzx} = -R_{xzzx} = R_{zyzy} = -R_{yzzz} \\
&= -R_{xtxt} = R_{txxt} = -R_{ytyt} = R_{tyyt} = R_{xzzz} = -R_{zxzz} = R_{zyyz} = -R_{zyyz}, \\
\frac{z^{1/2}}{4} &= R_{xyyx} = -R_{yxyx} = -R_{xyxy} = R_{yxyx}.
\end{aligned}$$

很容易看出它们满足 (3-4-9) 和 (3-4-10) 的关系.

16. 设 $\alpha(z)$, $\beta(z)$, $\gamma(z)$ 为任意函数, $h = t + \alpha(z)x + \beta(z)y + \gamma(z)$, 求度规

$$ds^2 = -dt^2 + dx^2 + dy^2 + h^2 dz^2$$

的黎曼张量在 $\{t, x, y, z\}$ 系的全部分量.

解 度规张量为

$$\begin{aligned}
g_{tt} &= -g_{xx} = -g_{yy} = -1, & g_{zz} &= h^2; \\
g^{tt} &= -g^{xx} = -g^{yy} = -1, & g^{zz} &= h^{-2}.
\end{aligned}$$

于是有

$$\begin{aligned}
g_{zz,t} &= 2h, \\
g_{zz,z} &= 2h(\alpha'x + \beta'y + \gamma') \equiv 2hh', \\
g_{zz,x} &= 2h\alpha, \\
g_{zz,y} &= 2h\beta.
\end{aligned}$$

先利用公式 (3-2-10')

$$\Gamma^\sigma{}_{\mu\nu} = \frac{1}{2}g^{\sigma\rho}(g_{\rho\mu,\nu} + g_{\rho\nu,\mu} - g_{\mu\nu,\rho})$$

计算克氏符:

$$\begin{aligned}
\Gamma^t_{\mu\nu} &= \frac{1}{2}g^{tt}(g_{t\mu,\nu} + g_{t\nu,\mu} - g_{\mu\nu,t}) = -\frac{1}{2}g^{tt}g_{\mu\nu,t} \Rightarrow \\
\Gamma^t_{zz} &= -\frac{1}{2}g^{tt}g_{zz,t} = -\frac{1}{2}(-1)(2h) = h ; \\
\Gamma^z_{\mu\nu} &= \frac{1}{2}g^{zz}(g_{z\mu,\nu} + g_{z\nu,\mu} - g_{\mu\nu,z}) \Rightarrow \\
\Gamma^z_{zz} &= \frac{1}{2}g^{zz}g_{zz,z} = \frac{1}{2}(h^{-2})(2hh') = h^{-1}h' , \\
\Gamma^z_{zt} &= \frac{1}{2}g^{zz}(g_{zz,t} + g_{zt,z} - g_{zt,z}) = \frac{1}{2}g^{zz}g_{zz,t} = \frac{1}{2}(h^{-2})(2h) = h^{-1} , \\
\Gamma^z_{zx} &= \frac{1}{2}g^{zz}(g_{zz,x} + g_{zx,z} - g_{zx,z}) = \frac{1}{2}g^{zz}g_{zz,x} = \frac{1}{2}(h^{-2})(2h\alpha) = h^{-1}\alpha , \\
\Gamma^z_{zy} &= \frac{1}{2}g^{zz}(g_{zz,y} + g_{zy,z} - g_{zy,z}) = \frac{1}{2}g^{zz}g_{zz,y} = \frac{1}{2}(h^{-2})(2h\beta) = h^{-1}\beta ; \\
\Gamma^x_{\mu\nu} &= \frac{1}{2}g^{xx}(g_{x\mu,\nu} + g_{x\nu,\mu} - g_{\mu\nu,x}) = -\frac{1}{2}g^{xx}g_{\mu\nu,x} \Rightarrow \\
\Gamma^x_{zz} &= -\frac{1}{2}g^{xx}g_{zz,x} = -\frac{1}{2}(1)(2h\alpha) = -h\alpha , \\
\Gamma^y_{zz} &= -\frac{1}{2}g^{yy}g_{zz,y} = -\frac{1}{2}(1)(2h\beta) = -h\beta .
\end{aligned}$$

总结非零克氏符如下:

$$\begin{aligned}
\Gamma^t_{zz} &= h , \\
\Gamma^z_{zz} &= h^{-1}(\alpha'x + \beta'y + \gamma') \equiv h^{-1}h' , \\
\Gamma^z_{zt} &= \Gamma^z_{tz} = h^{-1} , \\
\Gamma^z_{zx} &= \Gamma^z_{xz} = h^{-1}\alpha , \\
\Gamma^z_{zy} &= \Gamma^z_{yz} = h^{-1}\beta , \\
\Gamma^x_{zz} &= -h\alpha , \\
\Gamma^y_{zz} &= -h\beta .
\end{aligned}$$

因此求导后有:

$$\begin{aligned}
\Gamma^t_{zz,t} &= 1 , \\
\Gamma^z_{zz,t} &= -h^{-2}h' , \\
\Gamma^z_{zt,t} &= \Gamma^z_{tz,t} = -h^{-2} , \\
\Gamma^z_{zx,t} &= \Gamma^z_{xz,t} = -h^{-2}\alpha , \\
\Gamma^z_{zy,t} &= \Gamma^z_{yz,t} = -h^{-2}\beta , \\
\Gamma^x_{zz,t} &= -\alpha , \\
\Gamma^y_{zz,t} &= -\beta ; \\
\Gamma^t_{zz,z} &= h' ,
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\Gamma^z_{zz,z} &= -h^{-2}h'^2 + h^{-1}h'' , \\
\Gamma^z_{zt,z} = \Gamma^z_{tz,z} &= -h^{-2}h' , \\
\Gamma^z_{zx,z} = \Gamma^z_{xz,z} &= -h^{-2}h'\alpha + h^{-1}\alpha' , \\
\Gamma^z_{zy,z} = \Gamma^z_{yz,z} &= -h^{-2}h'\beta + h^{-1}\beta' , \\
\Gamma^x_{zz,z} &= -h'\alpha - h\alpha' , \\
\Gamma^y_{zz,z} &= -h'\beta - h\beta' ; \\
\Gamma^t_{zz,x} &= \alpha , \\
\Gamma^z_{zz,x} &= -h^{-2}\alpha h' + h^{-1}\alpha' , \\
\Gamma^z_{zt,x} = \Gamma^z_{tz,x} &= -h^{-2}\alpha , \\
\Gamma^z_{zx,x} = \Gamma^z_{xz,x} &= -h^{-2}\alpha^2 , \\
\Gamma^z_{zy,x} = \Gamma^z_{yz,x} &= -h^{-2}\alpha\beta , \\
\Gamma^x_{zz,x} &= -\alpha^2 , \\
\Gamma^y_{zz,x} &= -\alpha\beta ; \\
\Gamma^t_{zz,y} &= \beta , \\
\Gamma^z_{zz,y} &= -h^{-2}\beta h' + h^{-1}\beta' , \\
\Gamma^z_{zt,y} = \Gamma^z_{tz,y} &= -h^{-2}\beta , \\
\Gamma^z_{zx,y} = \Gamma^z_{xz,y} &= -h^{-2}\alpha\beta , \\
\Gamma^z_{zy,y} = \Gamma^z_{yz,y} &= -h^{-2}\beta^2 , \\
\Gamma^x_{zz,y} &= -\alpha\beta , \\
\Gamma^y_{zz,y} &= -\beta^2 .
\end{aligned}$$

最后利用公式 (3-4-20')

$$R_{\mu\nu\sigma}{}^\rho = \Gamma^\rho_{\mu\sigma,\nu} - \Gamma^\rho_{\nu\sigma,\mu} + \Gamma^\lambda_{\sigma\mu}\Gamma^\rho_{\nu\lambda} - \Gamma^\lambda_{\sigma\nu}\Gamma^\rho_{\mu\lambda}$$

计算黎曼曲率张量. 因为对前两个指标反对称, 所以只须计算 $\mu \neq \nu$ 的情形. 以下按 t, z, x, y 的次序计算:

$$\begin{aligned}
R_{tzt}{}^t &= \Gamma^t_{tt,z} - \Gamma^t_{zt,t} + \Gamma^\lambda_{tt}\Gamma^t_{z\lambda} - \Gamma^\lambda_{tz}\Gamma^t_{t\lambda} = 0 , \\
R_{tzt}{}^z &= \Gamma^z_{tt,z} - \Gamma^z_{zt,t} + \Gamma^\lambda_{tt}\Gamma^z_{z\lambda} - \Gamma^\lambda_{tz}\Gamma^z_{t\lambda} \\
&= -\Gamma^z_{zt,t} - \Gamma^z_{tz}\Gamma^z_{tz} \\
&= -(-h^{-2}) - (h^{-1})^2 \\
&= 0 , \\
R_{tzt}{}^x &= \Gamma^x_{tt,z} - \Gamma^x_{zt,t} + \Gamma^\lambda_{tt}\Gamma^x_{z\lambda} - \Gamma^\lambda_{tz}\Gamma^x_{t\lambda} = 0 = R_{tzt}{}^y ; \\
R_{tzz}{}^t &= \Gamma^t_{tz,z} - \Gamma^t_{zz,t} + \Gamma^\lambda_{zt}\Gamma^t_{z\lambda} - \Gamma^\lambda_{zz}\Gamma^t_{t\lambda}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= -\Gamma_{zz,t}^t + \Gamma_{zt}^z \Gamma_{zz}^t \\
&= -(1) + (h^{-1})(h) \\
&= 0, \\
R_{tzz}{}^z &= \Gamma_{tz,z}^z - \Gamma_{zz,t}^z + \Gamma_{zt}^\lambda \Gamma_{z\lambda}^z - \Gamma_{zz}^\lambda \Gamma_{t\lambda}^z \\
&= \Gamma_{tz,z}^z - \Gamma_{zz,t}^z + \Gamma_{zt}^z \Gamma_{zz}^z - \Gamma_{zz}^z \Gamma_{tz}^z \\
&= (-h^{-2}h') - (-h^{-2}h') \\
&= 0, \\
R_{tzz}{}^x &= \Gamma_{tz,z}^x - \Gamma_{zz,t}^x + \Gamma_{zt}^\lambda \Gamma_{z\lambda}^x - \Gamma_{zz}^\lambda \Gamma_{t\lambda}^x \\
&= -\Gamma_{zz,t}^x + \Gamma_{zt}^z \Gamma_{zz}^x \\
&= -(-\alpha) + (h^{-1})(-h\alpha) \\
&= 0 = R_{tzz}{}^y.
\end{aligned}$$

可以用 Mathematica 编程验证黎曼张量的所有分量在该坐标系下均为零！那么根据定理 3-4-9, 这时一定存在 (局域) 平直度规场, 即度规场的全部分量为常数！

17. 试证 2 维广义黎曼空间的爱因斯坦张量为零. 提示: 2 维广义黎曼空间的黎曼张量只有一个独立分量.

证 2 维广义黎曼空间的黎曼张量只有 $\frac{2^2(2^2-1)}{12} = 1$ 个独立分量, 即有关系

$$R_{1212} = R_{2121} = -R_{1221} = -R_{2112} = a.$$

因此里奇张量 $R_{ab} = g^{cd} R_{acbd}$ 的分量式为

$$\begin{aligned}
R_{11} &= g^{cd} R_{1c1d} = g^{22} R_{1212} = ag^{22}, \\
R_{12} &= g^{cd} R_{1c2d} = g^{21} R_{1221} = -ag^{21}, \\
R_{21} &= g^{cd} R_{2c1d} = g^{12} R_{2112} = -ag^{12}, \\
R_{22} &= g^{cd} R_{2c2d} = g^{11} R_{2121} = ag^{11}.
\end{aligned}$$

标量曲率 $R = g^{ab} R_{ab}$ 的分量式为

$$\begin{aligned}
R &= g^{11} R_{11} + g^{12} R_{12} + g^{21} R_{21} + g^{22} R_{22} \\
&= g^{11}(ag^{22}) + g^{12}(-ag^{21}) + g^{21}(-ag^{12}) + g^{22}(ag^{11}) \\
&= 2a(g^{11}g^{22} - g^{12}g^{21}).
\end{aligned}$$

于是爱因斯坦张量 $G_{ab} = R_{ab} - \frac{1}{2}Rg_{ab}$ 的分量式为

$$\begin{aligned}
G_{11} &= R_{11} - \frac{1}{2}Rg_{11} = ag^{22} - \frac{1}{2}2a(g^{11}g^{22} - g^{12}g^{21})g_{11} \\
&= ag^{22} - ag^{11}g_{11}g^{22} + ag^{12}g^{21}g_{11}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= ag^{22} - a(\delta^1_1 - g^{12}g_{21})g^{22} + ag^{12}g^{21}g_{11} \\
&= ag^{12}g_{21}g^{22} + ag^{12}g^{21}g_{11} = ag^{12}(g^{21}g_{11} + g^{22}g_{21}) \\
&= ag^{12}\delta^2_1 = 0, \\
G_{22} &= R_{22} - \frac{1}{2}Rg_{22} = ag^{11} - \frac{1}{2}2a(g^{11}g^{22} - g^{12}g^{21})g_{22} \\
&= ag^{11} - ag^{11}g^{22}g_{22} + ag^{12}g^{21}g_{22} \\
&= ag^{11} - ag^{11}(\delta^2_2 - g^{21}g_{12}) + ag^{12}g^{21}g_{22} \\
&= ag^{11}g^{21}g_{12} + ag^{12}g^{21}g_{22} = ag^{21}(g^{11}g_{12} + g^{12}g_{22}) \\
&= ag^{21}\delta^1_2 = 0, \\
G_{12} &= R_{12} - \frac{1}{2}Rg_{12} = -ag^{21} - \frac{1}{2}2a(g^{11}g^{22} - g^{12}g^{21})g_{12} \\
&= -ag^{21} - ag^{11}g_{12}g^{22} + ag^{12}g_{12}g^{21} \\
&= -ag^{21} - ag^{11}g_{12}g^{22} + a(\delta^1_1 - g^{11}g_{11})g^{21} \\
&= -ag^{11}g_{12}g^{22} - ag^{11}g_{11}g^{21} = -ag^{11}(g^{22}g_{21} + g^{21}g_{11}) \\
&= -ag^{11}\delta^2_1 = 0, \\
G_{21} &= R_{21} - \frac{1}{2}Rg_{21} = -ag^{12} - \frac{1}{2}2a(g^{11}g^{22} - g^{12}g^{21})g_{21} \\
&= -ag^{12} - ag^{11}g^{22}g_{21} + ag^{12}g^{21}g_{21} \\
&= -ag^{12} - ag^{11}g^{22}g_{21} + ag^{12}(\delta^2_2 - g^{22}g_{22}) \\
&= -ag^{11}g^{22}g_{21} - ag^{12}g_{22}g^{22} = -ag^{22}(g^{11}g_{12} + g^{12}g_{22}) \\
&= -ag^{22}\delta^1_2 = 0.
\end{aligned}$$

命题得证.

第 4 章 “李导数、 Killing 场和超曲面” 习题

- ~1. 试证由式 (4-1-1) 定义的 $(\phi_*v)^a$ 满足 §2.2 定义 2 对矢量的两个要求, 从而确是 $\phi(p)$ 点的矢量.

证 (a) 线性性:

$$\begin{aligned}
(\phi_*v)(\alpha f + \beta g) &\stackrel{(4-1-2)}{=} v[\phi^*(\alpha f + \beta g)] \\
&\stackrel{(4-1-1)(1)}{=} v[\alpha(\phi^*f) + \beta(\phi^*g)] \\
&\stackrel{\S 2.2 \text{ 定义 } 2(a)}{=} \alpha v(\phi^*f) + \beta v(\phi^*g) \\
&\stackrel{(4-1-2)}{=} \alpha(\phi_*v)(f) + \beta(\phi_*v)(g).
\end{aligned}$$

(b) 莱布尼茨律:

$$(\phi_*v)(fg) \stackrel{(4-1-2)}{=} v[\phi^*(fg)]$$

$$\begin{aligned}
& \stackrel{(4-1-1)(2)}{=} v[(\phi^* f)(\phi^* g)] \\
& \stackrel{\S 2.2 \text{ 定义 } 2(b)}{=} (\phi^* f)|_p v(\phi^* g) + (\phi^* g)|_p v(\phi^* f) \\
& \stackrel{(4-1-2)}{=} (\phi^* f)|_p (\phi_* v)(g) + (\phi^* g)|_p (\phi_* v)(f) \\
& \stackrel{\text{定义 } 1}{=} f|_{\phi(p)} (\phi_* v)(g) + g|_{\phi(p)} (\phi_* v)(f) .
\end{aligned}$$

因此 $\phi_* v$ 为点 $\phi(p) \in N$ 的一个矢量, $\phi_* v \in V_{\phi(p)}$, $\forall f, g \in \mathcal{F}_N$, 满足 §2.2 定义 2 要求的矢量的线性性和莱布尼茨律.

~2. 试证定理 4-1-1、4-1-2 和 4-1-3.

证 (a) 定理 4-1-1 的证明. $\forall f \in \mathcal{F}_N$ 有

$$\begin{aligned}
[\phi_*(\alpha u^a + \beta v^a)](f) & \stackrel{(4-1-2)}{=} (\alpha u + \beta v)(\phi^* f) \\
& = \alpha u(\phi^* f) + \beta v(\phi^* f) \\
& \stackrel{(4-1-2)}{=} \alpha (\phi_* u^a)(f) + \beta (\phi_* v^a)(f) .
\end{aligned}$$

(式中 u 和 v 的矢量上标 a 也可不写.) 因此 $\phi_* : V_p \rightarrow V_{\phi(p)}$ 是线性映射, 满足

$$\phi_*(\alpha u^a + \beta v^a) = \alpha \phi_* u^a + \beta \phi_* v^a .$$

(b) 定理 4-1-2 的证明. 令 $p \equiv C(t_0) \in M$, $\phi(p) \equiv \phi(C(t_0)) \in N$. $\forall f \in \mathcal{F}_N$ 有

$$\begin{aligned}
& [(\phi_* T^a)(f)]|_{\phi(C(t_0))} = [(\phi_* T^a)(f)]|_{\phi(p)} \\
& \stackrel{\text{定义 } 2}{=} [T(\phi^* f)]|_p = [T(\phi^* f)]|_{C(t_0)} = [T(\phi^* f|_{C(t)})]|_{t=t_0} \\
& \stackrel{\text{定义 } 1}{=} [T(f|_{\phi(C(t))})]|_{t=t_0} = T(f(\phi(C(t))))|_{t=t_0} \\
& = \left. \frac{d(f \circ \phi(C(t)))}{dt} \right|_{t=t_0} .
\end{aligned}$$

根据 §2.2 定义 6 式 (2-2-6), 等式右边定义出曲线 $\phi(C(t))$ 的切矢. 因此 M 上的曲线 $C(t)$ 的切矢 T^a 在 N 上的像 $\phi_* T^a$, 是 M 上的曲线 $C(t)$ 在 N 上的像 $\phi(C(t))$ 的切矢.

(c) 定理 4-1-3 的证明. 在证明此定理前, 须先证明式 (4-1-4) 和 (4-1-5). 根据定理 4-1-2: 曲线切矢的推前像等于曲线推前像的切矢. 考虑 M 上 q 点的一个局部坐标系 $\{x'^\mu\}$, 它被 ϕ 映射到 N 上 $\phi(q)$ 点的一个局部坐标系 $\{y^\mu\}$, 即满足 $x'^\mu(q) = y^\mu(\phi(q))$. 因此 $\{x'^\mu\}$ 系的坐标线被映射为 $\{y^\mu\}$ 系的坐标线, 注意到这两组坐标线在 q 和 $\phi(q)$ 点的切矢分别为 $(\partial/\partial x'^\mu)^a|_q$ 和 $(\partial/\partial y^\mu)^a|_{\phi(q)}$, 由定理 4-1-2 知 $\phi_*[(\partial/\partial x'^\mu)^a|_q] = (\partial/\partial y^\mu)^a|_{\phi(q)}$, 此即式 (4-1-4). 另一方面,

$$\begin{aligned}
\delta^\mu{}_\nu & = \phi_*[\delta^\mu{}_\nu] = \phi_*[(dx'^\mu)_a|_q(\partial/\partial x'^\nu)^a|_q] \stackrel{(4-1-10)}{=} \phi_*[(dx'^\mu)_a|_q]\phi_*[(\partial/\partial x'^\nu)^a|_q] \\
& \stackrel{(4-1-4)}{=} \phi_*[(dx'^\mu)_a|_q](\partial/\partial y^\nu)^a|_{\phi(q)} ,
\end{aligned}$$

两边作用 $(dy^\nu)_b|_{\phi(q)}$ 得

$$\delta^\mu_\nu (dy^\nu)_b|_{\phi(q)} = \phi_*[(dx'^\mu)_a|_q](\partial/\partial y^\nu)^a|_{\phi(q)}(dy^\nu)_b|_{\phi(q)} = \phi_*[(dx'^\mu)_a|_q]\delta^a_b,$$

此即式 (4-1-5) $\phi_*[(dx'^\mu)_b|_q] = (dy^\mu)_b|_{\phi(q)}$. 这两个关系也可等价地写成

$$\phi^*[(\partial/\partial y^\mu)^a|_{\phi(q)}] = (\partial/\partial x'^\mu)^a|_q, \quad \phi^*[(dy^\mu)_a|_{\phi(q)}] = (dx'^\mu)_a|_q.$$

对于 $p \in M$ 点的 $T \in \mathcal{F}_M(k, l)$, 经过微分同胚的推前映射后变为 $\phi(p) \in N$ 点的 $\phi_*T \in \mathcal{F}_N(k, l)$, 于是用坐标系展开成分量形式:

$$\begin{aligned} (\phi_*T)^{\mu_1 \cdots \mu_k}_{\nu_1 \cdots \nu_l}|_{\phi(p)} &= (\phi_*T)^{a_1 \cdots a_k}_{b_1 \cdots b_l} (dy^{\mu_1})_{a_1}|_{\phi(p)} \cdots (dy^{\mu_k})_{a_k}|_{\phi(p)} \\ &\quad \left(\frac{\partial}{\partial y^{\nu_1}}\right)^{b_1}|_{\phi(p)} \cdots \left(\frac{\partial}{\partial y^{\nu_l}}\right)^{b_l}|_{\phi(p)} \\ &= T^{a_1 \cdots a_k}_{b_1 \cdots b_l} \phi^*[(dy^{\mu_1})_{a_1}|_{\phi(p)}] \cdots \phi^*[(dy^{\mu_k})_{a_k}|_{\phi(p)}] \\ &\quad \phi^*\left[\left(\frac{\partial}{\partial y^{\nu_1}}\right)^{b_1}|_{\phi(p)}\right] \cdots \phi^*\left[\left(\frac{\partial}{\partial y^{\nu_l}}\right)^{b_l}|_{\phi(p)}\right] \\ &= T^{a_1 \cdots a_k}_{b_1 \cdots b_l} (dx'^{\mu_1})_{a_1}|_p \cdots (dx'^{\mu_k})_{a_k}|_p \\ &\quad \left(\frac{\partial}{\partial x'^{\nu_1}}\right)^{b_1}|_p \cdots \left(\frac{\partial}{\partial x'^{\nu_l}}\right)^{b_l}|_p \\ &= T'^{\mu_1 \cdots \mu_k}_{\nu_1 \cdots \nu_l}|_p. \end{aligned}$$

可见式中左边是新点 $\phi(p)$ 的新张量 ϕ_*T 在 (老) 坐标系 $\{y^\mu\}$ 的分量, 右边是老点 p 的老张量 T 在新坐标系 $\{x'^\mu\}$ 的分量.

3. 设 $\phi: M \rightarrow N$ 为光滑映射, $p \in M$, $\{y^\mu\}$ 是 $\phi(p)$ 点某邻域上的坐标, 试证

$$(\phi_*v)^a = v(\phi^*y^\mu)(\partial/\partial y^\mu)^a, \quad \forall v^a \in V_p.$$

证 因 $(\phi_*v)^a \in V_{\phi(p)}$, 以坐标系 $\{y^\mu\}$ 展开有

$$(\phi_*v)^a|_{\phi(p)} = (\phi_*v)^\mu|_{\phi(p)} \left(\frac{\partial}{\partial y^\mu}\right)^a|_{\phi(p)}.$$

另一方面,

$$\begin{aligned} (\phi_*v)^\mu|_{\phi(p)} &\stackrel{(4-1-6)}{=} v'^\mu|_p = v^a(dx'^\mu)_a|_p = v^a\phi^*[(dy^\mu)_a|_{\phi(p)}] \\ &= v^a[d(\phi^*y^\mu)]_a = v(\phi^*y^\mu). \end{aligned}$$

4. 设 M, N 是流形, $\phi: M \rightarrow N$ 是微分同胚, $p \in M, q \equiv \phi(p)$, 试证推前映射 $\phi_*: V_p \rightarrow V_q$ 是同构映射.

证 微分同胚映射是一一到上的映射, 所以推前映射也是一一到上的. 两个矢量空间一一到上的线性映射即是同构映射.

5. 设 M, N, Q 是流形, $\phi : M \rightarrow N$ 和 $\psi : N \rightarrow Q$ 是光滑映射.

(a) 试证 $(\psi \circ \phi)^* f = (\phi^* \circ \psi^*) f, \forall f \in \mathcal{F}_Q$.

(b) 试证 $(\psi \circ \phi)_* v^a = \psi_*(\phi_* v^a), \forall p \in M, v^a \in V_p$.

(c) 把 $(\psi \circ \phi)^*$ 和 $\phi^* \circ \psi^*$ 都看作由 $\mathcal{F}_Q(0, l)$ 到 $\mathcal{F}_M(0, l)$ 的映射, 试证

$$(\psi \circ \phi)^* = \phi^* \circ \psi^* .$$

证 对于复合映射 $\psi \circ \phi : p \mapsto q = \phi(p) \mapsto r = \psi(q) = \psi(\phi(p))$, 其中 $p \in M, q \in N, r \in Q$.

(a) $\forall f \in \mathcal{F}_Q$, 根据定义 1, 拉回映射 $(\psi \circ \phi)^* f|_p = f|_{\psi(\phi(p))}$. 另一方面, $\psi^* f|_q = f|_{\psi(q)} = g|_q$ 和 $\phi^* g|_p = g|_{\phi(p)}$, 所以有 $(\phi^* \circ \psi^*) f|_p = \phi^* g|_p = g|_{\phi(p)} = f|_{\psi(\phi(p))}$. 因此 $(\psi \circ \phi)^* f|_p = (\phi^* \circ \psi^*) f|_p = f|_{\psi(\phi(p))}$.

或者利用关系式 $\phi^* f = f \circ \phi$, 现在有

$$(\psi \circ \phi)^* f = f \circ (\psi \circ \phi) = (f \circ \psi) \circ \phi = (\psi^* f) \circ \phi = \phi^* \circ (\psi^* f) = (\phi^* \circ \psi^*) f .$$

(b) 根据定义 2, $\forall f \in \mathcal{F}_Q$, 推前映射 $[(\psi \circ \phi)_* v^a](f)|_{\psi(\phi(p))} = v[(\psi \circ \phi)^* f]|_p = v(f)|_{\psi(\phi(p))}$, 最后一步利用了 (a) 的结果. 另一方面, 同样根据定义 2:

$$\begin{aligned} [\psi_*(\phi_* v^a)](f)|_{\psi(\phi(p))} &= (\phi_* v^a)(\psi^* f)|_{\phi(p)} = v(\phi^*(\psi^* f))|_p = v((\phi^* \circ \psi^*) f)|_p \\ &= v(f)|_{\psi(\phi(p))} . \end{aligned}$$

因此有 $[(\psi \circ \phi)_* v^a](f) = [\psi_*(\phi_* v^a)](f)$, 导致 $(\psi \circ \phi)_* v^a = \psi_*(\phi_* v^a)$ 成立.

(c) $\forall T \in \mathcal{F}_Q(0, l), \psi^* T \in \mathcal{F}_N(0, l), \phi^*(\psi^* T) = (\phi^* \circ \psi^*) T \in \mathcal{F}_M(0, l)$. 根据定义 3 式 (4-1-3) 有

$$\begin{aligned} [(\psi \circ \phi)^* T]_{a_1 \dots a_l}|_p (v_1)^{a_1} \dots (v_l)^{a_l} &= T_{a_1 \dots a_l}|_{\psi(\phi(p))} [(\psi \circ \phi)_* v_1]^{a_1} \dots [(\psi \circ \phi)_* v_l]^{a_l} \\ &\stackrel{(b)}{=} T_{a_1 \dots a_l}|_{\psi(\phi(p))} [\psi_*(\phi_* v_1)]^{a_1} \dots [\psi_*(\phi_* v_l)]^{a_l} , \end{aligned}$$

其中 $v_1, \dots, v_l \in V_p$. 另一方面, 同样根据定义 3 式 (4-1-3),

$$\begin{aligned} [(\phi^* \circ \psi^*) T]_{a_1 \dots a_l}|_p (v_1)^{a_1} \dots (v_l)^{a_l} &= [\phi^*(\psi^* T)]_{a_1 \dots a_l}|_p (v_1)^{a_1} \dots (v_l)^{a_l} \\ &= (\psi^* T)_{a_1 \dots a_l}|_{\phi(p)} (\phi_* v_1)^{a_1} \dots (\phi_* v_l)^{a_l} \\ &= T_{a_1 \dots a_l}|_{\psi(\phi(p))} [\psi_*(\phi_* v_1)]^{a_1} \dots [\psi_*(\phi_* v_l)]^{a_l} . \end{aligned}$$

因此有

$$[(\psi \circ \phi)^* T]_{a_1 \dots a_l}|_p (v_1)^{a_1} \dots (v_l)^{a_l} = [(\phi^* \circ \psi^*) T]_{a_1 \dots a_l}|_p (v_1)^{a_1} \dots (v_l)^{a_l} ,$$

导致 $(\psi \circ \phi)^* = \phi^* \circ \psi^*$.

6. 设 $\phi : M \rightarrow N$ 是微分同胚, v^a, u^a 是 M 上矢量场, 试证 $\phi_*([v, u]^a) = [\phi_*v, \phi_*u]^a$, 其中 $[v, u]^a$ 代表对易子.

证 由定义 2

$$\phi_*[v, u](f) = [v, u](\phi^*f) = v(u(\phi^*f)) - u(v(\phi^*f)).$$

而

$$\begin{aligned} [\phi_*v, \phi_*u](f) &= \phi_*v(\phi_*u(f)) - \phi_*u(\phi_*v(f)) \stackrel{(4-1-9)}{=} \phi_*(vu)(f) - \phi_*(uv)(f) \\ &\stackrel{(4-1-2)}{=} (vu)(\phi^*f) - (uv)(\phi^*f) = v(u(\phi^*f)) - u(v(\phi^*f)). \end{aligned}$$

因此 $\phi_*[v, u](f) = [\phi_*v, \phi_*u](f), \forall f \in \mathcal{F}_N$, 给出

$$\phi_*[v, u] = [\phi_*v, \phi_*u].$$

7. 试证定理 4-2-4.

证 首先, 因为李导数满足莱布尼茨律, 故有

$$\mathcal{L}_v(\omega_a v^a) = (\mathcal{L}_v \omega_a) v^a + \omega_a (\mathcal{L}_v v^a) = v^a \mathcal{L}_v \omega_a,$$

其中利用了定理 4-2-3 式 (4-2-6) $\mathcal{L}_v v^a = [v, v]^a = 0$. 另一方面, 因 $\omega_a v^a$ 是标量场, 故由定理 4-2-1 式 (4-2-2) 有

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_v(\omega_a v^a) &= v(\omega_a v^a) \stackrel{\S 3.1 \text{ 定义 } 1(d)}{=} v^b \nabla_b (\omega_a v^a) = v^b [(\nabla_b \omega_a) v^a + \omega_a (\nabla_b v^a)] \\ &= v^a v^b \nabla_b \omega_a + v^b \omega_a \nabla_b v^a = v^a [v^b \nabla_b \omega_a + \omega_b \nabla_a v^b]. \end{aligned}$$

比较以上两式, 注意到 v^a 的任意性, 所以有

$$\mathcal{L}_v \omega_a = v^b \nabla_b \omega_a + \omega_b \nabla_a v^b.$$

注意这里的 ∇_a 可以是任一无挠导数算符.

8. 设 $v^a \in \mathcal{F}_M(1, 0), \omega_a \in \mathcal{F}_M(0, 1)$, 试证对任一坐标系 $\{x^\mu\}$ 有

$$(\mathcal{L}_v \omega)_\mu = v^\nu \partial \omega_\mu / \partial x^\nu + \omega_\nu \partial v^\nu / \partial x^\mu. \quad \text{提示: 用式 (4-2-7) 并令其 } \nabla_a \text{ 为 } \partial_a.$$

证 以坐标基底展开

$$\begin{aligned} (\mathcal{L}_v \omega)_\mu &= (\partial / \partial x^\mu)^a (\mathcal{L}_v \omega)_a \\ &\stackrel{(4-2-7)}{=} (\partial / \partial x^\mu)^a (v^b \partial_b \omega_a + \omega_b \partial_a v^b) \\ &\stackrel{(3-1-10)}{=} v^b \partial_b [(\partial / \partial x^\mu)^a \omega_a] + \omega_b [(\partial / \partial x^\mu)^a \partial_a] v^b \\ &= v^b \partial_b \omega_\mu + \omega_b \partial_\mu v^b \\ &\stackrel{(3-1-10)}{=} v^\nu \partial_\nu \omega_\mu + \omega_\nu \partial_\mu v^\nu \\ &= v^\nu \partial \omega_\mu / \partial x^\nu + \omega_\nu \partial v^\nu / \partial x^\mu. \end{aligned}$$

9. 设 $u^a, v^a \in \mathcal{F}_M(1, 0)$, 则下式作用于任意张量场都成立

$$[\mathcal{L}_v, \mathcal{L}_u] = \mathcal{L}_{[v, u]} \quad (\text{其中 } [\mathcal{L}_v, \mathcal{L}_u] \equiv \mathcal{L}_v \mathcal{L}_u - \mathcal{L}_u \mathcal{L}_v).$$

试就作用对象为 $f \in \mathcal{F}_M$ 和 $w^a \in \mathcal{F}_M(1, 0)$ 的情况给出证明. 提示: 当作用对象为 w^a 时可用雅可比恒等式 (第 2 章习题 8).

证 (a) 作用于标量场 f :

$$\begin{aligned} [\mathcal{L}_v, \mathcal{L}_u](f) &= (\mathcal{L}_v \mathcal{L}_u - \mathcal{L}_u \mathcal{L}_v)(f) \\ &= \mathcal{L}_v \mathcal{L}_u(f) - \mathcal{L}_u \mathcal{L}_v(f) \\ &= \mathcal{L}_v(\mathcal{L}_u f) - \mathcal{L}_u(\mathcal{L}_v f) \\ &\stackrel{(4-2-2)}{=} \mathcal{L}_v(u(f)) - \mathcal{L}_u(v(f)) \\ &\stackrel{(4-2-2)}{=} v(u(f)) - u(v(f)) \\ &\stackrel{(2-2-9)}{=} [v, u](f) \\ &\stackrel{(4-2-2)}{=} \mathcal{L}_{[v, u]}(f). \end{aligned}$$

(b) 作用于矢量场 w^a :

$$\begin{aligned} [\mathcal{L}_v, \mathcal{L}_u](w^a) &= (\mathcal{L}_v \mathcal{L}_u - \mathcal{L}_u \mathcal{L}_v)(w^a) \\ &= \mathcal{L}_v \mathcal{L}_u(w^a) - \mathcal{L}_u \mathcal{L}_v(w^a) \\ &= \mathcal{L}_v(\mathcal{L}_u w^a) - \mathcal{L}_u(\mathcal{L}_v w^a) \\ &\stackrel{(4-2-6)}{=} \mathcal{L}_v([u, w]^a) - \mathcal{L}_u([v, w]^a) \\ &\stackrel{(4-2-6)}{=} [v, [u, w]]^a - [u, [v, w]]^a \\ &= ([v, [u, w]]^a + [u, [w, v]]^a + [w, [v, u]]^a) - [w, [v, u]]^a \\ &= -[w, [v, u]]^a \\ &= [[v, u], w]^a \\ &\stackrel{(4-2-6)}{=} \mathcal{L}_{[v, u]}(w^a), \end{aligned}$$

其中倒数第四步用了雅可比恒等式.

(c) 作用于对偶矢量场 ω_a . 注意到

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_v \mathcal{L}_u(\omega_a) &= \mathcal{L}_v(\mathcal{L}_u \omega_a) \\ &\stackrel{(4-2-7)}{=} \mathcal{L}_v(u^b \nabla_b \omega_a + \omega_b \nabla_a u^b) \\ &\stackrel{(4-2-7)}{=} v^c \nabla_c (u^b \nabla_b \omega_a + \omega_b \nabla_a u^b) + (u^b \nabla_b \omega_c + \omega_b \nabla_c u^b) \nabla_a v^c \\ &= v^c \nabla_c u^b \nabla_b \omega_a + v^c u^b \nabla_c \nabla_b \omega_a + v^c \nabla_c \omega_b \nabla_a u^b + v^c \omega_b \nabla_c \nabla_a u^b \\ &\quad + u^b \nabla_b \omega_c \nabla_a v^c + \omega_b \nabla_c u^b \nabla_a v^c \\ &= v^c \nabla_c u^b \nabla_b \omega_a + v^c u^b \nabla_c \nabla_b \omega_a + v^c \nabla_a u^b \nabla_b \omega_c + v^c \omega_b \nabla_c \nabla_a u^b \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& +u^b \nabla_a v^c \nabla_b \omega_c + \omega_b \nabla_c u^b \nabla_a v^c \\
= & v^c u^b \nabla_c \nabla_b \omega_a + v^c \nabla_c u^b \nabla_b \omega_a + v^c \nabla_a u^b \nabla_c \omega_b + u^b \nabla_a v^c \nabla_b \omega_c \\
& +v^c \omega_b \nabla_c \nabla_a u^b + \omega_b \nabla_c u^b \nabla_a v^c,
\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}_u \mathcal{L}_v(\omega_a) &= u^c v^b \nabla_c \nabla_b \omega_a + u^c \nabla_c v^b \nabla_b \omega_a + u^c \nabla_a v^b \nabla_c \omega_b + v^b \nabla_a u^c \nabla_b \omega_c \\
&+ u^c \omega_b \nabla_c \nabla_a v^b + \omega_b \nabla_c v^b \nabla_a u^c \\
= & v^c u^b \nabla_b \nabla_c \omega_a + u^c \nabla_c v^b \nabla_b \omega_a + u^b \nabla_a v^c \nabla_b \omega_c + v^c \nabla_a u^b \nabla_c \omega_b \\
&+ u^c \omega_b \nabla_c \nabla_a v^b + \omega_b \nabla_c v^b \nabla_a u^c.
\end{aligned}$$

上两式相减, 第一、三、四项相互抵消, 得

$$\begin{aligned}
[\mathcal{L}_v, \mathcal{L}_u](\omega_a) &= \mathcal{L}_v \mathcal{L}_u(\omega_a) - \mathcal{L}_u \mathcal{L}_v(\omega_a) \\
&= (v^c \nabla_c u^b - u^c \nabla_c v^b) \nabla_b \omega_a \\
&\quad + \omega_b (v^c \nabla_c \nabla_a u^b - u^c \nabla_c \nabla_a v^b) + \omega_b (\nabla_a v^c \nabla_c u^b - \nabla_a u^c \nabla_c v^b) \\
&= (v^c \nabla_c u^b - u^c \nabla_c v^b) \nabla_b \omega_a + \omega_b \nabla_a (v^c \nabla_c u^b - u^c \nabla_c v^b) \\
&\stackrel{(4-2-6')}{=} [v, u]^b \nabla_b \omega_a + \omega_b \nabla_a [v, u]^b \\
&\stackrel{(4-2-7)}{=} \mathcal{L}_{[v, u]}(\omega_a).
\end{aligned}$$

10. 设 F_{ab} 是 4 维闵氏空间上的反对称张量场, 其在洛伦兹坐标系 $\{t, x, y, z\}$ 的分量为 $F_{01} = -F_{13} = x\rho^{-1}$, $F_{02} = -F_{23} = y\rho^{-1}$, $F_{03} = F_{12} = 0$, 其中 $\rho \equiv (x^2 + y^2)^{1/2}$. 试证 F_{ab} 有旋转对称性, 即 $\mathcal{L}_v F_{ab} = 0$, 其中 $v^a = -y(\partial/\partial x)^a + x(\partial/\partial y)^a$.

证 根据定理 4-2-5 式 (4-2-8),

$$\mathcal{L}_v F_{ab} = v^c \nabla_c F_{ab} + F_{cb} \nabla_a v^c + F_{ac} \nabla_b v^c.$$

因为这里的导数算符 ∇_a 可以任意, 所以选普通导数 ∂_a , 于是上式的分量式为

$$\mathcal{L}_v F_{\mu\nu} = v^\sigma \partial_\sigma F_{\mu\nu} + F_{\sigma\nu} \partial_\mu v^\sigma + F_{\mu\sigma} \partial_\nu v^\sigma.$$

于是有

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}_v F_{01} &= v^\sigma \partial_\sigma F_{01} + F_{\sigma 1} \partial_0 v^\sigma + F_{0\sigma} \partial_1 v^\sigma \\
&= (v^1 \partial_1 F_{01} + v^2 \partial_2 F_{01}) + 0 + F_{02} \partial_1 v^2 \\
&= (-y) \frac{\partial}{\partial x} (x\rho^{-1}) + x \frac{\partial}{\partial y} (x\rho^{-1}) + (y\rho^{-1}) \frac{\partial}{\partial x} (x) \\
&= -y\rho^{-1} - yx \left(-\frac{1}{2} \rho^{-3/2} 2x \right) + x^2 \left(-\frac{1}{2} \rho^{-3/2} 2y \right) + y\rho^{-1} \\
&= -y\rho^{-1} + yx^2 \rho^{-3/2} - x^2 y \rho^{-3/2} + y\rho^{-1} \\
&= 0,
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}_v F_{02} &= v^\sigma \partial_\sigma F_{02} + F_{\sigma 2} \partial_0 v^\sigma + F_{0\sigma} \partial_2 v^\sigma \\
&= (v^1 \partial_1 F_{02} + v^2 \partial_2 F_{02}) + 0 + F_{01} \partial_2 v^1 \\
&= (-y) \frac{\partial}{\partial x} (y \rho^{-1}) + x \frac{\partial}{\partial y} (y \rho^{-1}) + (x \rho^{-1}) \frac{\partial}{\partial y} (-y) \\
&= -y^2 \left(-\frac{1}{2} \rho^{-3/2} 2x \right) + x \rho^{-1} + xy \left(-\frac{1}{2} \rho^{-3/2} 2y \right) - x \rho^{-1} \\
&= xy^2 \rho^{-3/2} + x \rho^{-1} - xy^2 \rho^{-3/2} - x \rho^{-1} \\
&= 0, \\
\mathcal{L}_v F_{03} &= \mathcal{L}_v(0) = 0, \\
\mathcal{L}_v F_{12} &= \mathcal{L}_v(0) = 0, \\
\mathcal{L}_v F_{13} &= v^\sigma \partial_\sigma F_{13} + F_{\sigma 3} \partial_1 v^\sigma + F_{1\sigma} \partial_3 v^\sigma \\
&= (v^1 \partial_1 F_{13} + v^2 \partial_2 F_{13}) + F_{23} \partial_1 v^2 + 0 \\
&= -(v^1 \partial_1 F_{01} + v^2 \partial_2 F_{01}) - F_{02} \partial_1 v^2 \\
&= -\mathcal{L}_v F_{01} = 0, \\
\mathcal{L}_v F_{23} &= v^\sigma \partial_\sigma F_{23} + F_{\sigma 3} \partial_2 v^\sigma + F_{2\sigma} \partial_3 v^\sigma \\
&= (v^1 \partial_1 F_{23} + v^2 \partial_2 F_{23}) + F_{13} \partial_2 v^1 + 0 \\
&= -(v^1 \partial_1 F_{02} + v^2 \partial_2 F_{02}) - F_{01} \partial_2 v^1 \\
&= -\mathcal{L}_v F_{02} = 0.
\end{aligned}$$

因此对 $v^a = -y(\partial/\partial x)^a + x(\partial/\partial y)^a$ 有 $\mathcal{L}_v F_{ab} = 0$.

11. 设 ξ^a 是 (M, g_{ab}) 中的 Killing 矢量场, ∇_a 与 g_{ab} 适配, 试证 $\nabla_a \xi^a = 0$.

证 注意到 $\nabla_a \xi^a = \nabla_a (g^{ab} \xi_b) = \xi_b \nabla_a g^{ab} + g^{ab} \nabla_a \xi_b$. 其中第一项因 ∇_a 与 g_{ab} 的适配性有 $\nabla_a g^{bc} = 0$ (见 §3.2.2 例 1 前的证明), 于是 $\nabla_a g^{ab} = 0$. 第二项 $g^{ab} \nabla_a \xi_b = g^{(ab)} \nabla_{(a} \xi_{b)} \stackrel{\text{定理 2-6-2(a)}}{=} g^{(ab)} \nabla_{(a} \xi_{b)} \stackrel{\text{定理 4-3-1}}{=} 0$. 因此 $\nabla_a \xi^a = 0$.

12. 设 ξ^a 是 (M, g_{ab}) 中的 Killing 矢量场, $\phi: M \rightarrow N$ 【似应为 M 】是等度规映射, 试证 $\phi_* \xi^a$ 也是 (M, g_{ab}) 中的 Killing 矢量场. 提示: 利用习题 5(c) 的结论.

证 设 (M, g_{ab}) 上的 Killing 矢量场 ξ^a 给出的单参微分同胚群为 ψ , 其群元为 ψ_t , t 为 ξ^a 的积分曲线上的参数. 根据 Killing 矢量场的定义 (§4.3 定义 2) 以及李导数的定义 (§4.2 定义 1), 我们有

$$\mathcal{L}_\xi g_{ab} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} (\psi_t^* g_{ab} - g_{ab}) = 0.$$

现在要证的是如果 $\phi: M \rightarrow M$ 是等度规映射, 即满足 $\phi^* g_{ab} = g_{ab}$ (§4.3 定义 1), 那么有 $\mathcal{L}_{\phi_* \xi} g_{ab} = 0$, 即 $\phi_* \xi^a$ 也是 Killing 矢量场. 首先我们证明矢量场 $\phi_* \xi^a$ 给出的单参微分同胚群为 $\phi \circ \psi_t$. 根据定理 4-2-1 式 (4-2-2), $\mathcal{L}_{\phi_* \xi} = (\phi_* \xi)(f)$,

$\forall f \in \mathcal{F}_M$. 而由推前映射的定义式 (4-1-2) 有 $(\phi_*\xi)(f) = \xi(\phi^*f) = \mathcal{L}_\xi(\phi^*f)$. 将此结果代回李导数的定义式 (4-2-1) 得

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_{\phi_*\xi}f &= \mathcal{L}_\xi(\phi^*f) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} [\psi_t^*(\phi^*f) - f] = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} [(\psi_t^* \circ \phi^*)f - f] \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} [(\phi \circ \psi_t)^*f - f],\end{aligned}$$

其中最后一步利用了习题 5(c) 的结论 $(\psi_t^* \circ \phi^*) = (\phi \circ \psi_t)^*$. 因为 f 为任意函数, 于是看出由 $\phi_*\xi$ 生成的单参微分同胚群元为 $\phi \circ \psi_t$. 最后

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_{\phi_*\xi}g_{ab} &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} [(\phi \circ \psi_t)^*g_{ab} - g_{ab}] = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} [(\psi_t^* \circ \phi^*)g_{ab} - g_{ab}] \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} [\psi_t^*(\phi^*g_{ab}) - g_{ab}] = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} [\psi_t^*(g_{ab}) - g_{ab}] \\ &= \mathcal{L}_\xi g_{ab} = 0,\end{aligned}$$

其中利用了等度规映射 $\phi^*g_{ab} = g_{ab}$ 和 ξ 的 Killing 性 $\mathcal{L}_\xi g_{ab} = 0$.

13. 设 ξ^a, η^a 是 (M, g_{ab}) 的 Killing 矢量场, 试证其对易子 $[\xi, \eta]^a$ 也是 Killing 矢量场. 注: 此结论使得 M 上全体 Killing 矢量场的集合不但是矢量空间, 而且是李代数 (详见下册附录 G).

证 根据习题 9 的结果, 我们有

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_{[\xi, \eta]}g_{ab} &= [\mathcal{L}_\xi, \mathcal{L}_\eta]g_{ab} = \mathcal{L}_\xi \mathcal{L}_\eta g_{ab} - \mathcal{L}_\eta \mathcal{L}_\xi g_{ab} \\ &\stackrel{\text{定义 2}}{=} \mathcal{L}_\xi(0) - \mathcal{L}_\eta(0) = 0,\end{aligned}$$

因此由定义 2 知, $[\xi, \eta]^a$ 也是 Killing 矢量场. 或者直接验证方程 (4-3-1):

$$\begin{aligned}\nabla_a[\xi, \eta]_b + \nabla_b[\xi, \eta]_a &= \nabla_a[\xi^c \nabla_c \eta_b - \eta^c \nabla_c \xi_b] + \nabla_b[\xi^c \nabla_c \eta_a - \eta^c \nabla_c \xi_a] \\ &\stackrel{(4-3-1)}{=} \nabla_a[-\xi^c \nabla_b \eta_c + \eta^c \nabla_b \xi_c] + \nabla_b[-\xi^c \nabla_a \eta_c + \eta^c \nabla_a \xi_c] \\ &= \nabla_a \eta^c \nabla_b \xi_c + \eta^c \nabla_a \nabla_b \xi_c - \nabla_a \xi^c \nabla_b \eta_c - \xi^c \nabla_a \nabla_b \eta_c \\ &\quad + \nabla_b \eta^c \nabla_a \xi_c + \eta^c \nabla_b \nabla_a \xi_c - \nabla_b \xi^c \nabla_a \eta_c - \xi^c \nabla_b \nabla_a \eta_c \\ &= (\nabla_a \eta^c \nabla_b \xi_c - \nabla_b \xi^c \nabla_a \eta_c) + (\nabla_b \eta^c \nabla_a \xi_c - \nabla_a \xi^c \nabla_b \eta_c) \\ &\quad + \eta^c (\nabla_a \nabla_b + \nabla_b \nabla_a) \xi_c - \xi^c (\nabla_a \nabla_b + \nabla_b \nabla_a) \eta_c \\ &= (\nabla_a \eta^c \nabla_b \xi_c - \nabla_b \xi^c \nabla_a \eta_c) + (\nabla_b \eta^c \nabla_a \xi_c - \nabla_a \xi^c \nabla_b \eta_c) \\ &\quad + \eta^c (\nabla_a \nabla_b + \nabla_b \nabla_a) \xi_c - \xi^c (\nabla_a \nabla_b + \nabla_b \nabla_a) \eta_c \\ &= \eta^c (\nabla_a \nabla_b + \nabla_b \nabla_a) \xi_c - \xi^c (\nabla_a \nabla_b + \nabla_b \nabla_a) \eta_c.\end{aligned}$$

利用 Killing 性得

$$\begin{aligned}(\nabla_a \nabla_b + \nabla_b \nabla_a) \xi_c &= -\nabla_a \nabla_c \xi_b - \nabla_b \nabla_c \xi_a \\ &= -\nabla_c \nabla_a \xi_b - R_{acbd} \xi^d - \nabla_c \nabla_b \xi_a - R_{bcad} \xi^d\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= -\nabla_c \nabla_a \xi_b - R_{acbd} \xi^d - \nabla_c \nabla_b \xi_a - R_{bcad} \xi^d \\
&= -\nabla_c (\nabla_a \xi_b + \nabla_b \xi_a) - R_{acbd} \xi^d - R_{bcad} \xi^d \\
&= -R_{acbd} \xi^d - R_{bcad} \xi^d, \\
(\nabla_a \nabla_b + \nabla_b \nabla_a) \eta_c &= -R_{acbd} \eta^d - R_{bcad} \eta^d.
\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}
\nabla_a [\xi, \eta]_b + \nabla_b [\xi, \eta]_a &= \eta^c (-R_{acbd} \xi^d - R_{bcad} \xi^d) - \xi^c (-R_{acbd} \eta^d - R_{bcad} \eta^d) \\
&= -R_{acbd} \eta^c \xi^d - R_{bcad} \eta^c \xi^d + R_{acbd} \xi^c \eta^d + R_{bcad} \xi^c \eta^d \\
&= -R_{adb c} \eta^d \xi^c - R_{bdac} \eta^d \xi^c + R_{acbd} \xi^c \eta^d + R_{bcad} \xi^c \eta^d \\
&= (R_{bcad} - R_{adb c}) \xi^c \eta^d + (R_{acbd} - R_{bdac}) \xi^c \eta^d \\
&\stackrel{(3-4-10)}{=} 0.
\end{aligned}$$

14. 设 ξ^a 是广义黎曼空间 (M, g_{ab}) 的 Killing 矢量场, $R_{abc}{}^d$ 是 g_{ab} 的黎曼曲率张量.

(a) 试证 $\nabla_a \nabla_b \xi_c = -R_{bca}{}^d \xi_d$. 注: 此式对证明定理 4-3-4 有重要用处. 提示: 由 $R_{abc}{}^d$ 的定义以及 Killing 方程 (4-3-1) 可知 $\nabla_a \nabla_b \xi_c + \nabla_b \nabla_c \xi_a = R_{abc}{}^d \xi_d$. 此式称为第一式. 作指标替换 $a \mapsto b, b \mapsto c, c \mapsto a$ 得第二式, 再替换一次得第三式. 以第一、二式之和减第三式并利用式 (3-4-7) 便得证.

(b) 利用 (a) 的结果证明 $\nabla^a \nabla_a \xi_c = -R_{cd} \xi^d$, 其中 R_{cd} 是里奇张量.

证 (a) 根据黎曼曲率张量的定义 (3-4-3) 和 Killing 矢量场满足的方程 (4-3-1) 有

$$(\nabla_a \nabla_b - \nabla_b \nabla_a) \xi_c = \nabla_a \nabla_b \xi_c - \nabla_b \nabla_a \xi_c = \nabla_a \nabla_b \xi_c + \nabla_b \nabla_c \xi_a = R_{abc}{}^d \xi_d.$$

作指标替换 $a \mapsto b, b \mapsto c, c \mapsto a$ 得

$$\nabla_b \nabla_c \xi_a + \nabla_c \nabla_a \xi_b = R_{bca}{}^d \xi_d,$$

再替换一次得

$$\nabla_c \nabla_a \xi_b + \nabla_a \nabla_b \xi_c = R_{cab}{}^d \xi_d.$$

第一、二式之和减第三式得

$$\begin{aligned}
&\nabla_a \nabla_b \xi_c + \nabla_b \nabla_c \xi_a + \nabla_b \nabla_c \xi_a + \nabla_c \nabla_a \xi_b - \nabla_c \nabla_a \xi_b - \nabla_a \nabla_b \xi_c \\
&= 2\nabla_b \nabla_c \xi_a \\
&= R_{abc}{}^d \xi_d + R_{bca}{}^d \xi_d - R_{cab}{}^d \xi_d = (R_{abc}{}^d + R_{bca}{}^d + R_{cab}{}^d) \xi_d - 2R_{cab}{}^d \xi_d \\
&= -2R_{cab}{}^d \xi_d,
\end{aligned}$$

最后一步用到了黎曼曲率张量的循环恒等式 (3-4-7). 于是 $\nabla_b \nabla_c \xi_a = -R_{cab}{}^d \xi_d$, 此即 $\nabla_a \nabla_b \xi_c = -R_{bca}{}^d \xi_d$.

(b) 上式两边作用 g^{ab} :

$$g^{ab}\nabla_a\nabla_b\xi_c = \nabla^b\nabla_b\xi_c = -g^{ab}R_{bca}{}^d\xi_d = -g^{ab}R_{bcad}\xi^d = -R_{cd}\xi^d,$$

其中最后一步用到了黎曼曲率张量性质 (3-4-6)、(3-4-9) 和里奇张量的定义:

$$g^{ab}R_{bcad} = g^{ab}R_{cbda} = R_{cd}.$$

因此有 $\nabla^a\nabla_a\xi_c = -R_{cd}\xi^d$.

~15. 验证式 (4-3-3) 中的 $(\partial/\partial\eta)^a$ 的确满足 Killing 方程 (4-3-1).

证 欲证 $\xi^a = (\partial/\partial\eta)^a = t(\partial/\partial x)^a + x(\partial/\partial t)^a$ 满足 Killing 方程 (4-3-1): $\nabla_a\xi_b + \nabla_b\xi_a = 0$, 注意到与闵氏度规 η_{ab} 相适配的导数算符是普通导数 ∂_a , 故只须证 $\partial_a\xi_b + \partial_b\xi_a = 0$. 我们看其相应的分量方程: $\partial_\mu\xi_\nu + \partial_\nu\xi_\mu = 0$, 这里 $\mu, \nu = 0, 1$ 代表 t, x . 显然 $\xi^0 = x$ 和 $\xi^1 = t$. 于是,

$$\begin{aligned} (\mu, \nu) = (0, 0): \quad & \partial_0\xi_0 + \partial_0\xi_0 = 2\partial_0\xi_0 = 2\partial_0(\eta_{0\rho}\xi^\rho) = 2\partial_0(-\xi^0) \\ & = -2\partial_0\xi^0 = -2\frac{\partial}{\partial t}(x) = 0, \\ (\mu, \nu) = (0, 1) \text{ 或 } (1, 0): \quad & \partial_0\xi_1 + \partial_1\xi_0 = \partial_0(\eta_{1\rho}\xi^\rho) + \partial_1(\eta_{0\rho}\xi^\rho) \\ & = \partial_0(\xi^1) + \partial_1(-\xi^0) = \frac{\partial}{\partial t}(t) - \frac{\partial}{\partial x}(x) = 0, \\ (\mu, \nu) = (1, 1): \quad & \partial_1\xi_1 + \partial_1\xi_1 = 2\partial_1\xi_1 = 2\partial_1(\eta_{1\rho}\xi^\rho) = 2\partial_1(\xi^1) \\ & = 2\frac{\partial}{\partial x}(t) = 0 \end{aligned}$$

故知张量式 $\partial_a\xi_b + \partial_b\xi_a = 0$ 成立.

~16. 找出 2 维欧氏空间中由 $R^a = x(\partial/\partial y)^a - y(\partial/\partial x)^a$ 生出的单参等度规群的任一元素 ϕ_α 诱导的坐标变换.

解 矢量场 $R^a = x(\partial/\partial y)^a - y(\partial/\partial x)^a$ 的积分曲线的参数方程为 $\frac{dx^\mu(t)}{dt} = R^\mu$ ($\mu = 1, 2 = x, y$), 即

$$\frac{dx^1(t)}{dt} = \frac{dx(t)}{dt} = R^1 = -y(t), \quad \frac{dx^2(t)}{dt} = \frac{dy(t)}{dt} = R^2 = x(t).$$

$\forall p \in \mathbb{R}^2$, 设 $C(t)$ 是满足 $p = C(0)$ 的积分曲线, 即 $x(0) = x_p, y(0) = y_p$, 则容易看出以上方程的特解 [即该线的参数式] 为

$$x(t) = x_p \cos t - y_p \sin t, \quad y(t) = x_p \sin t + y_p \cos t.$$

设 $q \equiv \phi_\alpha(p)$, 则 q 就是 $C(t)$ 上参数值 $t = \alpha$ 的点, 即 $q = C(\alpha)$, 故由 ϕ_α 诱导的新坐标 x' 和 y' 满足

$$x'_p \equiv x_q = x_p \cos \alpha - y_p \sin \alpha, \quad y'_p \equiv y_q = x_p \sin \alpha + y_p \cos \alpha.$$

因 p 点任意, 故可去掉下标 p 而写成

$$x' = x \cos \alpha - y \sin \alpha, \quad y' = x \sin \alpha + y \cos \alpha.$$

此即熟知的二维平面旋转 (正交) 变换.

- *17. 设时空 (M, g_{ab}) 中的超曲面 $\phi[S]$ 上每点都有类光切矢而无类时切矢 (“切矢” 指切于 $\phi[S]$), 试证它必为类光超曲面. 提示: ①证明与类时矢量 t^a 正交的矢量必类空 [选正交归一基底 $\{(e_\mu)^a\}$ 使 $(e_0)^a = t^a$]; ②证明类时超曲面上每点都有类时切矢; ③由以上两点证明本命题.

证 ①首先我们证明与类时矢量正交的矢量必类空. 设矢量 t^a 类时, 有 $g_{ab}t^at^b < 0$. 如果矢量 v^a 与 t^a 正交, 即满足 $g_{ab}v^at^b = 0$, 则必有 $g_{ab}v^av^b > 0$. 设 n 维流形 M 的某一正交归一基底为 $\{(e_\mu)^a\}$. 不失一般性可选 $(e_0)^a = t^a$, 于是 $g_{ab}(e_0)^a(e_0)^b = g_{00} < 0$. v^a 在该基底的展开式 $v^a = v^\mu(e_\mu)^a$, 正交性给出

$$g_{ab}v^at^b = g_{ab}v^\mu(e_\mu)^a(e_0)^b = g_{\mu 0}v^\mu = g_{00}v^0 = 0.$$

因此知道 $v^0 = 0$. 而

$$\begin{aligned} g_{ab}v^av^b &= g_{ab}v^\mu(e_\mu)^av^\nu(e_\nu)^b = g_{\mu\nu}v^\mu v^\nu \\ &= g_{00}v^0v^0 + g_{\mu 0}v^\mu v^0 + g_{0\mu}v^0v^\mu + g_{ij}v^iv^j \\ &= g_{ij}v^iv^j = g_{ii}(v^i)^2 > 0, \end{aligned}$$

其中利用了 $n-1$ 维的空间部分度规张量的正定性. 因此得到结论. 由此证明也可以知道与类空矢量正交的矢量未必一定类时, 其原因在于时间只有一维而空间可以高于一维, 此时类空矢量之间可以相互正交.

②其次我们证明类时超曲面上每点都有类时切矢. 所谓类时超曲面, 根据定义 4 是它的法矢处处类空. 设类时超曲面 $\phi[S]$ 上 q 点的切空间为 W_q . 因为它的类空法矢 $n^a \notin W_q$, 故 W_q 的基底中必有一个类时, 它就是超曲面的类时切矢.

③如果超曲面 $\phi[S]$ 上每点都有类光切矢而无类时切矢, 那么它既不可能是类时超曲面也不可能是类空超曲面, 因而只可能是类光超曲面. 如果它是类时超曲面, 那么根据②, 它每点都有类时切矢, 这与题设每点都无类时切矢不符. 如果它是类空超曲面, 那么它每点的法矢都是类时的, 而法矢的性质告诉我们超曲面的切矢都与它正交, 所以从①的结论我们知道这些切矢都是类空的而没有类光的和类时的, 但题设中有类光切矢, 所以也有矛盾. 唯一的可能性就是该超曲面是类光超曲面.

第 5 章 “微分形式及其积分” 习题

~1. 在定理 5-1-3 证明中补证 $\{(e^1)_a \wedge (e^2)_b, (e^2)_a \wedge (e^3)_b, (e^3)_a \wedge (e^1)_b\}$ 线性独立.

证 假设它们不线性独立, 则必有非零的常数 a, b, c 满足

$$a(e^1)_a \wedge (e^2)_b + b(e^2)_a \wedge (e^3)_b + c(e^3)_a \wedge (e^1)_b = 0.$$

以 $(e_1)^a(e_2)^b$ 作用上式, 易得

$$\begin{aligned} (e_1)^a(e_2)^b(e^1)_a \wedge (e^2)_b &= (e_1)^a(e_2)^b[(e^1)_a(e^2)_b - (e^2)_a(e^1)_b] = 1, \\ (e_1)^a(e_2)^b(e^2)_a \wedge (e^3)_b &= (e_1)^a(e_2)^b[(e^2)_a(e^3)_b - (e^3)_a(e^2)_b] = 0, \\ (e_1)^a(e_2)^b(e^3)_a \wedge (e^1)_b &= (e_1)^a(e_2)^b[(e^3)_a(e^1)_b - (e^1)_a(e^3)_b] = 0, \end{aligned}$$

因此上式变为 $a = 0$. 同理可知 $b = c = 0$. 它们彼此线性独立.

~2. 设 V 为矢量空间, $\{(e^1)_a, (e^2)_a, (e^3)_a, (e^4)_a\}$ 是 V^* 的基底, 写出 $\omega_a \in \Lambda(1)$, $\omega_{abc} \in \Lambda(3)$ 和 $\omega_{abcd} \in \Lambda(4)$ 在此基底的展开式, 说明展开系数 (如 ω_{12}) 的定义.

解 分别有 $C_4^1 = 4, C_4^3 = 4, C_4^4 = 1$ 项:

$$\begin{aligned} \omega_a &= \omega_1(e^1)_a + \omega_2(e^2)_a + \omega_3(e^3)_a + \omega_4(e^4)_a, \\ \omega_{abc} &= \omega_{123}(e^1)_a \wedge (e^2)_b \wedge (e^3)_c + \omega_{124}(e^1)_a \wedge (e^2)_b \wedge (e^4)_c \\ &\quad + \omega_{134}(e^1)_a \wedge (e^3)_b \wedge (e^4)_c + \omega_{234}(e^2)_a \wedge (e^3)_b \wedge (e^4)_c, \\ \omega_{abcd} &= \omega_{1234}(e^1)_a \wedge (e^2)_b \wedge (e^3)_c \wedge (e^4)_d. \end{aligned}$$

展开系数的定义如

$$\omega_{134} = \omega_{abc}(e_1)^a(e_3)^b(e_4)^c.$$

~3. 用数学归纳法证明 $(\omega^1)_{a_1} \wedge \cdots \wedge (\omega^l)_{a_l} = l!(\omega^1)_{[a_1} \cdots (\omega^l)_{a_l]}$, 其中 $(\omega^1)_a, \cdots, (\omega^l)_a$ 为任意对偶矢量.

证 设对 l 成立 $(\omega^1)_{a_1} \wedge \cdots \wedge (\omega^l)_{a_l} = l!(\omega^1)_{[a_1} \cdots (\omega^l)_{a_l]}$, 这是个 l 形式, 令它等于 $F_{a_1 \cdots a_l}^{1 \cdots l}$, 于是根据楔形积的定义 2 式 (5-1-2) 和结合律有

$$\begin{aligned} (\omega^1)_{a_1} \wedge \cdots \wedge (\omega^l)_{a_l} \wedge (\omega^{l+1})_{a_{l+1}} &= F_{a_1 \cdots a_l}^{1 \cdots l} \wedge (\omega^{l+1})_{a_{l+1}} \\ &\stackrel{(5-1-2)}{=} \frac{(l+1)!}{l! 1!} F_{[a_1 \cdots a_l}^{1 \cdots l} (\omega^{l+1})_{a_{l+1}]} \\ &= (l+1)l!(\omega^1)_{[a_1} \cdots (\omega^l)_{a_l]} (\omega^{l+1})_{a_{l+1}} \\ &= (l+1)!(\omega^1)_{[a_1} \cdots (\omega^l)_{a_l]} (\omega^{l+1})_{a_{l+1}}], \end{aligned}$$

最后一步用到了定理 2-6-2(b)—括号内的同种子括号可随意增删. 因此它对 $l+1$ 成立. 事实上此式可由定义 2 式 (5-1-2) 直接写出:

$$(\omega^1)_{a_1} \wedge \cdots \wedge (\omega^l)_{a_l} = \frac{(1 + \cdots + 1)!}{1! \cdots 1!} (\omega^1)_{[a_1} \cdots (\omega^l)_{a_l]} = l!(\omega^1)_{[a_1} \cdots (\omega^l)_{a_l]}.$$

4. 试证定理 5-1-4.

证 因 $\omega_{a_1 \dots a_l} = \sum_C \omega_{\mu_1 \dots \mu_l} (dx^{\mu_1})_{a_1} \wedge \dots \wedge (dx^{\mu_l})_{a_l}$, 其中展开系数 $\omega_{\mu_1 \dots \mu_l}$ 为 0 形式, 展开基矢 $(dx^{\mu_1})_{a_1} \wedge \dots \wedge (dx^{\mu_l})_{a_l}$ 为 l 形式. 由外微分算符定义 3 式 (5-1-11) 知

$$d_b \omega_{a_1 \dots a_l} = (d\omega)_{ba_1 \dots a_l} = (l+1) \nabla_{[b} \omega_{a_1 \dots a_l]} .$$

取式中的 ∇_b 为普通导数 ∂_b , 注意到式 (3-1-10) 的结果: $\partial_b (dx^\mu)_a = 0$, 有 $\partial_b [(dx^{\mu_1})_{a_1} \wedge \dots \wedge (dx^{\mu_l})_{a_l}] = 0$. 于是

$$\begin{aligned} \nabla_b \omega_{a_1 \dots a_l} &= \partial_b \omega_{a_1 \dots a_l} = \sum_C \partial_b [\omega_{\mu_1 \dots \mu_l} (dx^{\mu_1})_{a_1} \wedge \dots \wedge (dx^{\mu_l})_{a_l}] \\ &= \sum_C (\partial_b \omega_{\mu_1 \dots \mu_l}) (dx^{\mu_1})_{a_1} \wedge \dots \wedge (dx^{\mu_l})_{a_l} \\ &\stackrel{(3-1-2)}{=} \sum_C (d\omega_{\mu_1 \dots \mu_l})_b (dx^{\mu_1})_{a_1} \wedge \dots \wedge (dx^{\mu_l})_{a_l} . \end{aligned}$$

式中 $(d\omega_{\mu_1 \dots \mu_l})_b$ 为 1 形式而 $(dx^{\mu_1})_{a_1} \wedge \dots \wedge (dx^{\mu_l})_{a_l}$ 为 l 形式. 于是根据楔形积的定义 2 式 (5-1-2) 有

$$\begin{aligned} &\sum_C (d\omega_{\mu_1 \dots \mu_l})_b \wedge (dx^{\mu_1})_{a_1} \wedge \dots \wedge (dx^{\mu_l})_{a_l} \\ &= \sum_C \frac{(1+l)!}{1!l!} (d\omega_{\mu_1 \dots \mu_l})_{[b} (dx^{\mu_1})_{a_1} \wedge \dots \wedge (dx^{\mu_l})_{a_l]} \\ &= (l+1) \sum_C (d\omega_{\mu_1 \dots \mu_l})_{[b} (dx^{\mu_1})_{a_1} \wedge \dots \wedge (dx^{\mu_l})_{a_l]} \\ &= (l+1) \nabla_{[b} \omega_{a_1 \dots a_l]} . \end{aligned}$$

结合外微分算符的定义 3 式 (5-1-11) 即得定理 5-1-4 式 (5-1-12):

$$(d\omega)_{ba_1 \dots a_l} = (l+1) \nabla_{[b} \omega_{a_1 \dots a_l]} = \sum_C (d\omega_{\mu_1 \dots \mu_l})_b \wedge (dx^{\mu_1})_{a_1} \wedge \dots \wedge (dx^{\mu_l})_{a_l} .$$

5. 设 ω 是 1 形式场, u, v 是矢量场, 试证 $d\omega(u, v) = u(\omega(v)) - v(\omega(u)) - \omega([u, v])$. 等式左边代表 $d\omega$ 对 u, v 的作用结果, 即 $(d\omega)_{ab} u^a v^b$.

证 由定义 3 式 (5-1-11): $(d\omega)_{ab} = 2\nabla_{[a} \omega_{b]} = \nabla_a \omega_b - \nabla_b \omega_a$. 于是

$$\text{左边} = (\nabla_a \omega_b - \nabla_b \omega_a) u^a v^b = u^a v^b \nabla_a \omega_b - u^a v^b \nabla_b \omega_a .$$

右边中

$$\begin{aligned} u(\omega(v)) &= u(\omega_b v^b) = u^a \nabla_a (\omega_b v^b) = u^a v^b \nabla_a \omega_b + u^a \omega_b \nabla_a v^b , \\ v(\omega(u)) &= v(\omega_b u^b) = v^a \nabla_a (\omega_b u^b) = v^a u^b \nabla_a \omega_b + v^a \omega_b \nabla_a u^b , \\ \omega([u, v]) &= \omega_b (u^a \nabla_a v^b - v^a \nabla_a u^b) = u^a \omega_b \nabla_a v^b - v^a \omega_b \nabla_a u^b . \end{aligned}$$

于是

$$\text{右边} = u^a v^b \nabla_a \omega_b - v^a u^b \nabla_a \omega_b = u^a v^b \nabla_a \omega_b - u^a v^b \nabla_b \omega_a = \text{左边} .$$

~6. 设 v^b 和 $\omega_{a_1 \dots a_l}$ 分别是流形 M 上的矢量场和 l 形式场, 试证

$$(a) \mathcal{L}_v \omega_{a_1 \dots a_l} = d_{a_1} (v^b \omega_{ba_2 \dots a_l}) + (d\omega)_{ba_1 \dots a_l} v^b.$$

注: 令 $\mu_{a_2 \dots a_l} \equiv v^b \omega_{ba_2 \dots a_l}$, 则 $d_{a_1} \mu_{a_2 \dots a_l}$ 是指 $(d\mu)_{a_1 a_2 \dots a_l}$.

(b) $\mathcal{L}_v d\omega = d\mathcal{L}_v \omega$ (这本身就是一个很有用的命题).

提示: (1) 证 (a) 时可先证 $l = 2$ 的特例, 找到感觉后不难推广至一般情况.

(2) 利用 (a) 的结果将使 (b) 的证明变得十分简单.

证 (a) 先看 $l = 2$ 的特例. 欲证等式的左边根据定理 4-2-5 式 (4-2-8) 为

$$\mathcal{L}_v \omega_{a_1 a_2} = v^b \nabla_b \omega_{a_1 a_2} + \omega_{ba_2} \nabla_{a_1} v^b + \omega_{a_1 b} \nabla_{a_2} v^b.$$

右边第一项为

$$\begin{aligned} d_{a_1} (v^b \omega_{ba_2}) &\stackrel{(5-1-11)}{=} 2 \nabla_{[a_1} (v^b \omega_{|b|a_2]}) = \nabla_{a_1} (v^b \omega_{ba_2}) - \nabla_{a_2} (v^b \omega_{ba_1}) \\ &\stackrel{(5-1-1)}{=} \nabla_{a_1} (v^b \omega_{ba_2}) + \nabla_{a_2} (v^b \omega_{a_1 b}) \\ &= \omega_{ba_2} \nabla_{a_1} v^b + v^b \nabla_{a_1} \omega_{ba_2} + \omega_{a_1 b} \nabla_{a_2} v^b + v^b \nabla_{a_2} \omega_{a_1 b} \\ &\stackrel{(5-1-1)}{=} \omega_{ba_2} \nabla_{a_1} v^b + \omega_{a_1 b} \nabla_{a_2} v^b + v^b \nabla_{a_1} \omega_{ba_2} - v^b \nabla_{a_2} \omega_{ba_1} \\ &= \omega_{ba_2} \nabla_{a_1} v^b + \omega_{a_1 b} \nabla_{a_2} v^b + 2v^b \nabla_{[a_1} \omega_{|b|a_2]}, \end{aligned}$$

右边第二项为

$$\begin{aligned} (d\omega)_{ba_1 a_2} v^b &\stackrel{(5-1-11)}{=} 3 \nabla_{[b} \omega_{a_1 a_2]} v^b = 3v^b \nabla_{[b} \omega_{a_1 a_2]} \\ &= 3 \frac{1}{3!} v^b [\nabla_b \omega_{a_1 a_2} + \nabla_{a_1} \omega_{a_2 b} + \nabla_{a_2} \omega_{ba_1} - \nabla_b \omega_{a_2 a_1} - \nabla_{a_2} \omega_{a_1 b} - \nabla_{a_1} \omega_{ba_2}] \\ &\stackrel{(5-1-1)}{=} \frac{1}{2} v^b [2 \nabla_b \omega_{a_1 a_2} - 2 \nabla_{a_1} \omega_{ba_2} + 2 \nabla_{a_2} \omega_{ba_1}] \\ &= v^b \nabla_b \omega_{a_1 a_2} - 2v^b \nabla_{[a_1} \omega_{|b|a_2]}. \end{aligned}$$

因此相加后

$$\text{右边} = \omega_{ba_2} \nabla_{a_1} v^b + \omega_{a_1 b} \nabla_{a_2} v^b + v^b \nabla_b \omega_{a_1 a_2} = \text{左边}.$$

下面看一般 l 情形. 首先左边根据定理 4-2-5 式 (4-2-8) 为

$$\mathcal{L}_v \omega_{a_1 \dots a_l} = v^b \nabla_b \omega_{a_1 \dots a_l} + \sum_{j=1}^l \omega_{a_1 \dots a_{j-1} b a_{j+1} \dots a_l} \nabla_{a_j} v^b.$$

右边第一项为

$$d_{a_1} (v^b \omega_{ba_2 \dots a_l}) \stackrel{(5-1-11)}{=} l \nabla_{[a_1} (v^b \omega_{|b|a_2 \dots a_l]}).$$

注意到

$$[a_1 a_2 \dots a_l] = \frac{1}{l!} \sum_{\pi} \delta_{\pi} a_{\pi(1)} a_{\pi(2)} \dots a_{\pi(l)}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{l} \left\{ a_1 [a_2 a_3 \cdots a_l] - a_2 [a_1 a_3 \cdots a_l] + \cdots + (-1)^{l-1} a_l [a_1 a_2 \cdots a_{l-1}] \right\} \\
&= \frac{1}{l} \sum_{j=1}^l (-1)^{j-1} a_j [a_1 \cdots a_{j-1} a_{j+1} \cdots a_l] ,
\end{aligned}$$

所以有

$$\begin{aligned}
d_{a_1}(v^b \omega_{ba_2 \cdots a_l}) &= l \nabla_{[a_1}(v^b \omega_{b|a_2 \cdots a_l]) \\
&= l \frac{1}{l} \sum_{j=1}^l (-1)^{j-1} \nabla_{a_j}(v^b \omega_{b[a_1 \cdots a_{j-1} a_{j+1} \cdots a_l]}) \\
&= \sum_{j=1}^l (-1)^{j-1} \nabla_{a_j}(v^b \omega_{[ba_1 \cdots a_{j-1} a_{j+1} \cdots a_l]}) \\
&\stackrel{(5-1-1)}{=} \sum_{j=1}^l \nabla_{a_j}(v^b \omega_{[a_1 \cdots a_{j-1} ba_{j+1} \cdots a_l]}) \\
&= \sum_{j=1}^l \nabla_{a_j}(v^b \omega_{a_1 \cdots a_{j-1} ba_{j+1} \cdots a_l}) \\
&= \sum_{j=1}^l \omega_{a_1 \cdots a_{j-1} ba_{j+1} \cdots a_l} \nabla_{a_j} v^b + v^b \sum_{j=1}^l \nabla_{a_j} \omega_{a_1 \cdots a_{j-1} ba_{j+1} \cdots a_l} .
\end{aligned}$$

右边第二项为

$$(d\omega)_{ba_1 \cdots a_l} v^b \stackrel{(5-1-11)}{=} (l+1) \nabla_{[b} \omega_{a_1 a_2 \cdots a_l]} v^b = v^b (l+1) \nabla_{[b} \omega_{a_1 a_2 \cdots a_l]} .$$

与前面类似，现在注意到

$$\begin{aligned}
&[ba_1 a_2 \cdots a_l] \\
&= \frac{1}{l+1} \left\{ b[a_1 a_2 \cdots a_l] - a_1[ba_2 \cdots a_l] + \cdots + (-1)^l a_l[ba_1 a_2 \cdots a_{l-1}] \right\} \\
&= \frac{1}{l+1} b[a_1 a_2 \cdots a_l] - \frac{1}{l+1} \left\{ a_1[ba_2 \cdots a_l] - \cdots - (-1)^l a_l[ba_1 a_2 \cdots a_{l-1}] \right\} \\
&= \frac{1}{l+1} b[a_1 a_2 \cdots a_l] - \frac{1}{l+1} \sum_{j=1}^l (-1)^{j-1} a_j [ba_1 \cdots a_{j-1} a_{j+1} \cdots a_l] \\
&= \frac{1}{l+1} b[a_1 a_2 \cdots a_l] - \frac{1}{l+1} \sum_{j=1}^l a_j [a_1 \cdots a_{j-1} ba_{j+1} \cdots a_l] ,
\end{aligned}$$

所以有

$$\begin{aligned}
(d\omega)_{ba_1 \cdots a_l} v^b &= v^b (l+1) \nabla_{[b} \omega_{a_1 a_2 \cdots a_l]} \\
&= v^b \nabla_b \omega_{[a_1 a_2 \cdots a_l]} - v^b \sum_{j=1}^l \nabla_{a_j} \omega_{[a_1 \cdots a_{j-1} ba_{j+1} \cdots a_l]} \\
&= v^b \nabla_b \omega_{a_1 a_2 \cdots a_l} - v^b \sum_{j=1}^l \nabla_{a_j} \omega_{a_1 \cdots a_{j-1} ba_{j+1} \cdots a_l} .
\end{aligned}$$

因此待证式的

$$\begin{aligned}
 \text{右边} &= d_{a_1}(v^b \omega_{ba_2 \dots a_l}) + (d\omega)_{ba_1 \dots a_l} v^b \\
 &= \sum_{j=1}^l \omega_{a_1 \dots a_{j-1} ba_{j+1} \dots a_l} \nabla_{a_j} v^b + v^b \sum_{j=1}^l \nabla_{a_j} \omega_{a_1 \dots a_{j-1} ba_{j+1} \dots a_l} \\
 &\quad + v^b \nabla_b \omega_{a_1 a_2 \dots a_l} - v^b \sum_{j=1}^l \nabla_{a_j} \omega_{a_1 \dots a_{j-1} ba_{j+1} \dots a_l} \\
 &= \sum_{j=1}^l \omega_{a_1 \dots a_{j-1} ba_{j+1} \dots a_l} \nabla_{a_j} v^b + v^b \nabla_b \omega_{a_1 a_2 \dots a_l} = \text{左边}.
 \end{aligned}$$

(b) 欲证式的左边:

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}_v d\omega &= \mathcal{L}_v (d\omega)_{ba_1 \dots a_l} \\
 &\stackrel{(a)}{=} d_b [v^c (d\omega)_{ca_1 \dots a_l}] + [d(d\omega)]_{cba_1 \dots a_l} v^c \\
 &= d_b [v^c (d\omega)_{ca_1 \dots a_l}],
 \end{aligned}$$

最后一步用了定理 5-1-5 的结果 $d \circ d = 0$. 欲证式的右边:

$$\begin{aligned}
 d\mathcal{L}_v \omega &\stackrel{(a)}{=} d_b [d_{a_1} (v^c \omega_{ca_2 \dots a_l}) + (d\omega)_{ca_1 \dots a_l} v^c] \\
 &= d_b [v^c (d\omega)_{ca_1 \dots a_l}],
 \end{aligned}$$

这里同样用到了 $d \circ d = 0$. 因此得

$$\mathcal{L}_v d\omega = d\mathcal{L}_v \omega = d_b [v^c (d\omega)_{ca_1 \dots a_l}].$$

7. 设 O 是 n 维流形 M 上坐标系 $\{x^\mu\}$ 的坐标域 (且 O 同胚于 RR^n), ω_a 是 O 上的 1 形式场, 试证

$$\partial \omega_\mu / \partial x^\nu = \partial \omega_\nu / \partial x^\mu \quad (\mu, \nu = 1, \dots, n) \text{ 当且仅当存在 } f: O \rightarrow RR \text{ 使 } \nabla_a f = \omega_a.$$

提示: 仿照 §5.1 推论 5-1-6 的证明.

证 (A) [充分性] 如果 1 形式 $\omega_a = \nabla_a f = d_a f$ 是恰当的, 那么根据定理 5-1-5 它必是闭的, 有 $0 = d_b \omega_a = 2\nabla_{[b} \omega_{a]} = \nabla_b \omega_a - \nabla_a \omega_b$, 即 $\nabla_b \omega_a = \nabla_a \omega_b$. 取 ∇_a 为普通导数 ∂_a , 则有 $\partial_b \omega_a = \partial_a \omega_b$. 用坐标系的分量表示就是 $\partial_\nu \omega_\mu = \partial_\mu \omega_\nu$, 即 $\partial \omega_\mu / \partial x^\nu = \partial \omega_\nu / \partial x^\mu$.

(B) [必要性] 如果 $\partial_\nu \omega_\mu = \partial_\mu \omega_\nu$, 于是有 $\partial_b \omega_a = \partial_a \omega_b$ 和 $d_b \omega_a = \nabla_b \omega_a - \nabla_a \omega_b = 0$, 即 ω_a 是闭的. 对 RR^n 流形定理 5-1-5 的逆定理成立, 所以它必是恰当的, 即可表示为 $\omega_a = d_a f = \nabla_a f$.

8. 设 $\{x, y, z\}$ 和 $\{r, \theta, \varphi\}$ 分别为 3 维欧氏空间的笛卡尔坐标系和球坐标系, 写出 $dr \wedge d\theta \wedge d\varphi$ 用 $dx \wedge dy \wedge dz$ 的表达式.

解 由 $x = r \sin \theta \cos \varphi$, $y = r \sin \theta \sin \varphi$, $z = r \cos \theta$, 得

$$\begin{aligned} dx &= \sin \theta \cos \varphi dr + r \cos \theta \cos \varphi d\theta - r \sin \theta \sin \varphi d\varphi, \\ dy &= \sin \theta \sin \varphi dr + r \cos \theta \sin \varphi d\theta + r \sin \theta \cos \varphi d\varphi, \\ dz &= \cos \theta dr - r \sin \theta d\theta. \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} dx \wedge dy &= \sin \theta \cos \varphi dr \wedge [r \cos \theta \sin \varphi d\theta + r \sin \theta \cos \varphi d\varphi] \\ &\quad + r \cos \theta \cos \varphi d\theta \wedge [\sin \theta \sin \varphi dr + r \sin \theta \cos \varphi d\varphi] \\ &\quad - r \sin \theta \sin \varphi d\varphi \wedge [\sin \theta \sin \varphi dr + r \cos \theta \sin \varphi d\theta] \\ &= r \sin \theta \cos \theta \sin \varphi \cos \varphi dr \wedge d\theta + r \sin^2 \theta \cos^2 \varphi dr \wedge d\varphi \\ &\quad + r \sin \theta \cos \theta \sin \varphi \cos \varphi d\theta \wedge dr + r^2 \sin \theta \cos \theta \cos^2 \varphi d\theta \wedge d\varphi \\ &\quad - r \sin^2 \theta \sin^2 \varphi d\varphi \wedge dr - r^2 \sin \theta \cos \theta \sin^2 \varphi d\varphi \wedge d\theta \\ &= r \sin^2 \theta dr \wedge d\varphi + r^2 \sin \theta \cos \theta d\theta \wedge d\varphi, \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} dx \wedge dy \wedge dz &= [r \sin^2 \theta dr \wedge d\varphi + r^2 \sin \theta \cos \theta d\theta \wedge d\varphi] \wedge [\cos \theta dr - r \sin \theta d\theta] \\ &= -r^2 \sin^3 \theta dr \wedge d\varphi \wedge d\theta + r^2 \sin \theta \cos^2 \theta d\theta \wedge d\varphi \wedge dr \\ &= r^2 \sin \theta dr \wedge d\theta \wedge d\varphi. \end{aligned}$$

反过来写就是

$$\begin{aligned} dr \wedge d\theta \wedge d\varphi &= \frac{1}{r^2 \sin \theta} dx \wedge dy \wedge dz \\ &= \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \sqrt{x^2 + y^2}} dx \wedge dy \wedge dz. \end{aligned}$$

~9. 连通流形 M 配以洛伦兹号差的度规场 g_{ab} 叫 **时空** (spacetime). 设 F_{ab} 是任意 4 维时空的 2 形式场 (第 6 章将看到电磁场张量 F_{ab} 就是一个 2 形式场), 试证

$$\frac{1}{2}(F_{ac}F_b{}^c + {}^*F_{ac}{}^*F_b{}^c) = F_{ac}F_b{}^c - \frac{1}{4}g_{ab}F_{cd}F^{cd},$$

其中 ${}^*F_{ac} \equiv ({}^*F)_{ac}$, ${}^*F_b{}^c = g^{ac}{}^*F_{ba}$ (此式对研究电磁场有帮助).

证 首先, 对于 4 维流形 (闵氏时空), 2 形式场 F_{ab} 的微分对偶形式仍是 2 形式场:

$${}^*F_{ac} \stackrel{(5-6-1)}{=} \frac{1}{2} F^{de} \varepsilon_{deac},$$

于是有 ${}^*F^{fc} = \frac{1}{2} F_{gh} \varepsilon^{ghfc}$ 和

$${}^*F_b{}^c = g_{bf} {}^*F^{fc} = \frac{1}{2} g_{bf} F_{gh} \varepsilon^{ghfc}.$$

计算等式左边的第二项:

$$\begin{aligned}
{}^*F_{ac} {}^*F_b{}^c &= \left(\frac{1}{2} F^{de} \varepsilon_{deac}\right) \left(\frac{1}{2} g_{bf} F_{gh} \varepsilon^{ghfc}\right) \\
&= \frac{1}{4} g_{bf} F^{de} F_{gh} [\varepsilon^{ghfc} \varepsilon_{deac}] \\
&\stackrel{(5-4-10)}{=} \frac{1}{4} g_{bf} F^{de} F_{gh} [(-1)^1 (4-3)! \delta_d^g \delta_e^h \delta^f{}_a] \\
&= -\frac{3}{2} F^{de} F_{gh} g_{fb} \delta_d^g \delta_e^h \delta^f{}_a \\
&\stackrel{(2-6-19)}{=} -\frac{3}{2} F^{de} F_{[gh} g_{f]b} \delta_d^g \delta_e^h \delta^f{}_a \\
&= -\frac{3}{2} F^{de} F_{[de} g_{a]b} \\
&= -\frac{3}{2} F^{de} \frac{1}{3} (F_{[de} g_{ab} + F_{[ad} g_{eb} + F_{[ea} g_{db}) \\
&\stackrel{(2-6-20)}{=} -\frac{1}{2} F^{de} (F_{de} g_{ab} + F_{ad} g_{eb} + F_{ea} g_{db}) \\
&= -\frac{1}{2} g_{ab} F_{de} F^{de} - \frac{1}{2} F_{ad} F^d{}_b - \frac{1}{2} F_{ea} F_b{}^e \\
&= -\frac{1}{2} g_{ab} F_{de} F^{de} + \frac{1}{2} F_{ad} F_b{}^d + \frac{1}{2} F_{ae} F_b{}^e \\
&= -\frac{1}{2} g_{ab} F_{cd} F^{cd} + F_{ac} F_b{}^c .
\end{aligned}$$

将此结果代入待证等式的左边:

$$\frac{1}{2} (F_{ac} F_b{}^c - \frac{1}{2} g_{ab} F_{cd} F^{cd} + F_{ac} F_b{}^c) = F_{ac} F_b{}^c - \frac{1}{4} g_{ab} F_{cd} F^{cd} .$$

等式成立.

- *10. 试证 $\hat{\varepsilon}_{a_1 \dots a_{n-1}} \equiv \pm n^b \hat{\varepsilon}_{ba_1 \dots a_{n-1}}$ 【应为 $\varepsilon_{ba_1 \dots a_{n-1}}$ 】 是 ∂N 上与诱导度规场 h_{ab} 相适配的体元.

证 即要证明 $\hat{\varepsilon}_{a_1 \dots a_{n-1}} = \pm n^b \varepsilon_{ba_1 \dots a_{n-1}}$ 满足式 (5-5-5):

$$\hat{\varepsilon}^{a_1 \dots a_{n-1}} \hat{\varepsilon}_{a_1 \dots a_{n-1}} = h^{a_1 b_1} \dots h^{a_{n-1} b_{n-1}} \hat{\varepsilon}_{b_1 \dots b_{n-1}} \hat{\varepsilon}_{a_1 \dots a_{n-1}} = (-1)^{\hat{s}} (n-1)! ,$$

其中 \hat{s} 为 N 上的度规 g_{ab} 在超曲面 ∂N 上的诱导度规 $h_{ab} = g_{ab} \mp n_a n_b$ 的对角元的负数的个数. 首先

$$\begin{aligned}
&h^{a_1 b_1} \dots h^{a_{n-1} b_{n-1}} \hat{\varepsilon}_{b_1 \dots b_{n-1}} \hat{\varepsilon}_{a_1 \dots a_{n-1}} \\
&= h^{a_1 b_1} \dots h^{a_{n-1} b_{n-1}} (\pm n^d \varepsilon_{db_1 \dots b_{n-1}}) (\pm n^c \varepsilon_{ca_1 \dots a_{n-1}}) \\
&= n^c n^d h^{a_1 b_1} \dots h^{a_{n-1} b_{n-1}} \varepsilon_{db_1 \dots b_{n-1}} \varepsilon_{ca_1 \dots a_{n-1}} \\
&= n^c n^d (g^{a_1 b_1} \mp n^{a_1} n^{b_1}) \dots (g^{a_{n-1} b_{n-1}} \mp n^{a_{n-1}} n^{b_{n-1}}) \varepsilon_{db_1 \dots b_{n-1}} \varepsilon_{ca_1 \dots a_{n-1}} .
\end{aligned}$$

很容易看出上式中的 $(g^{a_j b_j} \mp n^{a_j} n^{b_j})$ 中的 $n^{a_j} n^{b_j}$ 没有任何贡献, 因为乘开来后必有因子

$$n^c n^d n^{a_j} n^{b_j} \varepsilon_{db_1 \dots b_{n-1}} \varepsilon_{ca_1 \dots a_{n-1}} = n^c n^{a_j} \varepsilon_{ca_j \dots} n^d n^{b_j} \varepsilon_{db_j \dots}$$

$$\begin{aligned}
&= n^{(c} n^{a_j)} \varepsilon_{[ca_j \dots a_{n-1}]} n^{(d} n^{b_j)} \varepsilon_{[db_j \dots b_{n-1}]} \\
&\stackrel{(2-6-19)}{=} n^c n^{a_j} \varepsilon_{[(ca_j) \dots a_{n-1}]} n^d n^{b_j} \varepsilon_{[(db_j) \dots b_{n-1}]} \\
&\stackrel{(2-6-21)}{=} 0 .
\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}
&h^{a_1 b_1} \dots h^{a_{n-1} b_{n-1}} \hat{\varepsilon}_{b_1 \dots b_{n-1}} \hat{\varepsilon}_{a_1 \dots a_{n-1}} \\
&= n^c n^d g^{a_1 b_1} \dots g^{a_{n-1} b_{n-1}} \varepsilon_{db_1 \dots b_{n-1}} \varepsilon_{ca_1 \dots a_{n-1}} \\
&= n^c n_d \varepsilon^{da_1 \dots a_{n-1}} \varepsilon_{ca_1 \dots a_{n-1}} \\
&\stackrel{(5-4-10)}{=} n^c n_d (-1)^s (n-1)! \delta_c^d = n^c n_c (-1)^s (n-1)! .
\end{aligned}$$

令 $(-1)^{\hat{s}} \equiv n^c n_c (-1)^s$. 如果 ∂N 是类时超曲面, $n^c n_c = +1$, 这时 $\hat{s} = s$; 如果 ∂N 是类空超曲面, $n^c n_c = -1$, 这时 $\hat{s} = s - 1$ (见 §4.4 注 3 后的例子).

因此得到 $\hat{\varepsilon}^{a_1 \dots a_{n-1}} \hat{\varepsilon}_{a_1 \dots a_{n-1}} = (-1)^{\hat{s}} (n-1)!$, 超表面上的体元与超表面上的诱导度规相适配.

11. 试证定理 5-6-1 和 5-6-2.

证 定理 5-6-1 的证明. 由 §5.6 对偶微分形式的定义 1 式 (5-6-1), 对 l 形式 $\omega = \omega_{a_1 \dots a_l}$, 有

$$\begin{aligned}
{}^{**}\omega_{a_1 \dots a_l} &= \frac{1}{(n-l)!} {}^*\omega^{b_1 \dots b_{n-l}} \varepsilon_{b_1 \dots b_{n-l} a_1 \dots a_l} \\
&= \frac{1}{(n-l)!} \left[\frac{1}{l!} \omega_{c_1 \dots c_l} \varepsilon^{c_1 \dots c_l b_1 \dots b_{n-l}} \right] \varepsilon_{b_1 \dots b_{n-l} a_1 \dots a_l} \\
&= \frac{1}{(n-l)! l!} [\varepsilon^{c_1 \dots c_l b_1 \dots b_{n-l}} \varepsilon_{b_1 \dots b_{n-l} a_1 \dots a_l}] \omega_{c_1 \dots c_l} \\
&= \frac{1}{(n-l)! l!} (-1)^{l(n-l)} [\varepsilon^{b_1 \dots b_{n-l} c_1 \dots c_l} \varepsilon_{b_1 \dots b_{n-l} a_1 \dots a_l}] \omega_{c_1 \dots c_l} \\
&\stackrel{(5-4-10)}{=} \frac{1}{(n-l)! l!} (-1)^{l(n-l)} [(-1)^s l! (n-l)! \delta^{[c_1}_{a_1} \dots \delta^{c_l]}_{a_l}] \omega_{c_1 \dots c_l} \\
&= (-1)^{s+l(n-l)} \delta^{[c_1}_{a_1} \dots \delta^{c_l]}_{a_l} \omega_{c_1 \dots c_l} \\
&\stackrel{(2-6-19)}{=} (-1)^{s+l(n-l)} \delta^{c_1}_{a_1} \dots \delta^{c_l}_{a_l} \omega_{[c_1 \dots c_l]} \\
&= (-1)^{s+l(n-l)} \omega_{a_1 \dots a_l} ,
\end{aligned}$$

此即定理 5-6-1 式 (5-6-2)

$${}^{**}\omega = (-1)^{s+l(n-l)} \omega .$$

定理 5-6-2 的证明. 设 f 和 \vec{A} 是 3 维欧氏空间的函数和矢量场, 则

$$(a) \operatorname{grad} f = df, \quad (b) \operatorname{curl} \vec{A} = {}^*d\vec{A}, \quad (c) \operatorname{div} \vec{A} = {}^*d({}^*\vec{A}) .$$

(a) f 为 0 形式场, df 为 1 形式场, 有

$$(df)_a = \nabla_a f = \partial_a f = (\vec{\nabla} f)_a = (\text{grad } f)_a .$$

(b) A 为 1 形式场, dA 为 2 形式场, 故 $*dA$ 为 1 形式场. 由外微分定义式 (5-1-11)

$$(dA)_{ba} = d_b A_a = 2\nabla_{[b} A_{a]} = 2\partial_{[b} A_{a]} ,$$

以及对偶微分形式定义式 (5-6-1)

$$\begin{aligned} *(dA)_c &= \frac{1}{2!} (dA)^{ba} \varepsilon_{bac} = \frac{1}{2} 2\partial^{[b} A^{a]} \varepsilon_{bac} \\ &= \varepsilon_{abc} \partial^{[a} A^{b]} = \varepsilon_{[abc]} \partial^{[a} A^{b]} \\ &\stackrel{(2-6-19)}{=} \varepsilon_{[[ab]c]} \partial^a A^b \stackrel{(2-6-20)}{=} \varepsilon_{[abc]} \partial^a A^b \\ &= \varepsilon_{abc} \partial^a A^b \stackrel{(5-6-5)(c)}{=} (\vec{\nabla} \times \vec{A})_c \\ &= (\text{curl } \vec{A})_c . \end{aligned}$$

(c) A 为 1 形式场, $*A$ 为 2 形式场, $d(*A)$ 为 3 形式场, $*d(*A)$ 为 0 形式场 (标量场). 首先 A_a 的对偶微分形式

$$*A_{bc} \stackrel{(5-6-1)}{=} A^a \varepsilon_{abc} ,$$

它的外微分为

$$d(*A)_{dbc} \stackrel{(5-1-11)}{=} 3\partial_{[d} *A_{bc]} = 3\partial_{[d} A^a \varepsilon_{a|bc]} ,$$

再取对偶微分形式

$$\begin{aligned} *d(*A) &\stackrel{(5-6-1)}{=} \frac{1}{3!} d(*A)^{dbc} \varepsilon_{dbc} = \frac{1}{3!} \left(3\partial^{[d} A_a \varepsilon^{a|bc]} \right) \varepsilon_{dbc} \\ &= \frac{1}{2} \left(\partial^{[d} A_a \varepsilon^{a|bc]} \right) \varepsilon_{dbc} \stackrel{(5-4-6)}{=} \frac{1}{2} \partial^{[d} \left(A_a \varepsilon^{a|bc]} \varepsilon_{dbc} \right) \\ &\stackrel{(2-6-19)}{=} \frac{1}{2} \partial^d \left(A_a \varepsilon^{abc} \varepsilon_{[dbc]} \right) = \frac{1}{2} \partial^d \left(A_a \varepsilon^{abc} \varepsilon_{dbc} \right) \\ &\stackrel{(5-4-10)}{=} \frac{1}{2} \partial^d \left(A_a 2\delta^a_d \right) = \partial^a A_a = \partial_a A^a \\ &\stackrel{(5-6-5)(b)}{=} \vec{\nabla} \cdot \vec{A} = \text{div } \vec{A} . \end{aligned}$$

~12. 设 x, y, z 是 3 维欧氏空间的笛卡尔坐标, 试证

$$(a) *dx = dy \wedge dz ;$$

$$(b) *(dx \wedge dy \wedge dz) = 1 .$$

证 (a) 1 形式 $(dx)_a$ 的对偶微分形式

$$*(dx)_{bc} \stackrel{(5-6-1)}{=} (\partial/\partial x)^a \varepsilon_{abc} ,$$

而 3 维笛卡尔坐标系的适配体元 (右手) 为

$$\varepsilon_{abc} \stackrel{(5-4-4)}{=} (dx)_a \wedge (dy)_b \wedge (dz)_c = (dx \wedge dy \wedge dz)_{abc} ,$$

于是

$$*(dx)_{bc} = (\partial/\partial x)^a (dx \wedge dy \wedge dz)_{abc} \stackrel{(5-1-2)}{=} (\partial/\partial x)^a 3! (dx)_{[a} (dy)_b (dz)_{c]} .$$

而

$$[abc] = \frac{1}{3}(a[bc] + b[ca] + c[ab]) ,$$

利用 $(\partial/\partial x)^a (dx)_a = 1$ 和 $(\partial/\partial x)^a (dy)_a = (\partial/\partial x)^a (dz)_a = 0$ 得

$$\begin{aligned} *(dx)_{bc} &= 2(\partial/\partial x)^a [(dx)_a (dy)_{[b} (dz)_{c]} + (dx)_b (dy)_{[c} (dz)_{a]} + (dx)_c (dy)_{[a} (dz)_{b]}] \\ &= 2(dy)_{[b} (dz)_{c]} \stackrel{(5-1-2)}{=} (dy)_b \wedge (dz)_c = (dy \wedge dz)_{bc} , \end{aligned}$$

此即 $*dx = dy \wedge dz$.

(b) 3 形式 $(dx \wedge dy \wedge dz)_{abc} = (dx)_a \wedge (dy)_b \wedge (dz)_c$, 其实它就是 3 维笛卡尔坐标系的适配右手体元 ε_{abc} [见 (5-4-4) 式]. 其对偶微分形式为 0 形式:

$$\begin{aligned} *(dx \wedge dy \wedge dz) &\stackrel{(5-6-1)}{=} \frac{1}{3!} (\partial/\partial x)^a \wedge (\partial/\partial y)^b \wedge (\partial/\partial z)^c \varepsilon_{abc} \\ &\stackrel{(5-4-4)}{=} \frac{1}{3!} [(\partial/\partial x)^a \wedge (\partial/\partial y)^b \wedge (\partial/\partial z)^c] [(dx)_a \wedge (dy)_b \wedge (dz)_c] \\ &\stackrel{(5-1-2)}{=} 3! [(\partial/\partial x)^a (\partial/\partial y)^b (\partial/\partial z)^c] [(dx)_{[a} (dy)_b (dz)_{c]}] \\ &\stackrel{(2-6-19)}{=} 3! [(\partial/\partial x)^a (\partial/\partial y)^b (\partial/\partial z)^c] [(dx)_{[a} (dy)_b (dz)_{c]}] \\ &= 3! [(\partial/\partial y)^b (\partial/\partial z)^c] \frac{1}{3} [(dy)_{[b} (dz)_{c]}] \\ &= 2[(\partial/\partial z)^c] \frac{1}{2} [(dz)_c] \\ &= 1 . \end{aligned}$$

其实可以利用 (5-4-3) 式的结果直接得到, 因为对于正交归一的笛卡尔系 $(\partial/\partial x)^a \wedge (\partial/\partial y)^b \wedge (\partial/\partial z)^c = \varepsilon^{abc}$,

$$*(dx \wedge dy \wedge dz) = \frac{1}{3!} \varepsilon^{abc} \varepsilon_{abc} \stackrel{(5-4-3)}{=} \frac{1}{3!} 3! = 1 .$$

13. 设 $\{r, \theta, \varphi\}$ 是 3 维欧氏空间的球坐标系, 试证 $*dr = (r^2 \sin \theta) d\theta \wedge d\varphi$.

证 首先, 根据式 (5-4-4), 3 维欧氏空间球坐标系的右手适配体元为 (因 $g = \det(g_{\mu\nu}) = r^4 \sin^2 \theta$)

$$\varepsilon_{abc} = r^2 \sin \theta (dr)_a \wedge (d\theta)_b \wedge (d\varphi)_c = r^2 \sin \theta (dr \wedge d\theta \wedge d\varphi)_{abc} .$$

形式 1 $(dr)_a$ 的对偶微分形式为形式 2:

$$\begin{aligned} *(dr)_{bc} &\stackrel{(5-6-1)}{=} (\partial/\partial r)^a \varepsilon_{abc} = (\partial/\partial r)^a r^2 \sin \theta (dr)_a \wedge (d\theta)_b \wedge (d\varphi)_c \\ &= r^2 \sin \theta (d\theta)_b \wedge (d\varphi)_c = r^2 \sin \theta (d\theta \wedge d\varphi)_{bc}, \end{aligned}$$

即为 $*dr = (r^2 \sin \theta) d\theta \wedge d\varphi$.

14. 设 \vec{A}, \vec{B} 为 RR^3 上的矢量场, $\vec{\nabla}$ 为 RR^3 上与欧氏度规相适配的导数算符, 试证

$$\vec{\nabla} \times (\vec{A} \times \vec{B}) = (\vec{B} \cdot \vec{\nabla})\vec{A} + (\vec{\nabla} \cdot \vec{B})\vec{A} - (\vec{A} \cdot \vec{\nabla})\vec{B} - (\vec{\nabla} \cdot \vec{A})\vec{B}.$$

证 利用 $(\vec{A} \times \vec{B})^c = \varepsilon^{cab} A_a B_b$ 和 $(\vec{\nabla} \times \vec{B})^c = \varepsilon^{cab} \partial_a B_b$, 上式左边为

$$\begin{aligned} [\vec{\nabla} \times (\vec{A} \times \vec{B})]^c &= \varepsilon^{cab} \partial_a (\vec{A} \times \vec{B})_b = \varepsilon^{cab} \partial_a (\varepsilon_{bde} A^d B^e) \\ &\stackrel{(5-4-6)}{=} \varepsilon^{cab} \varepsilon_{bde} \partial_a (A^d B^e) = \varepsilon^{bca} \varepsilon_{bde} \partial_a (A^d B^e) \\ &\stackrel{(5-4-10)}{=} 2\delta^{[c}_d \delta^{a]}_e \partial_a (A^d B^e) \\ &= (\delta^c_d \delta^a_e - \delta^a_d \delta^c_e) \partial_a (A^d B^e) \\ &= \partial_a (A^c B^a) - \partial_a (A^a B^c) \\ &= B^a \partial_a A^c + (\partial_a B^a) A^c - A^a \partial_a B^c - (\partial_a A^a) B^c \\ &= (\vec{B} \cdot \vec{\nabla}) A^c + (\vec{\nabla} \cdot \vec{B}) A^c - (\vec{A} \cdot \vec{\nabla}) B^c - (\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) B^c \\ &= [(\vec{B} \cdot \vec{\nabla})\vec{A} + (\vec{\nabla} \cdot \vec{B})\vec{A} - (\vec{A} \cdot \vec{\nabla})\vec{B} - (\vec{\nabla} \cdot \vec{A})\vec{B}]^c \end{aligned}$$

即为上式右边.

15. 用微分形式证明 3 维欧氏空间场论中并不易证的下列熟知命题:

- (1) 无旋矢量场必可表为梯度;
- (2) 无散矢量场必可表为旋度 (见 §5.6 末).

证 (1) 由定理 5-6-2 的 $\text{curl } \vec{A} = *d\vec{A}$ 知, 如果 $\text{curl } \vec{A} = 0$, 则 $*d\vec{A} = 0$, 有 $d\vec{A} = 0$, 即 1 形式场 \vec{A} 是闭的. 而对于平凡流形 RR^3 , 闭形式场必恰当 (即定理 5-1-5 的逆成立), 因此 \vec{A} 必为某 0 形式场 (标量场) ϕ 的外微分, 即有

$$A^a = A_a = d_a \phi \stackrel{(5-1-11)}{=} \nabla_a \phi = \partial_a \phi,$$

此即 $\vec{A} = \vec{\nabla} \phi$.

(2) 由定理 5-6-2 的 $\text{div } \vec{A} = *d(*\vec{A})$ 知, 如果 $\text{div } \vec{A} = 0$, 则 $*d(*\vec{A}) = 0$, 有 $d(*\vec{A}) = 0$, 即 2 形式场 $*\vec{A}$ 是闭的. 而对于平凡流形 RR^3 , 闭形式场必恰当 (即定理 5-1-5 的逆成立), 因此 $*\vec{A}$ 必为某 1 形式场 B_a 的外微分, 即有

$$*A_{bc} = d_b B_c \stackrel{(5-1-11)}{=} 2\nabla_{[b} B_{c]} = 2\partial_{[b} B_{c]},$$

于是

$$\begin{aligned} **A^a &\stackrel{(5-6-1)}{=} \frac{1}{2} *A_{bc}\varepsilon^{bca} = \partial_{[b}B_{c]}\varepsilon^{bca} \stackrel{(2-6-19)}{=} \partial_b B_c \varepsilon^{[bc]a} \\ &\stackrel{(2-6-20)}{=} \partial_b B_c \varepsilon^{bca} \stackrel{(5-6-5)(c)}{=} (\vec{\nabla} \times \vec{B})^a. \end{aligned}$$

最后, 由定理 5-6-1 式 (5-6-2) 知

$$**A^a = (-1)^{0+1(3-1)} A^a = A^a,$$

因此总有 $\vec{A} = \vec{\nabla} \times \vec{B}$.

16. 设 ∇_a 是广义黎曼空间 (M, g_{ab}) 上的适配导数算符 (即 $\nabla_a g_{bc} = 0$), ε 是适配体元 (即 $\nabla_a \varepsilon_{b_1 \dots b_n} = 0$), v^a 是 M 上是矢量场, $v_a \equiv g_{ab} v^b$ 是 v^a 相应的 1 形式场, $*v$ 是 v_a 的对偶形式场, 试证 $(\nabla_a v^a) \varepsilon = d*v$.

注: 这个结论可做如下推广: 设 $F_{a_1 \dots a_k}$ 是 k 形式场 ($k \leq n$), 简记作 F , 把 $k-1$ 形式场 $\nabla^{a_k} F_{a_1 \dots a_k}$ 记作 $\text{div } F$, 则 $*(\text{div } F) = d*F$. 电磁场的麦氏方程 [式 (12-6-2)] 就是一例.

证 1 形式场 v_a 的对偶微分形式 $[(n-1) \text{ 形式}]$ 为

$$*v_{b_1 \dots b_{n-1}} \stackrel{(5-6-1)}{=} v^c \varepsilon_{cb_1 \dots b_{n-1}}.$$

它的外微分 (n 形式) 为

$$d_a *v_{b_1 \dots b_{n-1}} = (d*v)_{ab_1 \dots b_{n-1}} \stackrel{(5-1-11)}{=} n \nabla_{[a} *v_{b_1 \dots b_{n-1}]} = n \nabla_{[a} (v^c \varepsilon_{c|b_1 \dots b_{n-1}|}) .$$

因为 n 维流形的 n 形式的集合是 1 维矢量空间, 故它与 $\varepsilon_{ab_1 \dots b_{n-1}}$ 应该只差一个因子 (设为 h), 即有

$$n \nabla_{[a} (v^c \varepsilon_{c|b_1 \dots b_{n-1}|}) = h \varepsilon_{ab_1 \dots b_{n-1}} .$$

用 $\varepsilon^{ab_1 \dots b_{n-1}}$ 缩并此式, 右边得 $h(-1)^s n!$ [适配体元的性质式 (5-4-3)], 而左边为

$$\begin{aligned} n \varepsilon^{ab_1 \dots b_{n-1}} \nabla_{[a} (v^c \varepsilon_{c|b_1 \dots b_{n-1}|}) &\stackrel{(2-6-19)}{=} n \varepsilon^{[ab_1 \dots b_{n-1}]} \nabla_a (v^c \varepsilon_{cb_1 \dots b_{n-1}}) \\ &= n \varepsilon^{ab_1 \dots b_{n-1}} \nabla_a (v^c \varepsilon_{cb_1 \dots b_{n-1}}) \\ &\stackrel{(5-4-6)}{=} n \varepsilon^{ab_1 \dots b_{n-1}} \varepsilon_{cb_1 \dots b_{n-1}} \nabla_a v^c \\ &\stackrel{(5-4-10)}{=} n [(-1)^s (n-1)! \delta^a_c] \nabla_a v^c \\ &= (-1)^s n! \nabla_c v^c . \end{aligned}$$

因此知 $h = \nabla_c v^c$. 代入前面的结果有

$$d_a *v_{b_1 \dots b_{n-1}} = (\nabla_c v^c) \varepsilon_{ab_1 \dots b_{n-1}} ,$$

可简记作 $d^*v = (\nabla_a v^a)\varepsilon$.

推广到 k 形式场 $F = F_{a_1 \dots a_k}$, 其对偶微分 $(n-k)$ 形式为

$${}^*F_{b_1 \dots b_{n-k}} \stackrel{(5-6-1)}{=} \frac{1}{k!} F^{c_1 \dots c_k} \varepsilon_{c_1 \dots c_k b_1 \dots b_{n-k}} .$$

取其外微分 $(n-k+1)$ 形式

$$\begin{aligned} (d^*F)_{ab_1 \dots b_{n-k}} &= (d^*F)_{ab_1 \dots b_{n-k}} = d_a {}^*F_{b_1 \dots b_{n-k}} \stackrel{(5-1-11)}{=} (n-k+1) \nabla_{[a} {}^*F_{b_1 \dots b_{n-k}]} \\ &= (n-k+1) \nabla_{[a} \left(\frac{1}{k!} F^{c_1 \dots c_k} \varepsilon_{|c_1 \dots c_k| b_1 \dots b_{n-k}} \right) \\ &= \frac{(n-k+1)}{k!} \nabla_{[a} (F^{c_1 \dots c_k} \varepsilon_{|c_1 \dots c_k| b_1 \dots b_{n-k}})] . \end{aligned}$$

另一方面, $(k-1)$ 形式场 $\nabla^{c_k} F_{c_1 \dots c_{k-1} c_k} = \text{div } F$ 的对偶微分形式为 $(n-k+1)$ 形式:

$${}^*(\text{div } F)_{ab_1 \dots b_{n-k}} \stackrel{(5-6-1)}{=} \frac{1}{(k-1)!} (\nabla_{c_k} F^{c_1 \dots c_{k-1} c_k}) \varepsilon_{c_1 \dots c_{k-1} ab_1 \dots b_{n-k}} .$$

欲证 ${}^*(\text{div } F) = d^*F$ 即证

$$\begin{aligned} &\frac{(n-k+1)}{k!} \nabla_{[a} (F^{c_1 \dots c_k} \varepsilon_{|c_1 \dots c_k| b_1 \dots b_{n-k}})] \\ &= \frac{1}{(k-1)!} (\nabla_{c_k} F^{c_1 \dots c_{k-1} c_k}) \varepsilon_{c_1 \dots c_{k-1} ab_1 \dots b_{n-k}} , \end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned} &(n-k+1) \nabla_{[a} (F^{c_1 \dots c_k} \varepsilon_{|c_1 \dots c_k| b_1 \dots b_{n-k}})] \\ &= k (\nabla_{c_k} F^{c_1 \dots c_{k-1} c_k}) \varepsilon_{c_1 \dots c_{k-1} ab_1 \dots b_{n-k}} . \end{aligned}$$

亦即

$$\begin{aligned} &(n-k+1) \nabla_{[a} (F^{c_1 \dots c_k} \varepsilon_{b_1 \dots b_{n-k} c_1 \dots c_k}) \\ &= k (\nabla_{c_k} F^{c_1 \dots c_{k-1} c_k}) \varepsilon_{b_1 \dots b_{n-k} c_1 \dots c_{k-1} a} . \end{aligned}$$

两边作用 $\varepsilon^{ab_1 \dots b_{n-k} d_1 \dots d_{k-1}}$

$$\begin{aligned} &(n-k+1) \nabla_{[a} (F^{c_1 \dots c_k} \varepsilon_{b_1 \dots b_{n-k} c_1 \dots c_k} \varepsilon^{ab_1 \dots b_{n-k} d_1 \dots d_{k-1}}) \\ &= (n-k+1) \nabla_a (F^{c_1 \dots c_k} \varepsilon_{b_1 \dots b_{n-k} c_1 \dots c_k} \varepsilon^{[ab_1 \dots b_{n-k}] d_1 \dots d_{k-1}}) \\ &= (n-k+1) \nabla_a (F^{c_1 \dots c_k} \varepsilon_{b_1 \dots b_{n-k} c_1 \dots c_k} \varepsilon^{ab_1 \dots b_{n-k} d_1 \dots d_{k-1}}) \\ &= k (\nabla_{c_k} F^{c_1 \dots c_{k-1} c_k}) \varepsilon_{b_1 \dots b_{n-k} c_1 \dots c_{k-1} a} \varepsilon^{ab_1 \dots b_{n-k} d_1 \dots d_{k-1}} . \end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned} &(n-k+1) \nabla_a (F^{c_1 \dots c_k} \varepsilon_{b_1 \dots b_{n-k} c_1 \dots c_k} \varepsilon^{b_1 \dots b_{n-k} d_1 \dots d_{k-1} a}) \\ &= k (\nabla_{c_k} F^{c_1 \dots c_{k-1} c_k}) \varepsilon_{b_1 \dots b_{n-k} c_1 \dots c_{k-1} a} \varepsilon^{b_1 \dots b_{n-k} d_1 \dots d_{k-1} a} . \end{aligned}$$

利用式 (5-4-10)

$$\begin{aligned}
 \varepsilon^{b_1 \cdots b_{n-k} d_1 \cdots d_{k-1} a} \varepsilon_{b_1 \cdots b_{n-k} c_1 \cdots c_k} &= (-1)^s k! (n-k)! \delta^{[d_1}_{c_1} \cdots \delta^{d_{k-1}}_{c_{k-1}} \delta^a]_{c_k}, \\
 \varepsilon^{b_1 \cdots b_{n-k} d_1 \cdots d_{k-1} a} \varepsilon_{b_1 \cdots b_{n-k} c_1 \cdots c_{k-1} a} &= \varepsilon^{ab_1 \cdots b_{n-k} d_1 \cdots d_{k-1}} \varepsilon_{ab_1 \cdots b_{n-k} c_1 \cdots c_{k-1}} \\
 &= (-1)^s (k-1)! (n-k+1)! \delta^{[d_1}_{c_1} \cdots \delta^{d_{k-1}}_{c_{k-1}}]_{c_{k-1}}.
 \end{aligned}$$

待证式左边为

$$\begin{aligned}
 &(n-k+1) \nabla_a \left(F^{c_1 \cdots c_k} (-1)^s k! (n-k)! \delta^{[d_1}_{c_1} \cdots \delta^{d_{k-1}}_{c_{k-1}} \delta^a]_{c_k} \right) \\
 &= (-1)^s k! (n-k+1)! \delta^{[d_1}_{c_1} \cdots \delta^{d_{k-1}}_{c_{k-1}} \delta^a]_{c_k} \nabla_a F^{c_1 \cdots c_k},
 \end{aligned}$$

待证式右边为

$$\begin{aligned}
 &k (\nabla_{c_k} F^{c_1 \cdots c_{k-1} c_k}) (-1)^s (k-1)! (n-k+1)! \delta^{[d_1}_{c_1} \cdots \delta^{d_{k-1}}_{c_{k-1}}]_{c_{k-1}} \\
 &= (-1)^s k! (n-k+1)! \delta^{[d_1}_{c_1} \cdots \delta^{d_{k-1}}_{c_{k-1}}]_{c_{k-1}} \nabla_{c_k} F^{c_1 \cdots c_{k-1} c_k}.
 \end{aligned}$$

于是待证式变为

$$\delta^{[d_1}_{c_1} \cdots \delta^{d_{k-1}}_{c_{k-1}} \delta^a]_{c_k} \nabla_a F^{c_1 \cdots c_k} = \delta^{[d_1}_{c_1} \cdots \delta^{d_{k-1}}_{c_{k-1}}]_{c_{k-1}} \nabla_{c_k} F^{c_1 \cdots c_{k-1} c_k}.$$

这个等式是显然的, 因为

$$\begin{aligned}
 \text{左边} &= \delta^{d_1}_{[c_1} \cdots \delta^{d_{k-1}}_{c_{k-1}} \delta^a_{c_k]} \nabla_a F^{c_1 \cdots c_k} \\
 &\stackrel{(2-6-19)}{=} \delta^{d_1}_{c_1} \cdots \delta^{d_{k-1}}_{c_{k-1}} \delta^a_{c_k} \nabla_a F^{[c_1 \cdots c_k]} \\
 &= \delta^{d_1}_{c_1} \cdots \delta^{d_{k-1}}_{c_{k-1}} \delta^a_{c_k} \nabla_a F^{c_1 \cdots c_k} = \nabla_a F^{d_1 \cdots d_{k-1} a}, \\
 \text{右边} &= \delta^{d_1}_{[c_1} \cdots \delta^{d_{k-1}}_{c_{k-1}]} \nabla_{c_k} F^{c_1 \cdots c_{k-1} c_k} \\
 &\stackrel{(2-6-19)}{=} \delta^{d_1}_{c_1} \cdots \delta^{d_{k-1}}_{c_{k-1}} \nabla_{c_k} F^{[c_1 \cdots c_{k-1}] c_k} \\
 &= \delta^{d_1}_{c_1} \cdots \delta^{d_{k-1}}_{c_{k-1}} \nabla_{c_k} F^{c_1 \cdots c_{k-1} c_k} = \nabla_{c_k} F^{d_1 \cdots d_{k-1} c_k}.
 \end{aligned}$$

命题得证.

17. 试证由式 (5-7-2) 定义的 $\Gamma^\sigma_{\mu\tau}$ 正是 §3.1 定义的克氏符 Γ^c_{ab} 在式 (5-7-2) 涉及的坐标基底的分量.

证 克氏符的定义为 §3.1 定义 2: $\nabla_a \omega_b = \partial_b \omega_a - \Gamma^c_{ab} \omega_c$ [见 (3-1-6)]. 取这里的 ω_a 为对偶坐标基矢 $(dx^\nu)_a$, 则有

$$\nabla_a (dx^\nu)_b = \partial_b (dx^\nu)_a - \Gamma^c_{ab} (dx^\nu)_c.$$

以基矢 $(\partial/\partial x^\mu)^a (\partial/\partial x^\nu)^d$ 左作用:

$$\begin{aligned}
 &(\partial/\partial x^\mu)^a (\partial/\partial x^\nu)^d \nabla_a (dx^\nu)_b \\
 &= (\partial/\partial x^\mu)^a (\partial/\partial x^\nu)^d \partial_b (dx^\nu)_a - (\partial/\partial x^\mu)^a (\partial/\partial x^\nu)^d \Gamma^c_{ab} (dx^\nu)_c \\
 &\stackrel{(3-1-10)}{=} (\partial/\partial x^\mu)^a \partial_b [(\partial/\partial x^\nu)^d (dx^\nu)_a] - (\partial/\partial x^\mu)^a [(\partial/\partial x^\nu)^d (dx^\nu)_c] \Gamma^c_{ab} \\
 &= (\partial/\partial x^\mu)^a \partial_b \delta^d_a - (\partial/\partial x^\mu)^a \delta^d_c \Gamma^c_{ab} = -(\partial/\partial x^\mu)^a \Gamma^d_{ab},
 \end{aligned}$$

得到 [其实根据式 (3-1-10), 直接有 $\partial_b(dx^\nu)_a = 0$]

$$(\partial/\partial x^\mu)^a \Gamma_{ab}^d = -(\partial/\partial x^\mu)^a (\partial/\partial x^\nu)^d \nabla_a(dx^\nu)_b .$$

注意到

$$0 = \nabla_a \delta^d_b = \nabla_a [(\partial/\partial x^\nu)^d (dx^\nu)_b] = (\partial/\partial x^\nu)^d \nabla_a(dx^\nu)_b + (dx^\nu)_b \nabla_a(\partial/\partial x^\nu)^d ,$$

所以

$$(\partial/\partial x^\mu)^a \Gamma_{ab}^d = (\partial/\partial x^\mu)^a (dx^\nu)_b \nabla_a(\partial/\partial x^\nu)^d .$$

克氏符的坐标分量

$$\begin{aligned} \Gamma_{\mu\tau}^\sigma &= (\partial/\partial x^\tau)^b (dx^\sigma)_d (\partial/\partial x^\mu)^a \Gamma_{ab}^d \\ &= (\partial/\partial x^\tau)^b (dx^\sigma)_d (\partial/\partial x^\mu)^a (dx^\nu)_b \nabla_a(\partial/\partial x^\nu)^d \\ &= (dx^\sigma)_d (\partial/\partial x^\mu)^a \delta^\nu_\tau \nabla_a(\partial/\partial x^\nu)^d \\ &= (dx^\sigma)_d (\partial/\partial x^\mu)^a \nabla_a(\partial/\partial x^\tau)^d . \end{aligned}$$

左作用 $(\partial/\partial x^\sigma)^b$:

$$\begin{aligned} (\partial/\partial x^\sigma)^b \Gamma_{\mu\tau}^\sigma &= (\partial/\partial x^\sigma)^b (dx^\sigma)_d (\partial/\partial x^\mu)^a \nabla_a(\partial/\partial x^\tau)^d \\ &= \delta^b_d (\partial/\partial x^\mu)^a \nabla_a(\partial/\partial x^\tau)^d \\ &= (\partial/\partial x^\mu)^a \nabla_a(\partial/\partial x^\tau)^b . \end{aligned}$$

此即式 (5-7-2) 的定义 (因 $\Gamma_{\mu\tau}^\sigma = \Gamma_{\tau\mu}^\sigma$). 又见第 3 章习题 4.

- *18. 用正交归一标架分别求第 3 章习题 14~16 所给度规的曲率张量的全部标架分量, 并验证所得结果与用坐标基底法求得的曲率张量相同. 为与 R_{abc}^d 的坐标分量 $R_{\mu\nu\sigma}^\rho$ 区别, 在求得 R_{abc}^d 的全部标架分量后宜改用符号 $R_{(\mu)(\nu)(\sigma)}^{(\rho)}$ 代表标架分量.

解 (A) 习题 14.

(a) 选正交归一标架. 线元 $ds^2 = \Omega^2(t, x)(-dt^2 + dx^2)$, 故非归一坐标基底的度规分量为

$$g_{tt} = -\Omega^2(t, x), \quad g_{xx} = \Omega^2(t, x); \quad g^{tt} = -\Omega^{-2}(t, x), \quad g^{xx} = \Omega^{-2}(t, x).$$

度规张量场为

$$\begin{aligned} g_{ab} &= g_{tt}(dt)_a(dt)_b + g_{xx}(dx)_a(dx)_b \\ &= \eta_{00}(e^0)_a(e^0)_b + \eta_{11}(e^1)_a(e^1)_b, \\ g^{ab} &= g^{tt}(\partial_t)^a(\partial_t)^b + g^{xx}(\partial_x)^a(\partial_x)^b \\ &= \eta^{00}(e_0)^a(e_0)^b + \eta^{11}(e_1)^a(e_1)^b, \end{aligned}$$

其中 $\{(e_\mu)^a\}$ 和 $\{(e^\mu)_a\}$ ($\mu = 0, 1$) 为正交归一的基底和对偶基底, 即度规分量为 $-\eta_{00} = -\eta^{00} = \eta_{11} = \eta^{11} = 1$. 比较得

$$\begin{aligned}(e_0)^a &= \Omega^{-1} (\partial_t)^a, & (e_1)^a &= \Omega^{-1} (\partial_x)^a; \\ (e^0)_a &= \Omega (dt)_a, & (e^1)_a &= \Omega (dx)_a.\end{aligned}$$

用 g_{ab} 降 $(e_\mu)^b$ 或用 $\eta_{\mu\nu}$ 降 $(e^\nu)_a$, 如: $(e_0)_a = g_{ab}(e_0)^b = \eta_{00}(e^0)_a(e^0)_b(e_0)^b = -(e^0)_a = -\Omega(dt)_a$, 或 $(e_0)_a = \eta_{0\nu}(e^\nu)_a = -(e^0)_a = -\Omega(dt)_a$. 因此

$$(e_0)_a = -\Omega(dt)_a, \quad (e_1)_a = \Omega(dx)_a.$$

(b) 用式 (5-7-19) 计算 $\Lambda_{\mu\nu\rho}$ 和式 (5-7-20) 计算 $\omega_{\mu\nu\rho}$. 注意到反称关系 $\Lambda_{\mu\nu\rho} = -\Lambda_{\rho\nu\mu}$, 现在只有 2 个独立: $\Lambda_{001} = -\Lambda_{100}$ 和 $\Lambda_{011} = -\Lambda_{110}$. 因为

$$\begin{aligned}(e_0)_\lambda &= (e_0)_a(\partial_\lambda)^a = -\Omega(dt)_a(\partial_\lambda)^a = -\Omega\delta^0_\lambda, \\ (e_1)_\lambda &= (e_1)_a(\partial_\lambda)^a = \Omega(dx)_a(\partial_\lambda)^a = \Omega\delta^1_\lambda,\end{aligned}$$

有

$$\begin{aligned}(e_0)_{\lambda,\tau} &= \partial_\tau(-\Omega\delta^0_\lambda) = -\delta^0_\lambda\delta^0_\tau\dot{\Omega} - \delta^0_\lambda\delta^1_\tau\Omega', \\ (e_1)_{\lambda,\tau} &= \partial_\tau(\Omega\delta^1_\lambda) = \delta^1_\lambda\delta^0_\tau\dot{\Omega} + \delta^1_\lambda\delta^1_\tau\Omega' .\end{aligned}$$

代入式 (5-7-19) $\Lambda_{\mu\nu\rho} = [(e_\nu)_{\lambda,\tau} - (e_\nu)_{\tau,\lambda}](e_\mu)^\lambda(e_\rho)^\tau$:

$$\begin{aligned}\Lambda_{\mu 0\rho} &= [(e_0)_{\lambda,\tau} - (e_0)_{\tau,\lambda}](e_\mu)^\lambda(e_\rho)^\tau \\ &= [-\delta^0_\lambda\delta^0_\tau\dot{\Omega} - \delta^0_\lambda\delta^1_\tau\Omega' + \delta^0_\tau\delta^0_\lambda\dot{\Omega} + \delta^0_\tau\delta^1_\lambda\Omega'](e_\mu)^\lambda(e_\rho)^\tau \\ &= -\dot{\Omega}(e_\mu)^0(e_\rho)^0 - \Omega'(e_\mu)^0(e_\rho)^1 + \dot{\Omega}(e_\mu)^0(e_\rho)^0 + \Omega'(e_\mu)^1(e_\rho)^0 \\ &= -\Omega'(e_\mu)^0(e_\rho)^1 + \Omega'(e_\mu)^1(e_\rho)^0, \\ \Lambda_{\mu 1\rho} &= [(e_1)_{\lambda,\tau} - (e_1)_{\tau,\lambda}](e_\mu)^\lambda(e_\rho)^\tau \\ &= [\delta^1_\lambda\delta^0_\tau\dot{\Omega} + \delta^1_\lambda\delta^1_\tau\Omega' - \delta^1_\tau\delta^0_\lambda\dot{\Omega} - \delta^1_\tau\delta^1_\lambda\Omega'](e_\mu)^\lambda(e_\rho)^\tau \\ &= \dot{\Omega}(e_\mu)^1(e_\rho)^0 + \Omega'(e_\mu)^1(e_\rho)^1 - \dot{\Omega}(e_\mu)^0(e_\rho)^1 - \Omega'(e_\mu)^1(e_\rho)^1 \\ &= \dot{\Omega}(e_\mu)^1(e_\rho)^0 - \dot{\Omega}(e_\mu)^0(e_\rho)^1.\end{aligned}$$

得到非零的 $\Lambda_{\mu\nu\rho}$

$$\begin{aligned}\Lambda_{001} &= -\Lambda_{100} = -\Omega'(e_0)^0(e_1)^1 = -\Omega'\Omega^{-1}\Omega^{-1} = -\Omega'\Omega^{-2}, \\ \Lambda_{011} &= -\Lambda_{110} = -\dot{\Omega}(e_0)^0(e_1)^1 = -\dot{\Omega}\Omega^{-1}\Omega^{-1} = -\dot{\Omega}\Omega^{-2}.\end{aligned}$$

代入式 (5-7-20) $\omega_{\mu\nu\rho} = \frac{1}{2}(\Lambda_{\mu\nu\rho} + \Lambda_{\rho\mu\nu} - \Lambda_{\nu\rho\mu})$ 求得非零的 $\omega_{\mu\nu\rho}$ (注意反称关系, 非零时 $\mu \neq \nu$):

$$\begin{aligned}\omega_{010} &= \frac{1}{2}(\Lambda_{010} + \Lambda_{001} - \Lambda_{100}) = \Lambda_{001} = -\Omega'\Omega^{-2} = -\omega_{100}, \\ \omega_{011} &= \frac{1}{2}(\Lambda_{011} + \Lambda_{101} - \Lambda_{110}) = \Lambda_{011} = -\dot{\Omega}\Omega^{-2} = -\omega_{101}.\end{aligned}$$

联络 1 形式为 $\omega_{\mu\nu} = \omega_{\mu a} = \omega_{\mu\lambda}(e^\lambda)_a = \omega_{\mu\lambda}e^\lambda$:

$$\begin{aligned}\omega_{01} &= \omega_{010}e^0 + \omega_{011}e^1 = -\Omega'\Omega^{-2}e^0 - \dot{\Omega}\Omega^{-2}e^1 \\ &= -\Omega'\Omega^{-2}\Omega dt - \dot{\Omega}\Omega^{-2}\Omega dx = -\Omega'\Omega^{-1}dt - \dot{\Omega}\Omega^{-1}dx ,\end{aligned}$$

只有一个非零的独立元素.

(c) 用嘉当第二结构方程求曲率 2 形式. 由 $\omega_\mu{}^\nu = \eta^{\nu\sigma}\omega_{\mu\sigma}$ 知 $\omega_0^1 = \omega_{01}$. 代入式 (5-7-8): $R_\mu{}^\nu = d\omega_\mu{}^\nu + \omega_\mu{}^\lambda \wedge \omega_\lambda{}^\nu$, 得黎曼曲率 2 形式

$$\begin{aligned}R_0^1 &= d\omega_0^1 + \omega_0{}^\lambda \wedge \omega_\lambda^1 = d\omega_{01} + 0 \\ &= d(-\Omega'\Omega^{-1}dt - \dot{\Omega}\Omega^{-1}dx) \\ &\stackrel{(5-1-12)}{=} \left(-\frac{\dot{\Omega}'\Omega - \Omega'\dot{\Omega}}{\Omega^2}dt - \frac{\Omega''\Omega - \Omega'^2}{\Omega^2}dx \right) \wedge dt \\ &\quad + \left(-\frac{\ddot{\Omega}\Omega - \dot{\Omega}^2}{\Omega^2}dt - \frac{\dot{\Omega}'\Omega - \dot{\Omega}\Omega'}{\Omega^2}dx \right) \wedge dx \\ &= -\frac{\Omega''\Omega - \Omega'^2}{\Omega^2}dx \wedge dt - \frac{\ddot{\Omega}\Omega - \dot{\Omega}^2}{\Omega^2}dt \wedge dx \\ &= \frac{\Omega''\Omega - \Omega'^2 - \ddot{\Omega}\Omega + \dot{\Omega}^2}{\Omega^2}dt \wedge dx \\ &= \frac{\Omega''\Omega - \Omega'^2 - \ddot{\Omega}\Omega + \dot{\Omega}^2}{\Omega^4}(\Omega dt) \wedge (\Omega dx) \\ &= \left(\frac{\Omega'' - \ddot{\Omega}}{\Omega^3} + \frac{\dot{\Omega}^2 - \Omega'^2}{\Omega^4} \right) e^0 \wedge e^1 \\ &\equiv R e^0 \wedge e^1 .\end{aligned}$$

此式即为

$$(R_0^1)_{ab} = R(e^0)_a \wedge (e^1)_b = 2R(e^0)_{[a}(e^1)_{b]} .$$

因此黎曼曲率在正交归一标架基底的分量为

$$\begin{aligned}R_{\mu\nu 0}^1 &= (R_0^1)_{ab}(e_\mu)^a(e_\nu)^b \\ &= 2R(e^0)_{[a}(e^1)_{b]}(e_\mu)^a(e_\nu)^b \\ &= 2R\delta^0_{[\mu}\delta^1_{\nu]} \\ &= R(\delta^0_\mu\delta^1_\nu - \delta^0_\nu\delta^1_\mu) ,\end{aligned}$$

因此求得黎曼曲率张量

$$R_{010}^1 = -R_{100}^1 = R = \frac{\Omega'' - \ddot{\Omega}}{\Omega^3} + \frac{\dot{\Omega}^2 - \Omega'^2}{\Omega^4} .$$

它与第 3 章习题 14 的结果 $R_{txt}{}^x$ 的关系为

$$\begin{aligned}R_{txt}{}^x &= R_{abc}{}^d(\partial_t)^a(\partial_x)^b(\partial_t)^c(dx)_d \\ &= R_{\mu\nu\sigma}{}^\tau(e^\mu)_a(e^\nu)_b(e^\sigma)_c(e_\tau)^d(\partial_t)^a(\partial_x)^b(\partial_t)^c(dx)_d\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= R_{\mu\nu\sigma}{}^\tau (e^\mu)_a (e^\nu)_b (e^\sigma)_c (e_\tau)^d \Omega(e_0)^a \Omega(e_1)^b \Omega(e_0)^c \Omega^{-1}(e^1)_d \\
&= R_{\mu\nu\sigma}{}^\tau \Omega^2 (e^\mu)_a (e_0)^a (e^\nu)_b (e_1)^b (e^\sigma)_c (e_0)^c (e_\tau)^d (e^1)_d \\
&= R_{\mu\nu\sigma}{}^\tau \Omega^2 \delta^\mu{}_0 \delta^\nu{}_1 \delta^\sigma{}_0 \delta^1{}_\tau \\
&= R_{010}{}^1 \Omega^2 = \frac{\Omega'' - \ddot{\Omega}}{\Omega} + \frac{\dot{\Omega}^2 - \Omega'^2}{\Omega^2},
\end{aligned}$$

即是前面通过坐标基底场的度规张量计算的结果.

(B) 习题 15.

(a) 选正交归一标架. 线元 $ds^2 = z^{-1/2}(-dt^2 + dz^2) + z(dx^2 + dy^2)$, 故非归一坐标基底的度规分量为

$$\begin{aligned}
g_{tt} &= -z^{-1/2}, & g_{zz} &= z^{-1/2}, & g_{xx} &= z, & g_{yy} &= z; \\
g^{tt} &= -z^{1/2}, & g^{zz} &= z^{1/2}, & g^{xx} &= z^{-1}, & g^{yy} &= z^{-1}.
\end{aligned}$$

度规张量场为

$$\begin{aligned}
g_{ab} &= g_{tt}(dt)_a(dt)_b + g_{zz}(dz)_a(dz)_b + g_{xx}(dx)_a(dx)_b + g_{yy}(dy)_a(dy)_b \\
&= \eta_{00}(e^0)_a(e^0)_b + \eta_{33}(e^3)_a(e^3)_b + \eta_{11}(e^1)_a(e^1)_b + \eta_{22}(e^2)_a(e^2)_b, \\
g^{ab} &= g^{tt}(\partial_t)^a(\partial_t)^b + g^{zz}(\partial_z)^a(\partial_z)^b + g^{xx}(\partial_x)^a(\partial_x)^b + g^{yy}(\partial_y)^a(\partial_y)^b \\
&= \eta^{00}(e_0)^a(e_0)^b + \eta^{33}(e_3)^a(e_3)^b + \eta^{11}(e_1)^a(e_1)^b + \eta^{22}(e_2)^a(e_2)^b,
\end{aligned}$$

其中 $\{(e_\mu)^a\}$ 和 $\{(e^\mu)_a\}$ ($\mu = 0, 1, 2, 3$) 为正交归一的基底和对偶基底, 即度规分量为洛伦兹度规 $-\eta_{00} = -\eta^{00} = \eta_{11} = \eta^{11} = \eta_{22} = \eta^{22} = \eta_{33} = \eta^{33} = 1$. 比较得

$$\begin{aligned}
(e_0)^a &= z^{1/4}(\partial_t)^a, & (e_3)^a &= z^{1/4}(\partial_z)^a, & (e_1)^a &= z^{-1/2}(\partial_x)^a, & (e_2)^a &= z^{-1/2}(\partial_y)^a; \\
(e^0)_a &= z^{-1/4}(dt)_a, & (e^3)_a &= z^{-1/4}(dz)_a, & (e^1)_a &= z^{1/2}(dx)_a, & (e^2)_a &= z^{1/2}(dy)_a.
\end{aligned}$$

用 g_{ab} 降 $(e_\mu)^b$ 或用 $\eta_{\mu\nu}$ 降 $(e^\nu)_a$, 如: $(e_0)_a = g_{ab}(e_0)^b = \eta_{00}(e^0)_a(e^0)_b(e_0)^b = -(e^0)_a = -z^{-1/4}(dt)_a$, 或 $(e_0)_a = \eta_{0\nu}(e^\nu)_a = -(e^0)_a = -z^{-1/4}(dt)_a$. 因此

$$(e_0)_a = -z^{-1/4}(dt)_a, (e_3)_a = z^{-1/4}(dz)_a, (e_1)_a = z^{1/2}(dx)_a, (e_2)_a = z^{1/2}(dy)_a.$$

(b) 用式 (5-7-19) 计算 $\Lambda_{\mu\nu\rho}$ 和式 (5-7-20) 计算 $\omega_{\mu\nu\rho}$. 注意到反称关系 $\Lambda_{\mu\nu\rho} = -\Lambda_{\rho\nu\mu}$, 只须计算 $\mu \neq \rho$ 情形. 因为

$$\begin{aligned}
(e_0)_\lambda &= (e_0)_a(\partial_\lambda)^a = -z^{-1/4}(dt)_a(\partial_\lambda)^a = -z^{-1/4}\delta^0{}_\lambda, \\
(e_3)_\lambda &= (e_3)_a(\partial_\lambda)^a = z^{-1/4}(dz)_a(\partial_\lambda)^a = z^{-1/4}\delta^3{}_\lambda, \\
(e_1)_\lambda &= (e_1)_a(\partial_\lambda)^a = z^{1/2}(dx)_a(\partial_\lambda)^a = z^{1/2}\delta^1{}_\lambda, \\
(e_2)_\lambda &= (e_2)_a(\partial_\lambda)^a = z^{1/2}(dy)_a(\partial_\lambda)^a = z^{1/2}\delta^2{}_\lambda,
\end{aligned}$$

有

$$\begin{aligned}
(e_0)_{\lambda,\tau} &= \partial_\tau(-z^{-1/4} \delta^0_\lambda) = \delta^0_\lambda \delta^3_\tau \frac{1}{4} z^{-5/4}, \\
(e_3)_{\lambda,\tau} &= \partial_\tau(z^{-1/4} \delta^3_\lambda) = -\delta^3_\lambda \delta^3_\tau \frac{1}{4} z^{-5/4}, \\
(e_1)_{\lambda,\tau} &= \partial_\tau(z^{1/2} \delta^1_\lambda) = \delta^1_\lambda \delta^3_\tau \frac{1}{2} z^{-1/2}, \\
(e_2)_{\lambda,\tau} &= \partial_\tau(z^{1/2} \delta^2_\lambda) = \delta^2_\lambda \delta^3_\tau \frac{1}{2} z^{-1/2}.
\end{aligned}$$

代入式 (5-7-19) $\Lambda_{\mu\nu\rho} = [(e_\nu)_{\lambda,\tau} - (e_\nu)_{\tau,\lambda}](e_\mu)^\lambda (e_\rho)^\tau$:

$$\begin{aligned}
\Lambda_{\mu 0\rho} &= [(e_0)_{\lambda,\tau} - (e_0)_{\tau,\lambda}](e_\mu)^\lambda (e_\rho)^\tau \\
&= \frac{1}{4} z^{-5/4} [\delta^0_\lambda \delta^3_\tau - \delta^0_\tau \delta^3_\lambda] (e_\mu)^\lambda (e_\rho)^\tau \\
&= \frac{1}{4} z^{-5/4} [(e_\mu)^0 (e_\rho)^3 - (e_\mu)^3 (e_\rho)^0], \\
\Lambda_{\mu 3\rho} &= [(e_3)_{\lambda,\tau} - (e_3)_{\tau,\lambda}](e_\mu)^\lambda (e_\rho)^\tau \\
&= \frac{1}{4} z^{-5/4} [-\delta^3_\lambda \delta^3_\tau + \delta^3_\tau \delta^3_\lambda] (e_\mu)^\lambda (e_\rho)^\tau \\
&= 0, \\
\Lambda_{\mu 1\rho} &= [(e_1)_{\lambda,\tau} - (e_1)_{\tau,\lambda}](e_\mu)^\lambda (e_\rho)^\tau \\
&= \frac{1}{2} z^{-1/2} [\delta^1_\lambda \delta^3_\tau - \delta^1_\tau \delta^3_\lambda] (e_\mu)^\lambda (e_\rho)^\tau \\
&= \frac{1}{2} z^{-1/2} [(e_\mu)^1 (e_\rho)^3 - (e_\mu)^3 (e_\rho)^1], \\
\Lambda_{\mu 2\rho} &= [(e_2)_{\lambda,\tau} - (e_2)_{\tau,\lambda}](e_\mu)^\lambda (e_\rho)^\tau \\
&= \frac{1}{2} z^{-1/2} [\delta^2_\lambda \delta^3_\tau - \delta^2_\tau \delta^3_\lambda] (e_\mu)^\lambda (e_\rho)^\tau \\
&= \frac{1}{2} z^{-1/2} [(e_\mu)^2 (e_\rho)^3 - (e_\mu)^3 (e_\rho)^2].
\end{aligned}$$

得到非零的 $\Lambda_{\mu\nu\rho}$

$$\begin{aligned}
\Lambda_{003} &= -\Lambda_{300} = \frac{1}{4} z^{-5/4} (e_0)^0 (e_3)^3 = \frac{1}{4} z^{-5/4} z^{1/4} z^{1/4} = \frac{1}{4} z^{-3/4}, \\
\Lambda_{\mu 3\rho} &= 0, \\
\Lambda_{113} &= -\Lambda_{311} = \frac{1}{2} z^{-1/2} (e_1)^1 (e_3)^3 = \frac{1}{2} z^{-1/2} z^{-1/2} z^{1/4} = \frac{1}{2} z^{-3/4} \\
\Lambda_{223} &= -\Lambda_{322} = \frac{1}{2} z^{-1/2} (e_2)^2 (e_3)^3 = \frac{1}{2} z^{-1/2} z^{-1/2} z^{1/4} = \frac{1}{2} z^{-3/4}.
\end{aligned}$$

代入式 (5-7-20) $\omega_{\mu\nu\rho} = \frac{1}{2}(\Lambda_{\mu\nu\rho} + \Lambda_{\rho\mu\nu} - \Lambda_{\nu\rho\mu})$ 求得非零的 $\omega_{\mu\nu\rho}$ (注意反称关系, 非零时 $\mu \neq \nu$). 容易看出 $(\mu, \nu) = (0, 1)$ 时没有, $(0, 2)$ 时没有, $(0, 3)$ 时可以有, $(1, 2)$ 时没有, $(1, 3)$ 时可以有, $(2, 3)$ 时可以有:

$$\omega_{030} = \frac{1}{2}(\Lambda_{030} + \Lambda_{003} - \Lambda_{300}) = \Lambda_{003} = \frac{1}{4} z^{-3/4} = -\omega_{300},$$

$$\begin{aligned}\omega_{131} &= \frac{1}{2}(\Lambda_{131} + \Lambda_{113} - \Lambda_{311}) = \Lambda_{113} = \frac{1}{2}z^{-3/4} = -\omega_{311} \\ \omega_{232} &= \frac{1}{2}(\Lambda_{232} + \Lambda_{223} - \Lambda_{322}) = \Lambda_{223} = \frac{1}{2}z^{-3/4} = -\omega_{322} .\end{aligned}$$

联络 1 形式为 $\omega_{\mu\nu} = \omega_{\mu\nu a} = \omega_{\mu\nu\lambda}(e^\lambda)_a = \omega_{\mu\nu\lambda}e^\lambda$:

$$\begin{aligned}\omega_{03} &= \omega_{030}e^0 = \frac{1}{4}z^{-3/4}e^0 \\ &= \frac{1}{4}z^{-3/4}z^{-1/4}dt = \frac{1}{4}z^{-1}dt , \\ \omega_{13} &= \omega_{131}e^1 = \frac{1}{2}z^{-3/4}e^1 \\ &= \frac{1}{2}z^{-3/4}z^{1/2}dx = \frac{1}{2}z^{-1/4}dx , \\ \omega_{23} &= \omega_{232}e^2 = \frac{1}{2}z^{-3/4}e^2 \\ &= \frac{1}{2}z^{-3/4}z^{1/2}dy = \frac{1}{2}z^{-1/4}dy ,\end{aligned}$$

有 3 个非零的独立元素.

(c) 用嘉当第二结构方程求曲率 2 形式. 由 $\omega_\mu{}^\nu = \eta^{\nu\sigma}\omega_{\mu\sigma}$ 知 $\omega_0{}^i = \omega_{0i}$, $\omega_i{}^0 = -\omega_{i0} = \omega_{0i}$ 以及 $\omega_i{}^j = \omega_{ij}$. 代入式 (5-7-8): $R_\mu{}^\nu = d\omega_\mu{}^\nu + \omega_\mu{}^\lambda \wedge \omega_\lambda{}^\nu$, 得黎曼曲率 2 形式. 显然有定理 3-4-6 性质 (4) 式 (3-4-9): $R_{\mu\nu} = -R_{\nu\mu}$. 证明如下: $R_{\mu\nu} = d\omega_{\mu\nu} + \omega_\mu{}^\lambda \wedge \omega_{\lambda\nu} = -d\omega_{\nu\mu} - \omega_{\lambda\nu} \wedge \omega_\mu{}^\lambda = -d\omega_{\nu\mu} + \omega_{\nu\lambda} \wedge \omega_\mu{}^\lambda = -d\omega_{\nu\mu} + \omega_\nu{}^\lambda \wedge \omega_{\mu\lambda} = -d\omega_{\nu\mu} - \omega_\nu{}^\lambda \wedge \omega_{\lambda\mu} = -R_{\nu\mu}$.

$$\begin{aligned}R_0{}^1 &= d\omega_0{}^1 + \omega_0{}^\lambda \wedge \omega_\lambda{}^1 = 0 + \omega_{03} \wedge \omega_{31} \\ &= \left(\frac{1}{4}z^{-3/4}e^0\right) \wedge \left(-\frac{1}{2}z^{-3/4}e^1\right) \\ &= -\frac{1}{8}z^{-3/2}e^0 \wedge e^1 , \\ R_0{}^2 &= d\omega_0{}^2 + \omega_0{}^\lambda \wedge \omega_\lambda{}^2 = 0 + \omega_{03} \wedge \omega_{32} \\ &= \left(\frac{1}{4}z^{-3/4}e^0\right) \wedge \left(-\frac{1}{2}z^{-3/4}e^2\right) \\ &= -\frac{1}{8}z^{-3/2}e^0 \wedge e^2 , \\ R_0{}^3 &= d\omega_0{}^3 + \omega_0{}^\lambda \wedge \omega_\lambda{}^3 = d\omega_{03} + 0 \\ &= d\left(\frac{1}{4}z^{-1}dt\right) \\ &\stackrel{(5-1-12)}{=} -\frac{1}{4}z^{-2}dz \wedge dt = \frac{1}{4}z^{-2}dt \wedge dz \\ &= \frac{1}{4}z^{-2}z^{1/4}z^{1/4}(z^{-1/4}dt) \wedge (z^{-1/4}dz) \\ &= \frac{1}{4}z^{-3/2}e^0 \wedge e^3 , \\ R_1{}^0 &= d\omega_1{}^0 + \omega_1{}^\lambda \wedge \omega_\lambda{}^0 = 0 + \omega_{13} \wedge \omega_{03} \\ &= \left(\frac{1}{2}z^{-3/4}e^1\right) \wedge \left(\frac{1}{4}z^{-3/4}e^0\right)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{8} z^{-3/2} e^1 \wedge e^0 \\
&= -\frac{1}{8} z^{-3/2} e^0 \wedge e^1 = \mathbf{R}_0^1, \\
\mathbf{R}_1^2 &= d\omega_1^2 + \omega_1^\lambda \wedge \omega_\lambda^2 = 0 + \omega_{13} \wedge \omega_{32} \\
&= \left(\frac{1}{2} z^{-3/4} e^1\right) \wedge \left(-\frac{1}{2} z^{-3/4} e^2\right) \\
&= -\frac{1}{4} z^{-3/2} e^1 \wedge e^2, \\
\mathbf{R}_1^3 &= d\omega_1^3 + \omega_1^\lambda \wedge \omega_\lambda^3 = d\omega_{13} + 0 \\
&= d\left(\frac{1}{2} z^{-1/4} dx\right) \\
&\stackrel{(5-1-12)}{=} -\frac{1}{8} z^{-5/4} dz \wedge dx = \frac{1}{8} z^{-5/4} dx \wedge dz \\
&= \frac{1}{8} z^{-5/4} z^{-1/2} z^{1/4} (z^{1/2} dx) \wedge (z^{-1/4} dz) \\
&= \frac{1}{8} z^{-3/2} e^1 \wedge e^3, \\
\mathbf{R}_2^0 &= d\omega_2^0 + \omega_2^\lambda \wedge \omega_\lambda^0 = 0 + \omega_{23} \wedge \omega_{03} \\
&= \left(\frac{1}{2} z^{-3/4} e^2\right) \wedge \left(\frac{1}{4} z^{-3/4} e^0\right) \\
&= \frac{1}{8} z^{-3/2} e^2 \wedge e^0 = -\frac{1}{8} z^{-3/2} e^0 \wedge e^2 = \mathbf{R}_0^2, \\
\mathbf{R}_2^1 &= d\omega_2^1 + \omega_2^\lambda \wedge \omega_\lambda^1 = 0 + \omega_{23} \wedge \omega_{31} \\
&= \left(\frac{1}{2} z^{-3/4} e^2\right) \wedge \left(-\frac{1}{2} z^{-3/4} e^1\right) \\
&= -\frac{1}{4} z^{-3/2} e^2 \wedge e^1, \\
\mathbf{R}_2^3 &= d\omega_2^3 + \omega_2^\lambda \wedge \omega_\lambda^3 = d\omega_{23} + 0 \\
&= d\left(\frac{1}{2} z^{-1/4} dy\right) \\
&\stackrel{(5-1-12)}{=} -\frac{1}{8} z^{-5/4} dz \wedge dy = \frac{1}{8} z^{-5/4} dy \wedge dz \\
&= \frac{1}{8} z^{-5/4} z^{-1/2} z^{1/4} (z^{1/2} dy) \wedge (z^{-1/4} dz) \\
&= \frac{1}{8} z^{-3/2} e^2 \wedge e^3 \\
\mathbf{R}_3^0 &= d\omega_3^0 + \omega_3^\lambda \wedge \omega_\lambda^0 = d\omega_{03} + 0 \\
&= \mathbf{R}_0^3, \\
\mathbf{R}_3^1 &= -\mathbf{R}_1^3, \\
\mathbf{R}_3^2 &= -\mathbf{R}_2^3.
\end{aligned}$$

这些式子可写为

$$(R_\sigma{}^\tau)_{ab} = R(\sigma, \tau) (e^\sigma)_a \wedge (e^\tau)_b = 2R(\sigma, \tau) (e^\sigma)_{[a} (e^\tau)_{b]}.$$

因此黎曼曲率在正交归一标架基底的分量为

$$R_{\mu\nu\sigma}{}^\tau = (R_\sigma{}^\tau)_{ab} (e_\mu)^a (e_\nu)^b$$

$$\begin{aligned}
&= 2R(\sigma, \tau) (e^\sigma)_{[a} (e^\tau)_{b]} (e_\mu)^a (e_\nu)^b \\
&= 2R(\sigma, \tau) \delta^\sigma_{[\mu} \delta^\tau_{\nu]} \\
&= R(\sigma, \tau) (\delta^\sigma_\mu \delta^\tau_\nu - \delta^\sigma_\nu \delta^\tau_\mu) ,
\end{aligned}$$

于是求得非零黎曼曲率张量

$$\begin{aligned}
R_{010}{}^1 &= -R_{100}{}^1 = R(0, 1) = -\frac{1}{8}z^{-3/2} , \\
R_{020}{}^2 &= -R_{200}{}^2 = R(0, 2) = -\frac{1}{8}z^{-3/2} , \\
R_{030}{}^3 &= -R_{300}{}^3 = R(0, 3) = \frac{1}{4}z^{-3/2} , \\
R_{121}{}^2 &= -R_{211}{}^2 = R(1, 2) = -\frac{1}{4}z^{-3/2} , \\
R_{131}{}^3 &= -R_{311}{}^3 = R(1, 3) = \frac{1}{8}z^{-3/2} , \\
R_{232}{}^3 &= -R_{322}{}^3 = R(2, 3) = \frac{1}{8}z^{-3/2} .
\end{aligned}$$

它们与第 3 章习题 15 的结果 $R_{(\mu)(\nu)(\sigma)}^{(\tau)}$ 的关系为

$$\begin{aligned}
R_{txt}{}^x &= R_{abc}{}^d (\partial_t)^a (\partial_x)^b (\partial_t)^c (dx)_d \\
&= R_{\mu\nu\sigma}{}^\tau (e^\mu)_a (e^\nu)_b (e^\sigma)_c (e_\tau)^d (\partial_t)^a (\partial_x)^b (\partial_t)^c (dx)_d \\
&= R_{\mu\nu\sigma}{}^\tau (e^\mu)_a (e^\nu)_b (e^\sigma)_c (e_\tau)^d z^{-1/4} (e_0)^a z^{1/2} (e_1)^b z^{-1/4} (e_0)^c z^{-1/2} (e^1)_d \\
&= R_{\mu\nu\sigma}{}^\tau z^{-1/2} (e^\mu)_a (e_0)^a (e^\nu)_b (e_1)^b (e^\sigma)_c (e_0)^c (e_\tau)^d (e^1)_d \\
&= R_{\mu\nu\sigma}{}^\tau z^{-1/2} \delta^\mu_0 \delta^\nu_1 \delta^\sigma_0 \delta^1_\tau \\
&= R_{010}{}^1 z^{-1/2} = -\frac{1}{8}z^{-3/2} z^{-1/2} = -\frac{1}{8z^2} , \\
R_{tyt}{}^y &= R_{abc}{}^d (\partial_t)^a (\partial_y)^b (\partial_t)^c (dy)_d \\
&= R_{\mu\nu\sigma}{}^\tau (e^\mu)_a (e^\nu)_b (e^\sigma)_c (e_\tau)^d (\partial_t)^a (\partial_y)^b (\partial_t)^c (dy)_d \\
&= R_{\mu\nu\sigma}{}^\tau (e^\mu)_a (e^\nu)_b (e^\sigma)_c (e_\tau)^d z^{-1/4} (e_0)^a z^{1/2} (e_2)^b z^{-1/4} (e_0)^c z^{-1/2} (e^2)_d \\
&= R_{\mu\nu\sigma}{}^\tau z^{-1/2} (e^\mu)_a (e_0)^a (e^\nu)_b (e_2)^b (e^\sigma)_c (e_0)^c (e_\tau)^d (e^2)_d \\
&= R_{\mu\nu\sigma}{}^\tau z^{-1/2} \delta^\mu_0 \delta^\nu_2 \delta^\sigma_0 \delta^2_\tau \\
&= R_{020}{}^2 z^{-1/2} = -\frac{1}{8}z^{-3/2} z^{-1/2} = -\frac{1}{8z^2} , \\
R_{tzt}{}^z &= R_{abc}{}^d (\partial_t)^a (\partial_z)^b (\partial_t)^c (dz)_d \\
&= R_{\mu\nu\sigma}{}^\tau (e^\mu)_a (e^\nu)_b (e^\sigma)_c (e_\tau)^d (\partial_t)^a (\partial_z)^b (\partial_t)^c (dz)_d \\
&= R_{\mu\nu\sigma}{}^\tau (e^\mu)_a (e^\nu)_b (e^\sigma)_c (e_\tau)^d z^{-1/4} (e_0)^a z^{-1/4} (e_3)^b z^{-1/4} (e_0)^c z^{1/4} (e^3)_d \\
&= R_{\mu\nu\sigma}{}^\tau z^{-1/2} (e^\mu)_a (e_0)^a (e^\nu)_b (e_3)^b (e^\sigma)_c (e_0)^c (e_\tau)^d (e^3)_d \\
&= R_{\mu\nu\sigma}{}^\tau z^{-1/2} \delta^\mu_0 \delta^\nu_3 \delta^\sigma_0 \delta^3_\tau \\
&= R_{030}{}^3 z^{-1/2} = \frac{1}{4}z^{-3/2} z^{-1/2} = \frac{1}{4z^2} ,
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
R_{xyx}{}^y &= R_{abc}{}^d (\partial_x)^a (\partial_y)^b (\partial_x)^c (dy)_d \\
&= R_{\mu\nu\sigma}{}^\tau (e^\mu)_a (e^\nu)_b (e^\sigma)_c (e_\tau)^d (\partial_x)^a (\partial_y)^b (\partial_x)^c (dy)_d \\
&= R_{\mu\nu\sigma}{}^\tau (e^\mu)_a (e^\nu)_b (e^\sigma)_c (e_\tau)^d z^{1/2} (e_1)^a z^{1/2} (e_2)^b z^{1/2} (e_1)^c z^{-1/2} (e^2)_d \\
&= R_{\mu\nu\sigma}{}^\tau z (e^\mu)_a (e_1)^a (e^\nu)_b (e_2)^b (e^\sigma)_c (e_1)^c (e_\tau)^d (e^2)_d \\
&= R_{\mu\nu\sigma}{}^\tau z \delta^\mu{}_1 \delta^\nu{}_2 \delta^\sigma{}_1 \delta^2{}_\tau \\
&= R_{121}{}^2 z = -\frac{1}{4} z^{-3/2} z = -\frac{1}{4z^{1/2}}, \\
R_{xzx}{}^z &= R_{abc}{}^d (\partial_x)^a (\partial_z)^b (\partial_x)^c (dz)_d \\
&= R_{\mu\nu\sigma}{}^\tau (e^\mu)_a (e^\nu)_b (e^\sigma)_c (e_\tau)^d (\partial_x)^a (\partial_z)^b (\partial_x)^c (dz)_d \\
&= R_{\mu\nu\sigma}{}^\tau (e^\mu)_a (e^\nu)_b (e^\sigma)_c (e_\tau)^d z^{1/2} (e_1)^a z^{-1/4} (e_3)^b z^{1/2} (e_1)^c z^{1/4} (e^3)_d \\
&= R_{\mu\nu\sigma}{}^\tau z (e^\mu)_a (e_1)^a (e^\nu)_b (e_3)^b (e^\sigma)_c (e_1)^c (e_\tau)^d (e^3)_d \\
&= R_{\mu\nu\sigma}{}^\tau z \delta^\mu{}_1 \delta^\nu{}_3 \delta^\sigma{}_1 \delta^3{}_\tau \\
&= R_{131}{}^3 z = \frac{1}{8} z^{-3/2} z = \frac{1}{8z^{1/2}}, \\
R_{yzy}{}^z &= R_{abc}{}^d (\partial_y)^a (\partial_z)^b (\partial_y)^c (dz)_d \\
&= R_{\mu\nu\sigma}{}^\tau (e^\mu)_a (e^\nu)_b (e^\sigma)_c (e_\tau)^d (\partial_y)^a (\partial_z)^b (\partial_y)^c (dz)_d \\
&= R_{\mu\nu\sigma}{}^\tau (e^\mu)_a (e^\nu)_b (e^\sigma)_c (e_\tau)^d z^{1/2} (e_2)^a z^{-1/4} (e_3)^b z^{1/2} (e_2)^c z^{1/4} (e^3)_d \\
&= R_{\mu\nu\sigma}{}^\tau z (e^\mu)_a (e_2)^a (e^\nu)_b (e_3)^b (e^\sigma)_c (e_2)^c (e_\tau)^d (e^3)_d \\
&= R_{\mu\nu\sigma}{}^\tau z \delta^\mu{}_2 \delta^\nu{}_3 \delta^\sigma{}_2 \delta^3{}_\tau \\
&= R_{232}{}^3 z = \frac{1}{8} z^{-3/2} z = \frac{1}{8z^{1/2}}.
\end{aligned}$$

这正是前面通过坐标基底场的度规张量计算的结果.

(C) 习题 16.

(a) 选正交归一标架. 线元 $ds^2 = -dt^2 + dx^2 + dy^2 + h^2 dz^2$, 其中 $h = t + \alpha(z)x + \beta(z)y + \gamma(z)$, 故非归一坐标基底的度规分量为

$$\begin{aligned}
g_{tt} &= -1, & g_{zz} &= h^2, & g_{xx} &= 1, & g_{yy} &= 1; \\
g^{tt} &= -1, & g^{zz} &= h^{-2}, & g^{xx} &= 1, & g^{yy} &= 1.
\end{aligned}$$

度规张量场为

$$\begin{aligned}
g_{ab} &= g_{tt} (dt)_a (dt)_b + g_{zz} (dz)_a (dz)_b + g_{xx} (dx)_a (dx)_b + g_{yy} (dy)_a (dy)_b \\
&= \eta_{00} (e^0)_a (e^0)_b + \eta_{33} (e^3)_a (e^3)_b + \eta_{11} (e^1)_a (e^1)_b + \eta_{22} (e^2)_a (e^2)_b, \\
g^{ab} &= g^{tt} (\partial_t)^a (\partial_t)^b + g^{zz} (\partial_z)^a (\partial_z)^b + g^{xx} (\partial_x)^a (\partial_x)^b + g^{yy} (\partial_y)^a (\partial_y)^b \\
&= \eta^{00} (e_0)^a (e_0)^b + \eta^{33} (e_3)^a (e_3)^b + \eta^{11} (e_1)^a (e_1)^b + \eta^{22} (e_2)^a (e_2)^b,
\end{aligned}$$

其中 $\{(e_\mu)^a\}$ 和 $\{(e^\mu)_a\}$ ($\mu = 0, 1, 2, 3$) 为正交归一的基底和对偶基底, 即度规分量为洛伦兹度规 $-\eta_{00} = -\eta^{00} = \eta_{11} = \eta^{11} = \eta_{22} = \eta^{22} = \eta_{33} = \eta^{33} = 1$.

比较得

$$\begin{aligned}(e_0)^a &= (\partial_t)^a, \quad (e_3)^a = h^{-1}(\partial_z)^a, \quad (e_1)^a = (\partial_x)^a, \quad (e_2)^a = (\partial_y)^a; \\ (e^0)_a &= (dt)_a, \quad (e^3)_a = h(dz)_a, \quad (e^1)_a = (dx)_a, \quad (e^2)_a = (dy)_a.\end{aligned}$$

用 g_{ab} 降 $(e_\mu)^b$ 或用 $\eta_{\mu\nu}$ 降 $(e^\nu)_a$, 如: $(e_0)_a = g_{ab}(e_0)^b = \eta_{00}(e^0)_a(e^0)_b(e_0)^b = -(e^0)_a = -(dt)_a$, 或 $(e_0)_a = \eta_{0\nu}(e^\nu)_a = -(e^0)_a = -(dt)_a$. 因此

$$(e_0)_a = -(dt)_a, \quad (e_3)_a = h(dz)_a, \quad (e_1)_a = (dx)_a, \quad (e_2)_a = (dy)_a.$$

(b) 用式 (5-7-19) 计算 $\Lambda_{\mu\nu\rho}$ 和式 (5-7-20) 计算 $\omega_{\mu\nu\rho}$. 注意到反称关系 $\Lambda_{\mu\nu\rho} = -\Lambda_{\rho\nu\mu}$, 只须计算 $\mu \neq \rho$ 情形. 因为

$$\begin{aligned}(e_0)_\lambda &= (e_0)_a(\partial_\lambda)^a = -(dt)_a(\partial_\lambda)^a = -\delta^0_\lambda, \\ (e_3)_\lambda &= (e_3)_a(\partial_\lambda)^a = h(dz)_a(\partial_\lambda)^a = h\delta^3_\lambda, \\ (e_1)_\lambda &= (e_1)_a(\partial_\lambda)^a = (dx)_a(\partial_\lambda)^a = \delta^1_\lambda, \\ (e_2)_\lambda &= (e_2)_a(\partial_\lambda)^a = (dy)_a(\partial_\lambda)^a = \delta^2_\lambda,\end{aligned}$$

有

$$\begin{aligned}(e_0)_{\lambda,\tau} &= \partial_\tau(\delta^0_\lambda) = 0, \\ (e_3)_{\lambda,\tau} &= \partial_\tau(h\delta^3_\lambda) \\ &= \delta^3_\lambda(\delta^0_\tau h_t + \delta^3_\tau h_z + \delta^1_\tau h_x + \delta^2_\tau h_y) \\ &= h_\sigma \delta^3_\lambda \delta^\sigma_\tau, \\ (e_1)_{\lambda,\tau} &= \partial_\tau(\delta^1_\lambda) = 0, \\ (e_2)_{\lambda,\tau} &= \partial_\tau(\delta^2_\lambda) = 0,\end{aligned}$$

其中因 $h = t + \alpha(z)x + \beta(z)y + \gamma(z)$,

$$\begin{aligned}h_t &\equiv h_0 = 1, \\ h_z &\equiv h_3 = \alpha'(z)x + \beta'(z)y + \gamma'(z), \\ h_x &\equiv h_1 = \alpha(z), \\ h_y &\equiv h_2 = \beta(z).\end{aligned}$$

代入式 (5-7-19) $\Lambda_{\mu\nu\rho} = [(e_\nu)_{\lambda,\tau} - (e_\nu)_{\tau,\lambda}](e_\mu)^\lambda(e_\rho)^\tau$:

$$\begin{aligned}\Lambda_{\mu 0\rho} &= [(e_0)_{\lambda,\tau} - (e_0)_{\tau,\lambda}](e_\mu)^\lambda(e_\rho)^\tau = 0, \\ \Lambda_{\mu 3\rho} &= [(e_3)_{\lambda,\tau} - (e_3)_{\tau,\lambda}](e_\mu)^\lambda(e_\rho)^\tau \\ &= h_\sigma [\delta^3_\lambda \delta^\sigma_\tau - \delta^3_\tau \delta^\sigma_\lambda](e_\mu)^\lambda(e_\rho)^\tau \\ &= h_\sigma [(e_\mu)^3(e_\rho)^\sigma - (e_\mu)^\sigma(e_\rho)^3], \\ \Lambda_{\mu 1\rho} &= [(e_1)_{\lambda,\tau} - (e_1)_{\tau,\lambda}](e_\mu)^\lambda(e_\rho)^\tau = 0, \\ \Lambda_{\mu 2\rho} &= [(e_2)_{\lambda,\tau} - (e_2)_{\tau,\lambda}](e_\mu)^\lambda(e_\rho)^\tau = 0.\end{aligned}$$

因此只有 $\Lambda_{\mu 3\rho}$ 非零:

$$\begin{aligned}\Lambda_{33\sigma} &= -\Lambda_{\sigma 33} = h_\sigma (e_3)^3 (e_\sigma)^\sigma = h_\sigma h^{-1}(e_\sigma)^\sigma \\ &= h^{-1} h_\sigma (e_\sigma)^\sigma, \quad (\sigma \text{不求和}, \sigma \neq 3)\end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned}\Lambda_{330} &= -\Lambda_{033} = h^{-1} h_0 (e_0)^0 = h^{-1} h_t, \\ \Lambda_{331} &= -\Lambda_{133} = h^{-1} h_1 (e_1)^1 = h^{-1} h_x, \\ \Lambda_{332} &= -\Lambda_{233} = h^{-1} h_2 (e_2)^2 = h^{-1} h_y.\end{aligned}$$

代入式 (5-7-20) $\omega_{\mu\nu\rho} = \frac{1}{2}(\Lambda_{\mu\nu\rho} + \Lambda_{\rho\mu\nu} - \Lambda_{\nu\rho\mu})$ 求得非零的 $\omega_{\mu\nu\rho}$ (注意反称关系, 非零时 $\mu \neq \nu$). 容易看出 $(\mu, \nu) = (0, 1)$ 时没有, $(0, 2)$ 时没有, $(0, 3)$ 时可以有, $(1, 2)$ 时没有, $(1, 3)$ 时可以有, $(2, 3)$ 时可以有:

$$\begin{aligned}\omega_{033} &= \frac{1}{2}(\Lambda_{033} + \Lambda_{303} - \Lambda_{330}) = \Lambda_{033} = -h^{-1} h_t = -\omega_{330}, \\ \omega_{133} &= \frac{1}{2}(\Lambda_{133} + \Lambda_{313} - \Lambda_{331}) = \Lambda_{133} = -h^{-1} h_x = -\omega_{331}, \\ \omega_{233} &= \frac{1}{2}(\Lambda_{233} + \Lambda_{323} - \Lambda_{332}) = \Lambda_{233} = -h^{-1} h_y = -\omega_{322}.\end{aligned}$$

联络 1 形式为 $\omega_{\mu\nu} = \omega_{\mu\nu a} = \omega_{\mu\nu\lambda}(e^\lambda)_a = \omega_{\mu\nu\lambda} e^\lambda$:

$$\begin{aligned}\omega_{03} &= \omega_{033} e^3 = -h^{-1} h_t e^3 \\ &= -h^{-1} h_t h dz = -dz, \\ \omega_{13} &= \omega_{133} e^3 = -h^{-1} h_x e^3 \\ &= -h^{-1} h_x h dz = -\alpha(z) dz, \\ \omega_{23} &= \omega_{233} e^3 = -h^{-1} h_y e^3 \\ &= -h^{-1} h_y h dz = -\beta(z) dz,\end{aligned}$$

有 3 个非零的独立元素.

(c) 用嘉当第二结构方程求曲率 2 形式. 由 $\omega_\mu{}^\nu = \eta^{\nu\sigma} \omega_{\mu\sigma}$ 知 $\omega_0^i = \omega_{0i}$, $\omega_i^0 = -\omega_{i0} = \omega_{0i}$ 以及 $\omega_i^j = \omega_{ij}$. 代入式 (5-7-8): $R_\mu{}^\nu = d\omega_\mu{}^\nu + \omega_\mu{}^\lambda \wedge \omega_\lambda{}^\nu$, 得黎曼曲率 2 形式. 显然有定理 3-4-6 性质 (4) 式 (3-4-9): $R_{\mu\nu} = -R_{\nu\mu}$. 证明如下: $R_{\mu\nu} = d\omega_{\mu\nu} + \omega_\mu{}^\lambda \wedge \omega_{\lambda\nu} = -d\omega_{\nu\mu} - \omega_{\lambda\nu} \wedge \omega_\mu{}^\lambda = -d\omega_{\nu\mu} + \omega_{\nu\lambda} \wedge \omega_\mu{}^\lambda = -d\omega_{\nu\mu} + \omega_\nu{}^\lambda \wedge \omega_{\mu\lambda} = -d\omega_{\nu\mu} - \omega_\nu{}^\lambda \wedge \omega_{\lambda\mu} = -R_{\nu\mu}$.

$$\begin{aligned}R_0^1 &= d\omega_0^1 + \omega_0{}^\lambda \wedge \omega_\lambda^1 = 0 + \omega_{03} \wedge \omega_{31} \\ &= (-dz) \wedge (\alpha dz) \\ &= 0,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
R_0^2 &= d\omega_0^2 + \omega_0^\lambda \wedge \omega_\lambda^2 = 0 + \omega_{03} \wedge \omega_{32} \\
&= (-dz) \wedge (\beta dz) \\
&= 0, \\
R_0^3 &= d\omega_0^3 + \omega_0^\lambda \wedge \omega_\lambda^3 = d\omega_{03} + 0 \\
&= d(-dz) \\
&= 0, \quad (\text{定理 5-1-5}) \\
R_1^2 &= d\omega_1^2 + \omega_1^\lambda \wedge \omega_\lambda^2 = 0 + \omega_{13} \wedge \omega_{32} \\
&= (-\alpha dz) \wedge (\beta dz) \\
&= 0, \\
R_1^3 &= d\omega_1^3 + \omega_1^\lambda \wedge \omega_\lambda^3 = d\omega_{13} + 0 \\
&= d(-\alpha dz) \\
&\stackrel{(5-1-12)}{=} -\alpha' dz \wedge dz \\
&= 0, \\
R_2^3 &= d\omega_2^3 + \omega_2^\lambda \wedge \omega_\lambda^3 = d\omega_{23} + 0 \\
&= d(-\beta dz) \\
&\stackrel{(5-1-12)}{=} -\beta' dz \wedge dz \\
&= 0.
\end{aligned}$$

因此知道曲率张量恒为零！与前面通过坐标基底场的度规张量计算的结果相同。

第 6 章 “狭义相对论” 习题

1. 惯性观者 G 和 G' 相对速率为 $u = 0.6c$, 相遇时把钟读数都调为零. 用时空图讨论: (a) 在 G 所属的惯性参考系看来 (以其同时观判断), 当 G 钟读数为 $5\mu s$ 时, G' 钟的读数是多少? (b) 当 G 钟读数为 $5\mu s$ 时, 他实际看见 G' 钟的读数是多少?

解 $\gamma = (1 - u^2)^{-1/2} = 1.25$. 由图中的几何关系知:

(a) $l_{ob} = \sqrt{l_{oa}^2 - l_{ab}^2} = \sqrt{l_{oa}^2 - (ul_{oa})^2} = \sqrt{1 - u^2} l_{oa} = \gamma^{-1} l_{oa} = 5/1.25 = 4\mu s$. 当 G 钟读数为 $5\mu s$ 时, G' 钟的读数是 $4\mu s$.

(b) $l_{oc} = \gamma^{-1} l_{od} = \gamma^{-1} (l_{oa} - l_{ad}) = \gamma^{-1} (l_{oa} - l_{cd}) = \gamma^{-1} (l_{oa} - ul_{od}) = \gamma^{-1} (l_{oa} - u\gamma l_{oc})$. 解得 $l_{oc} = (1 + u)^{-1} \gamma^{-1} l_{oa} = \sqrt{\frac{1-u}{1+u}} l_{oa} = \sqrt{\frac{1-0.6}{1+0.6}} \times 5 = 2.5\mu s$. 当 G 钟读数为 $5\mu s$ 时, 他实际看见 G' 钟的读数是 $2.5\mu s$.

2. 远方星体以 $0.8c$ 的速率 (匀速直线地) 离开我们, 我们测得它辐射来的闪光按 5 昼夜的周期变化. 用时空图求星上观者测得的闪光周期.

解 根据上题 (b) 的结果我们知道 $l_{ob} = (1+v)^{-1}\gamma^{-1}l_{oa}$, $l_{od} = (1+v)^{-1}\gamma^{-1}l_{ob}$, 两式相减即得 $\Delta t' = l_{bd} = l_{od} - l_{ob} = (1+v)^{-1}\gamma^{-1}(l_{oc} - l_{oa}) = (1+v)^{-1}\gamma^{-1}l_{ac} = (1+v)^{-1}\gamma^{-1}\Delta t = \sqrt{\frac{1-u}{1+u}}\Delta t = \sqrt{\frac{1-0.8}{1+0.8}} \times 5 = \frac{5}{3}$ 昼夜.

这里的因子 $(1+u)^{-1}\gamma^{-1} = \sqrt{\frac{1-u}{1+u}}$ 也可以通过洛伦兹变换如下求得: 设时空原点两参考系 (我们和星体) 重合. 当我们的时间为 t 时, 星体距离我们为 vt , 星体上的钟走过 $\gamma^{-1}t$. 但是我们看到这一刻度必定在 $vt/c = vt$ 时间之后. 因此我们的钟走过 $t + vt = (1+v)t$ 时 “看到” 星体的钟走过 $\gamma^{-1}t$. 换句话说当我们的钟走过 t 时我们 “看到” 星体上的钟走过 $(1+u)^{-1}\gamma^{-1}t$.

3. 用图 6-20 的 oa 段和 oe 段线长分别记作 τ 和 τ' . (a) 用两钟的相对速率 u 表出 τ'/τ ; (b) 在 $u = 0.6c$ 和 $u = 0.8c$ 两种情况下求出 τ'/τ 的数值.

解 (a) 因 $l_{oa} = l_{ob} - l_{ab} = l_{ob} - l_{be} = l_{ob} - ul_{ob} = (1-u)l_{ob} = (1-u)\gamma l_{oe} = (1+u)^{-1/2}l_{oe}$, 即 $\tau = (1+u)^{-1/2}\tau'$, 故 $\tau'/\tau = (1+u)^{1/2}$.

(b) 当 $u = 0.6c$ 时, $\tau'/\tau = (1+0.6)^{1/2} = 1.265$; 当 $u = 0.8c$ 时, $\tau'/\tau = (1+0.8)^{1/2} = 1.342$. 注意这个比值有个极限 $\sqrt{2} = 1.414$.

4. 惯性质点 A, B, C 排成一直线并沿此线相对运动 (见图 6-42), 相对速率 $u_{BA} = 0.6c$, $u_{CA} = 0.8c$, A, B 所在惯性系各为 \mathcal{R}_A 和 \mathcal{R}_B . 设 \mathcal{R}_B 系认为 (测得) C 走了 60m, 画出时空图并求 \mathcal{R}_A 认为 (测得) 这一过程的时间.

解 解法 1. 转化成图中的几何语言, 待解的问题是: 已知 l_{oa} , 求出 $l_{od} = l_{fb}$. 令 $u_B \equiv u_{BA}$, $u_C \equiv u_{CA}$. 首先由关系 $l_{of} = l_{fb}u_C$, 即 $l_{og} + l_{gf} = (l_{fe} + l_{eb})u_C$, 知

$$l_{oa}\gamma_B + l_{ab}\gamma_B u_B = (l_{oa}\gamma_B u_B + l_{ab}\gamma_B)u_C,$$

解得关系

$$\frac{l_{oa}}{l_{ab}} = \frac{u_C - u_B}{1 - u_C u_B}.$$

这其实就是相对论速度迭加公式. 于是

$$\begin{aligned} l_{od} &= l_{fb} = l_{fe} + l_{eb} = l_{oa}\gamma_B u_B + l_{ab}\gamma_B = \gamma_B(l_{oa}u_B + l_{ab}) \\ &= \gamma_B \left(l_{oa}u_B + l_{oa} \frac{1 - u_C u_B}{u_C - u_B} \right) = l_{oa}\gamma_B \frac{1 - u_B^2}{u_C - u_B} \\ &= l_{oa} \frac{\sqrt{1 - u_B^2}}{u_C - u_B}. \end{aligned}$$

解法 2. A 和 B 之间的相对速率为 $v_A = u_{BA} = u_B$, 而 B 和 C 之间的相对速率为 $v_C = \frac{u_{CA} - u_{BA}}{1 - u_{CA}u_{BA}} = \frac{u_C - u_B}{1 - u_C u_B}$. 待解的问题仍然是: 已知 l_{oa} , 求出 l_{od} . 首先

注意关系 $l_{df} = l_{of}v_A = l_{od}\gamma_A v_A$, 而

$$\begin{aligned} l_{of} &= l_{oc} + l_{ce} + l_{ef} = l_{ab} + l_{cb}v_A + l_{df}v_A \\ &= l_{oa}/v_C + l_{oa}v_A + (l_{od}\gamma_A v_A)v_A = l_{od}\gamma_A, \end{aligned}$$

解得

$$l_{od} = l_{oa}\gamma_A \left(\frac{1}{v_C} + v_A \right) = l_{oa}\gamma_B \left(\frac{1 - u_C u_B}{u_C - u_B} + u_B \right) = l_{oa} \frac{\sqrt{1 - u_B^2}}{u_C - u_B}.$$

与解法 1 的结果相同.

因此, 最后的答案是 \mathcal{R}_A 测得这一过程的时间为 $60 \times \frac{\sqrt{1-0.6^2}}{0.8-0.6} = 240\text{m}/c$.

- ~5. A, B 是同一惯性系的两个惯性观者, 他们互相发射中子, 每一中子以相对速率 $0.6c$ 离开中子枪. 设 B 测得 B 枪的中子发射率为 10^4s^{-1} (即每秒发 10^4 个), 求 A 所发中子 (根据中子自己的标准钟) 测得的 B 枪的中子发射率 (要求画时空图求解).

解 从时空图可以找出 l_{oa} 和 l_{ob} 之间的关系.

$$\begin{aligned} l_{oc} &= l_{oa}\gamma_A, \\ l_{oe} &= l_{ob}\gamma_B; \\ l_{dc} &= l_{ca}v_A = (l_{oc}v_A)v_A = l_{oa}\gamma_A v_A^2, \\ l_{ed} &= l_{be}v_A = (l_{oe}v_B)v_A = l_{ob}\gamma_B v_A v_B. \end{aligned}$$

而

$$l_{oc} = l_{oe} + l_{ed} + l_{dc} = l_{ob}\gamma_B + l_{ob}\gamma_B v_A v_B + l_{oa}\gamma_A v_A^2 = l_{oa}\gamma_A,$$

解得

$$l_{oa} = l_{ob} \frac{\gamma_B(1 + v_A v_B)}{\gamma_A(1 - v_A^2)} = l_{ob}\gamma_A\gamma_B(1 + v_A v_B).$$

对于本题 $v_A = v_B = v = 0.6c$, $\gamma_A = \gamma_B = \gamma = 1.25$, $l_{oa} = l_{ob} \frac{1+v^2}{1-v^2}$. 故 A 所发中子测得的 B 枪的中子发射率为 $10^4 \times \frac{1-0.6^2}{1+0.6^2} = 4.71 \times 10^3 \text{s}^{-1}$. 从所得结果的对称形式可以知道, B 所发中子测得的 A 枪的中子发射率也是 $4.71 \times 10^3 \text{s}^{-1}$.

- ~6. 静止 μ 子的平均寿命为 $\tau_0 = 2 \times 10^{-6}\text{s}$. 宇宙线产生的 μ 子相对于地球以 $0.995c$ 的速率匀速直线下落, 用时空图求地球观者测得的 (a) μ 子的平均寿命; (b) μ 子在其平均寿命内所走过的距离.

解 $l_{ob} = l_{oa}\gamma$, $l_{oc} = l_{ca}v = l_{ob}v = l_{oa}\gamma v$. 因此 (a) μ 子的平均寿命 $\tau = l_{ob} = l_{oa}\gamma = \tau_0\gamma = 2 \times 10^{-6} \times (1 - 0.995^2)^{-1/2} = 2.00 \times 10^{-5}\text{s}$. (b) μ 子在其平均寿命内所走过的距离 $l_{oc} = l_{oa}\gamma v = \tau v = 1.99 \times 10^{-5}\text{s} \times c$.

7. 从惯性系 \mathcal{R} 看来 (认为, 测得), 位于某地 A 的两标准钟甲、乙指零时开始以速率 $v = 0.6c$ 一同做匀速直线运动. 两钟指 1s 时到达某地 B. 甲钟在到达 B 时立即以速率 v 向 A 地匀速返回, 乙钟在 B 地停留 1s (按他的钟) 后以速率 v 向 A 地匀速返回. 另有丙钟一直呆在 A 地, 且当甲、乙离 A 地时也指零, (a) 画出甲、乙、丙的世界线; (b) 求乙钟返回 A 地时三钟的读数 $\tau_{\text{甲}}$, $\tau_{\text{乙}}$ 和 $\tau_{\text{丙}}$.

解 $\gamma = 1.25$. 乙钟的读数 $\tau_{\text{乙}} = l_{oa} + l_{ac} + l_{cd} = 1 + 1 + 1 = 3\text{s}$. 甲钟的读数为 $\tau_{\text{甲}} = l_{oa} + l_{ab} + l_{bd} = l_{oa} + l_{ab} + l_{ac} = 1 + 1 + 1 = 3\text{s}$. 而丙钟的读数为

$$\begin{aligned}\tau_{\text{丙}} &= l_{od} = l_{oe} + l_{ef} + l_{fd} = l_{oa}\gamma + l_{ac} + l_{cd}\gamma \\ &= 2 \times 1.25 + 1 = 3.5 \text{ s} .\end{aligned}$$

- ~8. (单选题) 双子 A, B 静止于某惯性系 \mathcal{R} 中的同一空间点上. A 从某时刻 (此时 A, B 年龄相等) 开始向东以速率 u 相对于 \mathcal{R} 系做惯性运动, 一段时间后 B 以速率 $v > u$ 向东追上 A, 则相遇时 A 的年龄

(1) 比 B 大, (2) 比 B 小, (3) 与 B 等.

解 (1) 比 B 大. A 流逝的时间为 l_{oa} , B 流逝的时间为 $l_{ob} + l_{ba}$. 因为类时世界线以测地线 (直线) 为最长, 故 $l_{oa} > l_{ob} + l_{ba}$. 下面我们证明这一不等关系. 注意到 $l_{ca} = l_{oc}u = l_{oa}\gamma_u u$, 有 $l_{ba} = l_{bc}/\gamma_v = l_{ca}/v\gamma_v = l_{oa}\gamma_u u/v\gamma_v$. 另外 $l_{ob} = l_{oc} - l_{bc} = l_{oa}\gamma_u - l_{ca}/v = l_{oa}\gamma_u - l_{oa}\gamma_u u/v$. 于是

$$l_{ob} + l_{ba} = l_{oa}\gamma_u - l_{oa}\gamma_u u/v + l_{oa}\gamma_u u/v\gamma_v = l_{oa}\gamma_u (1 - u/v + u/v\gamma_v)$$

可以证明当 $v > u$ 时 $\gamma_u (1 - u/v + u/v\gamma_v) < 1$. 即

$$1 - \frac{u}{v}(1 - \sqrt{1 - v^2}) < \sqrt{1 - u^2} .$$

因左边恒为正, 可以平方得

$$1 + \frac{u^2}{v^2}(1 - \sqrt{1 - v^2})^2 - 2\frac{u}{v}(1 - \sqrt{1 - v^2}) < 1 - u^2 ,$$

即

$$\begin{aligned}& 1 + \frac{u^2}{v^2}(2 - v^2 - 2\sqrt{1 - v^2}) - 2\frac{u}{v}(1 - \sqrt{1 - v^2}) \\ &= 1 + \frac{2u^2}{v^2} - u^2 - \frac{2u^2}{v^2}\sqrt{1 - v^2} - \frac{2u}{v} + \frac{2u}{v}\sqrt{1 - v^2} \\ &= (1 - u^2) - \frac{2u}{v}\left(1 - \frac{u}{v}\right) - \frac{2u}{v}\left(1 - \frac{u}{v}\right)\sqrt{1 - v^2} < (1 - u^2) .\end{aligned}$$

可见该不等式在 $v > u$ 时成立 ($v = u$ 时变为等式).

9. 标准钟 A, B 静止于某惯性系中的同一空间点上. A 钟从某时刻开始以速率 $u = 0.6c$ 匀速直线飞出, 2s(根据 A 钟) 后以 $u = 0.6c$ 匀速直线返航. 已知分手时两钟皆指零. (1) 求重逢时两钟的读数; (2) 当 A 钟指 3s 时 A 看见 B 钟指多少?

解 $\gamma = 1.25$. (1) 因 $l_{ob} = l_{oc} + l_{cb} = l_{oa}\gamma + l_{ab}\gamma$, 故重逢时 A 钟的读数为 $l_{oa} + l_{ab} = 2 + 2 = 4$ s, B 钟的读数为 $l_{ob} = 2 \times 1.25 + 2 \times 1.25 = 5$ s.

(2) A 钟在 3s 时 (d 点) 看到 B 钟指向的时刻为 l_{of} , 可以求出

$$\begin{aligned} l_{of} &= l_{ob} - l_{eb} - l_{fe} = l_{ob} - l_{db}\gamma - l_{ed} = l_{ob} - l_{eb} - l_{ed} \\ &= l_{ob} - l_{db}\gamma - l_{db}\gamma u = (l_{oa} + l_{ab})\gamma - \frac{1}{2}l_{ab}\gamma(1 + u) \\ &= 4 \times 1.25 - \frac{1}{2} \times 2 \times 1.25 \times 1.6 = 3 \text{ s} . \end{aligned}$$

因此当 A 钟指 3s 时 A 看见 B 钟也刚好指 3s.

10. 地球自转线速率在赤道之值约为每小时 1600km. 甲、乙为赤道上的一对孪生子. 甲乘飞机以每小时 1600km 的速率向西绕赤道飞行一圈后回家与乙重逢 (忽略地球和太阳引力场的影响. 由第 7 章可知引力的存在对应于时空的弯曲.). (a) 画出地球表面的世界面和甲、乙的世界线 (甲相对于地面的运动抵消了地球自转的效应, 所以甲是惯性观者.); (b) 甲与乙中谁更年轻? (c) 两者年龄差多少? (答: 约为 10^{-7} s.) 注: 本实验已于 1971 年完成, 当然不是对人而是对铯原子钟. 见 Hafele and Keating (1972).

解 乙更年轻, 因为甲是惯性系, 世界线是测地线, 为竖直的时间线, 而乙的世界线为螺旋线, 其线元为 $ds = dt/\gamma$. 所以 $\tau_z = \tau_{\text{甲}}/\gamma$. 两者的年龄差为 $\tau_{\text{甲}}(1 - 1/\gamma)$. 因为

$$\frac{v}{c} = \frac{1.6 \times 10^6 / (60 \times 60)}{3 \times 10^8} = 1.48 \times 10^{-6} \ll 1 ,$$

所以

$$1 - 1/\gamma = 1 - [1 - (v/c)^2]^{1/2} \approx \frac{v^2}{2c^2} = 1.097 \times 10^{-12} .$$

得年龄差

$$\tau_{\text{甲}} \frac{v^2}{2c^2} \approx 24 \times 60 \times 60 \times 1.097 \times 10^{-12} = 9.48 \times 10^{-8} \text{ s} .$$

因此乙 (静止于赤道上) 比甲 (绕赤道反向飞行) 年轻约 10^{-7} s.

11. 静长 $l = 5$ m 的汽车以 $u = 0.6c$ 的速率匀速进库, 库有坚硬后墙. 为简化问题, 假定车头撞墙的信息以光速传播, 车身任一点接到信息立即停下. (a) 设司库测得在车头撞墙的同时车尾的钟 C_W 指零, 求车尾“获悉”车头撞墙

这一信息时 C_W 的读数; (b) 求车完全停下后的静长 \hat{l} ; (c) 用 u 表出新旧静长比 \hat{l}/l .

解 见文中图 6-23. (a) 司库看车头撞墙时车尾在时空点 c , 车上的钟 C_W 指零. 然后车尾的世界线为 l_{cf} , 直到在时空点 f 收到车头在撞墙时发出的信号. 因为 $l_{gc} = l_{gf}u = l_{cf}\gamma u$ 和 $l_{og} = l_{gf} = l_{cf}\gamma$, 而 $l_{og} + l_{gc} = l_{oc} = l/\gamma$, 有 $l_{cf}\gamma + l_{cf}\gamma u = l_{cf}\gamma(1+u) = l/\gamma$. 解得车尾“获悉”车头撞墙这一信息时 C_W 的读数

$$l_{cf} = l(1+u)^{-1}\gamma^{-2} = l(1-u) = \frac{5 \times (1-0.6)}{3 \times 10^8} = 6.67 \times 10^{-9} \text{ s}.$$

(b) 车完全停下后的静长为 $l_{fh} = l_{og} = l_{gf} = l_{cf}\gamma$, 即

$$\hat{l} = l(1-u)\gamma = l\sqrt{\frac{1-u}{1+u}}.$$

(c) 车的新旧静长比为

$$\frac{\hat{l}}{l} = \sqrt{\frac{1-u}{1+u}} = \sqrt{\frac{1-0.6}{1+0.6}} = 0.5.$$

12. 试证命题 6-3-4.

证 由 $0 = U^b \partial_b (-1) = U^b \partial_b (U^a U_a) = U^b U^a \partial_b U_a + U^b U_a \partial_b U^a$, 其中 $U^b U^a \partial_b U_a = U^b U^a \partial_b (\eta_{ac} U^c) = U^b U^a \eta_{ac} \partial_b U^c = U^b U_c \partial_b U^c = U^b U_b \partial_b U^b$, 这里利用了 ∂_a 与 η_{ab} 的适配性 $\partial_b \eta_{ac} = 0$. 于是 $0 = 2U^b U_a \partial_b U^a = 2U_a A^a$. 命题得证.

事实上, 这一结果也可从 U^a 和 A^a 的 $3+1$ 分解后的分量式 (6-3-30) 和 (6-3-37) 看出来. 因为

$$\begin{aligned} U^\mu &= (\gamma, \gamma \vec{u}), \\ A^\mu &= (\gamma^4 \vec{u} \cdot \vec{a}, \gamma^2 \vec{a} + \gamma^4 (\vec{u} \cdot \vec{a}) \vec{u}), \end{aligned}$$

故有

$$\begin{aligned} U^a A_a &= U^\mu A_\mu = -\gamma \gamma^4 \vec{u} \cdot \vec{a} + \gamma \vec{u} \cdot [\gamma^2 \vec{a} + \gamma^4 (\vec{u} \cdot \vec{a}) \vec{u}] \\ &= -\gamma^5 \vec{u} \cdot \vec{a} + \gamma^3 \vec{u} \cdot \vec{a} + u^2 \gamma^5 (\vec{u} \cdot \vec{a}) \\ &= [-\gamma^5 (1-u^2) + \gamma^3] \vec{u} \cdot \vec{a} \\ &= [-\gamma^3 + \gamma^3] \vec{u} \cdot \vec{a} = 0. \end{aligned}$$

~13. 设观者世界线为 $t \sim x$ 面内的双曲线 G (见图 6-43), 图中 K 值为已知, A^a 为观者的 4 加速, 求 $A^a A_a$ (结论是 $A^a A_a$ 为常数, 因此 G 称为匀加速运动观者. 请注意这指的是 4 加速.)

解 双曲线方程为 $x^2 - t^2 = K^2$. 对 t 求导 $2xu - 2t = 0$ 得 3 速 $u = t/x$. 再求导得 3 加速

$$a = \frac{x - tu}{x^2} = \frac{x - t^2/x}{x^2} = \frac{x^2 - t^2}{x^3} = \frac{K^2}{x^3} .$$

有 $\gamma = (1 - u^2)^{-1/2} = (1 - t^2/x^2)^{-1/2} = x/K$. 故由式 (6-3-37) 得 4 加速在该惯性洛伦兹参考系上的分量为

$$\begin{aligned} A^0 &= \left(\frac{x}{K}\right)^4 \left(\frac{t}{x}\right) \left(\frac{K^2}{x^3}\right) = \frac{t}{K^2} , \\ A^1 &= \left(\frac{x}{K}\right)^2 \left(\frac{K^2}{x^3}\right) + \left(\frac{x}{K}\right)^4 \left(\frac{t}{x}\right) \left(\frac{K^2}{x^3}\right) \left(\frac{t}{x}\right) \\ &= \frac{1}{x} + \frac{t^2}{K^2 x} = \frac{1}{x} + \frac{x^2 - K^2}{K^2 x} = \frac{x}{K^2} , \\ A^2 &= A^3 = 0 . \end{aligned}$$

因此有

$$A^a A_a = A^\mu A_\mu = -(A^0)^2 + (A^1)^2 = -\left(\frac{t}{K^2}\right)^2 + \left(\frac{x}{K^2}\right)^2 = \frac{x^2 - t^2}{K^4} = \frac{1}{K^2} .$$

该世界线的观者的 4 加速是个常数. (此世界线又称为 Rindler 世界线, 观者为 Rindler 观者.)

~14. 试证命题 6-6-2.

证 电磁场满足张量变换关系而非矢量变换关系!

$$\begin{aligned} E'_1 &= F'_{10} = F_{ab}(e'_1)^a (e'_0)^b = F_{\mu\nu}(e^\mu)_a (e^\nu)_b (e'_1)^a (e'_0)^b \\ &= F_{\mu\nu}[(dx^\mu)_a (\partial/\partial x')^a][[(dx^\nu)_b (\partial/\partial t')^b] = F_{\mu\nu}(\partial x^\mu/\partial x')(\partial x^\nu/\partial t') \\ &= F_{01}(\partial t/\partial x')(\partial x/\partial t') + F_{10}(\partial x/\partial x')(\partial t/\partial t') = F_{01}(\gamma v)(\gamma v) + F_{10}(\gamma)(\gamma) \\ &= F_{10}\gamma^2(1 - v^2) = F_{10} = E_1 , \\ E'_2 &= F'_{20} = F_{ab}(e'_2)^a (e'_0)^b = F_{\mu\nu}(e^\mu)_a (e^\nu)_b (e'_2)^a (e'_0)^b \\ &= F_{\mu\nu}[(dx^\mu)_a (\partial/\partial y')^a][[(dx^\nu)_b (\partial/\partial t')^b] = F_{\mu\nu}(\partial x^\mu/\partial y')(\partial x^\nu/\partial t') \\ &= F_{20}(\partial y/\partial y')(\partial t/\partial t') + F_{21}(\partial y/\partial y')(\partial x/\partial t') = F_{20}(1)(\gamma) + F_{21}(1)(\gamma v) \\ &= \gamma F_{20} - \gamma v F_{12} = \gamma(E_2 - v B_3) , \\ E'_3 &= F'_{30} = F_{ab}(e'_3)^a (e'_0)^b = F_{\mu\nu}(e^\mu)_a (e^\nu)_b (e'_3)^a (e'_0)^b \\ &= F_{\mu\nu}[(dx^\mu)_a (\partial/\partial z')^a][[(dx^\nu)_b (\partial/\partial t')^b] = F_{\mu\nu}(\partial x^\mu/\partial z')(\partial x^\nu/\partial t') \\ &= F_{30}(\partial z/\partial z')(\partial t/\partial t') + F_{31}(\partial z/\partial z')(\partial x/\partial t') = F_{30}(1)(\gamma) + F_{31}(1)(\gamma v) \\ &= \gamma F_{30} + \gamma v F_{31} = \gamma(E_3 + v B_2) . \end{aligned}$$

也可利用选读 6-6-1 中的关系式 (6-6-6): $(e'_0)^a = \gamma(e_0)^a + \gamma v(e_1)^a$, 和 (6-6-7): $(e'_1)^a = \gamma v(e_0)^a + \gamma(e_1)^a$.

$$B'_1 = F'_{23} = F_{ab}(e'_2)^a (e'_3)^b = F_{ab}(e_2)^a (e_3)^b = F_{23} = B_1 ,$$

$$\begin{aligned}
B'_2 &= F'_{31} = F_{ab}(e'_3)^a(e'_1)^b = F_{ab}(e_3)^a[\gamma v(e_0)^b + \gamma(e_1)^b] \\
&= \gamma v F_{ab}(e_3)^a(e_0)^b + \gamma F_{ab}(e_3)^a(e_1)^b = \gamma v F_{30} + \gamma F_{31} \\
&= \gamma(B_2 + vE_3), \\
B'_3 &= F'_{12} = F_{ab}(e'_1)^a(e'_2)^b = F_{ab}[\gamma v(e_0)^a + \gamma(e_1)^a](e_2)^b \\
&= \gamma v F_{ab}(e_0)^a(e_2)^b + \gamma F_{ab}(e_1)^a(e_2)^b = \gamma v F_{02} + \gamma F_{12} \\
&= \gamma(B_3 - vE_2).
\end{aligned}$$

*15. 设瞬时观者测 F_{ab} 所得电场和磁场分别为 E^a 和 B^a (也记作 \vec{E} 和 \vec{B}), 试证:

(a) $F_{ab}F^{ab} = 2(B^2 - E^2),$

(b) $F_{ab} {}^*F^{ab} = 4\vec{E} \cdot \vec{B}$. 提示: 可用惯性坐标基底把 $F_{ab} {}^*F^{ab}$ 写成分量表达式.

注: 本题表明, 虽然 \vec{E} 和 \vec{B} 都是观者依赖的, $B^2 - E^2$ 和 $\vec{E} \cdot \vec{B}$ 却同观者无关. 事实上, 由 F_{ab} 能构造的独立的不变量只有这两个.

证 电磁场和电磁场张量 (2 形式场) 在惯性坐标基底的分量关系为:

$$\begin{aligned}
E_i &= E^i = F_{i0} = -F_{0i} = -F^{i0} = F^{0i} = \frac{1}{2}\hat{\varepsilon}_{ijk} {}^*F^{jk} = \frac{1}{2}\hat{\varepsilon}^{ijk} {}^*F_{jk}, \\
B_i &= B^i = -{}^*F_{i0} = {}^*F_{0i} = {}^*F^{i0} = -{}^*F^{0i} = \frac{1}{2}\hat{\varepsilon}_{ijk} F^{jk} = \frac{1}{2}\hat{\varepsilon}^{ijk} F_{jk},
\end{aligned}$$

反转形式为

$${}^*F^{ij} = \hat{\varepsilon}^{ijk} E_k, \quad {}^*F_{ij} = \hat{\varepsilon}_{ijk} E^k, \quad F^{ij} = \hat{\varepsilon}^{ijk} B_k, \quad F_{ij} = \hat{\varepsilon}_{ijk} B^k.$$

于是有:

$$\begin{aligned}
(a) \quad F_{ab}F^{ab} &= F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} = F_{0i}F^{0i} + F_{i0}F^{i0} + F_{ij}F^{ij} \\
&= (-E_i)(E^i) + (E_i)(-E^i) + (\hat{\varepsilon}_{ijk}B^k)(\hat{\varepsilon}^{ijl}B_l) \\
&\stackrel{(5-4-10)}{=} -2E_iE^i + (-1)^0(3-2)!2!\delta^l{}_k B^k B_l \\
&= -2E_iE^i + 2B_iB^i = 2(B^2 - E^2).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(b) \quad F_{ab} {}^*F^{ab} &= F_{\mu\nu} {}^*F^{\mu\nu} = F_{0i} {}^*F^{0i} + F_{i0} {}^*F^{i0} + F_{ij} {}^*F^{ij} \\
&= (-E_i)(-B^i) + (E_i)(B^i) + (\hat{\varepsilon}_{ijk}B^k)(\hat{\varepsilon}^{ijl}E_l) \\
&= 2E_iB^i + (-1)^0(3-2)!2!\delta^l{}_k B^k E_l \\
&= 2E_iB^i + 2E_iB^i = 4\vec{E} \cdot \vec{B}.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(c) \quad {}^*F_{ab} {}^*F^{ab} &= {}^*F_{\mu\nu} {}^*F^{\mu\nu} = {}^*F_{0i} {}^*F^{0i} + {}^*F_{i0} {}^*F^{i0} + {}^*F_{ij} {}^*F^{ij} \\
&= (-B_i)(-B^i) + (-B_i)(B^i) + (\hat{\varepsilon}_{ijk}E^k)(\hat{\varepsilon}^{ijl}E_l) \\
&= -2B_iB^i + (-1)^0(3-2)!2!\delta^l{}_k E^k E_l \\
&= -2B_iB^i + 2E_iE^i = 2(E^2 - B^2) = -F_{ab}F^{ab}.
\end{aligned}$$

负号是由于对偶场的 E, B 互换.

~16. 试证命题 6-6-5 (只须证后两个麦氏方程).

证 以 δ_{ab} 代表所选惯性系的等 t 面上的 (诱导) 欧氏度规, $\hat{\partial}_a$ 和 ∂_a 分别代表与 δ_{ab} 和 η_{ab} 适配的导数算符, 令 $Z^a \equiv (\partial/\partial t)^a$. 麦氏方程 (6-6-12) 中的 (c): 注意到空间矢量 B^a 满足 $B_0 = 0$, 便有

$$\begin{aligned}\vec{\nabla} \cdot \vec{B} &= \hat{\partial}^a B_a = \partial B_i / \partial x_i = \partial^a B_a = \partial^a (-{}^*F_{ab} Z^b) = -Z^b \partial^a {}^*F_{ab} \\ &= -Z^b \partial^a \left(\frac{1}{2} \varepsilon_{abcd} F^{cd} \right) = -\frac{1}{2} Z^b \varepsilon_{abcd} \partial^a F^{cd} = \frac{1}{2} \hat{\varepsilon}_{acd} \partial^a F^{cd} \\ &= \frac{1}{2} \hat{\varepsilon}_{[acd]} \partial^a F^{cd} \stackrel{(2-6-19)}{=} \frac{1}{2} \hat{\varepsilon}_{acd} \partial^{[a} F^{cd]} \stackrel{(6-6-11)}{=} 0,\end{aligned}$$

其中 $\hat{\varepsilon}_{acd} \equiv Z^b \varepsilon_{bacd}$ 是等 t 面上与 δ_{ab} 适配的体元.

麦氏方程 (6-6-12) 中的 (d): 由式 (5-6-5c) 知

$$(\vec{\nabla} \times \vec{B})^c = \hat{\varepsilon}^{abc} \hat{\partial}_a B_b,$$

其中的 $\hat{\partial}_a B_b$ 可表为 [据式 (3-1-9)]

$$\hat{\partial}_a B_b = (dx^i)_a (dx^j)_b \hat{\partial}_i B_j = (dx^i)_a (dx^j)_b \partial_i B_j,$$

而 $B_0 = 0$ 导致

$$\partial_a B_b = (dx^\mu)_a (dx^j)_b \partial_\mu B_j = (dx^0)_a (dx^j)_b \partial_0 B_j + (dx^i)_a (dx^j)_b \partial_i B_j,$$

将上式投影到等 t 面, 注意到 $(dx^0)_a$ 的投影为零, $(dx^i)_a$ 的投影等于自身, 与前式比较得

$$\hat{\partial}_a B_b = h_a^d h_b^e \partial_d B_e.$$

注意到 $\hat{\varepsilon}^{abc} = Z_d \varepsilon^{dabc}$ 是空间张量, 其投影等于自身:

$$\begin{aligned}h_a^d h_b^e \hat{\varepsilon}^{abc} &= (\delta_a^d + Z_a Z^d) (\delta_b^e + Z_b Z^e) Z_f \varepsilon^{fabc} \\ &= (\delta_a^d + Z_a Z^d) Z_f \varepsilon^{faec} = Z_f \varepsilon^{fdec} = \hat{\varepsilon}^{dec},\end{aligned}$$

代入 $(\vec{\nabla} \times \vec{B})^c$, 便得

$$(\vec{\nabla} \times \vec{B})^c = \hat{\varepsilon}^{abc} h_a^d h_b^e \partial_d B_e = \hat{\varepsilon}^{dec} \partial_d B_e,$$

于是

$$\begin{aligned}(\vec{\nabla} \times \vec{B})^c &= \hat{\varepsilon}^{abc} \partial_a B_b = \hat{\varepsilon}^{abc} \partial_a (-{}^*F_{bd} Z^d) = -Z^d \hat{\varepsilon}^{abc} \partial_a {}^*F_{bd} \\ &= -Z^d \hat{\varepsilon}^{abc} \partial_a \left(\frac{1}{2} \varepsilon_{bdef} F^{ef} \right) = -\frac{1}{2} Z^d \varepsilon_{bdef} \hat{\varepsilon}^{abc} \partial_a F^{ef} \\ &= \frac{1}{2} \hat{\varepsilon}_{bef} \hat{\varepsilon}^{abc} \partial_a F^{ef} = -\frac{1}{2} \hat{\varepsilon}_{bef} \hat{\varepsilon}^{bac} \partial_a F^{ef} \\ &\stackrel{(5-4-10)}{=} -\frac{1}{2} (-1)^0 (3-1)! 1! \delta^{[a}_e \delta^{c]}_f \partial_a F^{ef} \\ &= -\partial_a F^{ac} \stackrel{(6-6-10)}{=} 4\pi J^c.\end{aligned}$$

注意这个结果是错的！正确的做法是

$$\begin{aligned}
 (\vec{\nabla} \times \vec{B})^c &= -\frac{1}{2} Z^d \varepsilon_{bdef} \hat{\varepsilon}^{abc} \partial_a F^{ef} = -\frac{1}{2} Z^d \varepsilon_{bdef} Z_g \varepsilon^{gabc} \partial_a F^{ef} \\
 &= -\frac{1}{2} Z^d Z_g \varepsilon_{bdef} \varepsilon^{bgac} \partial_a F^{ef} \\
 &\stackrel{(5-4-10)}{=} -\frac{1}{2} Z^d Z_g (-1)^1 (4-1)! 1! \delta^{[g}_d \delta^a_e \delta^c]_f \partial_a F^{ef} \\
 &= 3 Z_g \delta^g_{[d} \delta^a_e \delta^c]_f \partial_a (Z^d F^{ef}) \stackrel{(2-6-19)}{=} 3 Z_g \delta^g_d \delta^a_e \delta^c_f \partial_a (Z^d F^{ef}) \\
 &= 3 Z_g \partial_a (Z^{[g} F^{ac]}) = Z_g \partial_a (Z^g F^{ac} + Z^c F^{ga} + Z^a F^{cg}) \\
 &= Z_g Z^g \partial_a F^{ac} - Z^c \partial_a (F^{ag} Z_g) + Z^a \partial_a (F^{cg} Z_g) \\
 &= -\partial_a F^{ac} - Z^c \partial_a E^a + Z^a \partial_a E^c \\
 &\stackrel{(6-6-10)}{=} 4\pi J^c - Z^c \partial_a E^a + Z^a \partial_a E^c .
 \end{aligned}$$

于是有

$$\begin{aligned}
 (\vec{\nabla} \times \vec{B})^i &= (dx^i)_c (\vec{\nabla} \times \vec{B})^c \\
 &= (dx^i)_c (4\pi J^c - Z^c \partial_a E^a + Z^a \partial_a E^c) \\
 &= 4\pi J^i - 0 + Z^a \partial_a E^i = 4\pi j^i + \left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^a \partial_a E^i \\
 &= 4\pi j^i + \frac{\partial E^i}{\partial t} ,
 \end{aligned}$$

其中利用了 $(dx^i)_c Z^c = (dx^i)_c (\partial/\partial t)^c = \partial x^i / \partial t = 0$. 这就是麦氏方程 (6-6-12) 中的 (d).

为什么不能用

$$Z^d \varepsilon_{bdef} \hat{\varepsilon}^{abc} = -\hat{\varepsilon}_{bef} \hat{\varepsilon}^{abc} = \hat{\varepsilon}_{bef} \hat{\varepsilon}^{bac} \stackrel{(5-4-10)}{=} (-1)^0 (3-1)! 1! \delta^{[a}_e \delta^c]_f = 2\delta^{[a}_e \delta^c]_f ?$$

左边按定义为

$$\begin{aligned}
 Z^d \varepsilon_{bdef} Z_g \varepsilon^{gabc} &= Z^d Z_g \varepsilon_{bdef} \varepsilon^{bgac} \stackrel{(5-4-10)}{=} Z^d Z_g (-1)^1 (4-1)! 1! \delta^{[g}_d \delta^a_e \delta^c]_f \\
 &= -6 Z^d Z_g \delta^{[g}_d \delta^a_e \delta^c]_f \\
 &= -2 Z^d Z_g (\delta^g_d \delta^{[a}_e \delta^c]_f + \delta^c_d \delta^{[g}_e \delta^a]_f + \delta^a_d \delta^{[c}_e \delta^g]_f) \\
 &= -2 (Z^d Z_d \delta^{[a}_e \delta^c]_f + Z^c Z_g \delta^g_{[e} \delta^a_{f]} + Z^a Z_g \delta^c_{[e} \delta^g_{f]}) \\
 &= -2 (-\delta^{[a}_e \delta^c]_f + Z^c Z_{[e} \delta^a_{f]} + Z^a \delta^c_{[e} Z_{f]}) \\
 &= 2\delta^{[a}_e \delta^c]_f - 2 (Z^c Z_{[e} \delta^a_{f]} + Z^a \delta^c_{[e} Z_{f]}) .
 \end{aligned}$$

显然前面用 $\hat{\varepsilon}_{bef} \hat{\varepsilon}^{bac}$ 计算时, 少了后面两项！只有当指标限制在 3 维空间时, $\hat{\varepsilon}_{bef} \hat{\varepsilon}^{bac}$ 才能得到正确结果.

- ~17. 试证瞬时观者测得的电磁场能量密度和 3 动量密度分别为 $T_{00} = (E^2 + B^2)/8\pi$ 和 $w_i = -T_{i0} = (\vec{E} \times \vec{B})_i/4\pi$, $i = 1, 2, 3$. 提示: 用 F_{ab} 的对称表达式 (6-6-28') 可简化 T_{00} 的计算.

证 电磁场和电磁场张量 (2 形式场) 在惯性坐标基底的分量关系为:

$$\begin{aligned} E_i &= E^i = F_{i0} = -F_{0i} = -F^{i0} = F^{0i} = \frac{1}{2}\hat{\varepsilon}_{ijk} {}^*F^{jk} = \frac{1}{2}\hat{\varepsilon}^{ijk} {}^*F_{jk}, \\ B_i &= B^i = -{}^*F_{i0} = {}^*F_{0i} = {}^*F^{i0} = -{}^*F^{0i} = \frac{1}{2}\hat{\varepsilon}_{ijk} F^{jk} = \frac{1}{2}\hat{\varepsilon}^{ijk} F_{jk}, \end{aligned}$$

反转形式为

$${}^*F^{ij} = \hat{\varepsilon}^{ijk} E_k, \quad {}^*F_{ij} = \hat{\varepsilon}_{ijk} E^k, \quad F^{ij} = \hat{\varepsilon}^{ijk} B_k, \quad F_{ij} = \hat{\varepsilon}_{ijk} B^k.$$

利用电磁场能动张量的表达式 (6-6-28') $T_{ab} = \frac{1}{8\pi}(F_{ac}F_b{}^c + {}^*F_{ac}{}^*F_b{}^c)$ 可知电磁场能量密度为

$$\begin{aligned} T_{00} &= \frac{1}{8\pi}(F_{0i}F_0{}^i + {}^*F_{0i}{}^*F_0{}^i) = -\frac{1}{8\pi}(F_{0i}F^{0i} + {}^*F_{0i}{}^*F^{0i}) \\ &= -\frac{1}{8\pi}[(-E_i)(E^i) + (B_i)(-B^i)] = \frac{1}{8\pi}(E^2 + B^2). \end{aligned}$$

也可利用表达式 (6-6-28) $T_{ab} = \frac{1}{4\pi}(F_{ac}F_b{}^c - \frac{1}{4}\eta_{ab}F_{cd}F^{cd})$,

$$\begin{aligned} T_{00} &= \frac{1}{4\pi}\left(F_{0i}F_0{}^i - \frac{1}{4}\eta_{00}F_{cd}F^{cd}\right) = \frac{1}{4\pi}\left(-F_{0i}F^{0i} + \frac{1}{4}F_{cd}F^{cd}\right) \\ &= \frac{1}{4\pi}\left[-(-E_i)(E^i) + \frac{1}{4}2(B^2 - E^2)\right] = \frac{1}{8\pi}(E^2 + B^2). \end{aligned}$$

利用式 (6-6-28) 计算电磁场的能流密度 (坡印廷矢量) 和动量密度 ($c = 1$ 时它们相等) $w_i = -T_{i0}$:

$$\begin{aligned} w_i = -T_{i0} &= -\frac{1}{4\pi}\left(F_{ij}F_0{}^j - \frac{1}{4}\eta_{i0}F_{cd}F^{cd}\right) = \frac{1}{4\pi}F_{ij}F^{0j} \\ &= \frac{1}{4\pi}\hat{\varepsilon}_{ijk}B^kE^j = \frac{1}{4\pi}(\vec{E} \times \vec{B})_i. \end{aligned}$$

【最后我们补充计算动量流密度 (3 维) 张量, 也即选读 6-4-1 中讨论过的 3 应力张量 $T^{ij} = T_{ij} = \frac{1}{4\pi}(F_{ic}F_j{}^c - \frac{1}{4}\eta_{ij}F_{cd}F^{cd})$, 其中 $\eta_{ij} = \delta_{ij}$, $F_{cd}F^{cd} = 2(B^2 - E^2)$, 而

$$\begin{aligned} F_{ic}F_j{}^c &= F_{i\mu}F_j{}^\mu = F_{i0}F_j{}^0 + F_{ik}F_j{}^k = F_{i0}F^{j0} + F_{ik}F^{jk} \\ &= (E_i)(-E^j) + (\hat{\varepsilon}_{ikl}B^l)(\hat{\varepsilon}^{jkm}B_m) = -E_iE_j + 2\delta^{[j}_i\delta^{m]}_lB^lB_m \\ &= -E_iE_j + (\delta^j_i\delta^m_l - \delta^m_i\delta^j_l)B^lB_m = -E_iE_j + \delta^j_iB^lB_l - B^jB_i \\ &= -E_iE_j + \delta_{ij}B^2 - B_iB_j. \end{aligned}$$

代回上式得

$$\begin{aligned} T_{ij} &= \frac{1}{4\pi}\left[-E_iE_j + \delta_{ij}B^2 - B_iB_j - \frac{1}{4}\delta_{ij}2(B^2 - E^2)\right] \\ &= \frac{1}{4\pi}\left[-E_iE_j - B_iB_j + \delta_{ij}\frac{1}{2}(E^2 + B^2)\right] \\ &= -\frac{1}{4\pi}(E_iE_j + B_iB_j) + \delta_{ij}\frac{1}{8\pi}(E^2 + B^2). \end{aligned}$$

这正是电磁场动量流密度 (3 维) 张量 [见郭硕鸿 (1995) 书 220 页式 (7.5) 的 \overleftrightarrow{T}]. **■**

18. (a) 试证 4 电流密度为 J^a 的电磁场 F_{ab} 的能动张量 T_{ab} 满足 $\partial^a T_{ab} = -F_{bc} J^c$ (由此可知当 $J^a = 0$ 时有 $\partial^a T_{ab} = 0$); *(b) 试证上式在惯性坐标系中的时间分量反映能量守恒, 即郭硕鸿 (1995) 40 页式 (6.2); 空间分量反映 3 动量守恒, 即郭书 220 页式 (7.6). 提示: 用 4 洛伦兹力表达式 (6-6-20) 把 $F_{bc} J^c$ 改写为洛伦兹力密度.

证 (a) 能动张量 $T_{ab} = \frac{1}{4\pi}(F_{ac}F_b{}^c - \frac{1}{4}\eta_{ab}F_{cd}F^{cd})$. 因

$$\begin{aligned}
 \partial^a(F_{ac}F_b{}^c) &= F_b{}^c\partial^a F_{ac} + F_{ac}\partial^a F_b{}^c \\
 &\stackrel{(6-6-10)}{=} F_b{}^c(-4\pi J_c) + F^{ac}\partial_a F_{bc} \\
 &= -4\pi F_{bc}J^c + F^{ac}\partial_a F_{bc}, \\
 \partial^a(\eta_{ab}F_{cd}F^{cd}) &= \partial_b(F_{cd}F^{cd}) = F^{cd}\partial_b F_{cd} + F_{cd}\partial_b F^{cd} \\
 &= 2F^{cd}\partial_b F_{cd} \stackrel{(6-6-11)}{=} 2F^{cd}(-\partial_d F_{bc} - \partial_c F_{db}) \\
 &= 2F^{cd}(\partial_d F_{cb} - \partial_c F_{db}) = 4F^{cd}\partial_{[d}F_{c]b} \\
 &\stackrel{(2-6-19)}{=} -4F^{[dc]}\partial_d F_{cb} = -4F^{dc}\partial_d F_{cb} \\
 &= 4F^{ac}\partial_a F_{bc}.
 \end{aligned}$$

代入能动张量的表达式得

$$\partial^a T_{ab} = \frac{1}{4\pi} \left([-4\pi F_{bc}J^c + F^{ac}\partial_a F_{bc}] - \frac{1}{4}[4F^{ac}\partial_a F_{bc}] \right) = -F_{bc}J^c.$$

当无源 $J^c = 0$ 时, 有 $\partial^a T_{ab} = 0$.

(b) 洛伦兹 4 力密度的定义为

$$\tilde{f}^a = F^a{}_b J^b, \quad \text{或} \quad \tilde{f}_a = F_{ab} J^b.$$

将 4 电流密度做 3 + 1 分解 $J^b = \rho Z^b + j^b = \rho Z^b + \rho u^b$, 有

$$\tilde{f}_a = F_{ab}(\rho Z^b + j^b) = \rho F_{ab}Z^b + F_{ab}j^b = \rho E_a + F_{ab}j^b.$$

于是 (注意 E_a 和 j^b 没有时间分量)

$$\begin{aligned}
 \tilde{f}_0 &= F_{0i}j^i = -E_i j^i = -\vec{E} \cdot \vec{j}, \\
 \tilde{f}_i &= \rho E_i + F_{ij}j^j = \rho E_i + \varepsilon_{ijk}B^k j^j = \rho E_i + (\vec{j} \times \vec{B})_i.
 \end{aligned}$$

第二式即为 $\vec{\tilde{f}} = \rho \vec{E} + \vec{j} \times \vec{B}$. 由于 $\vec{j} = \rho \vec{u}$, 有 $\vec{\tilde{f}} \cdot \vec{u} = \rho \vec{u} \cdot \vec{E} = \vec{j} \cdot \vec{E}$, 因此 $\tilde{f}_0 = -\vec{\tilde{f}} \cdot \vec{u}$ 或 $\tilde{f}^0 = \vec{\tilde{f}} \cdot \vec{u}$.

也可仿照式 (6-6-27), 我们计算

$$\begin{aligned}
(\vec{j} \times \vec{B})_c &= \hat{\varepsilon}_{cab} j^a B^b = \hat{\varepsilon}_{cab} j^a (-{}^*F^{bd} Z_d) = \hat{\varepsilon}_{cab} j^a \left(-\frac{1}{2} \varepsilon^{bdef} F_{ef} Z_d \right) \\
&= -\frac{1}{2} Z_d \hat{\varepsilon}_{cab} \varepsilon^{bdef} j^a F_{ef} = -\frac{1}{2} Z_d Z^g \varepsilon_{gcab} \varepsilon^{bdef} j^a F_{ef} \\
&= \frac{1}{2} Z_d Z^g \varepsilon_{bgca} \varepsilon^{bdef} j^a F_{ef} \stackrel{(5-4-10)}{=} \frac{1}{2} Z_d Z^g (-1)^1 (4-1)! 1! \delta_g^{[d} \delta_c^e \delta^f]_a j^a F_{ef} \\
&= -3 Z^g \delta_g^{[d} \delta_c^e \delta^f]_a Z_d F_{ef} j^a \stackrel{(2-6-19)}{=} -3 Z^g \delta_g^d \delta_c^e \delta^f_a Z_{[d} F_{ef]} j^a \\
&= -3 Z^g Z_{[g} F_{ca]} j^a = -Z^g (Z_g F_{ca} + Z_a F_{gc} + Z_c F_{ag}) j^a \\
&= -(Z^g Z_g F_{ca} + Z_c F_{ag} Z^g) j^a = -(-F_{ca} + Z_c E_a) j^a \\
&= F_{ca} j^a - Z_c E_a j^a,
\end{aligned}$$

其中用到了 j^a 只有空间分量, 故 $Z_a j^a = 0$. 因此得

$$\begin{aligned}
\tilde{f}_a &= F_{ab} J^b = F_{ab} (\rho Z^b + j^b) = \rho F_{ab} Z^b + F_{ab} j^b \\
&= \rho E_a + Z_a E_b j^b + (\vec{j} \times \vec{B})_a.
\end{aligned}$$

所以同样有

$$\begin{aligned}
\tilde{f}_0 &= (e_0)^a \tilde{f}_a = Z^a \tilde{f}_a = \rho Z^a E_a + Z^a Z_a E_b j^b + Z^a (\vec{j} \times \vec{B})_a \\
&= 0 - E_b j^b + 0 = -\vec{E} \cdot \vec{j}, \\
\tilde{f}_i &= (e_i)^a \tilde{f}_a = (\partial/\partial x^i)^a \tilde{f}_a = \rho E_i + 0 + (\vec{j} \times \vec{B})_i \\
&= \rho E_i + (\vec{j} \times \vec{B})_i.
\end{aligned}$$

洛伦兹 4 力密度 $\tilde{f}_a = F_{ab} J^b$ 总结如下:

$$\text{空间分量 } \vec{\tilde{f}} = \rho \vec{E} + \vec{j} \times \vec{B}, \quad \text{时间分量 } \tilde{f}^0 = \vec{j} \cdot \vec{E} = \vec{\tilde{f}} \cdot \vec{u}.$$

有了这些结果下面我们看能量守恒和动量守恒, 利用 $\partial^a T_{ab} = -F_{bc} J^c = -\tilde{f}_b$, 即 $\partial_a T^{ab} = -F^{bc} J_c = -\tilde{f}^b$ 的分量式 $\partial_\mu T^{\mu\nu} = -\tilde{f}^\nu$.

(i) 能量守恒. 取 $\nu = 0$, $\partial_\mu T^{\mu 0} = \partial_0 T^{00} + \partial_i T^{i0} = -\tilde{f}^0$. 利用习题 17 的结果, 其中 $\partial_0 T^{00} = \partial_0 T_{00} = \frac{\partial}{\partial t} w$, 引入 $w \equiv T_{00} = \frac{1}{8\pi} (E^2 + B^2)$ 就是郭书的电磁场能量密度; $\partial_i T^{i0} = \partial_i (-T_{i0}) = \partial_i w_i = \partial_i w^i = \vec{\nabla} \cdot \vec{w} = \vec{\nabla} \cdot \vec{S}$, 引入 $\vec{S} \equiv \vec{w} = \frac{1}{4\pi} \vec{E} \times \vec{B}$ 就是郭书的电磁场能流密度 (坡印廷矢量). 因此我们得到

$$\frac{\partial w}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{S} = -\vec{j} \cdot \vec{E} = -\vec{\tilde{f}} \cdot \vec{u}.$$

这正是代表电磁场能量守恒性质的郭硕鸿书 (1995) 40 页的式 (6.2).

(ii) 动量守恒. 取 $\nu = i$, $\partial_\mu T^{\mu i} = \partial_0 T^{0i} + \partial_j T^{ji} = -\tilde{f}^i$. 利用习题 17 的结果, 其中 $\partial_0 T^{0i} = \partial_0 (-T_{0i}) = \partial_0 (-T_{i0}) = \frac{\partial}{\partial t} w_i = \frac{\partial}{\partial t} S_i = \frac{\partial}{\partial t} g_i = \frac{\partial g_i^i}{\partial t}$, 引入 3 维动量

密度 g^i , 它等于能流密度 ($c = 1$ 时); $\partial_j T^{ji} = \partial_j T_{ji} = (\nabla \cdot \vec{T})_i = (\nabla \cdot \vec{T})^i$, 其中 T_{ji} 为动量流密度 (3 维) 张量 (见习题 17 的补充计算). 因此我们得到

$$\frac{\partial g^i}{\partial t} + (\nabla \cdot \vec{T})^i = -\tilde{f}^i,$$

此即代表电磁场动量守恒性质的郭硕鸿书 (1995) 220 页的 3 维式 (7.6):

$$\vec{f} + \frac{\partial \vec{g}}{\partial t} = -\nabla \cdot \vec{T}.$$

19. 试证式 (6-6-29) 中的 a^a 和 ϕ 满足 $\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{a}$ 和 $\vec{E} = -\vec{\nabla} \phi - \partial \vec{a} / \partial t$, 因而是电动力学中的 3 矢势和标势.

证 利用 4 势 A^a 在任意惯性系 $\{t, x^i\}$ 的分解, 式 (6-6-29):

$$A^a = \phi Z^a + a^a = \phi(\partial/\partial t)^a + a^a, \quad \text{或} \quad A_a = \phi Z_a + a_a = -\phi(dt)_a + a_a,$$

我们有

$$\begin{aligned} (\vec{\nabla} \times \vec{a})_c &\stackrel{(5-6-5c)}{=} \hat{\varepsilon}_{cab} \partial^a a^b = \hat{\varepsilon}_{cab} \partial^a (A^b - \phi Z^b) \\ &= \hat{\varepsilon}_{cab} \partial^a A^b = \hat{\varepsilon}_{c[ab]} \partial^a A^b \stackrel{(2-6-19)}{=} \hat{\varepsilon}_{cab} \partial^{[a} A^{b]} \\ &= \frac{1}{2} \hat{\varepsilon}_{cab} F^{ab} = \frac{1}{2} Z^d \varepsilon_{dcab} F^{ab} = Z^d {}^*F_{dc} \\ &= -{}^*F_{cd} Z^d = B_c, \end{aligned}$$

其中利用了 $\hat{\varepsilon}_{cab}$ 的空间性, 有: $\hat{\varepsilon}_{cab} Z^b = Z^d \varepsilon_{dcab} Z^b = Z^{(d} Z^{b)} \varepsilon_{[d|ca|b]} = 0$. 此即关系式 $\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{a}$.

另一方面, 因为

$$\begin{aligned} F^{ab} &= \partial^a A^b - \partial^b A^a = \partial^a (\phi Z^b + a^b) - \partial^b (\phi Z^a + a^a) \\ &\stackrel{(3-1-10)}{=} Z^b \partial^a \phi + \partial^a a^b - Z^a \partial^b \phi - \partial^b a^a, \end{aligned}$$

得

$$\begin{aligned} E^a &= F^{ab} Z_b = Z_b (Z^b \partial^a \phi + \partial^a a^b - Z^a \partial^b \phi - \partial^b a^a) \\ &= Z_b Z^b \partial^a \phi + \partial^a (Z_b a^b) - Z^a Z_b \partial^b \phi - Z_b \partial^b a^a \\ &= -\partial^a \phi - Z^a Z_b \partial^b \phi - Z_b \partial^b a^a, \end{aligned}$$

最后一步用到了 a^b 的空间性: $Z_b a^b = 0$. 取上式的空间分量:

$$\begin{aligned} E^i &= (dx^i)_a E^a = (dx^i)_a (-\partial^a \phi - Z^a Z_b \partial^b \phi - Z_b \partial^b a^a) \\ &= -(dx^i)_a \partial^a \phi - (dx^i)_a Z^a Z_b \partial^b \phi - Z_b \partial^b [(dx^i)_a a^a] \\ &= -\partial^i \phi - 0 - Z^b \partial_b a^i = -\partial_i \phi - (\partial/\partial t)^b \partial_b a^i \\ &= -\frac{\partial \phi}{\partial x^i} - \frac{\partial a^i}{\partial t}, \end{aligned}$$

其中用到了 Z^a 的时间性: $(dx^i)_a Z^a = (dx^i)_a (\partial/\partial t)^a = \partial x^i/\partial t = 0$. 此即关系式 $\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi - \partial\vec{a}/\partial t$. 最后可以验证上面的 E^a 的形式的确没有时间分量:

$$\begin{aligned} E^0 &= (dt)_a E^a = -Z_a(-\partial^a\phi - Z^a Z_b \partial^b\phi - Z_b \partial^b a^a) \\ &= -Z_a \partial^a\phi - Z_a Z^a Z_b \partial^b\phi - Z_b \partial^b(Z_a a^a) \\ &= -Z_a \partial^a\phi + Z_b \partial^b\phi - Z_b \partial^b(0) \\ &= 0. \end{aligned}$$

20. 在选读 6-1-1 中, (a) 试证 $\nabla_a(dt)_b = 0$, 其中 t 为绝对时间, ∇_a 为牛顿时空的导数算符 [提示: 从式 (5-7-2) 出发.]; (b) 设 w^a 为空间矢量 (即切于绝对同时面的矢量), v^a 为任一 4 维矢量, 试证 $v^a \nabla_a w^b$ 仍为空间矢量 [提示: 注意 $\nabla_a t$ 是绝对同时面的法余矢.].

证 (a) 根据式 (5-7-2):

$$\left(\frac{\partial}{\partial x^\nu}\right)^a \nabla_a \left(\frac{\partial}{\partial x^\mu}\right)^b = \Gamma^\sigma_{\mu\nu} \left(\frac{\partial}{\partial x^\sigma}\right)^b.$$

而牛顿时空唯一的非零克氏符为 Γ^i_{00} , 故上式变为

$$\left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^a \nabla_a \left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^b = \Gamma^i_{00} \left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)^b.$$

两边作用 $(dt)_b$, 右边为零, 而左边等于

$$\begin{aligned} (dt)_b \left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^a \nabla_a \left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^b &= \left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^a \nabla_a \left[(dt)_b \left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^b\right] - \left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^a \left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^b \nabla_a (dt)_b \\ &= \left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^a \nabla_a [1] - \left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^a \left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^b \nabla_a (dt)_b \\ &= -\left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^a \left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^b \nabla_a (dt)_b. \end{aligned}$$

因此有 $\nabla_a(dt)_b = 0$.

(b) 因为 $\nabla_a t \stackrel{(3-1-2)}{=} (dt)_a$ 是绝对同时面的法余矢, 所以它与空间矢量 w^a 正交: $(\nabla_a t)w^a = (dt)_a w^a = 0$. 为了证明 $v^a \nabla_a w^b$ 仍为空间矢量, 只须证明它也与 $\nabla_b t = (dt)_b$ 正交. 利用 (a) 的结果, 我们有

$$(dt)_b v^a \nabla_a w^b = v^a \nabla_a [(dt)_b w^b] = v^a \nabla_a [0] = 0.$$

因此对任意 4 矢 v^a , $v^a \nabla_a w^b$ 仍是空间矢量.

- 附. 试推导任意绝对 4 矢 F^a 在任意两个惯性系的分量之间的洛伦兹变换关系式.

解 设有两个惯性系 \mathcal{R} 和 \mathcal{R}' , 它们的 4 速分别为 $U^a = (\frac{\partial}{\partial t})^a$ 和 $U'^a = (\frac{\partial}{\partial t'})^a$, 选相应的坐标系为 $\{x^\mu\}$ 和 $\{x'^\mu\}$. 我们要找出任意 4 矢 F^a 的分量在这两个坐标系之间的变换关系. 首先

$$\left(\frac{\partial}{\partial x'^\mu}\right)^a = \frac{\partial x^\nu}{\partial x'^\mu} \left(\frac{\partial}{\partial x^\nu}\right)^a.$$

因闵氏度规为

$$\eta_{ab} = \eta_{\mu\nu} (dx^\mu)_a (dx^\nu)_b = \eta_{\mu\nu} (dx'^\mu)_a (dx'^\nu)_b ,$$

于是有

$$\begin{aligned} \eta_{\mu\nu} &= \eta_{ab} \left(\frac{\partial}{\partial x'^\mu} \right)^a \left(\frac{\partial}{\partial x'^\nu} \right)^b \\ &= \frac{\partial x^\lambda}{\partial x'^\mu} \frac{\partial x^\rho}{\partial x'^\nu} \eta_{ab} \left(\frac{\partial}{\partial x^\lambda} \right)^a \left(\frac{\partial}{\partial x^\rho} \right)^b = \frac{\partial x^\lambda}{\partial x'^\mu} \frac{\partial x^\rho}{\partial x'^\nu} \eta_{\lambda\rho} . \end{aligned}$$

当然, 这其实就是定理 2-4-2 的张量变换律. 令

$$\begin{aligned} \frac{\partial x^0}{\partial x'^0} &= \frac{\partial t}{\partial t'} \equiv \gamma , \\ \frac{\partial x^i}{\partial x'^0} &= \frac{\partial x^i}{\partial t'} = \frac{\partial t}{\partial t'} \frac{dx^i}{dt} \equiv \gamma u^i , \\ \frac{\partial x^0}{\partial x'^i} &= \frac{\partial t}{\partial x'^i} \equiv \alpha_i , \\ \frac{\partial x^i}{\partial x'^j} &= \beta^i_j , \end{aligned}$$

其中 u^i 为 \mathcal{R}' 系相对于 \mathcal{R} 的运动速度在坐标系 $\{x^\mu\}$ 上的分量. 于是有

$$\begin{aligned} -1 &= \eta_{00} = \frac{\partial x^0}{\partial x'^0} \frac{\partial x^0}{\partial x'^0} \eta_{00} + \frac{\partial x^i}{\partial x'^0} \frac{\partial x^i}{\partial x'^0} \eta_{ii} \\ &= (\gamma)(\gamma)(-1) + (\gamma u^i)(\gamma u^i)(\delta_{ii}) = -\gamma^2(1 - u^2) , \\ 0 &= \eta_{0i} = \frac{\partial x^0}{\partial x'^0} \frac{\partial x^0}{\partial x'^i} \eta_{00} + \frac{\partial x^j}{\partial x'^0} \frac{\partial x^j}{\partial x'^i} \eta_{jj} \\ &= (\gamma)(\alpha_i)(-1) + (\gamma u^j)(\beta^j_i)(\delta_{ii}) = -\gamma \alpha_i + \gamma u_j \beta_{ji} , \\ \delta_{ij} &= \eta_{ij} = \frac{\partial x^0}{\partial x'^i} \frac{\partial x^0}{\partial x'^j} \eta_{00} + \frac{\partial x^k}{\partial x'^i} \frac{\partial x^k}{\partial x'^j} \eta_{kk} \\ &= (\alpha_i)(\alpha_j)(-1) + (\beta^k_i)(\beta^k_j)(\delta_{kk}) = -\alpha_i \alpha_j + \beta_{ki} \beta_{kj} . \end{aligned}$$

由第一个方程得 $\gamma = (1 - u^2)^{-1/2}$, 第二个方程得关系式

$$\alpha_i = u_j \beta_{ji} = \beta_{ij} u_j ,$$

注意到这里的 $\beta_{ij} = \beta_{ji}$ 是对称的. 代入第三个方程得

$$\delta_{ij} = -\beta_{ik} u_k u_l \beta_{lj} + \beta_{ik} \beta_{kj} .$$

下面将 α_i 和 u_i 看成列矢, β_{ij} 看成矩阵, 则上两式分别为

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\alpha}^T &= \mathbf{u}^T \boldsymbol{\beta} , \quad \text{或} \quad \boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\beta} \mathbf{u} , \\ \mathbf{I} &= -\boldsymbol{\beta} \mathbf{u} \mathbf{u}^T \boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\beta}^2 . \end{aligned}$$

猜 β 的解的形式为 $I + Auu^T$, 其中 A 为待定常数, 代入第二式有

$$\begin{aligned}
 I &= -(I + Auu^T)uu^T(I + Auu^T) + (I + Auu^T)^2 \\
 &= -(uu^T + 2Auu^Tuu^T + A^2uu^Tuu^Tuu^T) + (I + 2Auu^T + A^2uu^Tuu^T) \\
 &= -uu^T - 2A^2uu^T - A^2u^4uu^T + I + 2Auu^T + A^2u^2uu^T \\
 &= I - uu^T + 2A(1 - u^2)uu^T + A^2u^2(1 - u^2)uu^T \\
 &= I - uu^T + 2A\gamma^{-2}uu^T + A^2u^2\gamma^{-2}uu^T \\
 &= I + \gamma^{-2}(A^2u^2 + 2A - \gamma^2)uu^T,
 \end{aligned}$$

其中利用了 $u^T u = u^2$. 因此 A 满足

$$u^2 A^2 + 2A - \gamma^2 = 0.$$

其解为

$$A_{\pm} = \frac{-2 \pm \sqrt{4 + 4u^2\gamma^2}}{2u^2} = \frac{-1 \pm \gamma}{u^2} = \pm(\gamma \mp 1)u^{-2}.$$

取其正的解【凭什么? 凭 α 必须是 γu , 如果是 $-\gamma u$ 的话时间分量的变换就已经错了.】, 于是得到

$$\begin{aligned}
 \beta &= I + (\gamma - 1)u^{-2}uu^T, \\
 \alpha &= \beta u = [I + (\gamma - 1)u^{-2}uu^T]u = u + (\gamma - 1)u^{-2}uu^T u \\
 &= u + (\gamma - 1)u^{-2}u^2 u = \gamma u.
 \end{aligned}$$

写回分量形式就是:

$$\begin{aligned}
 \alpha_i &= \gamma u_i, \\
 \beta^i_j &= \delta^i_j + (\gamma - 1)u^{-2}u^i u_j.
 \end{aligned}$$

设 F^a 是任意的 4 矢, 是个绝对量, 它既可以在 \mathcal{R} 系展开 (用 $\{x^\mu\}$ 坐标) 也可在 \mathcal{R}' 系展开 (用 $\{x'^\mu\}$ 坐标):

$$F^a = f^0 \left(\frac{\partial}{\partial t} \right)^a + f^i \left(\frac{\partial}{\partial x^i} \right)^a = f'^0 \left(\frac{\partial}{\partial t'} \right)^a + f'^i \left(\frac{\partial}{\partial x'^i} \right)^a,$$

而

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{\partial}{\partial t'} \right)^a &= \frac{\partial t}{\partial t'} \left(\frac{\partial}{\partial t} \right)^a + \frac{\partial x^i}{\partial t'} \left(\frac{\partial}{\partial x^i} \right)^a = \gamma \left(\frac{\partial}{\partial t} \right)^a + \gamma u^i \left(\frac{\partial}{\partial x^i} \right)^a, \\
 \left(\frac{\partial}{\partial x'^i} \right)^a &= \frac{\partial t}{\partial x'^i} \left(\frac{\partial}{\partial t} \right)^a + \frac{\partial x^j}{\partial x'^i} \left(\frac{\partial}{\partial x^j} \right)^a = \alpha_i \left(\frac{\partial}{\partial t} \right)^a + \beta^j_i \left(\frac{\partial}{\partial x^j} \right)^a,
 \end{aligned}$$

所以有

$$\begin{aligned}
 f'^0 \left(\frac{\partial}{\partial t'} \right)^a + f'^i \left(\frac{\partial}{\partial x'^i} \right)^a &= f'^0 \left[\gamma \left(\frac{\partial}{\partial t} \right)^a + \gamma u^i \left(\frac{\partial}{\partial x^i} \right)^a \right] + f'^i \left[\alpha_i \left(\frac{\partial}{\partial t} \right)^a + \beta^j_i \left(\frac{\partial}{\partial x^j} \right)^a \right] \\
 &= (f'^0 \gamma + f'^i \alpha_i) \left(\frac{\partial}{\partial t} \right)^a + (f'^0 \gamma u^i + f'^j \beta^i_j) \left(\frac{\partial}{\partial x^i} \right)^a \\
 &= f^0 \left(\frac{\partial}{\partial t} \right)^a + f^i \left(\frac{\partial}{\partial x^i} \right)^a,
 \end{aligned}$$

得到变换关系

$$\begin{aligned} f^0 &= f'^0 \gamma + f'^i \alpha_i = f'^0 \gamma + f'^i \gamma u_i = \gamma(f'^0 + f'^i u_i), \\ f^i &= f'^0 \gamma u^i + f'^j \beta^i_j = f'^0 \gamma u^i + f'^j [\delta^i_j + (\gamma - 1)u^{-2} u^i u_j] \\ &= f'^0 \gamma u^i + f'^i + (\gamma - 1)u^{-2} u^i f'^j u_j, \end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned} f^0 &= \gamma(f'^0 + \vec{f}' \cdot \vec{u}), \\ \vec{f} &= \vec{f}' + \gamma \vec{u} f'^0 + (\gamma - 1)u^{-2} \vec{u}(\vec{f}' \cdot \vec{u}). \end{aligned}$$

这其实是逆变换, 其正变换为

$$\begin{aligned} f'^0 &= \gamma(f^0 - \vec{f} \cdot \vec{u}), \\ \vec{f}' &= \vec{f} - \gamma \vec{u} f^0 + (\gamma - 1)u^{-2} \vec{u}(\vec{f} \cdot \vec{u}). \end{aligned}$$

注意这里的 \vec{u} 是惯性系 \mathcal{R}' 相对于惯性系 \mathcal{R} 的 3 速度, 即用 $\{x^\mu\}$ 坐标描述的 \mathcal{R}' 的速度.

第 7 章 “广义相对论基础” 习题

- ~1. 试证弯曲时空麦氏方程 $\nabla^a F_{ab} = -4\pi J_b$ 蕴含电荷守恒定律, 即 $\nabla_a J^a = 0$.
注: $\nabla^a F_{ab} = -4\pi J_b$ 等价于式 (7-2-8) 而非式 (7-2-9), 故本题表明式 (7-2-8) 而非式 (7-2-9) 可推出电荷守恒.

证 由方程 $\nabla_a F^{ab} = -4\pi J^b$ 知

$$\begin{aligned} -4\pi \nabla_b J^b &= \nabla_b \nabla_a F^{ab} \stackrel{(3-4-5)}{=} \nabla_a \nabla_b F^{ab} + R_{abc}{}^a F^{cb} + R_{abc}{}^b F^{ac} \\ &= \nabla_a \nabla_b F^{ab} - R_{bc} F^{cb} + R_{ac} F^{ac} = \nabla_a \nabla_b F^{ab} - R_{cb} F^{cb} + R_{ac} F^{ac} \\ &= \nabla_a \nabla_b F^{ab}, \end{aligned}$$

其中利用了里奇张量的对称性 $R_{ac} = R_{ca} = R_{(ac)}$. 因此有

$$-4\pi \nabla_b J^b = \nabla_{(b} \nabla_{a)} F^{ab} = \nabla_{(b} \nabla_{a)} F^{[ab]} = 0.$$

命题得证.

也可用加了洛伦兹规范条件的 (7-2-8) 式 $\nabla_a \nabla^a A^b - R^{bd} A_d = -4\pi J^b$ 得到电荷守恒律:

$$-4\pi \nabla_b J^b = \nabla_b \nabla_a \nabla^a A^b - \nabla_b (R^{bd} A_d)$$

$$\begin{aligned}
& \stackrel{(3-4-5)}{=} \nabla_a \nabla_b \nabla^a A^b + R_{abc}{}^a \nabla^c A^b + R_{abc}{}^b \nabla^a A^c - \nabla^b (R_{bd} A^d) \\
& = \nabla_a \nabla_b \nabla^a A^b - R_{cb} \nabla^c A^b + R_{ac} \nabla^a A^c - \nabla^b (R_{bd} A^d) \\
& = \nabla_a \nabla_b \nabla^a A^b - \nabla^b (R_{bd} A^d) \\
& = \nabla^a \nabla_b \nabla_a A^b - \nabla^b (R_{bd} A^d) \\
& = \nabla^a (\nabla_a \nabla_b A^b + R_{ad} A^d) - \nabla^b (R_{bd} A^d) \\
& = 0,
\end{aligned}$$

最后一步用到了洛伦兹条件 $\nabla_b A^b = 0$. 这是必须的, 因为得到 (7-2-8) 式时已经用过这一条件. 于是可以看出从 (7-2-9) 式推不出电荷守恒.

~2. 试证 $\frac{D_F \omega_a}{d\tau} = \frac{D\omega_a}{d\tau} + (A_a \wedge Z_b) \omega^b \quad \forall \omega_a \in \mathcal{F}_G(0, 1)$.

证 利用 $\frac{D_F g_{ab}}{d\tau} = 0$ 和 $\frac{Dg_{ab}}{d\tau} = 0$, 我们有

$$\begin{aligned}
\frac{D_F \omega_a}{d\tau} &= \frac{D_F (g_{ab} \omega^b)}{d\tau} = g_{ab} \frac{D_F \omega^b}{d\tau} = g_{ab} \left[\frac{D\omega^b}{d\tau} + (A^b \wedge Z^c) \omega_c \right] \\
&= \frac{D(g_{ab} \omega^b)}{d\tau} + g_{ab} (A^b \wedge Z^c) \omega_c = \frac{D\omega_a}{d\tau} + (A_a \wedge Z_c) \omega^c.
\end{aligned}$$

~3. 试证费米导数性质 3.

证 若 w^a 是 $G(\tau)$ 上的空间矢量场, 则有 $w^a Z_a = 0$. 这时根据费米导数的定义

$$\frac{D_F w^a}{d\tau} = \frac{Dw^a}{d\tau} + (A^a Z^b - Z^a A^b) w_b = \frac{Dw^a}{d\tau} - Z^a A^b w_b.$$

另一方面, 由于投影映射 $h^a{}_b = \delta^a{}_b + Z^a Z_b$, 故有

$$\begin{aligned}
h^a{}_b \frac{Dw^b}{d\tau} &= (\delta^a{}_b + Z^a Z_b) \frac{Dw^b}{d\tau} = \frac{Dw^a}{d\tau} + Z^a Z_b Z^c \nabla_c w^b \\
&= \frac{Dw^a}{d\tau} + Z^a Z^c (Z_b \nabla_c w^b) = \frac{Dw^a}{d\tau} - Z^a Z^c (w^b \nabla_c Z_b) \\
&= \frac{Dw^a}{d\tau} - Z^a (Z^c \nabla_c Z_b) w^b = \frac{Dw^a}{d\tau} - Z^a A_b w^b \\
&= \frac{Dw^a}{d\tau} - Z^a A^b w_b,
\end{aligned}$$

其中用到了 $0 = \nabla_c(0) = \nabla_c(w^b Z_b) = Z_b \nabla_c w^b + w^b \nabla_c Z_b$. 因此有

$$\frac{D_F w^a}{d\tau} = h^a{}_b \frac{Dw^b}{d\tau}.$$

4. 试证类时线 $G(\tau)$ 上长度不变 (且非零) 的矢量场 v^a 必经受时空转动. 提示: 令 $u^a \equiv Dv^a/d\tau$, 则 $u_a v^a = 0$. 先证: 无论 $v_a v^a$ 为零与否, 总有 $G(\tau)$ 上矢量场 v'^a 使 $v'_a v^a = 1$. 再验证 v^a 经受以 $\Omega_{ab} \equiv 2v'_{[a} u_{b]}$ 为角速度 2 形式的时空转动.

证 因为 v^a 沿 $G(\tau)$ 长度不变, 故有 $0 = \frac{D(v^a v_a)}{d\tau} = 2v^a \frac{Dv_a}{d\tau} = 2v^a u_a$, 其中令 $u_a \equiv \frac{Dv_a}{d\tau}$. 总可以找到 $G(\tau)$ 上的矢量场 v'^a 满足 $v'_a v^a = 1$. 于是有关系式

$$\begin{aligned} \frac{Dv^a}{d\tau} &= u^a = u^a(1) - v'^a(0) = u^a(v'^b b v_b) - v'^a(u^b v_b) \\ &= -(v'^a u^b - u^a v'^b) v_b = -2v'^{[a} u^{b]} v_b = -\Omega^{ab} v_b, \end{aligned}$$

其中 $\Omega^{ab} \equiv 2v'^{[a} u^{b]}$, 它的角速度 2 形式为 $\Omega_{ab} \equiv 2v'_{[a} u_{b]} = v'_a \wedge u_b$. 可见矢量场 v^a 沿类时线 $G(\tau)$ 以角速度 Ω^{ab} 做时空转动.

5. 设 $\{T, X, Y, Z\}$ 为闵氏时空的洛伦兹坐标系, 曲线 $G(\tau)$ 的参数表达式为

$$T = A^{-1} \sinh A\tau, \quad X = A^{-1} \cosh A\tau, \quad Y = Z = 0, \quad (\text{其中 } A \text{ 为常数})$$

(a) 试证 $G(\tau)$ 是类时双曲线 (即图 6-43 的 G), τ 是固有时, A 是 $G(\tau)$ 的 4 加速 A^a 的长度.

*(b) 试证从 $\{T, X, Y, Z\}$ 系原点 o 出发的与 $G(\tau)$ 有交的任一半直线 $\mu(s)$ 都与 $G(\tau)$ 正交.

*(c) 设 (b) 中的 $\mu(s)$ 的参数 s 是 μ 的线长, 随着 $\mu(s)$ 取遍所有从 o 出发并与 $G(\tau)$ 有交的半直线, 便得 $G(\tau)$ 上的一个空间矢量场 $w^a \equiv (\partial/\partial s)^a$, 试证 w^a 沿 $G(\tau)$ 费移.

*(d) 令 $Z^a \equiv (\partial/\partial \tau)^a$, 选 $\{Z^a, w^a, (\partial/\partial Y)^a, (\partial/\partial Z)^a\}$ 为 $G(\tau)$ 上的正交归一 4 标架场, 求出 $G(\tau)$ 的固有坐标系 $\{t, x, y, z\}$ 并指出其坐标域.

答: $T = (A^{-1} + x) \sinh At, \quad X = (A^{-1} + x) \cosh At, \quad Y = y \quad Z = z.$

(e) 写出闵氏度规在上述固有坐标系中的线元表达式. 计算闵氏度规在该系的克氏符, 验证它满足引理 7-4-3, 即式 (7-4-10).

解 (a) 双曲线 $G(\tau)$ 由惯性洛伦兹系的参数坐标 $(A^{-1} \sinh A\tau, A^{-1} \cosh A\tau, 0, 0)$ 即 $X^2 - T^2 = A^{-2}$ 描述, 它的切矢 (4 速) 为 $Z^a = (\frac{\partial}{\partial \tau})^a$, 在洛伦兹系的参数式为

$$\begin{aligned} Z^\mu(\tau) &= Z^a (dX^\mu)_a = \left(\frac{\partial}{\partial \tau} \right)^a (dX^\mu)_a = \frac{\partial X^\mu}{\partial \tau} \\ &= \frac{\partial}{\partial \tau} (T, X, Y, Z) = (\cosh A\tau, \sinh A\tau, 0, 0). \end{aligned}$$

因为

$$Z^a Z_a = Z^\mu(\tau) Z_\mu(\tau) = \eta_{\mu\nu} Z^\mu(\tau) Z^\nu(\tau) = -\cosh^2 A\tau + \sinh^2 A\tau = -1,$$

所以它是类时双曲线. $G(\tau)$ 的 4 加速为 $A^a = Z^b \nabla_b Z^a$, 与闵氏时空的度规 η_{ab} 相适配的导数算符为普通导数 ∂_a , 故 $A^a = Z^b \partial_b Z^a$, 其在洛伦兹坐标系的

分量为

$$\begin{aligned}
 A^\mu(\tau) &= (dX^\mu)_a Z^b \partial_b Z^a = Z^b \partial_b [(dX^\mu)_a Z^a] \\
 &= \frac{\partial}{\partial \tau} Z^\mu(\tau) = \frac{\partial}{\partial \tau} (\cosh A\tau, \sinh A\tau, 0, 0) \\
 &= (A \sinh A\tau, A \cosh A\tau, 0, 0) .
 \end{aligned}$$

因此 4 加速 A^a 的长度 (平方) 为

$$A^a A_a = A^\mu A_\mu = \eta_{\mu\nu} A^\mu A^\nu = -(A \sinh A\tau)^2 + (A \cosh A\tau)^2 = A^2 ,$$

即 A 是 A^a 的长度, 所以 G 做匀加速运动 (见第 6 章习题 13).

(b) 从原点 o 出发的与 $G(\tau)$ 有交的任一半直线 $\mu(s)$ 都是闵氏时空的类空测地线, 其洛伦兹坐标的参数表达式为 $(sA^{-1} \sinh A\tau, sA^{-1} \cosh A\tau, 0, 0)$, 其中 s 为仿射参数. 如果要求 s 就是线长, 可取坐标参数为 $(s \sinh A\tau, s \cosh A\tau, 0, 0)$. $\mu(s)$ 的切矢为 $w^a = (\frac{\partial}{\partial s})^a$, 在洛伦兹系的参数式为

$$\begin{aligned}
 w^\mu(s) &= w^a (dX^\mu)_a = \left(\frac{\partial}{\partial s}\right)^a (dX^\mu)_a = \frac{\partial X^\mu}{\partial s} \\
 &= \frac{\partial}{\partial s} (s \sinh A\tau, s \cosh A\tau, 0, 0) = (\sinh A\tau, \cosh A\tau, 0, 0) .
 \end{aligned}$$

可见

$$w^a w_a = w^\mu w_\mu = -\sinh^2 A\tau + \cosh^2 A\tau = 1 ,$$

w^a 是类空单位矢. 另外, 显然有

$$w^a Z_a = w^\mu Z_\mu = -\sinh A\tau \cosh A\tau + \cosh A\tau \sinh A\tau = 0 ,$$

即 w^a 与 Z^a 正交, 也就是 $\mu(s)$ 与 $G(\tau)$ 正交, 交点 p 的洛伦兹坐标为

$$(s \sinh A\tau, s \cosh A\tau, 0, 0) = (A^{-1} \sinh A\tau, A^{-1} \cosh A\tau, 0, 0)$$

即仿射参数 (从 o 到交点的线长) 为 $s_p = A^{-1}$.

(c) w^a 沿 $G(\tau)$ 的费米导数为

$$\frac{D_F w^a}{d\tau} = \frac{D w^a}{d\tau} + (A^a Z^b - Z^a A^b) w_b = \frac{D w^a}{d\tau} - Z^a A^b w_b ,$$

相应的洛伦兹系的分量式为

$$\frac{D_F w^\mu}{d\tau} = \frac{D w^\mu}{d\tau} - Z^\mu A^\nu w_\nu ,$$

其中

$$\frac{D w^\mu}{d\tau} = \frac{d w^\mu}{d\tau} = \frac{d}{d\tau} (\sinh A\tau, \cosh A\tau, 0, 0) = (A \cosh A\tau, A \sinh A\tau, 0, 0) ,$$

$$A^\nu w_\nu = -(A \sinh A\tau) \sinh A\tau + (A \cosh A\tau) \cosh A\tau = A ,$$

$$Z^\mu A^\nu w_\nu = (\cosh A\tau, \sinh A\tau, 0, 0) A = (A \cosh A\tau, A \sinh A\tau, 0, 0) .$$

因此有

$$\frac{D_F w^\mu}{d\tau} = 0 ,$$

即 w^a 沿 $G(\tau)$ 费移.

(d) 选 $\{Z^a, w^a, (\partial/\partial Y)^a, (\partial/\partial Z)^a\}$ 为 $G(\tau)$ 上的正交归一 4 标架场. 设 $\mu(s)$ 与 $G(\tau)$ 交于 p , 则 $\mu(s)$ 上任意一点 q 在此标架上的分量为 $(t(q), x(q), y(q), z(q))$. 根据式 (7-4-1) 的定义, $t(q) = \tau_p$, 而 τ_p 等于 $G(\tau)$ 线的 p 点到任意一点 (如 p 与 X 轴交点) 的线长; $x(q)$ 等于 $\mu(s)$ 上的直线段 pq 的线长, 即 $x(q) = s_q - s_p = s_q - A^{-1}$. 注意到 q 点的洛伦兹坐标分量为 $(s_q \sinh A\tau_q, s_q \cosh A\tau_q, 0, 0)$, 故得到关系

$$\begin{aligned} T(q) &= s_q \sinh A\tau_q = [A^{-1} + x(q)] \sinh At(q) , \\ X(q) &= s_q \cosh A\tau_q = [A^{-1} + x(q)] \cosh At(q) , \\ Y(q) &= Z(q) = 0 . \end{aligned}$$

p 可以是 $G(\tau)$ 上的任意点, q 可以是 $\mu(s)$ 上的任意点, 于是我们找到 $G(\tau)$ 的固有坐标系 $\{t, x, y, z\}$ 和洛伦兹坐标系 $\{T, X, Y, Z\}$ 的关系:

$$\begin{aligned} T &= (A^{-1} + x) \sinh At , \\ X &= (A^{-1} + x) \cosh At , \\ Y &= y , \\ Z &= z . \end{aligned}$$

可以看出 t, y, z 都可从负无穷到正无穷, 但因 $X \geq 0$, 所以 x 的坐标域为 $[-A^{-1}, +\infty)$

(e) 因为

$$\begin{aligned} dT &= (1 + Ax) \cosh At dt + \sinh At dx , \\ dX &= (1 + Ax) \sinh At dt + \cosh At dx , \\ dY &= dy , \\ dZ &= dz , \end{aligned}$$

我们得闵氏度规的线元为

$$\begin{aligned} ds^2 &= -dT^2 + dX^2 + dY^2 + dZ^2 \\ &= -[(1 + Ax) \cosh At dt + \sinh At dx]^2 \\ &\quad + [(1 + Ax) \sinh At dt + \cosh At dx]^2 + dy^2 + dz^2 \\ &= -(1 + Ax)^2 dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2 . \end{aligned}$$

因此闵氏度规在 G 的固有坐标系的分量为

$$g_{00} = -(1 + Ax)^2, \quad g_{11} = g_{22} = g_{33} = 1,$$

或

$$g^{00} = -(1 + Ax)^{-2}, \quad g^{11} = g^{22} = g^{33} = 1.$$

注意坐标基底虽然正交却不归一. 为了得到正交归一基底, 由度规张量场

$$g_{ab} = g_{\mu\nu}(dx^\mu)_a(dx^\nu)_b = \eta_{\mu\nu}(e^\mu)_a(e^\nu)_b$$

对比得出对偶基底为

$$(e^0)_a = (1 + Ax)(dt)_a, \quad (e^1)_a = (dx)_a, \quad (e^2)_a = (dy)_a, \quad (e^3)_a = (dz)_a.$$

由

$$(e_\mu)^a = \eta_{\mu\nu}g^{ab}(e^\nu)_b = \eta_{\mu\nu}g^{\sigma\rho}(\partial/\partial x^\sigma)^a(\partial/\partial x^\rho)^b(e^\nu)_b$$

知基底为

$$\begin{aligned} (e_0)^a &= \eta_{00}g^{\sigma\rho}(\partial/\partial x^\sigma)^a(\partial/\partial x^\rho)^b(e^0)_b = -g^{\sigma\rho}(\partial/\partial x^\sigma)^a(\partial/\partial x^\rho)^b(1 + Ax)(dt)_b \\ &= -g^{00}(\partial/\partial t)^a(\partial/\partial t)^b(1 + Ax)(dt)_b = (1 + Ax)^{-1}(\partial/\partial t)^a, \\ (e_1)^a &= \eta_{11}g^{\sigma\rho}(\partial/\partial x^\sigma)^a(\partial/\partial x^\rho)^b(e^1)_b = g^{\sigma\rho}(\partial/\partial x^\sigma)^a(\partial/\partial x^\rho)^b(dx)_b \\ &= g^{11}(\partial/\partial x)^a(\partial/\partial x)^b(dx)_b = (\partial/\partial x)^a, \\ (e_2)^a &= \eta_{22}g^{\sigma\rho}(\partial/\partial x^\sigma)^a(\partial/\partial x^\rho)^b(e^2)_b = g^{\sigma\rho}(\partial/\partial x^\sigma)^a(\partial/\partial x^\rho)^b(dy)_b \\ &= g^{22}(\partial/\partial y)^a(\partial/\partial y)^b(dy)_b = (\partial/\partial y)^a, \\ (e_3)^a &= \eta_{33}g^{\sigma\rho}(\partial/\partial x^\sigma)^a(\partial/\partial x^\rho)^b(e^3)_b = g^{\sigma\rho}(\partial/\partial x^\sigma)^a(\partial/\partial x^\rho)^b(dz)_b \\ &= g^{33}(\partial/\partial z)^a(\partial/\partial z)^b(dz)_b = (\partial/\partial z)^a, \end{aligned}$$

即

$$(e_0)^a = (1 + Ax)^{-1}(\partial_t)^a, \quad (e_1)^a = (\partial_x)^a, \quad (e_2)^a = (\partial_y)^a, \quad (e_3)^a = (\partial_z)^a.$$

这一关系也可由度规张量场

$$g^{ab} = g^{\mu\nu}(\partial/\partial x^\mu)_a(\partial/\partial x^\nu)_b = \eta^{\mu\nu}(e_\mu)^a(e_\nu)^b$$

直接对比得出. 另外还有 [如 $(e_0)_a = \eta_{0\nu}(e^\nu)_a = \eta_{00}(e^0)_a = -(e^0)_a$]

$$(e_0)_a = -(1 + Ax)(dt)_a, \quad (e_1)_a = (dx)_a, \quad (e_2)_a = (dy)_a, \quad (e_3)_a = (dz)_a.$$

下面利用式 (5-7-19) 计算 $\Lambda_{\alpha\beta\gamma}$ 和式 (5-7-20) 计算 $\omega_{\alpha\beta\gamma}$. 注意到反称关系 $\Lambda_{\alpha\beta\gamma} = -\Lambda_{\gamma\beta\alpha}$, 只须计算 $\alpha \neq \gamma$ 情形. 因为

$$\begin{aligned} (e_0)_\lambda &= (e_0)_a(\partial/\partial x^\lambda)^a = -(1 + Ax)(dt)_a(\partial/\partial x^\lambda)^a = -(1 + Ax)\delta^0_\lambda, \\ (e_1)_\lambda &= (e_1)_a(\partial/\partial x^\lambda)^a = (dx)_a(\partial/\partial x^\lambda)^a = \delta^1_\lambda, \\ (e_2)_\lambda &= (e_2)_a(\partial/\partial x^\lambda)^a = (dy)_a(\partial/\partial x^\lambda)^a = \delta^2_\lambda, \\ (e_3)_\lambda &= (e_3)_a(\partial/\partial x^\lambda)^a = (dz)_a(\partial/\partial x^\lambda)^a = \delta^3_\lambda. \end{aligned}$$

有

$$\begin{aligned}(e_1)_{\lambda,\tau} &= (e_2)_{\lambda,\tau} = (e_3)_{\lambda,\tau} = 0, \\ (e_0)_{\lambda,\tau} &= \frac{\partial}{\partial x^\tau}[-(1+Ax)\delta^0_\lambda] = -A\delta^1_\tau\delta^0_\lambda.\end{aligned}$$

代入式 (5-7-19) $\Lambda_{\alpha\beta\gamma} = [(e_\beta)_{\lambda,\tau} - (e_\beta)_{\tau,\lambda}](e_\alpha)^\lambda(e_\gamma)^\tau$ (注意 这里的 α, β 为标架指标 0, 1, 2, 3, 而 λ, τ 为坐标系指标 0, 1, 2, 3!):

$$\begin{aligned}\Lambda_{\alpha 0 \gamma} &= [(e_0)_{\lambda,\tau} - (e_0)_{\tau,\lambda}](e_\alpha)^\lambda(e_\gamma)^\tau \\ &= [-A\delta^1_\tau\delta^0_\lambda + A\delta^1_\lambda\delta^0_\tau](e_\alpha)^\lambda(e_\gamma)^\tau \\ &= -A(e_\alpha)^0(e_\gamma)^1 + A(e_\alpha)^1(e_\gamma)^0 \\ &= -A(1+Ax)^{-1}\delta^0_\alpha\delta^1_\gamma + A(1+Ax)^{-1}\delta^1_\alpha\delta^0_\gamma.\end{aligned}$$

因此得到非零的 $\Lambda_{\alpha\beta\gamma}$:

$$\Lambda_{001} = -\Lambda_{100} = -A(1+Ax)^{-1}.$$

代入式 (5-7-20) $\omega_{\alpha\beta\gamma} = \frac{1}{2}(\Lambda_{\alpha\beta\gamma} + \Lambda_{\gamma\alpha\beta} - \Lambda_{\beta\gamma\alpha})$ 求得非零的 $\omega_{\alpha\beta\gamma}$ (注意反称关系, 非零时 $\alpha \neq \beta$):

$$\omega_{010} = \frac{1}{2}(\Lambda_{010} + \Lambda_{001} - \Lambda_{100}) = \Lambda_{001} = -A(1+Ax)^{-1} = -\omega_{100},$$

联络 1 形式为 $\omega_{\alpha\beta} = \omega_{\alpha\beta a}(e^\gamma)_a = \omega_{\alpha\beta\gamma}e^\gamma$:

$$-\omega_{10} = \omega_{01} = \omega_{010}e^0 = -A(1+Ax)^{-1}e^0 = -A(dt)_a,$$

即有

$$\omega_1^0 = \omega_0^1 = -A(1+Ax)^{-1}e^0 = -A(dt)_a.$$

由嘉当第二结构方程式 (5-7-8) 很容易看出现在的黎曼张量为零: $R_1^0 = d\omega_1^0 + \omega_1^\gamma \wedge \omega_\gamma^0 = -Ad(dt) = 0$, 因为闵氏时空的平直性.

在此正交归一标架上的联络由式 (5-7-1) 给出:

$$(e_\beta)^b \nabla_b (e_\alpha)^a = \gamma^\gamma_{\alpha\beta} (e_\gamma)^a,$$

即

$$\gamma^\gamma_{\alpha\beta} = (e^\gamma)_a (e_\beta)^b \nabla_b (e_\alpha)^a = -(e^\gamma)_a (e_\beta)^b \omega_\alpha^\delta{}_b (e_\delta)^a = -\omega_\alpha^\gamma{}_b (e_\beta)^b,$$

当然, 这就是式 (5-7-4). 于是非零的联络只有

$$\begin{aligned}\gamma^1_{0\beta} &= -\omega_0^1{}_b (e_\beta)^b = A(1+Ax)^{-1}(e^0)_b (e_\beta)^b = A(1+Ax)^{-1}\delta^0_\beta, \\ \gamma^0_{1\beta} &= -\omega_1^0{}_b (e_\beta)^b = A(1+Ax)^{-1}(e^0)_b (e_\beta)^b = A(1+Ax)^{-1}\delta^0_\beta,\end{aligned}$$

即

$$\gamma^0_{01} = \gamma^0_{10} = \gamma^1_{00} = A(1 + Ax)^{-1}.$$

也可以按如下方式求得. 度规在 $G(\tau)$ 的固有坐标系的克氏符号式 (3-2-10')

$$\Gamma^\sigma_{\mu\nu} = \frac{1}{2}g^{\sigma\rho}(g_{\rho\mu,\nu} + g_{\rho\nu,\mu} - g_{\mu\nu,\rho})$$

给出, 为此先计算

$$g_{00,1} = -2A(1 + Ax).$$

首先容易看出, 只有当 μ, ν 中至少有一个为 0 时, 克氏符才不为零, 于是 $\Gamma^\sigma_{ij} = 0$. 显然

$$\Gamma^0_{00} = \frac{1}{2}g^{0\rho}(g_{\rho 0,0} + g_{\rho 0,0} - g_{00,\rho}) = \frac{1}{2}g^{00}(g_{00,0} + g_{00,0} - g_{00,0}) = 0.$$

而

$$\begin{aligned}\Gamma^0_{0i} = \Gamma^0_{i0} &= \frac{1}{2}g^{0\rho}(g_{\rho 0,i} + g_{\rho i,0} - g_{0i,\rho}) = \frac{1}{2}g^{00}(g_{00,i} + g_{0i,0} - g_{0i,0}) \\ &= \frac{1}{2}g^{00}(g_{00,i}) = \frac{1}{2}[-(1 + Ax)^{-2}][-2A(1 + Ax)]\delta_{i1} \\ &= A(1 + Ax)^{-1}\delta_{i1}, \\ \Gamma^i_{00} &= \frac{1}{2}g^{i\rho}(g_{\rho 0,0} + g_{\rho 0,0} - g_{00,\rho}) = \frac{1}{2}g^{ii}(g_{i0,0} + g_{i0,0} - g_{00,i}) \\ &= -\frac{1}{2}g^{ii}g_{00,i} = -\frac{1}{2}[1][-2A(1 + Ax)]\delta_{i1} \\ &= A(1 + Ax)\delta_{i1}, \\ \Gamma^i_{0j} = \Gamma^i_{j0} &= \frac{1}{2}g^{i\rho}(g_{\rho 0,j} + g_{\rho j,0} - g_{0j,\rho}) = \frac{1}{2}g^{ii}(g_{i0,j} + g_{ij,0} - g_{0j,i}) \\ &= 0.\end{aligned}$$

转到正交归一标架上的克氏符 (联络):

$$\begin{aligned}\gamma^0_{0i} &= \gamma^c_{ab}(e^0)_c(e_0)^a(e_i)^b = \gamma^c_{ab}[(1 + Ax)(dt)_c][(1 + Ax)^{-1}(\partial_t)^a](\partial_i)^b \\ &= \gamma^c_{ab}(dt)_c(\partial_t)^a(\partial_i)^b = \Gamma^0_{0i} = A(1 + Ax)^{-1}\delta_{i1}, \\ \gamma^i_{00} &= \gamma^c_{ab}(e^i)_c(e_0)^a(e_0)^b = \gamma^c_{ab}(dx^i)_c[(1 + Ax)^{-1}(\partial_t)^a][(1 + Ax)^{-1}(\partial_t)^b] \\ &= (1 + Ax)^{-2}\gamma^c_{ab}(dx^i)_c(\partial_t)^a(\partial_t)^b = (1 + Ax)^{-2}\Gamma^i_{00} = A(1 + Ax)^{-1}\delta_{i1}.\end{aligned}$$

因此正交归一标架上的非零克氏符 (应为联络, 因为是非坐标基底) 为

$$\gamma^0_{01} = \gamma^0_{10} = \gamma^1_{00} = A(1 + Ax)^{-1}.$$

与前面的结果相同.

最后我们看 G 的 4 加速 A^a 在 G 的固有坐标系 $\{x^\mu\}$ 上的分量表达式, 令它为 \hat{A}^μ , 即有

$$\hat{A}^\mu = (dx^\mu)_a A^a = (dx^\mu)_a A^\nu \left(\frac{\partial}{\partial X^\nu} \right)^a = \frac{\partial x^\mu}{\partial X^\nu} A^\nu,$$

其中 $A^\nu = (A \sinh At, A \cosh At, 0, 0)$ 为它在洛伦兹系的分量式, 已在 (a) 中得到. 下面我们先求矩阵 $\frac{\partial X^\nu}{\partial x^\mu}$, 它的逆矩阵即为 $\frac{\partial x^\mu}{\partial X^\nu}$. 很容易看出

$$\left[\frac{\partial X^\nu}{\partial x^\mu} \right] = \begin{bmatrix} (1 + Ax) \cosh At & \sinh At & 0 & 0 \\ (1 + Ax) \sinh At & \cosh At & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

因此得

$$\left[\frac{\partial x^\mu}{\partial X^\nu} \right] = \left[\frac{\partial X^\nu}{\partial x^\mu} \right]^{-1} = \begin{bmatrix} (1 + Ax)^{-1} \cosh At & -(1 + Ax)^{-1} \sinh At & 0 & 0 \\ -\sinh At & \cosh At & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

最后我们得

$$\begin{aligned} \hat{A}^\mu &= \begin{bmatrix} \hat{A}^0 \\ \hat{A}^1 \\ \hat{A}^2 \\ \hat{A}^3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (1 + Ax)^{-1} \cosh At & -(1 + Ax)^{-1} \sinh At & 0 & 0 \\ -\sinh At & \cosh At & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A \sinh At \\ A \cosh At \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 \\ A \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

因此 G 的 4 加速 A^a 在 G 的固有坐标系上只有在 x 方向上有一个分量, 大小为 4 加速的大小 A , 即 $\hat{A}^1 = A$. 因为引理 7-4-3 仅对 G 线上 ($x = 0$) 成立, 显然现在

$$\Gamma^0_{01}|_{x=0} = \Gamma^0_{10}|_{x=0} = \Gamma^1_{00}|_{x=0} = \hat{A}^1.$$

6. 设 G 是质点 L 在点 $p \in L$ 的瞬时静止 自由下落 观者 (即 G 的 4 速 Z^a 与 L 的 4 速 U^a 在 p 点相切), A^a 是 L 在 p 点的 4 加速, a^a 是 L 在 p 点相对于 G 的 3 加速 [由式 (7-4-3) 定义], 试证 $a^a = A^a$. 注: 本命题可视为命题 6-3-6 在弯曲时空的推广.

证 我们考虑一个更加一般的情形: 设 $G(t)$ 是任意 (不一定自由下落而且可以有自转) 观者, 其 4 速为 $Z^a = (\frac{\partial}{\partial t})^a$, 在它的固有坐标系 $\{t, x^i\}$ 的 (某段) 坐标域内有个任意运动的质点 $L(\tau_L)$, 其 4 速为 $U^a = (\frac{\partial}{\partial \tau_L})^a$. 质点 L 的运动可用 G 的固有坐标的参数式表达的世界线 $\{x^\mu(t)\} = \{t, x^i(t)\}$ 描述, 那么质点 L 相对于观者 G 的 3 速为

$$u^a = \frac{dx^i(t)}{dt} \left(\frac{\partial}{\partial x^i} \right)^a,$$

3 加速为

$$a^a = \frac{d^2 x^i(t)}{dt^2} \left(\frac{\partial}{\partial x^i} \right)^a.$$

因为 G 和 L 都是任意运动, 所以它们都可以有 4 加速, 分别为 $\hat{A} = Z^b \nabla_b Z^a$ 和 $A = U^b \nabla_b U^a$. 观者 G 还可以有自转的空间转动角速度 ω^a . 题目中要证明的是: 当观者 G 无自转 ($\omega^a = 0$) 且自由下落 ($\hat{A}^a = 0$) 时, 若在某一时空点 p 正好和质点 L 相对静止 (它们的世界线在 p 点相切且 4 速相等), 即 $Z|_p = U|_p$, 那么质点 L 的 4 加速 A^a 等于观者 G 看到的质点的 3 加速 a^a (即质点相对于观者的 3 加速).

首先对质点 L 的 4 速 U^a 做 3+1 分解

$$\begin{aligned} U^a &= \left(\frac{\partial}{\partial \tau_L} \right)^a = \frac{dt}{d\tau_L} \left(\frac{\partial}{\partial t} \right)^a + \frac{dx^i}{d\tau_L} \left(\frac{\partial}{\partial x^i} \right)^a = \gamma \left(\frac{\partial}{\partial t} \right)^a + \gamma \frac{dx^i}{dt} \left(\frac{\partial}{\partial x^i} \right)^a \\ &= \gamma (e_0)^a + \gamma u^i (e_i)^a = \gamma Z^a + \gamma u^a, \end{aligned}$$

其中令 $\gamma \equiv \frac{dt}{d\tau_L}$, $(e_\mu)^a \equiv \left(\frac{\partial}{\partial x^\mu} \right)^a$ 为固有坐标基矢. 质点 L 的 4 加速 A^a 也可做 3+1 分解

$$\begin{aligned} A^a &= U^b \nabla_b U^a = U^b \nabla_b [\gamma (e_0)^a + \gamma u^i (e_i)^a] \\ &= U^b \left[(e_0)^a \nabla_b \gamma + \gamma \nabla_b (e_0)^a + (e_i)^a \nabla_b (\gamma u^i) + \gamma u^i \nabla_b (e_i)^a \right] \\ &= (e_0)^a \frac{d\gamma}{d\tau_L} + \gamma [\gamma (e_0)^b + \gamma u^j (e_j)^b] \nabla_b (e_0)^a \\ &\quad + (e_i)^a \frac{d(\gamma u^i)}{d\tau_L} + \gamma u^i [\gamma (e_0)^b + \gamma u^j (e_j)^b] \nabla_b (e_i)^a \\ &= (e_0)^a \gamma \frac{d\gamma}{dt} + \gamma^2 [(e_0)^b \nabla_b (e_0)^a + u^j (e_j)^b \nabla_b (e_0)^a] \\ &\quad + (e_i)^a \gamma \frac{d(\gamma u^i)}{dt} + \gamma^2 u^i [(e_0)^b \nabla_b (e_i)^a + u^j (e_j)^b \nabla_b (e_i)^a] \\ &\stackrel{(7-4-13)}{=} (e_0)^a \gamma \frac{d\gamma}{dt} + \gamma^2 [\Gamma^\sigma_{00} (e_\sigma)^a + u^j \Gamma^\sigma_{0j} (e_\sigma)^a] \\ &\quad + (e_i)^a \gamma \frac{d(\gamma u^i)}{dt} + \gamma^2 u^i [\Gamma^\sigma_{i0} (e_\sigma)^a + u^j \Gamma^\sigma_{ij} (e_\sigma)^a] \\ &\stackrel{(7-4-10)}{=} (e_0)^a \gamma \frac{d\gamma}{dt} + \gamma^2 [\Gamma^i_{00} (e_i)^a + u^j \Gamma^0_{0j} (e_0)^a + u^j \Gamma^i_{0j} (e_i)^a] \\ &\quad + (e_i)^a \gamma \frac{d(\gamma u^i)}{dt} + \gamma^2 u^i [\Gamma^0_{i0} (e_0)^a + \Gamma^j_{i0} (e_j)^a + 0] \\ &\stackrel{(7-4-10)}{=} (e_0)^a \gamma \frac{d\gamma}{dt} + \gamma^2 [\hat{A}^i (e_i)^a + u^j \hat{A}_j (e_0)^a + u^j (-\omega_k \varepsilon^{ki}_j) (e_i)^a] \\ &\quad + (e_i)^a \gamma \frac{d(\gamma u^i)}{dt} + \gamma^2 u^i [\hat{A}_i (e_0)^a + (-\omega_k \varepsilon^{kj}_i) (e_j)^a] \\ &= (e_0)^a \gamma \frac{d\gamma}{dt} + (e_i)^a \gamma \frac{d(\gamma u^i)}{dt} + \gamma^2 \hat{A}^i (e_i)^a + 2\gamma^2 (u^j \hat{A}_j) (e_0)^a + 2\gamma^2 \varepsilon^i_{kj} \omega^k u^j (e_i)^a \\ &= (e_0)^a \left[\gamma \frac{d\gamma}{dt} + 2\gamma^2 (u^j \hat{A}_j) \right] + (e_i)^a \left[\gamma \frac{d(\gamma u^i)}{dt} + \gamma^2 \hat{A}^i + 2\gamma^2 \varepsilon^i_{kj} \omega^k u^j \right] \end{aligned}$$

$$= (e_0)^a \left[\gamma \frac{d\gamma}{dt} + 2\gamma^2 (u^j \hat{A}_j) \right] + (e_i)^a \left[\gamma^2 a^i + u^i \gamma \frac{d\gamma}{dt} + \gamma^2 \hat{A}^i + 2\gamma^2 \varepsilon^i_{kj} \omega^k u^j \right].$$

[注意引理 7-4-3 式 (7-4-10) 仅对 G 线上的点成立.] 我们先看几种特殊情况:

①如果 G 是无自转自由观者 ($\hat{A}^a = 0, \omega^a = 0$), 那么

$$A^a = (e_0)^a \left[\gamma \frac{d\gamma}{dt} \right] + (e_i)^a \left[\gamma^2 a^i + u^i \gamma \frac{d\gamma}{dt} \right].$$

这一式子在 G 为惯性系 (平直的闵氏时空) 时就退回到命题 6-3-5 的结论 [式 (6-3-37)], 因为这时有 $\frac{d\gamma}{dt} = \gamma^3 u^i a_i = \gamma^3 \vec{u} \cdot \vec{a}$. ②如果 L 是自由下落质点, 而观者 G 的运动任意, 这时 $L(\tau_L)$ 为类时测地线, 质点的 4 加速 $A^a = 0$, 于是有关系式

$$\gamma \frac{d\gamma}{dt} + 2\gamma^2 (u^j \hat{A}_j) = 0,$$

这正是命题 7-4-2 的证明过程中用到的一个等式 (见选读 7-4-1 最后一个式子), 以及

$$\gamma^2 a^i + u^i \gamma \frac{d\gamma}{dt} + \gamma^2 \hat{A}^i + 2\gamma^2 \varepsilon^i_{kj} \omega^k u^j = 0,$$

利用上面的等式得

$$a^i - 2u^i (u^j \hat{A}_j) + \hat{A}^i + 2\varepsilon^i_{kj} \omega^k u^j = 0,$$

因为式中都是空间量, 没有时间分量, 改写为抽象指标即为

$$a^a - 2u^a (u^b \hat{A}_b) + \hat{A}^a + 2\varepsilon^a_{bc} \omega^b u^c = 0,$$

这正是命题 7-4-2 式 (7-4-7) 的结果.

最后我们回到习题本身. 如果 G 是无自转观者, 这时

$$A^a = (e_0)^a \left[\gamma \frac{d\gamma}{dt} + 2\gamma^2 (u^j \hat{A}_j) \right] + (e_i)^a \left[\gamma^2 a^i + u^i \gamma \frac{d\gamma}{dt} + \gamma^2 \hat{A}^i \right].$$

我们证明当 $Z|_p = U|_p$ 时 $u^i|_p = 0$ (即 $u^a|_p = 0$) 以及 $\gamma|_p = 1, \frac{d\gamma}{dt}|_p = 0$. 首先因 $U^b = \gamma Z^b + \gamma u^b$, 有 $g_{ab} Z^a U^b = g_{ab} Z^a (\gamma Z^b + \gamma u^b)$. 于是在 p 点上左边为 $g_{ab}|_p Z^a|_p U^b|_p = \eta_{ab} Z^a|_p Z^b|_p = -1$, 右边为 $g_{ab}|_p Z^a|_p (\gamma|_p Z^b|_p + \gamma|_p u^b|_p) = \gamma|_p g_{ab}|_p Z^a|_p Z^b|_p = -\gamma$, 得 $\gamma|_p = 1$. 这时 $U^a|_p = \gamma|_p Z^a|_p + \gamma|_p u^a|_p = Z^a|_p + u^a|_p$, 故有 $u^a|_p = U^a|_p - Z^a|_p = 0$. 【如何证明 $\frac{d\gamma}{dt}|_p = 0$?】 将这些结果代回上式, 我们有

$$A^a|_p = (e_i)^a \left[a^i|_p + \hat{A}^i|_p \right] = a^a|_p + \hat{A}^a|_p.$$

当观者 G 自由下落时有 $A^a|_p = a^a|_p$.

~7. 度规 g_{ab} 叫 **里奇平直** 的, 若 g_{ab} 的里奇张量为零. 试证 g_{ab} 是真空爱因斯坦方程的解的充要条件为 g_{ab} 是里奇平直的.

证 真空爱因斯坦方程为 $G_{ab} = R_{ab} - \frac{1}{2}g_{ab}R = 0$. 如果 g_{ab} 是里奇平直的, 则里奇张量 $R_{ab} = 0$, 于是标量曲率 $R = g^{ab}R_{ab} = 0$, 显然这是爱因斯坦方程的解. 如果 R_{ab} 是爱因斯坦方程的解, 满足 $R_{ab} - \frac{1}{2}g_{ab}R = 0$, 以度规 g^{ab} 作用, 有 $g^{ab}R_{ab} - \frac{1}{2}g^{ab}g_{ab}R = R - \frac{1}{2}\delta^a_a R = R - 2R = -R = 0$, 代回方程即有 $R_{ab} = 0$, 所以里奇平直.

8. 设 (M, g_{ab}) 为里奇平直时空 (定义见上题), ξ^a 是其中的一个 Killing 矢量场, 试证 $F_{ab} := (d\xi)_{ab}$ 满足 (M, g_{ab}) 的无源 ($J_a = 0$) 麦氏方程. 提示: 利用 Killing 场 ξ^a 满足的 $\nabla_a \xi^a = 0$ (第 4 章习题 11 的结果).

证 无源麦氏方程为 $\nabla^a F_{ab} = 0$ 和 $\nabla_{[a} F_{bc]} = 0$. 现在

$$F_{ab} = (d\xi)_{ab} \stackrel{(5-1-11)}{=} 2\nabla_{[a}\xi_{b]} = \nabla_a \xi_b - \nabla_b \xi_a.$$

第一个方程需证 $\nabla^a \nabla_a \xi_b - \nabla^a \nabla_b \xi_a = 0$. 因 ξ_a 是 Killing 场, 满足 $\nabla_a \xi_b = -\nabla_b \xi_a$, 于是上式变为 $-2\nabla^a \nabla_b \xi_a = 0$. 由于度规与导数算符适配, 即要证 $\nabla_a \nabla_b \xi^a = 0$. 注意到

$$\begin{aligned} \nabla_a \nabla_b \xi^a &\stackrel{(3-4-4)}{=} \nabla_b \nabla_a \xi^a - R_{abc}{}^a \xi^c \stackrel{(3-4-6)}{=} \nabla_b \nabla_a \xi^a + R_{bac}{}^a \xi^c \\ &= \nabla_b \nabla_a \xi^a + R_{bc} \xi^c. \end{aligned}$$

因为里奇平直, 所以 $R_{bc} = 0$; 又由第 4 章习题 11 的结果知对 Killing 场有 $\nabla_a \xi^a = 0$, 因此 $\nabla_a \nabla_b \xi^a = 0$, 即第一个麦氏方程 $\nabla^a F_{ab} = 0$ 成立. 又由于

$$\nabla_a \nabla_b \xi_c \stackrel{(3-4-3)}{=} \nabla_b \nabla_a \xi_c + R_{abc}{}^d \xi_d,$$

对第二个方程有

$$\begin{aligned} \nabla_{[a} F_{bc]} &= 2\nabla_{[a} \nabla_{[b} \xi_{c]}] \stackrel{(2-6-20)}{=} 2\nabla_{[a} \nabla_b \xi_{c]} \\ &= 2\nabla_{[b} \nabla_a \xi_{c]} + 2R_{[abc]}{}^d \xi_d \\ &\stackrel{(3-4-7)}{=} 2\nabla_{[b} \nabla_a \xi_{c]} = -2\nabla_{[a} \nabla_b \xi_{c]}, \end{aligned}$$

因此 $\nabla_{[a} F_{bc]} = 0$, 第二个方程也成立.

9. 设 ξ_μ ($\mu = 0, 1, 2, 3$) 为方程 $\partial^b \partial_b \xi_\mu = 0$ 在初始条件式 (7-9-10)~(7-9-13) 下的解, 试证由 $\xi_a = \xi_\mu (dx^\mu)_a$ 及 γ_{ab} 按式 (7-9-8) 构造的 γ'_{ab} 在无源区既满足洛伦兹规范条件 $\partial^a \bar{\gamma}'_{ab} = 0$ 又满足 $\gamma' = 0$ 和 $\gamma'_{0i} = 0$ ($i = 1, 2, 3$). 提示: (1) 根据解的唯一性定理, 只须证明 $\gamma' = 0$ 和 $\gamma'_{0i} = 0$ 分别是方程 $\partial^c \partial_c \gamma' = 0$ 和 $\partial^c \partial_c \gamma'_{0i} = 0$ 的满足初始条件 $\gamma'|_{\Sigma_0} = 0$, $\partial \gamma' / \partial t|_{\Sigma_0} = 0$, $\gamma'_{0i}|_{\Sigma_0} = 0$ 和 $\partial \gamma'_{0i} / \partial t|_{\Sigma_0} = 0$ 的解. (2) 由 $\partial^b \partial_b \xi_\mu = 0$ 可得 $\partial^2 \xi_\mu / \partial t^2 = \nabla^2 \xi_\mu$.

证 首先, 如果 γ_{ab} (即 $\bar{\gamma}_{ab}$) 是洛伦兹规范条件 ($\partial^a \bar{\gamma}_{ab} = 0$) 下的线性爱因斯坦方程 ($\partial^c \partial_c \bar{\gamma}_{ab} = -16\pi T_{ab}$) 的解, 那么 (再一次) 通过规范变换式 (7-9-8), 并满足条件 $\partial^b \partial_b \xi_a = 0$, 得到的

$$\gamma'_{ab} = \gamma_{ab} + \partial_a \xi_b + \partial_b \xi_a,$$

也是这一方程的解, 即满足 $\partial^a \bar{\gamma}'_{ab} = 0$. 这是显然的, 因为规范变换不会改变黎曼张量, 故不会改变方程, 或可直接验证. 注意到

$$\begin{aligned}\gamma' &= \eta^{ab} \gamma'_{ab} = \eta^{ab} (\gamma_{ab} + \partial_a \xi_b + \partial_b \xi_a) = \gamma + 2\partial^c \xi_c, \\ \bar{\gamma}'_{ab} &= \gamma'_{ab} - \frac{1}{2} \eta_{ab} \gamma' = (\gamma_{ab} + \partial_a \xi_b + \partial_b \xi_a) - \frac{1}{2} \eta_{ab} (\gamma + 2\partial^c \xi_c) \\ &= \bar{\gamma}_{ab} + \partial_a \xi_b + \partial_b \xi_a - \eta_{ab} \partial^c \xi_c,\end{aligned}$$

如果 $\partial^c \partial_c \xi_a = 0$, 显然有 $\partial^c \partial_c \bar{\gamma}'_{ab} = \partial^c \partial_c \bar{\gamma}_{ab} = -16\pi T_{ab}$, 可见 $\bar{\gamma}'_{ab}$ 也满足 (洛伦兹规范条件下的) 线性爱因斯坦方程, 所以需要验证相应的洛伦兹规范条件 $\partial^a \bar{\gamma}'_{ab} = 0$ 是否满足. 显然有

$$\begin{aligned}\partial^a \bar{\gamma}'_{ab} &= \partial^a (\bar{\gamma}_{ab} + \partial_a \xi_b + \partial_b \xi_a - \eta_{ab} \partial^c \xi_c) \\ &= \partial^a \bar{\gamma}_{ab} + \partial^a \partial_a \xi_b + \partial_b \partial^a \xi_a - \partial_b \partial^c \xi_c \\ &= \partial^a \bar{\gamma}_{ab} + \partial^a \partial_a \xi_b = 0,\end{aligned}$$

其中用到了洛伦兹条件 $\partial^a \bar{\gamma}_{ab} = 0$ 和 $\partial^a \partial_a \xi_b = 0$.

下面我们从满足洛伦兹条件的 γ_{ab} (即 $\bar{\gamma}_{ab}$) 出发, 通过这一规范变换使得在 无源区 $\gamma' = 0$, $\gamma'_{0i} = 0$. 首先由于 ξ_a 满足方程 $\partial^c \partial_c \xi_a = 0$, 在坐标分量下为 $\partial^\nu \partial_\nu \xi_\mu = 0$, 即要求 ξ_μ 满足

$$\left(-\frac{\partial^2}{\partial t^2} + \nabla^2 \right) \xi_\mu = 0, \quad \text{即} \quad \frac{\partial^2 \xi_\mu}{\partial t^2} = \nabla^2 \xi_\mu.$$

因为在无源区, $\bar{\gamma}'_{ab}$ 满足 $\partial^c \partial_c \bar{\gamma}'_{ab} = \partial^c \partial_c (\gamma'_{ab} - \frac{1}{2} \eta_{ab} \gamma') = 0$, 以 η^{ab} 作用得 $\partial^c \partial_c (\gamma' - \frac{1}{2} 4\gamma') = -\partial^c \partial_c \gamma' = 0$. 设 Σ_0 是 $t = t_0$ 时刻的超曲面, 如果 $\gamma|_{\Sigma_0}$ 满足式 (7-9-10) 以及 $\frac{\partial \gamma}{\partial t}|_{\Sigma_0}$ 满足式 (7-9-11), 则因 $\gamma' = \gamma + 2\partial^c \xi_c = \gamma + 2\partial^\mu \xi_\mu = \gamma - 2\partial_0 \xi_0 + 2\partial_i \xi_i = \gamma + 2(\vec{\nabla} \cdot \vec{\xi} - \frac{\partial \xi_0}{\partial t})$ 有

$$\begin{aligned}\gamma'|_{\Sigma_0} &= \gamma|_{\Sigma_0} + 2 \left[\vec{\nabla} \cdot \vec{\xi} - \frac{\partial \xi_0}{\partial t} \right]_{\Sigma_0} \stackrel{(7-9-10)}{=} 0, \\ \frac{\partial \gamma'}{\partial t} \Big|_{\Sigma_0} &= \frac{\partial \gamma}{\partial t} \Big|_{\Sigma_0} + 2 \left[\vec{\nabla} \cdot \left(\frac{\partial \vec{\xi}}{\partial t} \right) - \frac{\partial^2 \xi_0}{\partial t^2} \right]_{\Sigma_0} \\ &= \frac{\partial \gamma}{\partial t} \Big|_{\Sigma_0} + 2 \left[\vec{\nabla} \cdot \left(\frac{\partial \vec{\xi}}{\partial t} \right) - \nabla^2 \xi_0 \right]_{\Sigma_0} \stackrel{(7-9-11)}{=} 0,\end{aligned}$$

其中利用了 $\frac{\partial^2 \xi_0}{\partial t^2} = \nabla^2 \xi_0$. 方程 $\partial^c \partial_c \gamma' = 0$ 加上这两个初值条件, 决定唯一解 $\gamma' = 0$. 于是现在真空线性爱因斯坦方程变为 $\partial^c \partial_c \bar{\gamma}'_{ab} = \partial^c \partial_c (\gamma'_{ab} - \frac{1}{2} \eta_{ab} \gamma') = \partial^c \partial_c \gamma'_{ab} = 0$. 下面看 γ'_{0i} . 因 $\gamma'_{0i} = \gamma_{0i} + \partial_0 \xi_i + \partial_i \xi_0 = \gamma_{0i} + \frac{\partial \xi_i}{\partial t} + \frac{\partial \xi_0}{\partial x^i}$, 则因式 (7-9-12) 和 (7-9-13) 有

$$\begin{aligned}\gamma'_{0i}|_{\Sigma_0} &= \gamma_{0i}|_{\Sigma_0} + \left[\frac{\partial \xi_i}{\partial t} + \frac{\partial \xi_0}{\partial x^i} \right]_{\Sigma_0} \stackrel{(7-9-12)}{=} 0, \\ \frac{\partial \gamma'_{0i}}{\partial t} \Big|_{\Sigma_0} &= \frac{\partial \gamma_{0i}}{\partial t} \Big|_{\Sigma_0} + \left[\frac{\partial^2 \xi_i}{\partial t^2} + \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial \xi_0}{\partial x^i} \right) \right]_{\Sigma_0} \\ &= \frac{\partial \gamma_{0i}}{\partial t} \Big|_{\Sigma_0} + \left[\nabla^2 \xi_i + \frac{\partial}{\partial x^i} \left(\frac{\partial \xi_0}{\partial t} \right) \right]_{\Sigma_0} \stackrel{(7-9-13)}{=} 0,\end{aligned}$$

其中利用了 $\frac{\partial^2 \xi_i}{\partial t^2} = \nabla^2 \xi_i$. 方程 $\partial^c \partial_c \gamma'_{0i} = 0$ 加上这两个初值条件, 决定唯一解 $\gamma'_{0i} = 0$.

与电磁场的情况比较有点不同, 那里 [方程 (7-9-6) 和 (7-9-7)] 只用到了初始值 $A_0|_{\Sigma_0}$ 和 $\vec{a}|_{\Sigma_0}$, 并没有用到 $\frac{\partial A_0}{\partial t}|_{\Sigma_0}$, 因为它可以通过洛伦兹条件变为 $\vec{\nabla} \cdot \vec{a}|_{\Sigma_0}$, 所以现在也应该利用洛伦兹条件 $\partial^a \bar{\gamma}_{ab} = 0$ 化掉式 (7-9-11) 和 (7-9-13) 右边的 $\frac{\partial \gamma}{\partial t}|_{\Sigma_0}$ 和 $\frac{\partial \gamma_{0i}}{\partial t}|_{\Sigma_0}$, 这似乎只有在 $\gamma_{00} = 0$ 时才能做到! 因为这时由洛伦兹条件

$$0 = \partial^\mu \bar{\gamma}_{\mu\nu} = \partial^\mu \left(\gamma_{\mu\nu} - \frac{1}{2} \eta_{\mu\nu} \gamma \right) = \partial^\mu \gamma_{\mu\nu} - \frac{1}{2} \partial_\nu \gamma,$$

有

$$\frac{\partial \gamma}{\partial t} \Big|_{\Sigma_0} = \partial_0 \gamma|_{\Sigma_0} = 2\partial^\mu \gamma_{\mu 0}|_{\Sigma_0} = 2\partial^i \gamma_{i0}|_{\Sigma_0} = 2 \frac{\partial \gamma_{0i}}{\partial x^i} \Big|_{\Sigma_0},$$

所以只需知道 $\gamma_{0i}|_{\Sigma_0}$, 就有 $\frac{\partial \gamma_{0i}}{\partial x^i}|_{\Sigma_0}$ (因为不需要对时间求导, 所以不需要知道 Σ_0 外的行为) 和 $\frac{\partial \gamma}{\partial t}|_{\Sigma_0}$. 最后

$$\begin{aligned} \frac{\partial \gamma_{0i}}{\partial t} \Big|_{\Sigma_0} &= \partial_0 \gamma_{0i}|_{\Sigma_0} = -\partial^0 \gamma_{0i}|_{\Sigma_0} = \left[\partial^j \gamma_{ji} - \frac{1}{2} \partial_i \gamma \right]_{\Sigma_0} \\ &= \left[\frac{\partial \gamma_{ij}}{\partial x^j} - \frac{1}{2} \frac{\partial \gamma}{\partial x^i} \right]_{\Sigma_0}, \end{aligned}$$

这样只要知道 $\gamma_{0i}|_{\Sigma_0}$ 和 $\gamma_{ij}|_{\Sigma_0}$, 就有了 $\frac{\partial \gamma_{0i}}{\partial t}|_{\Sigma_0}$.

10. 设 γ_{ab} 满足 (a) $\partial^a \bar{\gamma}_{ab} = 0$; (b) $\gamma = 0$; (c) $\gamma_{0i} = 0$ ($i = 1, 2, 3$); (d) $\gamma_{00} = \text{常数}$. 试找出一个“无限小”矢量场 ξ^a 使 $\tilde{\gamma}_{ab} \equiv \gamma_{ab} + \partial_a \xi_b + \partial_b \xi_a$ 满足

$$(a) \partial^a \tilde{\gamma}_{ab} = 0; \quad (b) \tilde{\gamma} = 0; \quad (c) \tilde{\gamma}_{0i} = 0 \quad (i = 1, 2, 3); \quad (d) \tilde{\gamma}_{00} = 0.$$

解 (a) 由前题知道在规范变换下仍保持洛伦兹规范条件, 要求 $\partial^b \partial_b \xi_a = 0$, 即

$$\left(-\frac{\partial^2}{\partial t^2} + \nabla^2 \right) \xi_\mu = 0.$$

(b) 由 $\tilde{\gamma} = \eta^{ab} \tilde{\gamma}_{ab} = \gamma + 2\partial^a \xi_a = 2\partial^a \xi_a = 0$, 要求 $\partial_0 \xi_0 = \partial_i \xi_i$, 即

$$\frac{\partial \xi_0}{\partial t} = \frac{\partial \xi_i}{\partial x^i} = \vec{\nabla} \cdot \vec{\xi}.$$

(c) 要求 $\tilde{\gamma}_{0i} = \gamma_{0i} + \partial_0 \xi_i + \partial_i \xi_0 = \partial_0 \xi_i + \partial_i \xi_0 = 0$, 即

$$\frac{\partial \xi_i}{\partial t} + \frac{\partial \xi_0}{\partial x^i} = 0.$$

(d) 要求 $\tilde{\gamma}_{00} = \gamma_{00} + 2\partial_0 \xi_0 = 0$, 因 γ_{00} 是常数, 即要求

$$\frac{\partial \xi_0}{\partial t} = -\frac{\gamma_{00}}{2}.$$

满足以上 (a)–(d) 的一个显而易见的解为

$$\xi_0 = -\frac{\gamma_{00}}{2}t = -\frac{\gamma_{00}}{2}x^0, \quad \xi_i = -\frac{\gamma_{00}}{6}x^i \quad (\text{即 } \vec{\xi} = -\frac{\gamma_{00}}{6}\vec{x}).$$

验证如下: (a) 因为解对时空参数是线性依赖, 其二阶导数都为零. (b)

$$\frac{\partial \xi_0}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t}(-\frac{\gamma_{00}}{2}t) = -\frac{\gamma_{00}}{2}, \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{\xi} = \vec{\nabla} \cdot (-\frac{\gamma_{00}}{6}\vec{x}) = -\frac{\gamma_{00}}{6} \times 3 = -\frac{\gamma_{00}}{2}. \quad (\text{c}) \quad \frac{\partial \xi_i}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t}(-\frac{\gamma_{00}}{6}x^i) = 0, \quad \frac{\partial \xi_0}{\partial x^i} = \frac{\partial}{\partial x^i}(-\frac{\gamma_{00}}{2}t) = 0. \quad (\text{d}) \text{ 易见.}$$

11. 试证命题 7-9-2.

证 已经求出黎曼张量式 (7-9-32)

$$\begin{aligned} R_{abc}{}^d = & [f(e^1)_a \wedge (e^4)_b + g(e^2)_a \wedge (e^4)_b][(e^1)_c(e_3)^d + (e^4)_c(e_1)^d] \\ & + [g(e^1)_a \wedge (e^4)_b - f(e^2)_a \wedge (e^4)_b][(e^2)_c(e_3)^d + (e^4)_c(e_2)^d], \end{aligned}$$

所以有

$$\begin{aligned} R_{abcd} &= g_{de} R_{abc}{}^e \\ &= [f(e^1)_a \wedge (e^4)_b + g(e^2)_a \wedge (e^4)_b][(e^1)_c g_{de}(e_3)^e + (e^4)_c g_{de}(e_1)^e] \\ &\quad + [g(e^1)_a \wedge (e^4)_b - f(e^2)_a \wedge (e^4)_b][(e^2)_c g_{de}(e_3)^e + (e^4)_c g_{de}(e_2)^e], \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} g_{de}(e_1)^e &= (e_1)_d = g_{1\beta}(e^\beta)_d = g_{11}(e^1)_d = (e^1)_d, \\ g_{de}(e_2)^e &= (e_2)_d = g_{2\beta}(e^\beta)_d = g_{22}(e^2)_d = (e^1)_d, \\ g_{de}(e_3)^e &= (e_3)_d = g_{3\beta}(e^\beta)_d = g_{34}(e^4)_d = -(e^4)_d. \end{aligned}$$

当然这些关系也可用度规场 g_{ab} 的式 (7-9-23) 硬算, 如:

$$\begin{aligned} g_{de}(e_3)^e &= \left(\eta_{de} + 2P[(dt)_d - (dz)_d][(dt)_e - (dz)_e] \right) [(\partial/\partial t)^e + (\partial/\partial z)^e] \\ &= -(dt)_d + (dz)_d + 2P[(dt)_d - (dz)_d][1 - 1] = -(du)_d = -(e^4)_d. \end{aligned}$$

因此得

$$\begin{aligned} R_{abcd} &= [f(e^1)_a \wedge (e^4)_b + g(e^2)_a \wedge (e^4)_b][-(e^1)_c(e^4)_d + (e^4)_c(e^1)_d] \\ &\quad + [g(e^1)_a \wedge (e^4)_b - f(e^2)_a \wedge (e^4)_b][-(e^2)_c(e^4)_d + (e^4)_c(e^2)_d] \\ &= [f(e^1)_a \wedge (e^4)_b + g(e^2)_a \wedge (e^4)_b](e^4)_c \wedge (e^1)_d \\ &\quad + [g(e^1)_a \wedge (e^4)_b - f(e^2)_a \wedge (e^4)_b](e^4)_c \wedge (e^2)_d, \end{aligned}$$

即命题 7-9-2 的结果.

12. 验证式 (7-9-41) 后的 (1)~(3).

证 ① $\{(E_i)^a\}$ 的正交归一性. 由式 (7-9-41)

$$\begin{aligned}(E_1)^a &= (\partial/\partial x)^a + E^{-1}Z_1K^a = (e_1)^a + E^{-1}Z_1(e_3)^a, \\(E_2)^a &= (\partial/\partial y)^a + E^{-1}Z_2K^a = (e_2)^a + E^{-1}Z_2(e_3)^a, \\(E_3)^a &= E^{-1}K^a - Z^a = E^{-1}(e_3)^a - Z^a,\end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}E &= -g_{ab}Z^aK^b = -g_{ab}Z^a(e_3)^b, \\Z_1 &= g_{ab}Z^a(\partial/\partial x)^b = g_{ab}Z^a(e_1)^b, \\Z_2 &= g_{ab}Z^a(\partial/\partial y)^b = g_{ab}Z^a(e_2)^b.\end{aligned}$$

显然归一:

$$\begin{aligned}g_{ab}(E_1)^a(E_1)^b &= g_{ab}[(e_1)^a + E^{-1}Z_1(e_3)^a][(e_1)^b + E^{-1}Z_1(e_3)^b] \\&= g_{11} + g_{13}E^{-1}Z_1 + g_{31}E^{-1}Z_1 + g_{33}E^{-2}Z_1^2 \\&= 1 + 0 + 0 + 0 = 1, \\g_{ab}(E_2)^a(E_2)^b &= g_{ab}[(e_2)^a + E^{-1}Z_2(e_3)^a][(e_2)^b + E^{-1}Z_2(e_3)^b] \\&= g_{22} + g_{23}E^{-1}Z_2 + g_{32}E^{-1}Z_2 + g_{33}E^{-2}Z_1^2 \\&= 1 + 0 + 0 + 0 = 1, \\g_{ab}(E_3)^a(E_3)^b &= g_{ab}[E^{-1}(e_3)^a - Z^a][E^{-1}(e_3)^b - Z^b] \\&= g_{33}E^{-2} - g_{ab}(e_3)^aZ^bE^{-1} - g_{ab}Z^a(e_3)^bE^{-1} + g_{ab}Z^aZ^b \\&= 0 - (-E)E^{-1} - (-E)E^{-1} + (-1) = 1,\end{aligned}$$

而且正交:

$$\begin{aligned}g_{ab}(E_1)^a(E_2)^b &= g_{ab}[(e_1)^a + E^{-1}Z_1(e_3)^a][(e_2)^b + E^{-1}Z_2(e_3)^b] \\&= g_{12} + g_{13}E^{-1}Z_2 + g_{32}E^{-1}Z_1 + g_{33}E^{-2}Z_1^2 \\&= 0 + 0 + 0 + 0 = 0, \\g_{ab}(E_1)^a(E_3)^b &= g_{ab}[(e_1)^a + E^{-1}Z_1(e_3)^a][E^{-1}(e_3)^b - Z^b] \\&= g_{13}E^{-1} - g_{ab}(e_1)^aZ^b + g_{ab}(e_3)^a(e_3)^bE^{-2}Z_1 - g_{ab}(e_3)^aZ^bE^{-1}Z_1 \\&= 0 - Z_1 + 0 - (-E)E^{-1}Z_1 = 0, \\g_{ab}(E_2)^a(E_3)^b &= g_{ab}[(e_2)^a + E^{-1}Z_2(e_3)^a][E^{-1}(e_3)^b - Z^b] \\&= g_{23}E^{-1} - g_{ab}(e_2)^aZ^b + g_{ab}(e_3)^a(e_3)^bE^{-2}Z_2 - g_{ab}(e_3)^aZ^bE^{-1}Z_2 \\&= 0 - Z_2 + 0 - (-E)E^{-1}Z_2 = 0.\end{aligned}$$

②与 Z^a 正交的投影算符 $h^a_b = \delta^a_b + Z^aZ_b$ 可将 p 点的任意 4 矢投影到 W_p 3 维空间子空间, 于是 K^a 在 W_p 上的投影为

$$h^a_bK^b = (\delta^a_b + Z^aZ_b)K^b = K^a + Z^aZ_bZ^b = K^a + Z^a(-E) = K^a - EZ^a,$$

它的“长度”的平方为

$$\begin{aligned}
 & g_{ab}(K^a - EZ^a)(K^b - EZ^b) \\
 &= g_{ab}K^aK^b - g_{ab}K^aZ^bE - g_{ab}E^aK^bE + g_{ab}Z^aZ^bE^2 \\
 &= 0 - (-E)E - (-E)E + (-1)E^2 = E^2,
 \end{aligned}$$

因此把该投影归一化后

$$E^{-1}(K^a - EZ^a) = E^{-1}K^a - Z^a = (E_3)^a.$$

③首先证明 $(E_3)^a$ 沿测地线 $\gamma(\tau)$ 平移, 即 $Z^c\nabla_c(E_3)^a = 0$. 注意到

$$Z^c\nabla_cE = Z^c\nabla_c(-g_{ab}Z^aK^b) = -g_{ab}K^bZ^c\nabla_cZ^a - g_{ab}Z^aZ^c\nabla_cK^b = 0,$$

其中利用了 $\gamma(\tau)$ 的测地性 $Z^c\nabla_cZ^a = 0$ 和 K^a 的 Killing 矢量性 $\nabla_cK^b = 0$. 于是有

$$\begin{aligned}
 Z^c\nabla_c(E_3)^a &= Z^c\nabla_c(E^{-1}K^a - Z^a) = Z^c\nabla_c(E^{-1}K^a) - Z^c\nabla_cZ^a \\
 &= K^aZ^c\nabla_cE^{-1} + E^{-1}Z^c\nabla_cK^a - Z^c\nabla_cZ^a \\
 &= 0.
 \end{aligned}$$

为了证明 $(E_1)^a$ 沿测地线平移, 利用式 (5-7-5): $\omega_\alpha^\beta{}_a = (e_\alpha)^c\nabla_a(e^\beta)_c = -(e^\beta)_c\nabla_a(e_\alpha)^c$, 两边作用 $(e_\beta)^b$: $(e_\beta)^b\omega_\alpha^\beta{}_a = -(e_\beta)^b(e^\beta)_c\nabla_a(e_\alpha)^c = -\nabla_a(e_\alpha)^b$, 即 $\nabla_a(e_\alpha)^b = -\omega_\alpha^\beta{}_a(e_\beta)^b$. 现在

$$\nabla_a(e_1)^b = -\omega_1^\beta{}_a(e_\beta)^b \stackrel{(7-9-30)}{=} -\omega_1^3{}_a(e_3)^b,$$

其中 $\omega_1^3{}_a$ 根据 (7-9-30) 为 $\omega_1^3{}_a = (fx + gy)(du)_a$. 于是有

$$\begin{aligned}
 Z^a\nabla_a(E_1)^b &= Z^a\nabla_a[(e_1)^b + E^{-1}Z_1(e_3)^b] \\
 &= Z^a\nabla_a(e_1)^b + Z_1(e_3)^bZ^a\nabla_aE^{-1} + E^{-1}(e_3)^bZ^a\nabla_aZ_1 + E^{-1}Z_1Z^a\nabla_a(e_3)^b \\
 &= Z^a\nabla_a(e_1)^b + 0 + E^{-1}(e_3)^bZ^a\nabla_a[g_{cd}Z^c(e_1)^d] + 0 \\
 &= Z^a\nabla_a(e_1)^b + E^{-1}g_{cd}Z^c(e_3)^bZ^a\nabla_a(e_1)^d \\
 &= Z^a[-\omega_1^3{}_a(e_3)^b] + E^{-1}g_{cd}Z^c(e_3)^bZ^a[-\omega_1^3{}_a(e_3)^d] \\
 &= -\omega_1^3{}_aZ^a(e_3)^b - \omega_1^3{}_aE^{-1}[g_{cd}Z^c(e_3)^d]Z^a(e_3)^b \\
 &= -\omega_1^3{}_aZ^a(e_3)^b - \omega_1^3{}_aE^{-1}[-E]Z^a(e_3)^b \\
 &= 0.
 \end{aligned}$$

同样可证 $(E_2)^a$ 沿测地线平移, 即 $Z^a\nabla_a(E_2)^b = 0$.

13. 试证式 (7-9-43).

证 把式 (7-9-33) 代入式 (7-9-42), 我们有

$$\begin{aligned}
 \psi^i_j &= -R_{abcd}Z^a(E_j)^b Z^c(E_i)^d \\
 &= -[f(e^1)_a \wedge (e^4)_b + g(e^2)_a \wedge (e^4)_b](e^4)_c \wedge (e^1)_d Z^a(E_j)^b Z^c(E_i)^d \\
 &\quad -[g(e^1)_a \wedge (e^4)_b - g(e^2)_a \wedge (e^4)_b](e^4)_c \wedge (e^2)_d Z^a(E_j)^b Z^c(E_i)^d \\
 &= -[f(e^1)_a \wedge (e^4)_b Z^a(E_j)^b + g(e^2)_a \wedge (e^4)_b Z^a(E_j)^b](e^4)_c \wedge (e^1)_d Z^c(E_i)^d \\
 &\quad -[g(e^1)_a \wedge (e^4)_b Z^a(E_j)^b - f(e^2)_a \wedge (e^4)_b Z^a(E_j)^b](e^4)_c \wedge (e^2)_d Z^c(E_i)^d,
 \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}
 (e^1)_a \wedge (e^4)_b Z^a(E_j)^b &= [(e^1)_a(e^4)_b - (e^4)_a(e^1)_b]Z^a(E_j)^b \\
 &= [(e^1)_a Z^a][(e^4)_b(E_j)^b] - [(e^4)_a Z^a][(e^1)_b(E_j)^b], \\
 (e^2)_a \wedge (e^4)_b Z^a(E_j)^b &= [(e^2)_a(e^4)_b - (e^4)_a(e^2)_b]Z^a(E_j)^b \\
 &= [(e^2)_a Z^a][(e^4)_b(E_j)^b] - [(e^4)_a Z^a][(e^2)_b(E_j)^b], \\
 (e^4)_c \wedge (e^1)_d Z^c(E_i)^d &= [(e^4)_c(e^1)_d - (e^1)_c(e^4)_d]Z^c(E_i)^d \\
 &= [(e^4)_c Z^c][(e^1)_d(E_i)^d] - [(e^1)_c Z^c][(e^4)_d(E_i)^d], \\
 (e^4)_c \wedge (e^2)_d Z^c(E_i)^d &= [(e^4)_c(e^2)_d - (e^2)_c(e^4)_d]Z^c(E_i)^d \\
 &= [(e^4)_c Z^c][(e^2)_d(E_i)^d] - [(e^2)_c Z^c][(e^4)_d(E_i)^d].
 \end{aligned}$$

因为

$$\begin{aligned}
 (e^1)_a Z^a &= g^{11}(e_1)_a Z^a = g_{ab}(e_1)^a Z^b = Z_1, \\
 (e^2)_a Z^a &= g^{22}(e_2)_a Z^a = g_{ab}(e_2)^a Z^b = Z_2, \\
 (e^4)_a Z^a &= g^{43}(e_3)_a Z^a = -g_{ab}(e_3)^a Z^b = E, \\
 (e^1)_a(E_i)^a &= g^{11}(e_1)_a \left\{ \delta^1_i[(e_1)^a + E^{-1}Z_1(e_3)^a] + \delta^2_i[(e_2)^a + E^{-1}Z_2(e_3)^a] \right. \\
 &\quad \left. + \delta^3_i[E^{-1}(e_3)^a - Z^a] \right\} \\
 &= \delta^1_i[g_{11} + g_{13}E^{-1}Z_1] + \delta^2_i[g_{12} + g_{13}E^{-1}Z_2] \\
 &\quad + \delta^3_i[g_{13}E^{-1} - (e_1)_a Z^a] \\
 &= \delta^1_i - \delta^3_i Z_1, \\
 (e^2)_a(E_i)^a &= g^{22}(e_2)_a \left\{ \delta^1_i[(e_1)^a + E^{-1}Z_1(e_3)^a] + \delta^2_i[(e_2)^a + E^{-1}Z_2(e_3)^a] \right. \\
 &\quad \left. + \delta^3_i[E^{-1}(e_3)^a - Z^a] \right\} \\
 &= \delta^1_i[g_{21} + g_{23}E^{-1}Z_1] + \delta^2_i[g_{22} + g_{23}E^{-1}Z_2] \\
 &\quad + \delta^3_i[g_{23}E^{-1} - (e_2)_a Z^a] \\
 &= \delta^2_i - \delta^3_i Z_2, \\
 (e^4)_a(E_i)^a &= g^{43}(e_3)_a \left\{ \delta^1_i[(e_1)^a + E^{-1}Z_1(e_3)^a] + \delta^2_i[(e_2)^a + E^{-1}Z_2(e_3)^a] \right.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& +\delta^3_i[E^{-1}(e_3)^a - Z^a]\} \\
& = -\delta^1_i[g_{31} + g_{33}E^{-1}Z_1] - \delta^2_i[g_{32} + g_{33}E^{-1}Z_2] \\
& \quad -\delta^3_i[g_{33}E^{-1} - (e_3)_a Z^a] \\
& = \delta^3_i(e_3)_a Z^a = -\delta^3_i E .
\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}
(e^1)_a \wedge (e^4)_b Z^a (E_j)^b &= [Z_1][-\delta^3_j E] - [E][\delta^1_j - \delta^3_j Z_1] = -\delta^1_j E , \\
(e^2)_a \wedge (e^4)_b Z^a (E_j)^b &= [Z_2][-\delta^3_j E] - [E][\delta^2_j - \delta^3_j Z_2] = -\delta^2_j E , \\
(e^4)_c \wedge (e^1)_d Z^c (E_i)^d &= [E][\delta^1_i - \delta^3_i Z_1] - [Z_1][-\delta^3_i E] = \delta^1_i E , \\
(e^4)_c \wedge (e^2)_d Z^c (E_i)^d &= [E][\delta^2_i - \delta^3_i Z_2] - [Z_2][-\delta^3_i E] = \delta^2_i E .
\end{aligned}$$

代入 ψ^i_j 的表达式

$$\begin{aligned}
\psi^i_j &= -[f(-\delta^1_j E) + g(-\delta^2_j E)](\delta^1_i E) - [g(-\delta^1_j E) - f(-\delta^2_j E)](\delta^2_i E) \\
&= E^2 f \delta^1_i \delta^1_j + E^2 g \delta^1_i \delta^2_j + E^2 g \delta^2_i \delta^1_j - E^2 f \delta^2_i \delta^2_j \\
&= \alpha \delta^1_i \delta^1_j + \beta \delta^1_i \delta^2_j + \beta \delta^2_i \delta^1_j - \alpha \delta^2_i \delta^2_j ,
\end{aligned}$$

其中 $\alpha = E^2 f$, $\beta = E^2 g$. 写成矩阵形式

$$(\psi^i_j) = \begin{bmatrix} \alpha & \beta & 0 \\ \beta & -\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} ,$$

即式 (7-9-43).

14. 试证式 (7-9-36), 即 $\nabla^a \nabla_a P = (\partial^2 P / \partial x^2) + (\partial^2 P / \partial y^2)$.

证 首先因

$$\begin{aligned}
\nabla_a P &= \nabla_a P(x, y, u) \stackrel{(3-1-2)}{=} (dP)_a = P_x(dx)_a + P_y(dy)_a + P_u(du)_a \\
&\stackrel{(7-9-28)}{=} P_x(e^1)_a + P_y(e^2)_a + P_u(e^4)_a ,
\end{aligned}$$

其中记 $P_x \equiv \partial P / \partial x$ 等. 故

$$\begin{aligned}
\nabla^a P &= P_x(e^1)^a + P_y(e^2)^a + P_u(e^4)^a \\
&= P_x g^{11}(e_1)^a + P_y g^{22}(e_2)^a + P_u g^{43}(e_3)^a \\
&= P_x(e_1)^a + P_y(e_2)^a - P_u(e_3)^a .
\end{aligned}$$

于是

$$\nabla_a \nabla^a P = \nabla_a [P_x(e_1)^a] + \nabla_a [P_y(e_2)^a] - \nabla_a [P_u(e_3)^a]$$

$$\begin{aligned}
&= (e_1)^a \nabla_a P_x + P_x \nabla_a (e_1)^a \\
&\quad + (e_2)^a \nabla_a P_y + P_y \nabla_a (e_2)^a \\
&\quad - (e_3)^a \nabla_a P_u - P_u \nabla_a (e_3)^a \\
&= (e_1)^a [P_{xx}(dx)_a + P_{xy}(dy)_a + P_{xu}(du)_a] + P_x \nabla_a (e_1)^a \\
&\quad + (e_2)^a [P_{yx}(dx)_a + P_{yy}(dy)_a + P_{yu}(du)_a] + P_y \nabla_a (e_2)^a \\
&\quad - (e_3)^a [P_{ux}(dx)_a + P_{uy}(dy)_a + P_{uu}(du)_a] - P_u \nabla_a (e_3)^a \\
&= (e_1)^a [P_{xx}(e_1)_a + P_{xy}(e_2)_a - P_{xu}(e_3)_a] + P_x \nabla_a (e_1)^a \\
&\quad + (e_2)^a [P_{yx}(e_1)_a + P_{yy}(e_2)_a + P_{yu}(e_3)_a] + P_y \nabla_a (e_2)^a \\
&\quad - (e_3)^a [P_{ux}(e_1)_a + P_{uy}(e_2)_a + P_{uu}(e_3)_a] - P_u \nabla_a (e_3)^a \\
&= g_{11}P_{xx} + g_{12}P_{xy} - g_{13}P_{xu} + P_x \nabla_a (e_1)^a \\
&\quad + g_{21}P_{yx} + g_{22}P_{yy} + g_{23}P_{yu} + P_y \nabla_a (e_2)^a \\
&\quad - g_{31}P_{ux} - g_{32}P_{uy} - g_{33}P_{uu} - P_u \nabla_a (e_3)^a \\
&= P_{xx} + P_{yy} + P_x \nabla_a (e_1)^a + P_y \nabla_a (e_2)^a - P_u \nabla_a (e_3)^a .
\end{aligned}$$

利用 $\nabla_a (e_\alpha)^b = -\omega_\alpha^\beta{}_a (e_\beta)^b$ 并注意式 (7-9-30), 我们有

$$\begin{aligned}
\nabla_a (e_1)^a &= -\omega_1^\beta{}_a (e_\beta)^a = -\omega_1^3{}_a (e_3)^a = -(fx + gy)(du)_a (e_3)^a \\
&= (fx + gy)(e_3)_a (e_3)^a = g_{33}(fx + gy) = 0 , \\
\nabla_a (e_2)^a &= -\omega_2^\beta{}_a (e_\beta)^a = -\omega_2^3{}_a (e_3)^a = -(gx - fy)(du)_a (e_3)^a \\
&= (gx - fy)(e_3)_a (e_3)^a = g_{33}(gx - fy) = 0 , \\
\nabla_a (e_3)^a &= -\omega_3^\beta{}_a (e_\beta)^a = 0 .
\end{aligned}$$

最后得到

$$\nabla_a \nabla^a P = P_{xx} + P_{yy} = \frac{\partial^2 P}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 P}{\partial y^2} .$$

第 8 章 “爱因斯坦方程的求解” 习题

~1. 试证命题 8-1-1.

证 由 Killing 矢量场 $\xi^a = (\partial/\partial t)^a$ 决定的单参等度规群元为 ϕ_t , 它将处处与 ξ^a 正交的超曲面 $\Sigma_0 = \{p \in M | t(p) = 0\}$ 上的点 p 映射到超曲面 $\Sigma_{t_1} = \{q \in M | t(q) = t_1\}$ 上的 $q = \phi_{t_1}(p)$ 点 [有 $p = \phi_{t_1}^{-1}(q) = \phi_{-t_1}(q)$]. 设 q 点的切空间为 V_q , 与超曲面 Σ_{t_1} 相切的子空间为 W_q (即 “躺在” Σ_{t_1} 面内的矢量构成的矢量空间). 下面我们要证明属于 W_q 的矢量 $w^a|_q$ 都与 $\xi^a|_q$ 正交, 即

$$(g_{ab}\xi^a w^b)|_q = g_{ab}|_q \xi^a|_q w^b|_q = 0 .$$

因为 ϕ_t 为等度规映射, 根据 §4.3 注 1, $\phi_t^{-1} = \phi_{-t}$ 也为等度规映射, 有 $\phi_{-t_1}^* g_{ab} = g_{ab}$. 所以

$$\begin{aligned} (g_{ab} \xi^a w^b)|_q &= (\phi_{-t_1}^* g_{ab})|_q \xi^a|_q w^b|_q \stackrel{(4-1-3)}{=} g_{ab}|_{\phi_{-t_1}(q)} (\phi_{-t_1}^* \xi)^a|_{\phi_{-t_1}(q)} (\phi_{-t_1}^* w)^b|_{\phi_{-t_1}(q)} \\ &= g_{ab}|_p (\phi_{-t_1}^* \xi)^a|_p (\phi_{-t_1}^* w)^b|_p = g_{ab}|_p (\phi_{t_1}^* \xi)^a|_p (\phi_{t_1}^* w)^b|_p. \end{aligned}$$

下面我们证明 $\phi_{t_1}^*(\xi^a|_q) = (\phi_{t_1}^* \xi)^a|_p = \xi^a|_p$, 而 $\phi_{t_1}^*(w^b|_q) = (\phi_{t_1}^* w)^b|_p$ 为超曲面 Σ_0 上 p 点切于超曲面 (“躺在” 超曲面 Σ_0 内) 的矢量, 即 $(\phi_{t_1}^* w)^b|_p \in W_p$.

设 f 是任一光滑函数, 则 Σ_0 上 p 点的矢量 $(\phi_{t_1}^* \xi)^a|_p$ 对 f 的作用为

$$(\phi_{t_1}^* \xi)|_p(f) \stackrel{(4-1-2)}{=} \xi(\phi_{t_1}^* f) = \left. \frac{\partial}{\partial t} \right|_{t=t_1} (\phi_{t_1}^* f) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} [(\phi_{t_1}^* f)|_r - (\phi_{t_1}^* f)|_q].$$

其中 r 为 ξ^a 的积分曲线 $C(t)$ 上的一点: $r = C(t_1 + \Delta t)$ [$p = C(0)$, $q = C(t_1)$]. 于是有

$$(\phi_{t_1}^* \xi)|_p(f) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} [f|_s - f|_p] = \xi|_p(f),$$

其中 s 也是 $C(t)$ 上的一点: $s = \phi_{-t_1}(r) = C(\Delta t)$. f 的任意性给出 $(\phi_{t_1}^* \xi)^a|_p = \xi^a|_p$.

最后, 设 $\mu(s)$ 是躺在 (切于) Σ_{t_1} 面内过 q 点并由 $w^a|_q$ 决定的测地线, r' 是该线上的一点: $r' = \mu(\Delta s)$ [$q = \mu(0)$], 则

$$\begin{aligned} (\phi_{t_1}^* w)|_p(f) &\stackrel{(4-1-2)}{=} w(\phi_{t_1}^* f) = \left. \frac{\partial}{\partial s} \right|_{\Delta s=0} (\phi_{t_1}^* f) = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} [(\phi_{t_1}^* f)|_{r'} - (\phi_{t_1}^* f)|_q] \\ &= \lim_{\Delta s \rightarrow 0} [f|_{s'} - f|_p] \equiv \bar{w}|_p(f), \end{aligned}$$

注意其中 $s' = \phi_{-t_1}(r')$ 是 Σ_0 面上的点, 因此 $(\phi_{t_1}^* w)^a|_p = \bar{w}^a|_p$ 与超曲面 Σ_0 相切, 即 $(\phi_{t_1}^* w)^a|_p = \bar{w}^a|_p \in W_p$.

于是我们得到

$$(g_{ab} \xi^a w^b)|_q = g_{ab}|_p (\phi_{t_1}^* \xi)^a|_p (\phi_{t_1}^* w)^b|_p = g_{ab}|_p \xi^a|_p \bar{w}^b|_p = (g_{ab} \xi^a \bar{w}^b)|_p = 0,$$

最后一个等式是由于 Σ_0 与 ξ^a 正交. 既然 q 是超曲面 Σ_{t_1} 上的任意一点, 因此超曲面本身与 ξ^a 处处正交.

~2. 设 $\gamma(r)$ 是图 8-6 中 Σ_t 上从 p_1 到 p_2 的、 θ 和 φ 都为常数的曲线 (以径向坐标 r 为曲线参数), 试证 $\gamma(r)$ 是 (非仿射参数化的) 测地线. 提示: 用式 (5-7-2).

证 令曲线 $\gamma(r)$ 的切矢 $T^a = (\frac{\partial}{\partial r})^a$, 因

$$\begin{aligned} T^b \nabla_b T^a &= \left(\frac{\partial}{\partial r} \right)^b \nabla_b \left(\frac{\partial}{\partial r} \right)^a \stackrel{(5-7-2)}{=} \Gamma^\sigma{}_{11} \left(\frac{\partial}{\partial x^\sigma} \right)^a \stackrel{(8-3-20)}{=} \Gamma^1{}_{11}(r) \left(\frac{\partial}{\partial r} \right)^a \\ &= \alpha(r) T^a, \end{aligned}$$

其中 $\alpha(r) = \Gamma^1{}_{11}(r) = -\frac{M}{r^2} (1 - \frac{2M}{r})^{-1}$. 由定理 3-3-2, 知道 $\gamma(r)$ 为非仿射参数化的测地线. 令重参数化 $\gamma'(r') = \gamma(r)$ 可获得仿射参数化的测地线 $\gamma'(r')$. 利

用第 3 章习题 9 (定理 3-3-2 的证明) 的结果, 函数关系 $r' = r'(r)$ 满足常微分方程

$$\frac{d^2 r'(r)}{dr^2} = \alpha(r) \frac{dr'(r)}{dr}.$$

$\gamma'(r')$ 的切矢 $T'^a = (\frac{\partial}{\partial r'})^a$ 满足测地线方程 $T'^b \nabla_b T'^a = 0$, r' 是仿射参数.

3. 设 ξ^a 是稳态时空的类时 Killing 矢量场, $\chi \equiv (-g_{ab}\xi^a\xi^b)^{1/2}$.

(a) 试证 χ 在 ξ^a 的积分曲线上为常数;

(b) 试证稳态观者的 4 加速 $A^a = \nabla^a(\ln \chi)$. 提示: 利用 Killing 方程 $\nabla^{(a}\xi^{b)} = 0$ 和 (a) 的结果.

证 令 $\chi \equiv (-\xi_a\xi^a)^{1/2} = (-g_{ab}\xi^a\xi^b)^{1/2} = (-g_{00})^{1/2}$.

(a) χ 在 ξ^a 的积分曲线上的变化为

$$\begin{aligned}\xi^b \nabla_b \chi &= \xi^b \nabla_b (-\xi_a \xi^a)^{1/2} = \frac{1}{2} (-\xi_a \xi^a)^{-1/2} [-\xi^b \xi_a \nabla_b \xi^a - \xi^b \xi^a \nabla_b \xi_a] \\ &= -\chi^{-1} \xi^b \xi^a \nabla_b \xi_a \stackrel{(4-3-1)}{=} -\chi^{-1} \xi^{(b} \xi^{a)} \nabla_{[b} \xi_{a]} = 0,\end{aligned}$$

其中利用了 ξ^a 的 Killing 性. 这一结果说明在 ξ^a 的积分曲线上矢量 ξ^a 的“长度”不变.

(b) 设 τ 是稳态观者的固有时, 其世界线与 ξ^a 的积分曲线重合. 稳态观者的 4 速为 $Z^a = (\frac{\partial}{\partial \tau})^a$, 因

$$\begin{aligned}-1 &= Z_a Z^a = g_{ab} Z^a Z^b = g_{ab} \left(\frac{\partial}{\partial \tau}\right)^a \left(\frac{\partial}{\partial \tau}\right)^b \\ &= g_{ab} \left(\frac{dt}{d\tau}\right)^2 \left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^a \left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^b = g_{00} \left(\frac{dt}{d\tau}\right)^2,\end{aligned}$$

得

$$\frac{d\tau}{dt} = (-g_{00})^{1/2} = \chi.$$

于是有关系 $Z^a = \chi^{-1} \xi^a$. 稳态观者的 4 加速按定义为

$$A^a = Z^b \nabla_b Z^a = \chi^{-1} \xi^b \nabla_b (\chi^{-1} \xi^a) = \chi^{-2} \xi^b \nabla_b \xi^a,$$

最后一步利用了 (a) 的结果. 另一方面,

$$\begin{aligned}\nabla^a \ln \chi &= \chi^{-1} \nabla^a \chi = \chi^{-1} \nabla^a (-\xi_b \xi^b)^{1/2} = \chi^{-1} \frac{1}{2} (-\xi_b \xi^b)^{-1/2} [-2\xi_b \nabla^a \xi^b] \\ &= -\chi^{-2} \xi_b \nabla^a \xi^b \stackrel{(4-3-1)}{=} -\chi^{-2} \xi_b \nabla^b \xi^a = \chi^{-2} \xi^b \nabla_b \xi^a.\end{aligned}$$

因此有 $A^a = \nabla^a \ln \chi$.

- ~4. 试证: (a) 电磁场能动张量的迹为零, 即 $T \equiv g^{ab}T_{ab} = 0$; (b) 电磁真空时空的标量曲率 $R = 0$.

证 (a) 电磁场的能动张量为式 (8-4-1)

$$T_{ab} = \frac{1}{4\pi} \left(F_{ac}F_b{}^c - \frac{1}{4}g_{ab}F_{cd}F^{cd} \right),$$

它的迹为

$$g^{ab}T_{ab} = T_a{}^a = \frac{1}{4\pi} \left(F_{ac}F^{ac} - \frac{1}{4}g_a{}^a F_{cd}F^{cd} \right) = \frac{1}{4\pi} \left(F_{ac}F^{ac} - F_{cd}F^{cd} \right) = 0,$$

其中利用了 $g_a{}^a = \delta_a{}^a = 4$.

(b) 因为电磁真空时空满足的爱因斯坦方程为 $G_{ab} = R_{ab} - \frac{1}{2}Rg_{ab} = 8\pi T_{ab}$, 求迹后有

$$R_a{}^a - \frac{1}{2}Rg_a{}^a = R - 2R = T_a{}^a = 0,$$

于是标量曲率 $R = 0$.

- ~5. 试证式 (8-4-7) 和 (8-4-28).

证 式 (8-4-7) 的证明:

由式 (8-4-5) 的定义 $\Sigma_{ab} = F_{ab} + i{}^*F_{ab}$, 知 $\Sigma^{ab} = F^{ab} + i{}^*F^{ab}$, 于是

$$\begin{aligned} \Sigma_{ab}\Sigma^{ab} &= (F_{ab} + i{}^*F_{ab})(F^{ab} + i{}^*F^{ab}) \\ &= F_{ab}F^{ab} - {}^*F_{ab}{}^*F^{ab} + iF_{ab}{}^*F^{ab} + i{}^*F_{ab}F^{ab} \\ &= F_{ab}F^{ab} - {}^*F_{ab}{}^*F^{ab} + 2iF_{ab}{}^*F^{ab}, \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} {}^*F_{ab}{}^*F^{ab} &\stackrel{(5-6-1)}{=} \frac{1}{2}F^{cd}\varepsilon_{cdab}\frac{1}{2}F_{ef}\varepsilon^{efab} = \frac{1}{4}F^{cd}F_{ef}\varepsilon_{cdab}\varepsilon^{efab} \\ &\stackrel{(5-4-10)}{=} \frac{1}{4}F^{cd}F_{ef}(-1)^1 2!2!\delta^{[e}_c\delta^{f]}_d = -F^{cd}F_{[ef]}\delta^e{}_c\delta^f{}_d = -F^{cd}F_{cd}. \end{aligned}$$

由此得

$$\Sigma_{ab}\Sigma^{ab} = 2(F_{ab}F^{ab} + iF_{ab}{}^*F^{ab}).$$

此即式 (8-4-7).

式 (8-4-28) 的证明:

与第 3 题 (b) 类似, 根据线元式 (8-4-23), 静态观者 G 的 4 速 Z^a 与 Killing 场 ξ^a 的关系为

$$Z^a = \left(\frac{\partial}{\partial \tau} \right)^a = (-g_{00})^{-1/2} \left(\frac{\partial}{\partial t} \right)^a = (-g_{00})^{-1/2} \xi^a.$$

现在

$$g_{00} = -\left(1 + \frac{Q^2}{r^2} + \frac{C}{r}\right) \equiv -f,$$

有 $Z^a = f^{-1/2}\xi^a = f^{-1/2}(\partial/\partial t)^a$. G 的正交归一 4 标架的对偶基底可从线元式 (8-4-23) 看出:

$$(e^0)_a = f^{1/2}(dt)_a, \quad (e^1)_a = f^{-1/2}(dr)_a, \quad (e^2)_a = r(d\theta)_a, \quad (e^3)_a = r \sin \theta (d\varphi)_a,$$

相应的基底为:

$$(e_0)^a = f^{-1/2}(\partial_t)_a, \quad (e_1)^a = f^{1/2}(\partial_r)_a, \quad (e_2)^a = r^{-1}(\partial_\theta)_a, \quad (e_3)^a = (r \sin \theta)^{-1}(\partial_\varphi)_a.$$

静态观者 G 测得的电场和磁场分别为 $E_a = F_{ab}Z^b$ 和 $B_a = -{}^*F_{ab}Z^b$, 其中 $Z^b = (e_0)^b$. 注意到式 (8-4-27)

$$\begin{aligned} F_{ab} &= -\frac{Q}{r^2}[f^{-1/2}(e^0)_a] \wedge [f^{1/2}(e^1)_b] = -\frac{Q}{r^2}(e^0)_a \wedge (e^1)_b \\ &= -\frac{Q}{r^2}[(e^0)_a(e^1)_b - (e^0)_b(e^1)_a], \end{aligned}$$

故

$$F^{ab} = -\frac{Q}{r^2}[(e^0)^a(e^1)^b - (e^0)^b(e^1)^a] = \frac{Q}{r^2}[(e_0)^a(e_1)^b - (e_0)^b(e_1)^a].$$

于是有

$$\begin{aligned} E_a &= F_{ab}Z^b = -\frac{Q}{r^2}[(e^0)_a(e^1)_b - (e^0)_b(e^1)_a](e_0)^b = \frac{Q}{r^2}(e^1)_a, \\ B_a &= -{}^*F_{ab}Z^b = -\frac{1}{2}F^{cd}\varepsilon_{cdab}Z^b \\ &= -\frac{1}{2}\frac{Q}{r^2}[(e_0)^c(e_1)^d - (e_0)^d(e_1)^c]\varepsilon_{cdab}(e_0)^b \\ &= -\frac{Q}{r^2}(e_0)^c(e_1)^d\varepsilon_{cdab}(e_0)^b = \frac{Q}{r^2}(e_0)^b(e_0)^c(e_1)^d\varepsilon_{bcda} \\ &= \frac{Q}{r^2}(e_0)^{(b}(e_0)^c)(e_1)^d\varepsilon_{[bc]da} = 0, \end{aligned}$$

和

$$E^a = \frac{Q}{r^2}(e_1)^a, \quad B^a = 0, \quad [\text{其中 } (e_1)^a = f^{1/2}(\partial_r)^a = f^{1/2}(\partial/\partial r)^a].$$

此即式 (8-4-28).

6. 设 F_{ab} 是任意时空中的 2 形式场, ${}^*F_{ab}$ 是 F_{ab} 的对偶 2 形式场, $\alpha \in [0, 2\pi]$ 为常实数, 则 $F'_{ab} \equiv F_{ab} \cos \alpha - {}^*F_{ab} \sin \alpha$ 称为 F_{ab} 的、角度为 α 的一个 **对偶转动** (duality rotation).

(a) 试证 F_{ab} 为无源电磁场当且仅当 F'_{ab} 为无源电磁场 [证明很易. 若用麦氏方程的外微分表达式 (7-2-4') 和 (7-2-5') 甚至一望便知.].

(b) 试证电磁场 F_{ab} 和 F'_{ab} 有相同能动张量. 提示: 用 T_{ab} 的对称表示式 (6-6-28') 可简化证明.

(c) 令 $M \equiv 2F_{ab}F^{ab}$, $N \equiv 2F_{ab}{}^*F^{ab}$, $M' \equiv 2F'_{ab}F'^{ab}$, $N' \equiv 2F'_{ab}{}^*F'^{ab}$, 试证

$$M' = M \cos 2\alpha - N \sin 2\alpha, \quad N' = M \sin 2\alpha + N \cos 2\alpha.$$

(d) 令 $\Sigma_{ab} \equiv F_{ab} + i{}^*F_{ab}$, $\Sigma'_{ab} \equiv F'_{ab} + i{}^*F'_{ab}$, 则 $K \equiv \Sigma_{ab}\Sigma^{ab}$ 和 $K' \equiv \Sigma'_{ab}\Sigma'^{ab}$ 为复标量场, 故在每一时空点的 K 和 K' 相当于复平面上的两个矢量. 试用 (c) 的结果证明矢量 K' 是矢量 K 逆时针转 2α 角的结果 (即 $|K| = |K'|$, K' 与 K 的辐角差为 2α).

(e) 设 (\vec{E}, \vec{B}) 和 (\vec{E}', \vec{B}') 是瞬时观者分别测 F_{ab} 和 F'_{ab} 所得的电场和磁场, 试证

$$\vec{E}' = \vec{E} \cos \alpha + \vec{B} \sin \alpha, \quad \vec{B}' = -\vec{E} \sin \alpha + \vec{B} \cos \alpha.$$

注: 对偶转动的进一步物理意义见本书下册及 Jackson (1975).

证 (a) 首先由于

$${}^{**}F_{ab} \stackrel{(5-6-2)}{=} (-1)^{1+2(4-2)} F_{ab} = -F_{ab},$$

根据 $F'_{ab} \equiv F_{ab} \cos \alpha - {}^*F_{ab} \sin \alpha$, 有

$${}^*F'_{ab} = {}^*F_{ab} \cos \alpha - {}^{**}F_{ab} \sin \alpha = F_{ab} \sin \alpha + {}^*F_{ab} \cos \alpha,$$

其反变换为

$$\begin{cases} F_{ab} = F'_{ab} \cos \alpha + {}^*F'_{ab} \sin \alpha. \\ {}^*F_{ab} = -F'_{ab} \sin \alpha + {}^*F'_{ab} \cos \alpha. \end{cases}$$

麦氏方程的外微分表达式由式 (7-2-4') 和 (7-2-5') 给出:

$$d{}^*\mathbf{F} = 4\pi{}^*\mathbf{J},$$

$$d\mathbf{F} = 0,$$

在无源时为齐次. 因此从上面的线性变换关系立即知道 F_{ab} 为无源电磁场当且仅当 F'_{ab} 为无源电磁场.

(b) 电磁场能动张量 T_{ab} 的对称表达式为 (6-6-28'):

$$T_{ab} = \frac{1}{8\pi}(F_{ac}F_b{}^c + {}^*F_{ac}{}^*F_b{}^c).$$

显然有

$$\begin{aligned} T'_{ab} &= \frac{1}{8\pi}(F'_{ac}F_b{}'^c + {}^*F'_{ac}{}^*F_b{}'^c) \\ &= \frac{1}{8\pi}[(F_{ac} \cos \alpha - {}^*F_{ac} \sin \alpha)(F_b{}^c \cos \alpha - {}^*F_b{}^c \sin \alpha) \\ &\quad + (F_{ac} \sin \alpha + {}^*F_{ac} \cos \alpha)(F_b{}^c \sin \alpha + {}^*F_b{}^c \cos \alpha)] \\ &= \frac{1}{8\pi}(F_{ac}F_b{}^c + {}^*F_{ac}{}^*F_b{}^c) = T_{ab}. \end{aligned}$$

(c) 注意第 5 题第一问的证明时得到的一个关系式 $*F_{ab} *F^{ab} = -F_{ab} F^{ab}$. 于是有

$$\begin{aligned}
 M' &= 2F'_{ab} F'^{ab} = 2(F_{ab} \cos \alpha - *F_{ab} \sin \alpha)(F^{ab} \cos \alpha - *F^{ab} \sin \alpha) \\
 &= 2F_{ab} F^{ab} \cos^2 \alpha - 2F_{ab} *F^{ab} \sin \alpha \cos \alpha \\
 &\quad - 2*F_{ab} F^{ab} \sin \alpha \cos \alpha + 2*F_{ab} *F^{ab} \sin^2 \alpha \\
 &= 2F_{ab} F^{ab} (\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha) - 4F_{ab} *F^{ab} \sin \alpha \cos \alpha \\
 &= M \cos 2\alpha - N \sin 2\alpha ; \\
 N' &= 2F'_{ab} *F'^{ab} = 2(F_{ab} \cos \alpha - *F_{ab} \sin \alpha)(F^{ab} \sin \alpha + *F^{ab} \cos \alpha) \\
 &= 2F_{ab} F^{ab} \sin \alpha \cos \alpha + 2F_{ab} *F^{ab} \cos^2 \alpha \\
 &\quad - 2*F_{ab} F^{ab} \sin^2 \alpha - 2*F_{ab} *F^{ab} \sin \alpha \cos \alpha \\
 &= 4F_{ab} F^{ab} \sin \alpha \cos \alpha + 2F_{ab} *F^{ab} (\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha) \\
 &= M \sin 2\alpha + N \cos 2\alpha .
 \end{aligned}$$

(d) 根据定义我们有

$$\begin{aligned}
 K' &= \Sigma'_{ab} \Sigma'^{ab} = (F'_{ab} + i *F'_{ab})(F'^{ab} + i *F'^{ab}) \\
 &= F'_{ab} F'^{ab} + i F'_{ab} *F'^{ab} + i *F'_{ab} F'^{ab} - *F'_{ab} *F'^{ab} \\
 &= 2F'_{ab} F'^{ab} + 2i F'_{ab} *F'^{ab} = M' + iN' .
 \end{aligned}$$

因此由 (c) 的结果知复平面上的矢量 K' 是矢量 K 逆时针转 2α 角的结果.

(e) 瞬时静态观者测得的电场和磁场分别为 $E_a = F_{ab} Z^b$ 和 $B_a = -*F_{ab} Z^b$, 因此有

$$\begin{aligned}
 E'_a &= F'_{ab} Z^b = (F_{ab} \cos \alpha - *F_{ab} \sin \alpha) Z^b \\
 &= F_{ab} Z^b \cos \alpha - *F_{ab} Z^b \sin \alpha \\
 &= E_a \cos \alpha + B_a \sin \alpha ; \\
 B'_a &= -*F'_{ab} Z^b = -(F_{ab} \sin \alpha + *F_{ab} \cos \alpha) Z^b \\
 &= -F_{ab} Z^b \sin \alpha - *F_{ab} Z^b \cos \alpha \\
 &= -E_a \sin \alpha + B_a \cos \alpha .
 \end{aligned}$$

此即

$$\vec{E}' = \vec{E} \cos \alpha + \vec{B} \sin \alpha , \quad \vec{B}' = -\vec{E} \sin \alpha + \vec{B} \cos \alpha , .$$

7. n 维时空称为 **爱因斯坦时空**, 若 $R_{ab} = Rg_{ab}/2$, 其中 g_{ab} , R_{ab} 和 R 分别为度规、里奇张量和标量曲率. 试证电磁真空时空 (其中电磁场非零) 不是爱因斯坦时空. 注: 由第 3 章习题 17 可知任意 2 维时空必为爱因斯坦时空.

证 爱因斯坦时空即为爱因斯坦张量 $G_{ab} = 0$ 的时空, 而电磁真空时空的爱因斯坦方程为

$$G_{ab} = R_{ab} - \frac{1}{2}Rg_{ab} = 8\pi T_{ab},$$

其中 T_{ab} 为电磁场的能动张量. 因为在有电磁场时 T_{ab} 一般不为零, 故 G_{ab} 一般也不为零, 所以电磁真空时空不是爱因斯坦时空.

但是第 3 章习题 17 的结论告诉我们: 2 维空间或 2 维时空的爱因斯坦张量都为零, 因此 2 维时空必为爱因斯坦时空, 反过来也就是说 2 维时空的电磁场能动张量必须为零. 但是对于 1+1 维时空, 情况并非如此. 电磁场的能动张量为 $T_{ab} = \frac{1}{4\pi}(F_{ac}F_b{}^c - \frac{1}{4}g_{ab}F_{cd}F^{cd})$, 其分量式为 $T_{\mu\nu} = \frac{1}{4\pi}(F_{\mu\sigma}F_\nu{}^\sigma - \frac{1}{4}g_{\mu\nu}F_{\sigma\rho}F^{\sigma\rho})$. 利用场强张量的反称性, 现在只有一个独立分量 $F_{01} = -F_{10}$. 注意到 $F_{\sigma\rho}F^{\sigma\rho} = F_{01}F^{01} + F_{10}F^{10} = 2F_{01}F^{01}$, 于是有

$$\begin{aligned} T_{00} &= \frac{1}{4\pi}\left(F_{0\sigma}F_0{}^\sigma - \frac{1}{4}g_{00}2F_{01}F^{01}\right) = \frac{1}{4\pi}\left(F_{01}F_0{}^1 - \frac{1}{2}g_{00}F_{01}F^{01}\right) \\ &= \frac{1}{4\pi}\left(g_{0\sigma}F_{01}F^{\sigma 1} - \frac{1}{2}g_{00}F_{01}F^{01}\right) = \frac{1}{8\pi}g_{00}F_{01}F^{01}, \\ T_{01} &= \frac{1}{4\pi}\left(F_{0\sigma}F_1{}^\sigma - \frac{1}{4}g_{01}2F_{01}F^{01}\right) = \frac{1}{4\pi}\left(F_{01}F_1{}^1 - \frac{1}{2}g_{01}F_{01}F^{01}\right) \\ &= \frac{1}{4\pi}\left(g_{1\sigma}F_{01}F^{\sigma 1} - \frac{1}{2}g_{01}F_{01}F^{01}\right) = \frac{1}{8\pi}g_{01}F_{01}F^{01}, \\ T_{11} &= \frac{1}{4\pi}\left(F_{1\sigma}F_1{}^\sigma - \frac{1}{4}g_{11}2F_{01}F^{01}\right) = \frac{1}{4\pi}\left(F_{10}F_1{}^0 - \frac{1}{2}g_{11}F_{01}F^{01}\right) \\ &= \frac{1}{4\pi}\left(g_{1\sigma}F_{10}F^{\sigma 0} - \frac{1}{2}g_{11}F_{01}F^{01}\right) = \frac{1}{8\pi}g_{11}F_{01}F^{01}. \end{aligned}$$

可见 $T_{\mu\nu} \neq 0$, 与爱因斯坦张量 $G_{\mu\nu} = 0$ 不相容! 因此 1+3 维形式的电磁场能动张量不适用于 1+1 维情形.

8. 考虑 Taub 的平面对称真空解 (8-6-1').

(a) 写出静态观者的 4 速用坐标基矢的表达式;

(b) 设两静态观者的空间坐标分别为 (x, y, z_1) 和 (x, y, z_2) , 求他们间的空间距离.

解 (a) 由 Taub 平面对称真空解

$$ds^2 = z^{-1/2}(-dt^2 + dz^2) + z(dx^2 + dy^2)$$

知 $g_{00} = -z^{-1/2}$. 设静态观者的固有时为 τ , 因 $d\tau = \sqrt{-g_{00}} dt$, 于是静态观者的 4 速为

$$Z^a = \left(\frac{\partial}{\partial\tau}\right)^a = (-g_{00})^{-1/2}\left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^a = z^{1/4}\left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^a = z^{1/4}\xi^a.$$

(b) 位于 (x, y, z_1) 和 (x, y, z_2) 的两静态观者的空间距离为 (设 $z_2 > z_1 > 0$)

$$l = \int_{z_1}^{z_2} \sqrt{z^{-1/2}dz^2} = \int_{z_1}^{z_2} z^{-1/4}dz = \frac{4}{3}(z_2^{3/4} - z_1^{3/4}).$$

设他们的坐标距离为 $l_c = z_2 - z_1$. 当 $z_1 < 1$ 时, 对于小的 l_c 有 $l > l_c$, 对于大的 l_c 有 $l < l_c$; 相等时的 l_c 由方程

$$\frac{4}{3}[(l_c + z_1)^{3/4} - z_1^{3/4}] = l_c$$

决定. 而当 $z_1 > 1$ 时, 总有 $l < l_c$.

9. 试证式 (eq8-6-5) 的 F_{ab} 有平面对称性, 即 $\mathcal{L}_{\xi_i} F_{ab} = 0$ ($i = 1, 2, 3$), 其中 $\xi_1^a \equiv (\partial/\partial x)^a$, $\xi_2^a \equiv (\partial/\partial y)^a$, $\xi_3^a \equiv -y(\partial/\partial x)^a + x(\partial/\partial y)^a$ 是反映度规 (8-6-3) 平面对称性的 Killing 场.

证这是显而易见的, 因为 ξ_1^a 和 ξ_2^a 的积分曲线分别为 x 和 y 坐标线, 而 ξ_3^a 的积分曲线为 φ 坐标线, 其中 φ 满足 $\cos \varphi = x/\sqrt{x^2 + y^2}$ (或 $\sin \varphi = y/\sqrt{x^2 + y^2}$). 注意到 F_{ab} 的分量 [式 (8-6-5)] 都只是 z 的函数, 故根据定理 4-2-2 式 (4-2-3) 有

$$(\mathcal{L}_{\xi_1} F)_{\mu\nu} = \frac{\partial F_{\mu\nu}}{\partial x} = 0, \quad (\mathcal{L}_{\xi_2} F)_{\mu\nu} = \frac{\partial F_{\mu\nu}}{\partial y} = 0, \quad (\mathcal{L}_{\xi_3} F)_{\mu\nu} = \frac{\partial F_{\mu\nu}}{\partial \varphi} = 0,$$

亦即 $\mathcal{L}_{\xi_i} F_{ab} = 0$.

或者利用定理 4-2-5 的公式 (4-2-8) 来计算:

$$\mathcal{L}_{\xi_i} F_{ab} = \xi_i^c \partial_c F_{ab} + F_{cb} \partial_a \xi_i^c + F_{ac} \partial_b \xi_i^c.$$

右边的第一项为

$$\begin{aligned} \xi_i^c \partial_c F_{ab} &= (dx^\mu)_a (dx^\nu)_b \xi_i^\sigma \partial_\sigma F_{\mu\nu}(z) = (dx^\mu)_a (dx^\nu)_b \xi_i^\sigma \delta^3_{\sigma z} \frac{\partial}{\partial z} F_{\mu\nu}(z) \\ &= (dx^\mu)_a (dx^\nu)_b \xi_i^3 \frac{\partial}{\partial z} F_{\mu\nu}(z) = 0. \end{aligned}$$

最后一步是因为 $\xi_i^3 = 0$ (非零的 Killing 场分量只有 $\xi_1^1 = 1$, $\xi_2^2 = 1$, $\xi_3^1 = -y$ 和 $\xi_3^2 = x$). 右边的后两项中的 $\partial_a \xi_i^c$ 根据式 (3-1-10) 有

$$\partial_a \xi_1^c = \partial_a (\partial/\partial x)^c = \partial_a \xi_2^c = \partial_a (\partial/\partial y)^c = 0,$$

显然对 ξ_1^a 和 ξ_2^a 结论成立. 而对 $\partial_a \xi_3^c$ 有

$$\begin{aligned} \partial_a \xi_3^c &= (dx^\mu)_\mu \left[-y \left(\frac{\partial}{\partial x} \right)^c + x \left(\frac{\partial}{\partial y} \right)^c \right] = (dy)_a \left[- \left(\frac{\partial}{\partial x} \right)^c \right] + (dx)_a \left[\left(\frac{\partial}{\partial y} \right)^c \right] \\ &= -(dx^2)_a \left(\frac{\partial}{\partial x^1} \right)^c + (dx^1)_a \left(\frac{\partial}{\partial x^2} \right)^c, \end{aligned}$$

导致

$$\begin{aligned} &F_{cb} \partial_a \xi_3^c + F_{ac} \partial_b \xi_3^c \\ &= F_{cb} \left[- (dx^2)_a \left(\frac{\partial}{\partial x^1} \right)^c + (dx^1)_a \left(\frac{\partial}{\partial x^2} \right)^c \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& +F_{ac}\left[-(dx^2)_b\left(\frac{\partial}{\partial x^1}\right)^c+(dx^1)_b\left(\frac{\partial}{\partial x^2}\right)^c\right] \\
& = -(dx^2)_aF_{1b}+(dx^1)_aF_{2b}-(dx^2)_bF_{a1}+(dx^1)_bF_{a2} \\
& = -(dx^2)_a(dx^\mu)_bF_{1\mu}+(dx^1)_a(dx^\mu)_bF_{2\mu}-(dx^2)_b(dx^\mu)_aF_{\mu 1}+(dx^1)_b(dx^\mu)_aF_{\mu 2} \\
& \stackrel{(8-6-5)}{=} -(dx^2)_a(dx^2)_bF_{12}+(dx^1)_a(dx^1)_bF_{21}-(dx^2)_b(dx^2)_aF_{21}+(dx^1)_b(dx^1)_aF_{12} \\
& = 0.
\end{aligned}$$

对 ξ_3^a 结论也成立. 故命题得证.

*10. 推出有源麦氏方程在 NP 形式中的表达式. 答案: 在式 (8-8-3a)–(8-8-3d) 的每式右边各加一项, 依次为 $-4\pi J_4, -4\pi J_2, -4\pi J_1, -4\pi J_3$ 【似应为 $2\pi!$ 】(J_1, J_2, J_3, J_4 是 J_a 在类光标架的分量).

解 可仿照式 (8-8-3a) 的推导. 第一个方程:

$$\begin{aligned}
2D\Phi_1 &= k^c\nabla_c[F_{ab}(k^al^b+\bar{m}^am^b)]=F_{ab}k^ak^c\nabla_cl^b+F_{ab}l^bk^c\nabla_ck^a+k^al^bk^c\nabla_cF_{ab} \\
&+F_{ab}\bar{m}^ak^c\nabla_cm^b+F_{ab}m^bk^c\nabla_c\bar{m}^a+\bar{m}^am^bk^c\nabla_cF_{ab},
\end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}
F_{ab}k^ak^c\nabla_cl^b &= F_{4\nu}(\varepsilon^\nu)_b(\varepsilon_4)^c\nabla_c(\varepsilon_3)^b=F_{4\nu}g^{\nu\mu}\omega_{\mu 34} \\
&= F_{41}g^{12}\omega_{234}+F_{42}g^{21}\omega_{134}+F_{43}g^{34}\omega_{434} \\
&= F_{41}\omega_{234}+F_{42}\omega_{134}+F_{43}\omega_{344}, \\
F_{ab}l^bk^c\nabla_ck^a &= F_{\nu 3}(\varepsilon^\nu)_a(\varepsilon_4)^c\nabla_c(\varepsilon_4)^a=F_{\nu 3}g^{\nu\mu}\omega_{\mu 44} \\
&= F_{13}g^{12}\omega_{244}+F_{23}g^{21}\omega_{144}+F_{43}g^{43}\omega_{344} \\
&= F_{13}\omega_{244}+F_{23}\omega_{144}-F_{43}\omega_{344}, \\
F_{ab}\bar{m}^ak^c\nabla_cm^b &= F_{2\nu}(\varepsilon^\nu)_b(\varepsilon_4)^c\nabla_c(\varepsilon_1)^b=F_{2\nu}g^{\nu\mu}\omega_{\mu 14} \\
&= F_{21}g^{12}\omega_{214}+F_{23}g^{34}\omega_{414}+F_{24}g^{43}\omega_{314} \\
&= -F_{21}\omega_{124}+F_{23}\omega_{144}-F_{42}\omega_{134}, \\
F_{ab}m^bk^c\nabla_c\bar{m}^a &= F_{\nu 1}(\varepsilon^\nu)_a(\varepsilon_4)^c\nabla_c(\varepsilon_2)^a=F_{\nu 1}g^{\nu\mu}\omega_{\mu 24} \\
&= F_{21}g^{21}\omega_{124}+F_{31}g^{34}\omega_{424}+F_{41}g^{43}\omega_{324} \\
&= F_{21}\omega_{124}-F_{13}\omega_{244}+F_{41}\omega_{234},
\end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned}
& F_{ab}k^ak^c\nabla_cl^b+F_{ab}l^bk^c\nabla_ck^a+F_{ab}\bar{m}^ak^c\nabla_cm^b+F_{ab}m^bk^c\nabla_c\bar{m}^a \\
& = 2F_{41}\omega_{234}+2F_{23}\omega_{144}=2(\pi\Phi_0-\kappa\Phi_2).
\end{aligned}$$

得

$$2D\Phi_1=2(\pi\Phi_0-\kappa\Phi_2)+k^al^bk^c\nabla_cF_{ab}+\bar{m}^am^bk^c\nabla_cF_{ab}.$$

类似地,

$$\bar{\delta}\Phi_0 = \bar{m}^c \nabla_c [F_{ab} k^a m^b] = F_{ab} k^a \bar{m}^c \nabla_c m^b + F_{ab} m^b \bar{m}^c \nabla_c k^a + k^a m^b \bar{m}^c \nabla_c F_{ab} ,$$

其中

$$\begin{aligned} F_{ab} k^a \bar{m}^c \nabla_c m^b &= F_{4\nu} (\varepsilon^\nu)_b (\varepsilon_2)^c \nabla_c (\varepsilon_1)^b = F_{4\nu} g^{\nu\mu} \omega_{\mu 12} \\ &= F_{41} g^{12} \omega_{212} + F_{42} g^{21} \omega_{112} + F_{43} g^{34} \omega_{412} \\ &= -F_{41} \omega_{122} + F_{43} \omega_{142} , \\ F_{ab} m^b \bar{m}^c \nabla_c k^a &= F_{\nu 1} (\varepsilon^\nu)_a (\varepsilon_2)^c \nabla_c (\varepsilon_4)^a = F_{\nu 1} g^{\nu\mu} \omega_{\mu 42} \\ &= F_{21} g^{21} \omega_{142} + F_{31} g^{34} \omega_{442} + F_{41} g^{43} \omega_{342} \\ &= F_{21} \omega_{142} - F_{41} \omega_{342} , \end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned} &F_{ab} k^a \bar{m}^c \nabla_c m^b + F_{ab} m^b \bar{m}^c \nabla_c k^a \\ &= -F_{41} (\omega_{122} + \omega_{342}) + (F_{43} + F_{21}) \omega_{142} \\ &= -\Phi_0 (-2\alpha) + 2\Phi_1 (-\rho) = 2(\alpha\Phi_0 - \rho\Phi_1) . \end{aligned}$$

得

$$\bar{\delta}\Phi_0 = 2(\alpha\Phi_0 - \rho\Phi_1) + k^a m^b \bar{m}^c \nabla_c F_{ab} .$$

于是有

$$\begin{aligned} &D\Phi_1 - \bar{\delta}\Phi_0 \\ &= (\pi\Phi_0 - \kappa\Phi_2) + \frac{1}{2} (k^a l^b k^c + \bar{m}^a m^b k^c) \nabla_c F_{ab} - 2(\alpha\Phi_0 - \rho\Phi_1) - k^a m^b \bar{m}^c \nabla_c F_{ab} \\ &= (\pi - 2\alpha)\Phi_0 + 2\rho\Phi_1 - \kappa\Phi_2 + \frac{1}{2} (k^a l^b k^c + \bar{m}^a m^b k^c - 2k^a m^b \bar{m}^c) \nabla_c F_{ab} . \end{aligned}$$

第二个方程:

$$D\Phi_2 = k^c \nabla_c [F_{ab} \bar{m}^a l^b] = F_{ab} \bar{m}^a k^c \nabla_c l^b + F_{ab} l^b k^c \nabla_c \bar{m}^a + \bar{m}^a l^b k^c \nabla_c F_{ab} ,$$

其中

$$\begin{aligned} F_{ab} \bar{m}^a k^c \nabla_c l^b &= F_{2\nu} (\varepsilon^\nu)_b (\varepsilon_4)^c \nabla_c (\varepsilon_3)^b = F_{2\nu} g^{\nu\mu} \omega_{\mu 34} \\ &= F_{21} g^{12} \omega_{234} + F_{23} g^{34} \omega_{434} + F_{24} g^{43} \omega_{334} \\ &= F_{21} \omega_{234} + F_{23} \omega_{344} , \\ F_{ab} l^b k^c \nabla_c \bar{m}^a &= F_{\nu 3} (\varepsilon^\nu)_a (\varepsilon_4)^c \nabla_c (\varepsilon_2)^a = F_{\nu 3} g^{\nu\mu} \omega_{\mu 23} \\ &= F_{13} g^{12} \omega_{224} + F_{23} g^{21} \omega_{124} + F_{43} g^{43} \omega_{324} \\ &= F_{23} \omega_{124} + F_{43} \omega_{234} , \end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned}
& F_{ab}\bar{m}^a k^c \nabla_c l^b + F_{ab} l^b k^c \nabla_c \bar{m}^a \\
&= F_{23}(\omega_{124} + \omega_{344}) + (F_{21} + F_{43})\omega_{234} \\
&= \Phi_2(-2\varepsilon) + 2\Phi_1\pi = 2(\pi\Phi_1 - \varepsilon\Phi_2) .
\end{aligned}$$

得

$$D\Phi_2 = 2(\pi\Phi_1 - \varepsilon\Phi_2) + \bar{m}^a l^b k^c \nabla_c F_{ab} .$$

类似地,

$$\begin{aligned}
2\bar{\delta}\Phi_1 &= \bar{m}^c \nabla_c [F_{ab}(k^a l^b + \bar{m}^a m^b)] = F_{ab} k^a \bar{m}^c \nabla_c l^b + F_{ab} l^b \bar{m}^c \nabla_c k^a + k^a l^b \bar{m}^c \nabla_c F_{ab} \\
&\quad + F_{ab} \bar{m}^a \bar{m}^c \nabla_c m^b + F_{ab} m^b \bar{m}^c \nabla_c \bar{m}^a + \bar{m}^a m^b \bar{m}^c \nabla_c F_{ab} ,
\end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}
F_{ab} k^a \bar{m}^c \nabla_c l^b &= F_{4\nu}(\varepsilon^\nu)_b(\varepsilon_2)^c \nabla_c (\varepsilon_3)^b = F_{4\nu} g^{\nu\mu} \omega_{\mu 32} \\
&= F_{41} g^{12} \omega_{232} + F_{42} g^{21} \omega_{132} + F_{43} g^{34} \omega_{432} \\
&= F_{41} \omega_{232} + F_{42} \omega_{132} + F_{43} \omega_{342} , \\
F_{ab} l^b \bar{m}^c \nabla_c k^a &= F_{\nu 3}(\varepsilon^\nu)_a(\varepsilon_2)^c \nabla_c (\varepsilon_4)^a = F_{\nu 3} g^{\nu\mu} \omega_{\mu 42} \\
&= F_{13} g^{12} \omega_{242} + F_{23} g^{21} \omega_{142} + F_{43} g^{43} \omega_{342} \\
&= F_{13} \omega_{242} + F_{23} \omega_{142} - F_{43} \omega_{342} , \\
F_{ab} \bar{m}^a \bar{m}^c \nabla_c m^b &= F_{2\nu}(\varepsilon^\nu)_b(\varepsilon_2)^c \nabla_c (\varepsilon_1)^b = F_{2\nu} g^{\nu\mu} \omega_{\mu 14} \\
&= F_{21} g^{12} \omega_{212} + F_{23} g^{34} \omega_{412} + F_{24} g^{43} \omega_{312} \\
&= -F_{21} \omega_{122} + F_{23} \omega_{142} - F_{42} \omega_{132} , \\
F_{ab} m^b \bar{m}^c \nabla_c \bar{m}^a &= F_{\nu 1}(\varepsilon^\nu)_a(\varepsilon_2)^c \nabla_c (\varepsilon_2)^a = F_{\nu 1} g^{\nu\mu} \omega_{\mu 22} \\
&= F_{21} g^{21} \omega_{122} + F_{31} g^{34} \omega_{422} + F_{41} g^{43} \omega_{322} \\
&= F_{21} \omega_{122} - F_{13} \omega_{242} + F_{41} \omega_{232} ,
\end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned}
& F_{ab} k^a \bar{m}^c \nabla_c l^b + F_{ab} l^b \bar{m}^c \nabla_c k^a + F_{ab} \bar{m}^a \bar{m}^c \nabla_c m^b + F_{ab} m^b \bar{m}^c \nabla_c \bar{m}^a \\
&= 2F_{41} \omega_{232} + 2F_{23} \omega_{142} = 2(\lambda\Phi_0 - \rho\Phi_2) .
\end{aligned}$$

得

$$2\bar{\delta}\Phi_1 = 2(\lambda\Phi_0 - \rho\Phi_2) + k^a l^b \bar{m}^c \nabla_c F_{ab} + \bar{m}^a m^b \bar{m}^c \nabla_c F_{ab} .$$

于是有

$$\begin{aligned}
& D\Phi_2 - \bar{\delta}\Phi_1 \\
&= 2(\pi\Phi_1 - \varepsilon\Phi_2) + \bar{m}^a l^b k^c \nabla_c F_{ab} - (\lambda\Phi_0 - \rho\Phi_2) - \frac{1}{2}(k^a l^b \bar{m}^c + \bar{m}^a m^b \bar{m}^c) \nabla_c F_{ab} \\
&= -\lambda\Phi_0 + 2\pi\Phi_1 + (\rho - 2\varepsilon)\Phi_2 + \frac{1}{2}(-k^a l^b \bar{m}^c - \bar{m}^a m^b \bar{m}^c + 2\bar{m}^a l^b k^c) \nabla_c F_{ab} .
\end{aligned}$$

第三个方程:

$$2\delta\Phi_1 = m^c\nabla_c[F_{ab}(k^al^b + \bar{m}^am^b)] = F_{ab}k^am^c\nabla_cl^b + F_{ab}l^bm^c\nabla_ck^a + k^al^bm^c\nabla_cF_{ab} \\ + F_{ab}\bar{m}^am^c\nabla_cm^b + F_{ab}m^bm^c\nabla_c\bar{m}^a + \bar{m}^am^bm^c\nabla_cF_{ab} ,$$

其中

$$\begin{aligned} F_{ab}k^am^c\nabla_cl^b &= F_{4\nu}(\varepsilon^\nu)_b(\varepsilon_1)^c\nabla_c(\varepsilon_3)^b = F_{4\nu}g^{\nu\mu}\omega_{\mu 31} \\ &= F_{41}g^{12}\omega_{231} + F_{42}g^{21}\omega_{131} + F_{43}g^{34}\omega_{431} \\ &= F_{41}\omega_{231} + F_{42}\omega_{131} + F_{43}\omega_{341} , \\ F_{ab}l^bm^c\nabla_ck^a &= F_{\nu 3}(\varepsilon^\nu)_a(\varepsilon_1)^c\nabla_c(\varepsilon_4)^a = F_{\nu 3}g^{\nu\mu}\omega_{\mu 41} \\ &= F_{13}g^{12}\omega_{241} + F_{23}g^{21}\omega_{141} + F_{43}g^{43}\omega_{341} \\ &= F_{13}\omega_{241} + F_{23}\omega_{141} - F_{43}\omega_{341} , \\ F_{ab}\bar{m}^am^c\nabla_cm^b &= F_{2\nu}(\varepsilon^\nu)_b(\varepsilon_1)^c\nabla_c(\varepsilon_1)^b = F_{2\nu}g^{\nu\mu}\omega_{\mu 11} \\ &= F_{21}g^{12}\omega_{211} + F_{23}g^{34}\omega_{411} + F_{24}g^{43}\omega_{311} \\ &= -F_{21}\omega_{121} + F_{23}\omega_{141} - F_{42}\omega_{131} , \\ F_{ab}m^bm^c\nabla_c\bar{m}^a &= F_{\nu 1}(\varepsilon^\nu)_a(\varepsilon_1)^c\nabla_c(\varepsilon_2)^a = F_{\nu 1}g^{\nu\mu}\omega_{\mu 21} \\ &= F_{21}g^{21}\omega_{121} + F_{31}g^{34}\omega_{421} + F_{41}g^{43}\omega_{321} \\ &= F_{21}\omega_{121} - F_{13}\omega_{241} + F_{41}\omega_{231} , \end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned} &F_{ab}k^am^c\nabla_cl^b + F_{ab}l^bm^c\nabla_ck^a + F_{ab}\bar{m}^am^c\nabla_cm^b + F_{ab}m^bm^c\nabla_c\bar{m}^a \\ &= 2F_{41}\omega_{231} + 2F_{23}\omega_{141} = 2(\mu\Phi_0 - \sigma\Phi_2) . \end{aligned}$$

得

$$2\delta\Phi_1 = 2(\mu\Phi_0 - \sigma\Phi_2) + k^al^bm^c\nabla_cF_{ab} + \bar{m}^am^bm^c\nabla_cF_{ab} .$$

类似地,

$$\Delta\Phi_0 = l^c\nabla_c[F_{ab}k^am^b] = F_{ab}k^al^c\nabla_cm^b + F_{ab}m^bl^c\nabla_ck^a + k^am^bl^c\nabla_cF_{ab} ,$$

其中

$$\begin{aligned} F_{ab}k^al^c\nabla_cm^b &= F_{4\nu}(\varepsilon^\nu)_b(\varepsilon_3)^c\nabla_c(\varepsilon_1)^b = F_{4\nu}g^{\nu\mu}\omega_{\mu 13} \\ &= F_{41}g^{12}\omega_{213} + F_{42}g^{21}\omega_{113} + F_{43}g^{34}\omega_{413} \\ &= -F_{41}\omega_{123} + F_{43}\omega_{143} , \\ F_{ab}m^bl^c\nabla_ck^a &= F_{\nu 1}(\varepsilon^\nu)_a(\varepsilon_3)^c\nabla_c(\varepsilon_4)^a = F_{\nu 1}g^{\nu\mu}\omega_{\mu 43} \\ &= F_{21}g^{21}\omega_{143} + F_{31}g^{34}\omega_{443} + F_{41}g^{43}\omega_{343} \\ &= F_{21}\omega_{143} - F_{41}\omega_{343} , \end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned}
& F_{ab}k^al^c\nabla_cm^b + F_{ab}m^bl^c\nabla_ck^a \\
&= -F_{41}(\omega_{123} + \omega_{343}) + (F_{43} + F_{21})\omega_{143} \\
&= -\Phi_0(-2\gamma) + 2\Phi_1(-\tau) = 2(\gamma\Phi_0 - \tau\Phi_1) .
\end{aligned}$$

得

$$\Delta\Phi_0 = 2(\gamma\Phi_0 - \tau\Phi_1) + k^am^bl^c\nabla_cF_{ab} .$$

于是有

$$\begin{aligned}
& \delta\Phi_1 - \Delta\Phi_0 \\
&= (\mu\Phi_0 - \sigma\Phi_2) + \frac{1}{2}(k^al^bm^c + \bar{m}^am^bm^c)\nabla_cF_{ab} - 2(\gamma\Phi_0 - \tau\Phi_1) - k^am^bl^c\nabla_cF_{ab} \\
&= (\mu - 2\gamma)\Phi_0 + 2\tau\Phi_1 - \sigma\Phi_2 + \frac{1}{2}(k^al^bm^c + \bar{m}^am^bm^c - 2k^am^bl^c)\nabla_cF_{ab} .
\end{aligned}$$

第四个方程:

$$\delta\Phi_2 = m^c\nabla_c[F_{ab}\bar{m}^al^b] = F_{ab}\bar{m}^am^c\nabla_cl^b + F_{ab}l^bm^c\nabla_c\bar{m}^a + \bar{m}^al^bm^c\nabla_cF_{ab} ,$$

其中

$$\begin{aligned}
F_{ab}\bar{m}^am^c\nabla_cl^b &= F_{2\nu}(\varepsilon^\nu)_b(\varepsilon_1)^c\nabla_c(\varepsilon_3)^b = F_{2\nu}g^{\nu\mu}\omega_{\mu 31} \\
&= F_{21}g^{12}\omega_{231} + F_{23}g^{34}\omega_{431} + F_{24}g^{43}\omega_{331} \\
&= F_{21}\omega_{231} + F_{23}\omega_{341} , \\
F_{ab}l^bm^c\nabla_c\bar{m}^a &= F_{\nu 3}(\varepsilon^\nu)_a(\varepsilon_1)^c\nabla_c(\varepsilon_2)^a = F_{\nu 3}g^{\nu\mu}\omega_{\mu 21} \\
&= F_{13}g^{12}\omega_{221} + F_{23}g^{21}\omega_{121} + F_{43}g^{43}\omega_{321} \\
&= F_{23}\omega_{121} + F_{43}\omega_{231} ,
\end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned}
& F_{ab}\bar{m}^am^c\nabla_cl^b + F_{ab}l^bm^c\nabla_c\bar{m}^a \\
&= F_{23}(\omega_{121} + \omega_{341}) + (F_{21} + F_{43})\omega_{231} \\
&= \Phi_2(-2\beta) + 2\Phi_1\mu = 2(\mu\Phi_1 - \beta\Phi_2) .
\end{aligned}$$

得

$$\delta\Phi_2 = 2(\mu\Phi_1 - \beta\Phi_2) + \bar{m}^al^bm^c\nabla_cF_{ab} .$$

类似地,

$$\begin{aligned}
2\Delta\Phi_1 &= l^c\nabla_c[F_{ab}(k^al^b + \bar{m}^am^b)] = F_{ab}k^al^c\nabla_cl^b + F_{ab}l^bl^c\nabla_ck^a + k^al^bl^c\nabla_cF_{ab} \\
&\quad + F_{ab}\bar{m}^al^c\nabla_cm^b + F_{ab}m^bl^c\nabla_c\bar{m}^a + \bar{m}^am^bl^c\nabla_cF_{ab} ,
\end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}
F_{ab}k^al^c\nabla_cl^b &= F_{4\nu}(\varepsilon^\nu)_b(\varepsilon_3)^c\nabla_c(\varepsilon_3)^b = F_{4\nu}g^{\nu\mu}\omega_{\mu 33} \\
&= F_{41}g^{12}\omega_{233} + F_{42}g^{21}\omega_{133} + F_{43}g^{34}\omega_{433} \\
&= F_{41}\omega_{233} + F_{42}\omega_{133} + F_{43}\omega_{343} , \\
F_{ab}l^bl^c\nabla_ck^a &= F_{\nu 3}(\varepsilon^\nu)_a(\varepsilon_3)^c\nabla_c(\varepsilon_4)^a = F_{\nu 3}g^{\nu\mu}\omega_{\mu 43} \\
&= F_{13}g^{12}\omega_{243} + F_{23}g^{21}\omega_{143} + F_{43}g^{43}\omega_{343} \\
&= F_{13}\omega_{243} + F_{23}\omega_{143} - F_{43}\omega_{343} , \\
F_{ab}\bar{m}^al^c\nabla_cm^b &= F_{2\nu}(\varepsilon^\nu)_b(\varepsilon_3)^c\nabla_c(\varepsilon_1)^b = F_{2\nu}g^{\nu\mu}\omega_{\mu 13} \\
&= F_{21}g^{12}\omega_{213} + F_{23}g^{34}\omega_{413} + F_{24}g^{43}\omega_{313} \\
&= -F_{21}\omega_{123} + F_{23}\omega_{143} - F_{42}\omega_{133} , \\
F_{ab}m^bl^c\nabla_c\bar{m}^a &= F_{\nu 1}(\varepsilon^\nu)_a(\varepsilon_3)^c\nabla_c(\varepsilon_2)^a = F_{\nu 1}g^{\nu\mu}\omega_{\mu 23} \\
&= F_{21}g^{21}\omega_{123} + F_{31}g^{34}\omega_{423} + F_{41}g^{43}\omega_{323} \\
&= F_{21}\omega_{123} - F_{13}\omega_{243} + F_{41}\omega_{233} ,
\end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned}
&F_{ab}k^al^c\nabla_cl^b + F_{ab}l^bl^c\nabla_ck^a + F_{ab}\bar{m}^al^c\nabla_cm^b + F_{ab}m^bl^c\nabla_c\bar{m}^a \\
&= 2F_{41}\omega_{233} + 2F_{23}\omega_{143} = 2(\nu\Phi_0 - \tau\Phi_2) .
\end{aligned}$$

得

$$2\Delta\Phi_1 = 2(\nu\Phi_0 - \tau\Phi_2) + k^al^bl^c\nabla_cF_{ab} + \bar{m}^am^bl^c\nabla_cF_{ab} .$$

于是有

$$\begin{aligned}
&\delta\Phi_2 - \Delta\Phi_1 \\
&= 2(\mu\Phi_1 - \beta\Phi_2) + \bar{m}^al^bm^c\nabla_cF_{ab} - (\nu\Phi_0 - \tau\Phi_2) - \frac{1}{2}(k^al^bl^c + \bar{m}^am^bl^c)\nabla_cF_{ab} \\
&= -\nu\Phi_0 + 2\mu\Phi_1 + (\tau - 2\beta)\Phi_2 + \frac{1}{2}(-k^al^bl^c - \bar{m}^am^bl^c + 2\bar{m}^al^bm^c)\nabla_cF_{ab} .
\end{aligned}$$

令

$$\begin{aligned}
G_1 &= \frac{1}{2}(k^al^bk^c + \bar{m}^am^bk^c - 2k^am^b\bar{m}^c)\nabla_cF_{ab} , \\
G_2 &= \frac{1}{2}(-k^al^b\bar{m}^c - \bar{m}^am^b\bar{m}^c + 2\bar{m}^al^bk^c)\nabla_cF_{ab} , \\
G_3 &= \frac{1}{2}(k^al^bm^c + \bar{m}^am^bm^c - 2k^am^bl^c)\nabla_cF_{ab} , \\
G_4 &= \frac{1}{2}(-k^al^bl^c - \bar{m}^am^bl^c + 2\bar{m}^al^bm^c)\nabla_cF_{ab} ,
\end{aligned}$$

四个方程变为

$$\begin{aligned}
D\Phi_1 - \bar{\delta}\Phi_0 &= (\pi - 2\alpha)\Phi_0 + 2\rho\Phi_1 - \kappa\Phi_2 + G_1, \\
D\Phi_2 - \bar{\delta}\Phi_1 &= -\lambda\Phi_0 + 2\pi\Phi_1 + (\rho - 2\varepsilon)\Phi_2 + G_2, \\
\delta\Phi_1 - \Delta\Phi_0 &= (\mu - 2\gamma)\Phi_0 + 2\tau\Phi_1 - \sigma\Phi_2 + G_3, \\
\delta\Phi_2 - \Delta\Phi_1 &= -\nu\Phi_0 + 2\mu\Phi_1 + (\tau - 2\beta)\Phi_2 + G_4.
\end{aligned}$$

由式 (8-7-3) 可知

$$g^{ac} = m^a \bar{m}^c + \bar{m}^a m^c - l^a k^c - k^a l^c,$$

故有源麦氏方程 $\nabla^a F_{ab} = -4\pi J_b$ 可表为

$$(m^a \bar{m}^c + \bar{m}^a m^c - l^a k^c - k^a l^c) \nabla_c F_{ab} = -4\pi J_b.$$

与 k^b 缩并得

$$\begin{aligned}
-4\pi J_4 &= (m^a k^b \bar{m}^c + \bar{m}^a k^b m^c - l^a k^b k^c - k^a k^b l^c) \nabla_c F_{ab} \\
&= [m^a k^b \bar{m}^c + \bar{m}^a k^b m^c - (l^a k^b k^c + k^a k^b l^c)] \nabla_c F_{ab} \\
&= [m^a k^b \bar{m}^c - (m^a \bar{m}^b k^c + k^a m^b \bar{m}^c) + k^a l^b k^c] \nabla_c F_{ab} \\
&= [-m^b k^a \bar{m}^c - (-m^b \bar{m}^a k^c + k^a m^b \bar{m}^c) + k^a l^b k^c] \nabla_c F_{ab} \\
&= (k^a l^b k^c + \bar{m}^a m^b k^c - 2k^a m^b \bar{m}^c) \nabla_c F_{ab} \\
&= 2G_1,
\end{aligned}$$

其中第三步是因为 $\nabla_{[c} F_{ab]} = 0$ 导致 $\bar{m}^{[a} k^b m^{c]} \nabla_c F_{ab} = 0$ 和 $l^{[a} k^b k^{c]} \nabla_c F_{ab} = 0$.
与 \bar{m}^b 缩并得

$$\begin{aligned}
-4\pi J_2 &= (m^a \bar{m}^b \bar{m}^c + \bar{m}^a \bar{m}^b m^c - l^a \bar{m}^b k^c - k^a \bar{m}^b l^c) \nabla_c F_{ab} \\
&= [(m^a \bar{m}^b \bar{m}^c + \bar{m}^a \bar{m}^b m^c) - l^a \bar{m}^b k^c - k^a \bar{m}^b l^c] \nabla_c F_{ab} \\
&= [-\bar{m}^a m^b \bar{m}^c - l^a \bar{m}^b k^c + (\bar{m}^a l^b k^c + l^a k^b \bar{m}^c)] \nabla_c F_{ab} \\
&= [-\bar{m}^a m^b \bar{m}^c + l^b \bar{m}^a k^c + (\bar{m}^a l^b k^c - l^b k^a \bar{m}^c)] \nabla_c F_{ab} \\
&= (k^a l^b m^c + \bar{m}^a m^b m^c - 2k^a m^b l^c) \nabla_c F_{ab} \\
&= 2G_3,
\end{aligned}$$

其中第三步是因为 $\nabla_{[c} F_{ab]} = 0$ 导致 $m^{[a} \bar{m}^b \bar{m}^{c]} \nabla_c F_{ab} = 0$ 和 $k^{[a} \bar{m}^b l^{c]} \nabla_c F_{ab} = 0$.
与 m^b 缩并得

$$\begin{aligned}
-4\pi J_1 &= (m^a m^b \bar{m}^c + \bar{m}^a m^b m^c - l^a m^b k^c - k^a m^b l^c) \nabla_c F_{ab} \\
&= [(m^a m^b \bar{m}^c + \bar{m}^a m^b m^c) - l^a m^b k^c - k^a m^b l^c] \nabla_c F_{ab} \\
&= [-m^a \bar{m}^b m^c + (k^a l^b m^c + m^a k^b l^c) - k^a m^b l^c] \nabla_c F_{ab} \\
&= [m^b \bar{m}^a m^c + (k^a l^b m^c - m^b k^a l^c) - k^a m^b l^c] \nabla_c F_{ab} \\
&= (k^a l^b m^c + \bar{m}^a m^b m^c - 2k^a m^b l^c) \nabla_c F_{ab} \\
&= 2G_3,
\end{aligned}$$

其中第三步是因为 $\nabla_{[c}F_{ab]} = 0$ 导致 $m^{[a}m^b\bar{m}^c]\nabla_c F_{ab} = 0$ 和 $l^{[a}m^b k^c]\nabla_c F_{ab} = 0$. 与 l^b 缩并得

$$\begin{aligned}
-4\pi J_3 &= (m^a l^b \bar{m}^c + \bar{m}^a l^b m^c - l^a l^b k^c - k^a l^b l^c) \nabla_c F_{ab} \\
&= [m^a l^b \bar{m}^c + \bar{m}^a l^b m^c - (l^a l^b k^c + k^a l^b l^c)] \nabla_c F_{ab} \\
&= [-(\bar{m}^a m^b l^c + l^a \bar{m}^b m^c) + \bar{m}^a l^b m^c + l^a k^b l^c] \nabla_c F_{ab} \\
&= [-(\bar{m}^a m^b l^c - l^b \bar{m}^a m^c) + \bar{m}^a l^b m^c - l^b k^a l^c] \nabla_c F_{ab} \\
&= (-k^a l^b l^c - \bar{m}^a m^b l^c + 2\bar{m}^a l^b m^c) \nabla_c F_{ab} \\
&= 2G_4 .
\end{aligned}$$

其中第三步是因为 $\nabla_{[c}F_{ab]} = 0$ 导致 $m^{[a}l^b\bar{m}^c]\nabla_c F_{ab} = 0$ 和 $l^{[a}l^b k^c]\nabla_c F_{ab} = 0$.

结合前面的结果, 我们最终推得有源麦氏方程的 NP 形式为

$$\begin{aligned}
D\Phi_1 - \bar{\delta}\Phi_0 &= (\pi - 2\alpha)\Phi_0 + 2\rho\Phi_1 - \kappa\Phi_2 - 2\pi J_4 , \\
D\Phi_2 - \bar{\delta}\Phi_1 &= -\lambda\Phi_0 + 2\pi\Phi_1 + (\rho - 2\varepsilon)\Phi_2 - 2\pi J_2 , \\
\delta\Phi_1 - \Delta\Phi_0 &= (\mu - 2\gamma)\Phi_0 + 2\tau\Phi_1 - \sigma\Phi_2 - 2\pi J_1 , \\
\delta\Phi_2 - \Delta\Phi_1 &= -\nu\Phi_0 + 2\mu\Phi_1 + (\tau - 2\beta)\Phi_2 - 2\pi J_3 .
\end{aligned}$$

这四个方程是方程 (8-8-3a)–(8-8-3d) 在有源时的推广.

*11. 试证式 (8-8-7) 和 (8-8-10).

证 式 (8-8-7) 的证明. 电磁场的能动张量为式 (7-2-6)

$$T_{\mu\nu} = \frac{1}{4\pi} \left(F_{\mu\sigma} F_{\nu}{}^{\sigma} - \frac{1}{4} g_{\mu\nu} F_{\rho\sigma} F^{\rho\sigma} \right) .$$

首先

$$\begin{aligned}
F_{\rho\sigma} F^{\rho\sigma} &= 2(F_{43}F^{43} + F_{42}F^{42} + F_{41}F^{41} + F_{32}F^{32} + F_{31}F^{31} + F_{21}F^{21}) \\
&= 2(F_{43}F_{34} - F_{42}F_{31} - F_{41}F_{32} - F_{32}F_{41} - F_{31}F_{42} + F_{21}F_{12}) \\
&= 2(-F_{43}^2 + F_{42}F_{13} + F_{41}F_{23} + F_{23}F_{41} + F_{13}F_{42} - F_{21}^2) \\
&= 2(-F_{43}^2 + 2F_{42}F_{13} + 2F_{41}F_{23} - F_{21}^2) \\
&= -2(F_{43}^2 + F_{21}^2) + 4(F_{41}F_{23} + F_{42}F_{13}) \\
&= -2(F_{43}^2 + F_{21}^2) + 4(F_{41}F_{23} + \bar{F}_{41}\bar{F}_{23}) .
\end{aligned}$$

利用式 (8-8-1b), $\Phi_1 = \frac{1}{2}(F_{43} + F_{21})$, 有 $\bar{\Phi}_1 = \frac{1}{2}(F_{43} - F_{21}) = \frac{1}{2}(F_{43} - F_{21})$, 故

$$\Phi_1^2 + \bar{\Phi}_1^2 = \frac{1}{2}(F_{43}^2 + F_{21}^2) , \quad \Phi_1^2 - \bar{\Phi}_1^2 = F_{43}F_{21} , \quad \Phi_1\bar{\Phi}_1 = \frac{1}{4}(F_{43}^2 - F_{21}^2) .$$

于是结合式 (8-8-1a) 和 (8-8-1c) 得

$$F_{\rho\sigma} F^{\rho\sigma} = -4(\Phi_1^2 + \bar{\Phi}_1^2) + 4(\Phi_0\Phi_2 + \bar{\Phi}_0\bar{\Phi}_2) .$$

电磁场的能动张量在类光标架的分量为

$$\begin{aligned}
T_{11} &= \frac{1}{4\pi} \left(F_{1\sigma} F_1{}^\sigma - \frac{1}{4} g_{11} F_{\rho\sigma} F^{\rho\sigma} \right) \\
&= \frac{1}{4\pi} \left(F_{12} F_1{}^2 + F_{13} F_1{}^3 + F_{14} F_1{}^4 - 0 \right) \\
&= \frac{1}{4\pi} \left(F_{12} F_{11} - F_{13} F_{14} - F_{14} F_{13} \right) \\
&= \frac{1}{2\pi} F_{41} F_{13} = \frac{1}{2\pi} \Phi_0 \bar{\Phi}_2, \\
T_{12} &= \frac{1}{4\pi} \left(F_{1\sigma} F_2{}^\sigma - \frac{1}{4} g_{12} F_{\rho\sigma} F^{\rho\sigma} \right) \\
&= \frac{1}{4\pi} \left(F_{12} F_2{}^2 + F_{13} F_2{}^3 + F_{14} F_2{}^4 - \frac{1}{4} F_{\rho\sigma} F^{\rho\sigma} \right) \\
&= \frac{1}{4\pi} \left(F_{12} F_{21} - F_{13} F_{24} - F_{14} F_{23} - \frac{1}{4} F_{\rho\sigma} F^{\rho\sigma} \right) \\
&= \frac{1}{4\pi} \left(-F_{21}^2 + F_{13} F_{42} + F_{41} F_{23} - \frac{1}{4} [-2(F_{43}^2 + F_{21}^2) + 4(F_{41} F_{23} + \bar{F}_{41} \bar{F}_{23})] \right) \\
&= \frac{1}{4\pi} \left(-F_{21}^2 + \bar{F}_{41} \bar{F}_{23} + F_{41} F_{23} + \frac{1}{2} (F_{43}^2 + F_{21}^2) - (F_{41} F_{23} + \bar{F}_{41} \bar{F}_{23}) \right) \\
&= \frac{1}{8\pi} (F_{43}^2 - F_{21}^2) = \frac{1}{2\pi} \Phi_1 \bar{\Phi}_1, \\
T_{13} &= \frac{1}{4\pi} \left(F_{1\sigma} F_3{}^\sigma - \frac{1}{4} g_{13} F_{\rho\sigma} F^{\rho\sigma} \right) \\
&= \frac{1}{4\pi} \left(F_{12} F_3{}^2 + F_{13} F_1{}^3 + F_{14} F_3{}^4 - 0 \right) \\
&= \frac{1}{4\pi} \left(F_{12} F_{31} - F_{13} F_{34} - F_{14} F_{33} \right) \\
&= \frac{1}{4\pi} F_{13} (F_{21} + F_{43}) = \frac{1}{2\pi} \bar{\Phi}_2 \Phi_1, \\
T_{14} &= \frac{1}{4\pi} \left(F_{1\sigma} F_4{}^\sigma - \frac{1}{4} g_{14} F_{\rho\sigma} F^{\rho\sigma} \right) \\
&= \frac{1}{4\pi} \left(F_{12} F_4{}^2 + F_{13} F_4{}^3 + F_{14} F_4{}^4 - 0 \right) \\
&= \frac{1}{4\pi} \left(F_{12} F_{41} - F_{13} F_{44} - F_{14} F_{43} \right) \\
&= \frac{1}{4\pi} F_{41} (F_{43} - F_{21}) = \frac{1}{2\pi} \Phi_0 \bar{\Phi}_1, \\
T_{22} &= \frac{1}{4\pi} \left(F_{2\sigma} F_2{}^\sigma - \frac{1}{4} g_{22} F_{\rho\sigma} F^{\rho\sigma} \right) \\
&= \frac{1}{4\pi} \left(F_{21} F_2{}^1 + F_{23} F_2{}^3 + F_{24} F_2{}^4 - 0 \right) \\
&= \frac{1}{4\pi} \left(F_{21} F_{22} - F_{23} F_{24} - F_{24} F_{23} \right) \\
&= \frac{1}{2\pi} F_{23} F_{42} = \frac{1}{2\pi} \Phi_2 \bar{\Phi}_0, \\
T_{23} &= \frac{1}{4\pi} \left(F_{2\sigma} F_3{}^\sigma - \frac{1}{4} g_{23} F_{\rho\sigma} F^{\rho\sigma} \right) \\
&= \frac{1}{4\pi} \left(F_{21} F_3{}^1 + F_{23} F_3{}^3 + F_{24} F_3{}^4 - 0 \right)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{4\pi} (F_{21}F_{32} - F_{23}F_{34} - F_{24}F_{33}) \\
&= \frac{1}{4\pi} F_{23}(F_{43} - F_{21}) = \frac{1}{2\pi} \Phi_2 \bar{\Phi}_1, \\
T_{24} &= \frac{1}{4\pi} (F_{2\sigma}F_4^\sigma - \frac{1}{4}g_{24}F_{\rho\sigma}F^{\rho\sigma}) \\
&= \frac{1}{4\pi} (F_{21}F_4^1 + F_{23}F_4^3 + F_{24}F_4^4 - 0) \\
&= \frac{1}{4\pi} (F_{21}F_{42} - F_{23}F_{44} - F_{24}F_{43}) \\
&= \frac{1}{4\pi} F_{42}(F_{43} + F_{21}) = \frac{1}{2\pi} \bar{\Phi}_0 \Phi_1, \\
T_{33} &= \frac{1}{4\pi} (F_{3\sigma}F_3^\sigma - \frac{1}{4}g_{33}F_{\rho\sigma}F^{\rho\sigma}) \\
&= \frac{1}{4\pi} (F_{31}F_3^1 + F_{32}F_3^2 + F_{34}F_3^4 - 0) \\
&= \frac{1}{4\pi} (F_{31}F_{32} + F_{32}F_{31} - F_{34}F_{33}) \\
&= \frac{1}{2\pi} F_{23}F_{13} = \frac{1}{2\pi} \Phi_2 \bar{\Phi}_2, \\
T_{34} &= \frac{1}{4\pi} (F_{3\sigma}F_4^\sigma - \frac{1}{4}g_{34}F_{\rho\sigma}F^{\rho\sigma}) \\
&= \frac{1}{4\pi} (F_{31}F_4^1 + F_{32}F_4^2 + F_{34}F_4^4 + \frac{1}{4}F_{\rho\sigma}F^{\rho\sigma}) \\
&= \frac{1}{4\pi} (F_{31}F_{42} + F_{32}F_{41} - F_{34}F_{43} + \frac{1}{4}F_{\rho\sigma}F^{\rho\sigma}) \\
&= \frac{1}{4\pi} (-F_{13}F_{42} - F_{23}F_{41} + F_{43}^2 + \frac{1}{4}[-2(F_{43}^2 + F_{21}^2) + 4(F_{41}F_{23} + \bar{F}_{41}\bar{F}_{23})]) \\
&= \frac{1}{4\pi} (-\bar{F}_{23}\bar{F}_{41} - F_{23}F_{41} + F_{43}^2 - \frac{1}{2}(F_{43}^2 + F_{21}^2) + (F_{41}F_{23} + \bar{F}_{41}\bar{F}_{23})) \\
&= \frac{1}{8\pi} (F_{43}^2 - F_{21}^2) = \frac{1}{2\pi} \Phi_1 \bar{\Phi}_1, \\
T_{44} &= \frac{1}{4\pi} (F_{4\sigma}F_4^\sigma - \frac{1}{4}g_{44}F_{\rho\sigma}F^{\rho\sigma}) \\
&= \frac{1}{4\pi} (F_{41}F_4^1 + F_{42}F_4^2 + F_{43}F_4^3 - 0) \\
&= \frac{1}{4\pi} (F_{41}F_{42} + F_{42}F_{41} - F_{43}F_{44}) \\
&= \frac{1}{2\pi} F_{41}F_{42} = \frac{1}{2\pi} \Phi_0 \bar{\Phi}_0.
\end{aligned}$$

此即 (8-8-7) 中诸式.

式 (8-8-10) 的证明. 由式 (8-4-7) 知

$$\Sigma_{ab}\Sigma^{ab} = 2(F_{ab}F^{ab} + iF_{ab}{}^*F^{ab}).$$

上面我们已经证明了

$$F_{ab}F^{ab} = F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} = -4(\Phi_1^2 + \bar{\Phi}_1^2) + 4(\Phi_0\Phi_2 + \bar{\Phi}_0\bar{\Phi}_2).$$

下面我们求 $F_{ab} {}^*F^{ab}$. 根据对偶微分形式的定义

$$\begin{aligned}
F_{ab} {}^*F^{ab} &= F_{ab} \frac{1}{2} F_{cd} \varepsilon^{cdab} = \frac{1}{2} F^{ab} F^{cd} \varepsilon_{cdab} = \frac{1}{2} F^{\mu\nu} F^{\rho\sigma} \varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma} \\
&= F^{12} F^{\rho\sigma} \varepsilon_{12\rho\sigma} + F^{13} F^{\rho\sigma} \varepsilon_{13\rho\sigma} + F^{14} F^{\rho\sigma} \varepsilon_{14\rho\sigma} \\
&\quad + F^{23} F^{\rho\sigma} \varepsilon_{23\rho\sigma} + F^{24} F^{\rho\sigma} \varepsilon_{24\rho\sigma} + F^{34} F^{\rho\sigma} \varepsilon_{34\rho\sigma} \\
&= 2F^{12} F^{34} \varepsilon_{1234} + 2F^{13} F^{24} \varepsilon_{1324} + 2F^{14} F^{23} \varepsilon_{1423} \\
&\quad + 2F^{23} F^{14} \varepsilon_{2314} + 2F^{24} F^{13} \varepsilon_{2413} + 2F^{34} F^{12} \varepsilon_{3412} \\
&= \varepsilon_{1234} (2F^{12} F^{34} - 2F^{13} F^{24} + 2F^{14} F^{23} + 2F^{23} F^{14} - 2F^{24} F^{13} + 2F^{34} F^{12}) \\
&= \varepsilon_{1234} (4F^{12} F^{34} - 4F^{13} F^{24} + 4F^{14} F^{23}) \\
&= 4\varepsilon_{1234} (F_{21} F_{43} - F_{24} F_{13} + F_{23} F_{14}) \\
&= 4\varepsilon_{1234} (F_{43} F_{21} + F_{42} F_{13} - F_{41} F_{23}) \\
&= 4\varepsilon_{1234} (\Phi_1^2 - \bar{\Phi}_1^2 + \bar{\Phi}_0 \bar{\Phi}_2 - \Phi_0 \Phi_2) .
\end{aligned}$$

现在计算类光标架中的体元 ε_{1234} , 应该转成正交归一标架中的相应量:

$$\begin{aligned}
\varepsilon_{1234} &= \varepsilon_{abcd} (\varepsilon_1)^a (\varepsilon_2)^b (\varepsilon_3)^c (\varepsilon_4)^d \\
&\stackrel{(8-7-1)}{=} \varepsilon_{abcd} \frac{1}{4} [(e_1)^a - i(e_2)^a] [(e_1)^b + i(e_2)^b] [(e_0)^c - (e_3)^c] [(e_0)^d + (e_3)^d] \\
&= \frac{1}{4} \varepsilon_{abcd} \left\{ i[(e_1)^a (e_2)^b - (e_2)^a (e_1)^b] [(e_0)^c (e_3)^d - (e_3)^c (e_0)^d] \right\} \\
&= i\varepsilon_{abcd} (e_1)^a (e_2)^b (e_0)^c (e_3)^d \\
&= i\varepsilon_{1203} = i\varepsilon_{0123} = i .
\end{aligned}$$

因此

$$F_{ab} {}^*F^{ab} = F_{\mu\nu} {}^*F^{\mu\nu} = 4i(\Phi_1^2 - \bar{\Phi}_1^2 + \bar{\Phi}_0 \bar{\Phi}_2 - \Phi_0 \Phi_2) .$$

最后得

$$\begin{aligned}
\Sigma_{ab} \Sigma^{ab} &= \Sigma_{\mu\nu} \Sigma^{\mu\nu} \\
&= 2(F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + iF_{\mu\nu} {}^*F^{\mu\nu}) \\
&= 2 \left[-4(\Phi_1^2 + \bar{\Phi}_1^2) + 4(\Phi_0 \Phi_2 + \bar{\Phi}_0 \bar{\Phi}_2) - 4(\Phi_1^2 - \bar{\Phi}_1^2 + \bar{\Phi}_0 \bar{\Phi}_2 - \Phi_0 \Phi_2) \right] \\
&= 16(\Phi_0 \Phi_2 - \Phi_1^2) .
\end{aligned}$$

此即式 (8-8-10).

第 9 章 “施瓦西时空” 习题

- ~1. 考虑 Taub 的平面对称静态时空, 其线元为式 (8-6-1'), 试借助 Killing 矢量场写出类时测地线 $\gamma(\tau)$ 的参数表达式 $t(\tau), x(\tau), y(\tau), z(\tau)$ 所满足的解耦方程 (参考 §9.1).

解 Taub 平面对称静态时空的线元为

$$ds^2 = z^{-1/2}(-dt^2 + dz^2) + z(dx^2 + dy^2),$$

从线元式很容易看出度规分量为

$$g_{00} = -g_{33} = -z^{-1/2}, \quad g_{11} = g_{22} = z,$$

其相应的克氏符已在第 3 章习题 15 中求得:

$$\Gamma^0_{03} = \Gamma^0_{30} = \Gamma^3_{00} = \Gamma^3_{33} = -\frac{1}{4z},$$

$$\Gamma^3_{11} = \Gamma^3_{22} = -\frac{z^{1/2}}{2},$$

$$\Gamma^1_{13} = \Gamma^1_{31} = \Gamma^2_{23} = \Gamma^2_{32} = \frac{1}{2z}.$$

从度规只是 z 的函数知平面对称静态时空的独立 Killing 场有 4 个 — 1 个反映时间平移对称性的类时 Killing 场: $\xi_0^a = (\frac{\partial}{\partial t})^a$; 2 个反映空间平移对称性的类空 Killing 场 $\xi_1^a = (\frac{\partial}{\partial x})^a$ 和 $\xi_2^a = (\frac{\partial}{\partial y})^a$; 1 个反映空间转动对称性的类空 Killing 场 $\xi_3^a = -y(\frac{\partial}{\partial x})^a + x(\frac{\partial}{\partial y})^a$.

利用定理 4-3-3 定义测地线 $\gamma(\tau)$ 上的 3 个常量:

$$E = -g_{ab}\left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^a\left(\frac{\partial}{\partial \tau}\right)^b = -g_{00}(dt)_b\left(\frac{\partial}{\partial \tau}\right)^b = -g_{00}\frac{dt}{d\tau} = z^{-1/2}\frac{dt}{d\tau},$$

$$P_x = g_{ab}\left(\frac{\partial}{\partial x}\right)^a\left(\frac{\partial}{\partial \tau}\right)^b = g_{11}(dx)_b\left(\frac{\partial}{\partial \tau}\right)^b = g_{11}\frac{dx}{d\tau} = z\frac{dx}{d\tau},$$

$$P_y = g_{ab}\left(\frac{\partial}{\partial y}\right)^a\left(\frac{\partial}{\partial \tau}\right)^b = g_{22}(dy)_b\left(\frac{\partial}{\partial \tau}\right)^b = g_{22}\frac{dy}{d\tau} = z\frac{dy}{d\tau},$$

另外根据测地线的类时性 ($\kappa = 1$) 或类光性 ($\kappa = 0$) 定义:

$$\begin{aligned} \kappa &:= -g_{ab}U^aU^b = -g_{ab}\left(\frac{\partial}{\partial \tau}\right)^a\left(\frac{\partial}{\partial \tau}\right)^b \\ &= -g_{00}\left(\frac{dt}{d\tau}\right)^2 - g_{33}\left(\frac{dz}{d\tau}\right)^2 - g_{11}\left(\frac{dx}{d\tau}\right)^2 - g_{22}\left(\frac{dy}{d\tau}\right)^2 \\ &= z^{-1/2}\left(\frac{dt}{d\tau}\right)^2 - z^{-1/2}\left(\frac{dz}{d\tau}\right)^2 - z\left(\frac{dx}{d\tau}\right)^2 - z\left(\frac{dy}{d\tau}\right)^2. \end{aligned}$$

以 3 个常量代入得:

$$\kappa = z^{1/2}E^2 - z^{-1/2}\left(\frac{dz}{d\tau}\right)^2 - z^{-1}P_x^2 - z^{-1}P_y^2,$$

即

$$\left(\frac{dz}{d\tau}\right)^2 = E^2z - (P_x^2 + P_y^2)z^{-1/2} - \kappa z^{1/2} = E^2z - P^2z^{-1/2} - \kappa z^{1/2},$$

其中 $P^2 \equiv P_x^2 + P_y^2$. 先从

$$\frac{dz}{d\tau} = \pm \sqrt{E^2z - P^2z^{-1/2} - \kappa z^{1/2}},$$

解出 $z = z(\tau)$, 然后代入另外 3 个微分方程

$$\frac{dt}{d\tau} = Ez^{1/2}, \quad \frac{dx}{d\tau} = P_x z^{-1}, \quad \frac{dy}{d\tau} = P_y z^{-1},$$

即可求得测地线 $\gamma(\tau)$ 的参数表达式 $x^\mu = x^\mu(\tau)$.

下面我们验证以上 4 个方程的确与测地线方程组

$$\frac{d^2 x^\mu}{d\tau^2} + \Gamma^\mu_{\nu\sigma} \frac{dx^\nu}{d\tau} \frac{dx^\sigma}{d\tau} = 0, \quad \mu = 0, 1, 2, 3$$

一致:

$$\begin{aligned} \mu = 0: \quad & \frac{d^2 t}{d\tau^2} + 2\left(-\frac{1}{4z}\right)\left(\frac{dt}{d\tau}\right)\left(\frac{dz}{d\tau}\right) = \frac{1}{2}Ez^{-1/2}\frac{dz}{d\tau} - \frac{1}{2z}\left(\frac{dt}{d\tau}\right)\left(\frac{dz}{d\tau}\right) \\ & = \frac{1}{2}Ez^{-1/2}\frac{dz}{d\tau} - \frac{1}{2z}(Ez^{1/2})\frac{dz}{d\tau} = 0, \\ \mu = 1: \quad & \frac{d^2 x}{d\tau^2} + 2\left(\frac{1}{2z}\right)\left(\frac{dx}{d\tau}\right)\left(\frac{dz}{d\tau}\right) = -P_x z^{-2}\frac{dz}{d\tau} + \frac{1}{z}\left(\frac{dx}{d\tau}\right)\left(\frac{dz}{d\tau}\right) \\ & = -P_x z^{-2}\frac{dz}{d\tau} + \frac{1}{z}(P_x z^{-1})\frac{dz}{d\tau} = 0, \\ \mu = 2: \quad & \frac{d^2 y}{d\tau^2} + 2\left(\frac{1}{2z}\right)\left(\frac{dy}{d\tau}\right)\left(\frac{dz}{d\tau}\right) = -P_y z^{-2}\frac{dz}{d\tau} + \frac{1}{z}\left(\frac{dy}{d\tau}\right)\left(\frac{dz}{d\tau}\right) \\ & = -P_y z^{-2}\frac{dz}{d\tau} + \frac{1}{z}(P_y z^{-1})\frac{dz}{d\tau} = 0, \\ \mu = 3: \quad & \frac{d^2 z}{d\tau^2} + \left(-\frac{1}{4z}\right)\left[\left(\frac{dt}{d\tau}\right)^2 + \left(\frac{dx}{d\tau}\right)^2 + \left(\frac{dy}{d\tau}\right)^2\right] + \left(-\frac{z^{1/2}}{2}\right)\left[\left(\frac{dx}{d\tau}\right)^2 + \left(\frac{dy}{d\tau}\right)^2\right] \\ & = \frac{d^2 z}{d\tau^2} - \frac{1}{4z}(E^2 z + E^2 z - P^2 z^{-1/2} - \kappa z^{1/2}) - \frac{z^{1/2}}{2}(P_x^2 z^{-2} + P_y^2 z^{-2}) \\ & = \frac{d^2 z}{d\tau^2} - \frac{1}{2}E^2 + \frac{1}{4}P^2 z^{-3/2} + \frac{1}{4}\kappa z^{-1/2} - \frac{1}{2}P^2 z^{-3/2} \\ & = \frac{d^2 z}{d\tau^2} - \frac{1}{2}E^2 - \frac{1}{4}P^2 z^{-3/2} + \frac{1}{4}\kappa z^{-1/2} = 0, \end{aligned}$$

最后一步是由于 $(\frac{dz}{d\tau})^2 = E^2 z - P^2 z^{-1/2} - \kappa z^{1/2}$, 两边对 z 求导得

$$2\left(\frac{dz}{d\tau}\right)\frac{d^2 z}{d\tau^2} = \left[E^2 + \frac{1}{2}P^2 z^{-3/2} - \frac{1}{2}\kappa z^{-1/2}\right]\left(\frac{dz}{d\tau}\right),$$

于是有

$$\frac{d^2 z}{d\tau^2} = \frac{1}{2}E^2 + \frac{1}{4}P^2 z^{-3/2} - \frac{1}{4}\kappa z^{-1/2}.$$

可见前面的 4 个退耦方程与测地线方程的 4 个方程一致.

最后我们看 3 个沿测地线的常量 E 、 P_x 和 P_y 的物理意义:

$$\begin{aligned} E &= z^{-1/2}\frac{dt}{d\tau} = z^{-1/2}\gamma = \frac{z^{-1/2}}{m}\gamma m = \frac{z^{-1/2}}{m}E_{\text{当}}, \\ P_x &= z\frac{dx}{d\tau} = z\gamma\frac{dx}{dt} = z\gamma v_{\text{当}}^x = \frac{z}{m}\gamma m v_{\text{当}}^x = \frac{z}{m}p_{\text{当}}^x, \\ P_y &= z\frac{dy}{d\tau} = z\gamma\frac{dy}{dt} = z\gamma v_{\text{当}}^y = \frac{z}{m}\gamma m v_{\text{当}}^y = \frac{z}{m}p_{\text{当}}^y, \end{aligned}$$

这里等式右边的 $E_{\text{当}}$ 、 $p_{\text{当}}^x$ 和 $p_{\text{当}}^y$ 分别为当时当地测量的质点的能量和沿着 x 和 y 方向的动量, 而等式左边为相应的总量.

2. 用牛顿引力论借图 9-8 直接推出式 (9-3-18).

解 由图 9-8 知, 在空间体元 $dV = drdS$ 内的质量为 $\rho dV = \rho drdS$, 它受到的向内的引力大小为 $\frac{m(r)(\rho drdS)}{r^2}$, 其中 $m(r)$ 是半径 r 内的星体的质量, 由式 (9-3-8) 给出. 此外, 因为存在压强梯度, 该体元还受到向外的压力, 大小为 $[p - (p + dp)]dS = -dpdS$, 两者平衡得关系式 $\frac{m(r)(\rho drdS)}{r^2} = -dpdS$, 于是即有方程 (9-3-18): $\frac{dp}{dr} = -\frac{\rho m(r)}{r^2}$.

~3. 试证 OV 流体静力学平衡方程 (9-3-17) 可改写为

$$\left[1 - \frac{2m(r)}{r}\right]^{1/2} \frac{dp}{dr} = -(\rho + p)g, \quad (9-4-60)$$

其中 g 代表流体质点的 4 加速 $U^b \nabla_b U^a$ 的大小.

注 在牛顿近似下 $[1 - 2m(r)/r]^{1/2} \cong 1$, $p \cong 0$, 式 (9-4-60) 成为 $dp/dr \cong -\rho g$. 而 $g \cong m(r)/r^2$, 故得式 (9-3-18), 即 $dp/dr \cong -\rho m(r)/r^2$.

证 利用第 8 章习题 3 的结论流体质点的 4 加速 $A^a = U^b \nabla_b U^a = \nabla^a \ln \chi$, 其中 $\chi = (-\xi^a \xi_a)^{1/2} = (-g_{00})^{1/2} = [e^{2A(r)}]^{1/2} = e^{A(r)}$. 于是 4 加速的大小 (的平方)

$$\begin{aligned} g^2 &= A^a A_a = g^{ab} (\nabla_a \ln \chi) (\nabla_b \ln \chi) = \chi^{-2} g^{ab} (\nabla_a \chi) (\nabla_b \chi) \\ &= e^{-2A(r)} \left[e^{A(r)} \frac{dA(r)}{dr} \right]^2 g^{ab} (dr)_a (dr)_b \\ &\stackrel{(9-3-11)}{=} \left[\frac{m(r) + 4\pi p r^3}{r[r - 2m(r)]} \right]^2 g^{11} \\ &= \left[\frac{m(r) + 4\pi p r^3}{r[r - 2m(r)]} \right]^2 \left[1 - \frac{2m(r)}{r} \right]. \end{aligned}$$

在牛顿近似下, $g \cong \frac{m(r)}{r^2}$, 即重力加速度. 式 (9-4-60) 可写为

$$\begin{aligned} \frac{dp}{dr} &= -(\rho + p) \left[1 - \frac{2m(r)}{r} \right]^{-1/2} g \\ &= -(\rho + p) \left[1 - \frac{2m(r)}{r} \right]^{-1/2} \left[\frac{m(r) + 4\pi p r^3}{r[r - 2m(r)]} \right] \left[1 - \frac{2m(r)}{r} \right]^{1/2} \\ &= -(\rho + p) \frac{m(r) + 4\pi p r^3}{r[r - 2m(r)]}. \end{aligned}$$

此即 OV 流体静力学平衡方程 (9-3-17).

~4. 试证当 $R \gg M$ 时式 (9-3-26) 近似回到牛顿引力论的式 (9-3-23).

证 均匀密度星的施瓦西内解为式 (9-3-25):

$$p(r) = \rho \frac{(1 - 2M/R)^{1/2} - (1 - 2Mr^2/R^3)^{1/2}}{(1 - 2Mr^2/R^3)^{1/2} - 3(1 - 2M/R)^{1/2}} ,$$

中心压强为式 (9-3-26):

$$p_0 = \rho \frac{1 - (1 - 2M/R)^{1/2}}{3(1 - 2M/R)^{1/2} - 1} .$$

当 $R \gg M$ 时, 它们分别回到牛顿引力论的式 (9-3-24) 和 (9-3-23):

$$\begin{aligned} p(r) &\approx \rho \frac{(1 - M/R) - (1 - Mr^2/R^3)}{(1 - Mr^2/R^3) - 3(1 - M/R)} \\ &\approx \rho \frac{Mr^2/R^3 - M/R}{-2} = \rho \frac{M}{2R^3} (R^2 - r^2) \\ &= \rho \frac{4\pi R^3 \rho / 3}{2R^3} (R^2 - r^2) = \frac{2}{3} \pi \rho^2 (R^2 - r^2) , \\ p_0 &\approx \rho \frac{1 - (1 - M/R)}{3(1 - M/R) - 1} \approx \rho \frac{M/R}{2} \\ &= \rho \frac{4\pi R^3 / 3 \rho}{2R} = \frac{2}{3} \pi \rho^2 R^2 . \end{aligned}$$

~5. 求闵氏时空中 Rindler 坐标 t, x 与洛伦兹坐标 T, X 的关系.

解 由关系式 (9-4-16)、(9-4-11)、(9-4-12)、(9-4-6) 可得洛伦兹坐标与 Rindler 坐标的关系:

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2}(V + U) = \frac{1}{2}(e^v - e^{-u}) = \frac{1}{2}(e^{\ln x + t} - e^{\ln x - t}) = x \sinh t , \\ X &= \frac{1}{2}(V - U) = \frac{1}{2}(e^v + e^{-u}) = \frac{1}{2}(e^{\ln x + t} + e^{\ln x - t}) = x \cosh t . \end{aligned}$$

于是有

$$\begin{aligned} dT &= x \cosh t dt + \sinh t dx , \\ dX &= x \sinh t dt + \cosh t dx , \end{aligned}$$

线元为

$$\begin{aligned} ds^2 &= -dT^2 + dX^2 = -(x \cosh t dt + \sinh t dx)^2 + (x \sinh t dt + \cosh t dx)^2 \\ &= -x^2 dt^2 + dx^2 . \end{aligned}$$

~6. Rindler 时空的类时 Killing 矢量场 $(\partial/\partial t)^a$ 是闵氏时空的哪个 Killing 矢量场?

解 由上题的结果 $T = x \sinh t$, $X = x \cosh t$ 知

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^a &= \left(\frac{\partial}{\partial T}\right)^a \frac{\partial T}{\partial t} + \left(\frac{\partial}{\partial X}\right)^a \frac{\partial X}{\partial t} \\ &= \left(\frac{\partial}{\partial T}\right)^a x \cosh t + \left(\frac{\partial}{\partial X}\right)^a x \sinh t \\ &= X \left(\frac{\partial}{\partial T}\right)^a + T \left(\frac{\partial}{\partial X}\right)^a, \end{aligned}$$

代表 2 维闵氏时空伪转动的 Killing 矢量场.

- ~7. 求施瓦西时空中静态观者的 4 加速的长度 $A \equiv (A^a A_a)^{1/2}$. 提示: 可借用第 8 章习题 3 的结论, 即 $A_a = \nabla_a \ln \chi$.

解 根据第 8 章习题 3 的结论, 设 $\xi^a = \left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^a$ 为施瓦西时空的类时 Killing 矢量场, 则静态观者的 4 加速为

$$\begin{aligned} A_a &= \nabla_a \ln \chi = \nabla_a \ln(-\xi^a \xi_a)^{1/2} = \nabla_a \ln(-g_{00})^{1/2} \\ &= \nabla_a \ln \left(1 - \frac{2M}{r}\right)^{1/2} = \left(1 - \frac{2M}{r}\right)^{-1} \frac{M}{r^2} (dr)_a, \end{aligned}$$

故得

$$\begin{aligned} A &= (A^a A_a)^{1/2} = (g^{ab} A_a A_b)^{1/2} = (g^{11} A_1 A_1)^{1/2} \\ &= \left\{ \left(1 - \frac{2M}{r}\right) \left[\left(1 - \frac{2M}{r}\right)^{-1} \frac{M}{r^2} \right]^2 \right\}^{1/2} \\ &= \left(1 - \frac{2M}{r}\right)^{-1/2} \frac{M}{r^2}. \end{aligned}$$

在牛顿近似下 $A \cong \frac{M}{r^2} = g$, 即为重力加速度.

- ~8. 把图 9-13(a) 的 N_1 (或 N_2) 所代表的径向类光测地线简称为 N_1 (或 N_2), 试证: (1) 坐标 V (或 U) 是类光测地线 N_1 (或 N_2) 的仿射参数; (2) 坐标 r 是除 N_1 和 N_2 外的径向类光测地线的仿射参数.

证 设 $\eta(\lambda)$ 为任一径向类光测地线, 其参数式为 $t = t(\lambda)$, $r = r(\lambda)$, $\theta =$ 常数, $\varphi =$ 常数. 而其切矢

$$\left(\frac{\partial}{\partial \lambda}\right)^a = \left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^a \frac{dt(\lambda)}{d\lambda} + \left(\frac{\partial}{\partial r}\right)^a \frac{dr(\lambda)}{d\lambda}$$

满足

$$\begin{aligned} 0 &= g_{ab} \left(\frac{\partial}{\partial \lambda}\right)^a \left(\frac{\partial}{\partial \lambda}\right)^b = g_{00} \left(\frac{dt(\lambda)}{d\lambda}\right)^2 + g_{11} \left(\frac{dr(\lambda)}{d\lambda}\right)^2 \\ &= -\left(1 - \frac{2M}{r}\right) \left(\frac{dt(\lambda)}{d\lambda}\right)^2 + \left(1 - \frac{2M}{r}\right)^{-1} \left(\frac{dr(\lambda)}{d\lambda}\right)^2, \end{aligned}$$

即

$$dt = \pm \left(1 - \frac{2M}{r}\right)^{-1} dr = \pm dr_*.$$

于是径向类光测地线对应于 $v = t + r_* = 0$ 或 $u = t - r_* = 0$.

因为 $\xi^a = (\frac{\partial}{\partial t})^a$ 是 Killing 矢量场, 根据定理 4-3-3 下面定义的 E 沿测地线 $\eta(\lambda)$ 为常数

$$E := -g_{ab} \left(\frac{\partial}{\partial t} \right)^a \left(\frac{\partial}{\partial \lambda} \right)^b = -g_{00} (dt)_b \left(\frac{\partial}{\partial \lambda} \right)^b = -g_{00} \frac{dt}{d\lambda} = \left(1 - \frac{2M}{r} \right) \frac{dt}{d\lambda}.$$

由以上关系 $(1 - \frac{2M}{r})dt = \pm dr$, 得径向测地线上有关系 $d\lambda = \pm \frac{dr}{E}$, 即

$$\lambda = \pm \frac{r}{E} + c, \quad c = \text{常数}.$$

因为 λ 是类光测地线的仿射参数, 根据定理 3-3-3, r 也是这一测地线的仿射参数.

但是以上结果不适用于 N_1 或 N_2 所代表的类光测地线, 因为在 N_1 或 N_2 上, $r = 2M$ 而 $t = \pm\infty$, 故以上关系不成立. 但根据式 (9-4-26)–(9-4-28),

$$d\hat{s}^2 = \frac{32M^3}{r} e^{-r/2M} (-dT^2 + dX^2) = -\frac{32M^3}{r} e^{-r/2M} dV dU,$$

可知 N_1 由 $U = T - X = 0$ 描述, 它是 V 坐标线, 切矢为 $(\frac{\partial}{\partial V})^a$, 所以它的仿射参数就是 V ; 类似地, N_2 由 $V = T + X = 0$ 描述, 它是 U 坐标线, 切矢为 $(\frac{\partial}{\partial U})^a$, 所以它的仿射参数就是 U . 它们都是类光测地线, 满足 $g_{ab}(\frac{\partial}{\partial V})^a(\frac{\partial}{\partial V})^b = g_{ab}(\frac{\partial}{\partial U})^a(\frac{\partial}{\partial U})^b = 0$.

下面我们讨论径向类时测地线 $\gamma(\tau)$, 其参数式为 $t = t(\tau)$, $r = r(\tau)$, $\theta = \text{常数}$, $\varphi = \text{常数}$. 由方程 (9-1-6) ($\kappa = 1$, $L = 0$) 知

$$-1 = -\left(1 - \frac{2M}{r}\right)^{-1} E^2 + \left(1 - \frac{2M}{r}\right)^{-1} \left(\frac{dr}{d\tau}\right)^2,$$

即有

$$\frac{dr}{d\tau} = \pm \sqrt{E^2 - (1 - 2M/r)},$$

积分后可得函数关系 $\tau = \tau(r)$. 因为 r 终止于 $r = 0$, 故 τ 也终止于 $\tau(0)$, 故径向类时测地线 $\gamma(\tau)$ 也是不完备的. 从图 9-13a 来看 $\gamma(\tau)$ 必然与锯齿线有交.

~9. 引入与 Kruskal 坐标类似的坐标消除下列线元的坐标奇性 $r = R$:

$$ds^2 = -(1 - r^2/R^2)dt^2 + (1 - r^2/R^2)^{-1}dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2\theta d\varphi^2), \quad R = \text{常数}.$$

解 仿照得到 Kruskal 坐标的过程, 令

$$\begin{aligned} d\hat{s}^2 &= -(1 - r^2/R^2)dt^2 + (1 - r^2/R^2)^{-1}dr^2 \\ &= (1 - r^2/R^2)[-dt^2 + (1 - r^2/R^2)^{-2}dr^2] \\ &= (1 - r^2/R^2)(-dt^2 + dr_*^2), \end{aligned}$$

其中

$$dr_* = (1 - r^2/R^2)^{-1} dr = d[R \operatorname{arctanh}(r/R)] = d\left[\frac{R}{2} \ln \frac{1+r/R}{1-r/R}\right],$$

因此对 $0 < r < R$, 可取

$$r_* := \frac{R}{2} \ln \frac{1+r/R}{1-r/R}.$$

再令

$$v := t + r_*, \quad u := t - r_* \quad \text{即} \quad t = (v + u)/2, \quad r_* = (v - u)/2,$$

则 v 和 u 的取值范围是

$$-\infty < v, u < \infty.$$

因 $-dt^2 + dr_*^2 = -dvdu$, 得

$$d\hat{s}^2 = -(1 - r^2/R^2)dvdu.$$

令

$$V := e^{\beta v}, \quad U := -e^{-\beta u} \quad (\beta \text{ 为待定常数}),$$

则 V 和 U 的取值范围是

$$0 < V < \infty, \quad -\infty < U < 0,$$

且

$$dvdu = \beta^{-2} e^{\beta(u-v)} dV dU,$$

故

$$\begin{aligned} d\hat{s}^2 &= -\beta^{-2} (1 - r^2/R^2) e^{\beta(u-v)} dV dU \\ &= -\beta^{-2} (1 - r^2/R^2) e^{-2\beta r_*} dV dU \\ &= -\beta^{-2} (1 - r^2/R^2) e^{-\beta R \ln \frac{1+r/R}{1-r/R}} dV dU \\ &= -\beta^{-2} (1 - r/R)(1 + r/R) \left(\frac{1 - r/R}{1 + r/R}\right)^{\beta R} dV dU. \end{aligned}$$

为了消除上式在 $r = R$ 处的奇性, 可选 $\beta R = -1$, 即

$$\beta = -1/R.$$

于是

$$d\hat{s}^2 = -R^2 (1 + r/R)^2 dV dU = -(r + R)^2 dV dU.$$

上式表明度规分量在 $r = R$ 处不再奇异, 故可把 V, U 的取值范围延拓至 $V \leq 0$ 和 $U \geq 0$ 的区域. 因为 $r = 0$ 仍可能是 (后两个指标 θ 和 φ 的) 奇点, 所以对 V 和 U 的取值的限制是必须满足 $r > 0$ 的条件. 再令

$$T := \frac{1}{2}(V + U), \quad X := \frac{1}{2}(V - U),$$

并补上后两维, 便得新坐标系 $\{T, X, \theta, \varphi\}$ 中的线元表达式为

$$ds^2 = (r + R)^2(-dT^2 + dX^2) + r^2(d\theta^2 + \sin^2\theta d\varphi^2).$$

与 Kruskal 对施瓦西时空所做的延拓类似, 现在也可分为 4 个区 (借用了 Kruskal 的标记).

A \boxtimes ($X > |T|$, $0 < r < R$, $r_* = \frac{R}{2} \ln \frac{1+r/R}{1-r/R}$):

$$\begin{aligned} V &= e^{-v/R} = e^{-(t+r_*)/R} = \left(\frac{1-r/R}{1+r/R}\right)^{1/2} e^{-t/R}, \\ U &= -e^{u/R} = -e^{(t-r_*)/R} = -\left(\frac{1-r/R}{1+r/R}\right)^{1/2} e^{t/R}, \\ T &= \frac{1}{2}(V+U) = -\left(\frac{1-r/R}{1+r/R}\right)^{1/2} \sinh(t/R), \\ X &= \frac{1}{2}(V-U) = \left(\frac{1-r/R}{1+r/R}\right)^{1/2} \cosh(t/R); \end{aligned}$$

B \boxtimes ($T > |X|$, $r > R$, $r_* = \frac{R}{2} \ln \frac{r/R+1}{r/R-1}$):

$$\begin{aligned} V &= e^{-v/R} = e^{-(t+r_*)/R} = \left(\frac{r/R-1}{r/R+1}\right)^{1/2} e^{-t/R}, \\ U &= e^{u/R} = e^{(t-r_*)/R} = \left(\frac{r/R-1}{r/R+1}\right)^{1/2} e^{t/R}, \\ T &= \frac{1}{2}(V+U) = \left(\frac{r/R-1}{r/R+1}\right)^{1/2} \cosh(t/R), \\ X &= \frac{1}{2}(V-U) = -\left(\frac{r/R-1}{r/R+1}\right)^{1/2} \sinh(t/R); \end{aligned}$$

W \boxtimes ($T < -|X|$, $r > R$, $r_* = \frac{R}{2} \ln \frac{r/R+1}{r/R-1}$):

$$\begin{aligned} V &= -e^{-v/R} = -e^{-(t+r_*)/R} = -\left(\frac{r/R-1}{r/R+1}\right)^{1/2} e^{-t/R}, \\ U &= -e^{u/R} = -e^{(t-r_*)/R} = -\left(\frac{r/R-1}{r/R+1}\right)^{1/2} e^{t/R}, \\ T &= \frac{1}{2}(V+U) = -\left(\frac{r/R-1}{r/R+1}\right)^{1/2} \cosh(t/R), \\ X &= \frac{1}{2}(V-U) = \left(\frac{r/R-1}{r/R+1}\right)^{1/2} \sinh(t/R); \end{aligned}$$

A' \boxtimes ($X < -|T|$, $0 < r < R$, $r_* = \frac{R}{2} \ln \frac{1+r/R}{1-r/R}$):

$$\begin{aligned} V &= -e^{-v/R} = -e^{-(t+r_*)/R} = -\left(\frac{1-r/R}{1+r/R}\right)^{1/2} e^{-t/R}, \\ U &= e^{u/R} = e^{(t-r_*)/R} = \left(\frac{1-r/R}{1+r/R}\right)^{1/2} e^{t/R}, \end{aligned}$$

$$T = \frac{1}{2}(V + U) = \left(\frac{1 - r/R}{1 + r/R} \right)^{1/2} \sinh(t/R) ,$$

$$X = \frac{1}{2}(V - U) = - \left(\frac{1 - r/R}{1 + r/R} \right)^{1/2} \cosh(t/R) .$$

逆变换为

$$\begin{aligned} \text{A, B, W, A' 区} \quad & \frac{1 - r/R}{1 + r/R} = X^2 - T^2 , \\ \text{A, A' 区} \quad & t/R = -\operatorname{arctanh}(T/X) , \\ \text{B, W 区} \quad & t/R = -\operatorname{arctanh}(X/T) . \end{aligned}$$

在任何区域都有

$$(r + R)^2(-dT^2 + dX^2) = -(1 - r^2/R^2)dt^2 + (1 - r^2/R^2)^{-1}dr^2 ,$$

其中 $r + R$ 可表为 $2R(X^2 - T^2 + 1)^{-1}$. 要注意的是现在的 $r = 0$ 对应的是 $X^2 - T^2 = 1$, 位于 A 区和 A' 区, 而不是 B 区和 W 区.

为了看出 $r = 0$ 处是否存在奇性, 可以将线元改写为

$$ds^2 = (r + R)^2(-dT^2 + dX^2) - dr^2 + [dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2\theta d\varphi^2)] ,$$

其中方括号中为 3 维平直欧氏空间的线元, 所以没有奇性. 而由 $\frac{1-r/R}{1+r/R} = X^2 - T^2$ 得 $dr = R^{-1}(r + R)^2(TdT - XdX)$, 故

$$dr^2 = R^{-2}(r + R)^4(T^2dT^2 + X^2dX^2 - 2TXdTdX) ,$$

由此可以看出 $r = 0$ 也只是坐标系 $\{T, X, \theta, \varphi\}$ 的坐标奇性.

r 在 R 和 0 处的坐标奇性也可通过计算曲率的标量多项式 (s.p.) 而获得有用的信息. 为此先求得 (借助 Mathematica) 与初始坐标相应的克氏符如下:

$$\begin{aligned} \Gamma^0_{01} = \Gamma^0_{10} &= -(1 - r^2/R^2)^{-1}r/R^2 , \\ \Gamma^1_{00} &= -(1 - r^2/R^2)r/R^2 , \\ \Gamma^1_{11} &= (1 - r^2/R^2)^{-1}r/R^2 , \\ \Gamma^1_{22} &= -(1 - r^2/R^2)r , \\ \Gamma^1_{33} &= -(1 - r^2/R^2)r \sin^2\theta , \\ \Gamma^2_{12} = \Gamma^2_{21} &= 1/r , \\ \Gamma^2_{33} &= -\sin\theta \cos\theta , \\ \Gamma^3_{13} = \Gamma^3_{31} &= 1/r , \\ \Gamma^3_{23} = \Gamma^3_{32} &= \cot\theta , \end{aligned}$$

然后可得黎曼张量在初始坐标下的非零分量如下:

$$\begin{aligned}
 R_{0101} &= -1/R^2, \\
 R_{0202} &= (1 - r^2/R^2)r^4/R^4, \\
 R_{0303} &= (1 - r^2/R^2)(r^4/R^4)\sin^2\theta, \\
 R_{1212} &= (1 - r^2/R^2)^{-1}r^2/R^2, \\
 R_{1313} &= (1 - r^2/R^2)^{-1}(r^2/R^2)\sin^2\theta, \\
 R_{2323} &= (r^4/R^2)\sin^2\theta.
 \end{aligned}$$

于是可求得里奇张量的非零分量为:

$$\begin{aligned}
 R_{00} &= -3R^{-2}(1 - r^2/R^2), \\
 R_{11} &= 3R^{-2}(1 - r^2/R^2)^{-1}, \\
 R_{22} &= 3R^{-2}r^2, \\
 R_{33} &= 3R^{-2}r^2\sin^2\theta.
 \end{aligned}$$

下面我们计算 s.p.:

① 标量曲率 R :

$$R = g^{\mu\nu} R_{\mu\nu} = g^{00} R_{00} + g^{11} R_{11} + g^{22} R_{22} + g^{33} R_{33} = 12R^{-2}.$$

② $R_{ab}R^{ab}$

$$R_{ab}R^{ab} = g^{\mu\mu'} g^{\nu\nu'} R_{\mu\nu} R_{\mu'\nu'} = 36R^{-4}.$$

③ $R_{abcd}R^{abcd}$

$$R_{abcd}R^{abcd} = g^{\mu\mu'} g^{\nu\nu'} g^{\sigma\sigma'} g^{\rho\rho'} R_{\mu\nu\sigma\rho} R_{\mu'\nu'\sigma'\rho'} = 24R^{-4}.$$

至少这些 s.p. 都没有任何奇性.

10. 试证最大延拓施瓦西时空有 s.p. 曲率奇性. 提示: 利用式 (8-3-21).

证 利用施瓦西时空的黎曼张量表达式 (8-3-21), 注意黎曼张量的性质式 (3-4-6)、(3-4-9) 和 (3-4-10), 我们有 (也可借助 Mathematica 简单算得):

$$\begin{aligned}
 R_{abcd}R^{abcd} &= g^{\mu\mu'} g^{\nu\nu'} g^{\sigma\sigma'} g^{\rho\rho'} R_{\mu\nu\sigma\rho} R_{\mu'\nu'\sigma'\rho'} \\
 &= 4[(g^{00}g^{11}R_{0101})^2 + (g^{00}g^{22}R_{0202})^2 + (g^{00}g^{33}R_{0303})^2 \\
 &\quad + (g^{11}g^{22}R_{1212})^2 + (g^{11}g^{33}R_{1313})^2 + (g^{22}g^{33}R_{2323})^2] \\
 &= 4\left\{\left[-\left(1 - \frac{2M}{r}\right)^{-1}\left(1 - \frac{2M}{r}\right)\left(-\frac{2M}{r^3}\right)\right]^2\right. \\
 &\quad \left.+ \left[-\left(1 - \frac{2M}{r}\right)^{-1}\left(\frac{1}{r^2}\right)\frac{M}{r}\left(1 - \frac{2M}{r}\right)\right]^2\right\}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + \left[- \left(1 - \frac{2M}{r} \right)^{-1} \left(\frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \right) \frac{M}{r} \left(1 - \frac{2M}{r} \right) \sin^2 \theta \right]^2 \\
& + \left[\left(1 - \frac{2M}{r} \right) \left(\frac{1}{r^2} \right) \left(- \frac{M}{r} \right) \left(1 - \frac{2M}{r} \right)^{-1} \right]^2 \\
& + \left[\left(1 - \frac{2M}{r} \right) \left(\frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \right) \left(- \frac{M}{r} \right) \left(1 - \frac{2M}{r} \right)^{-1} \sin^2 \theta \right]^2 \\
& + \left[\left(\frac{1}{r^2} \right) \left(\frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \right) 2Mr \sin^2 \theta \right]^2 \Big\} \\
& = 4 \left\{ \frac{4M^2}{r^6} + \frac{M^2}{r^6} + \frac{M^2}{r^6} + \frac{M^2}{r^6} + \frac{M^2}{r^6} + \frac{4M^2}{r^6} \right\} \\
& = \frac{48M^2}{r^6} .
\end{aligned}$$

故 $r \rightarrow 2M$ 有限而 $r \rightarrow 0$ 发散, 可见 $r \rightarrow 0$ 有 s.p. 曲率奇性. 注意施瓦西时空的里奇张量 R_{ab} 为零, 因而标量曲率 R 和 $R_{ab}R^{ab}$ 都为零.

11. 试证图 9-13(a) 的 N_1 是类光超曲面. 提示: 只须证明其法矢 n^a 类光. 请注意 N_1 的方程为 $U = 0$, 其法余矢为 $n_a = \nabla_a U$.

证 超曲面 N_1 由方程 $U = 0$ 决定, 其法余矢为 $n_a = \nabla_a U = (dU)_a$. 而从线元式 (9-4-28) 和 (9-4-26) 知

$$\begin{aligned}
ds^2 &= \frac{32M^3}{r} e^{-r/2M} (-dT^2 + dX^2) + r^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2) \\
&= -\frac{32M^3}{r} e^{-r/2M} dV dU + r^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2) ,
\end{aligned}$$

于是有

$$n_a n^a = g^{ab} n_a n_b = g^{ab} (dU)_a (dU)_b = g^{UU} = 0 .$$

因此 N_1 为类光超曲面.

12. 试由式 (9-4-50) 推出式 (9-4-51), 再推出式 (9-4-54).

解 由式 (9-4-50)

$$d\hat{s}^2 = -(1 - 2M/r) dt^2 + (1 - 2M/r)^{-1} dr^2 ,$$

定义 $v := t + r_*$ 并利用 $(1 - 2M/r)^{-1} dr = dr_*$, 有

$$\begin{aligned}
d\hat{s}^2 &= (1 - 2M/r) [-dt^2 + (1 - 2M/r)^{-2} dr^2] \\
&= (1 - 2M/r) [-dt^2 + dr_*^2] \\
&= (1 - 2M/r) d(r_* + t) d(r_* - t) \\
&= (1 - 2M/r) dv d(2r_* - v) \\
&= 2(1 - 2M/r) dv dr_* - (1 - 2M/r) dv^2 \\
&= -(1 - 2M/r) dv^2 + 2dv dr ,
\end{aligned}$$

此即式 (9-4-51). 再定义 $\tilde{t} := v - r$,

$$\begin{aligned} dv^2 &= (d\tilde{t} + dr)^2 = d\tilde{t}^2 + dr^2 + 2d\tilde{t}dr, \\ dvdr &= (d\tilde{t} + dr)dr = d\tilde{t}dr + dr^2, \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} d\hat{s}^2 &= -(1 - 2M/r)(d\tilde{t}^2 + dr^2 + 2d\tilde{t}dr) + 2(d\tilde{t}dr + dr^2) \\ &= -(1 - 2M/r)d\tilde{t}^2 + (1 + 2M/r)dr^2 + (4M/r)d\tilde{t}dr, \end{aligned}$$

此即式 (9-4-54).

- *13. 写出施瓦西度规在外向 Eddington 坐标系 $\{u, r, \theta, \varphi\}$ ($u \equiv t - r_*$) 的线元表达式.

解 与上题类似,

$$\begin{aligned} d\hat{s}^2 &= (1 - 2M/r)[-dt^2 + (1 - 2M/r)^{-2}dr^2] \\ &= (1 - 2M/r)[-dt^2 + dr_*^2] \\ &= (1 - 2M/r)d(r_* + t)d(r_* - t) \\ &= (1 - 2M/r)d(2r_* + u)(-du) \\ &= -2(1 - 2M/r)dudr_* - (1 - 2M/r)du^2 \\ &= -(1 - 2M/r)du^2 - 2dudr, \end{aligned}$$

这就是施瓦西度规在外向 Eddington 坐标系 $\{u, r, \theta, \varphi\}$ 的线元表达式.

- *14. 试证用 $(\partial/\partial V)^a$ 和 $(\partial/\partial U)^a$ 定义的 ξ^a [见式 (9-4-40)] 在 N_1 和 N_2 上是类光 Killing 矢量场.

证 由式 (9-4-26) 知 $g_{VU} = -\frac{16M^3}{r}e^{-r/2M}$, 故有

$$\begin{aligned} g_{ab}\xi^a\xi^b &= g_{ab}\frac{1}{(4M)^2}\left[V\left(\frac{\partial}{\partial V}\right)^a - U\left(\frac{\partial}{\partial U}\right)^a\right]\left[V\left(\frac{\partial}{\partial V}\right)^b - U\left(\frac{\partial}{\partial U}\right)^b\right] \\ &= -\frac{VU}{(4M)^2}\left[g_{ab}\left(\frac{\partial}{\partial V}\right)^a\left(\frac{\partial}{\partial U}\right)^b + g_{ab}\left(\frac{\partial}{\partial U}\right)^a\left(\frac{\partial}{\partial V}\right)^b\right] \\ &= -\frac{VU}{(4M)^2}2g_{VU} = VU\frac{2M}{r}e^{-r/2M}. \end{aligned}$$

在 N_1 上 $U = 0$, 在 N_2 上 $V = 0$, 所以在 N_1 和 N_2 上 ξ^a 是类光 Killing 矢量场.

- *15. 把图 9-21 改画为图 9-23. 试通过计算图中的 $\Delta\tau'/\Delta\tau$ 给出式 (9-4-58) 的另一推导. 提示: (1) $U \equiv -e^{(r_*-t)/4M}$ 在每条外向类光测地线上为常数. 先后沿外部静态观者世界线和星面自由下落观者世界线求得同一 dU 的两个表

达式 (分别含 $d\tau'$ 和 $d\tau$), 在两式之间画等号便得式 (9-4-58). (2) 在写出用 $d\tau$ 表出 dU 的式子时要用到以能量 E 表达 $dt/d\tau$ 和 $dr/d\tau$ 的公式, 这可借 §9.1 的手法求得.

解 首先注意到以下的讨论都限于径向运动, 不涉及 θ 和 φ (即 $d\theta = d\varphi = 0$), 故只须考虑前两维. 如果 $G(\tau)$ 为星体外静态观者的世界线 (在 $T \sim X$ 图中表现为 A 区中的双曲线族), 它的 4 速为 $Z^a = (\frac{\partial}{\partial \tau})^a$. 因为它与类时 Killing 矢量场 $\xi^a = (\frac{\partial}{\partial t})^a$ 的积分曲线重合, 故由 4 速归一性得

$$-1 = Z_a Z^a = g_{ab} \left(\frac{\partial}{\partial \tau} \right)^a \left(\frac{\partial}{\partial \tau} \right)^b = g_{00} (dt)_a (dt)_b \left(\frac{\partial}{\partial \tau} \right)^a \left(\frac{\partial}{\partial \tau} \right)^b = g_{00} \left(\frac{dt}{d\tau} \right)^2,$$

得

$$\frac{dt}{d\tau} = (-g_{00})^{-1/2} = \left(1 - \frac{2M}{r} \right)^{-1/2} \equiv \chi^{-1}(r),$$

此即关系 $\xi^a = \chi Z^a$. 如果 p 和 p' 是由类光测地线 (即等 U 线) 联系的两个星外静态观者世界线上的两点, 那么就有关系

$$\frac{\omega'}{\omega} = \frac{\chi}{\chi'} \quad \text{或} \quad \frac{\lambda'}{\lambda} = \frac{\chi'}{\chi},$$

此即代表引力红移的式 (9-2-2). 令 $\Delta\tau$ 和 $\Delta\tau'$ 分别为由两根等 U 线在 $G(\tau)$ (p 点) 和 $G'(\tau')$ (p' 点) 截得的线长 (固有时线段, 见图), 那么有关系

$$\frac{\Delta\tau'}{\Delta\tau} = \frac{\chi'}{\chi} = \frac{\chi(r(p'))}{\chi(r(p))} = \frac{[1 - 2M/r(p')]^{1/2}}{[1 - 2M/r(p)]^{1/2}}.$$

下面可把 p 看成星体表面静态观者 $G(\tilde{\tau})$ 的点而把 p' 看成星外静态观者的点 (见图), 上式中的 $\Delta\tau$ 换成 $\Delta\tilde{\tau}$:

$$\frac{\Delta\tau'}{\Delta\tilde{\tau}} = \frac{\chi(r(p'))}{\chi(r(p))} = \frac{\chi'}{\chi}.$$

这其实就是式 (9-4-55).

对于无压强 (尘埃) 球对称恒星, 星体表面每点的坍缩世界线为径向 (内向) 类时测地线 $\gamma(\tau)$, 其 4 速为 $(\frac{\partial}{\partial \tau})^a$. 由定理 4-3-3 知该测地线的能量为

$$\begin{aligned} E &= -g_{ab} \left(\frac{\partial}{\partial t} \right)^a \left(\frac{\partial}{\partial \tau} \right)^b = -g_{00} (dt)_b \left(\frac{\partial}{\partial \tau} \right)^b = -g_{00} \frac{dt}{d\tau} \\ &= \left(1 - \frac{2M}{r} \right) \frac{dt}{d\tau} = \chi^2(r) \frac{dt}{d\tau}, \end{aligned}$$

即有

$$\frac{dt}{d\tau} = \frac{E}{\chi^2(r)},$$

其中 $r = r(p)$, 为星体表面在某一时刻的半径 [此即式 (9-1-4)]. 另外由 4 速的归一条件得

$$\begin{aligned} -1 &= g_{ab} \left(\frac{\partial}{\partial \tau} \right)^a \left(\frac{\partial}{\partial \tau} \right)^b = \left[g_{00} (dt)_a (dt)_b + g_{11} (dr)_a (dr)_b \right] \left(\frac{\partial}{\partial \tau} \right)^a \left(\frac{\partial}{\partial \tau} \right)^b \\ &= g_{00} \left(\frac{dt}{d\tau} \right)^2 + g_{11} \left(\frac{dr}{d\tau} \right)^2 = -\chi^2 (\chi^{-2} E)^2 + \chi^{-2} \left(\frac{dr}{d\tau} \right)^2, \end{aligned}$$

即

$$\left(\frac{dr}{d\tau} \right)^2 = E^2 - \chi^2(r).$$

由于 $\gamma(\tau)$ 内向, 故

$$\frac{dr}{d\tau} = -\sqrt{E^2 - \chi^2}.$$

于是对于星面测地线有关系,

$$\frac{dr}{dt} = -\frac{\sqrt{E^2 - \chi^2}}{\chi^{-2} E} = -\frac{\chi^2 \sqrt{E^2 - \chi^2}}{E}.$$

最后注意到 $U = -e^{(r_* - t)/4M}$, 知

$$\begin{aligned} dU &= U \frac{1}{4M} (dr_* - dt) = \frac{U}{4M} \left[\left(1 - \frac{2M}{r} \right)^{-1} dr - dt \right] = \frac{U}{4M} [\chi^{-2} dr - dt] \\ &= \frac{U}{4M} \left[\chi^{-2} \left(\frac{dr}{dt} \right) - 1 \right] dt = \frac{U}{4M} \left[-\frac{\sqrt{E^2 - \chi^2}}{E} - 1 \right] dt \\ &= -\frac{U}{4M} \frac{\sqrt{E^2 - \chi^2} + E}{E} dt \\ &= -\frac{U}{4M} \frac{\sqrt{E^2 - \chi^2(r(p))} + E}{E} \left[\frac{E}{\chi^2(r(p))} d\tau \right] \\ &= -\frac{U}{4M} \frac{\sqrt{E^2 - \chi^2(r(p))} + E}{\chi^2(r(p))} d\tau. \end{aligned}$$

另一方面, 对于星外静态观者的世界线 $G'(\tau')$, 由于 $r = \text{常数}$, 故有

$$dU = U \frac{1}{4M} (-dt) = -\frac{U}{4M} [\chi^{-1}(r(p')) d\tau'].$$

与前式相等得

$$\frac{d\tau'}{d\tau} = \frac{\chi(r(p'))(\sqrt{E^2 - \chi^2(r(p))} + E)}{\chi^2(r(p))} = \frac{\chi'(\sqrt{E^2 - \chi^2} + E)}{\chi^2},$$

此即式 (9-4-59), 其中 $\chi = [1 - 2M/r(p)]^{1/2}$, $\chi' = [1 - 2M/r(p')]^{1/2}$.

附. 对尘埃星估算星体表面自由坍缩观者从越过事件视界 ($r = 2M$) 后到跌入奇点 ($r = 0$) 的固有时流逝 (对 $M = 3M_\odot$ 的黑洞).

解 由上题的求解过程知道, 星体表面自由坍缩观者的世界线为径向测地线 $\gamma(\tau)$, 并且有关系

$$\frac{dr}{d\tau} = -\sqrt{E^2 - \chi^2(r)},$$

其中 E 表征该测地线的能量, 是个常数, 而 $\chi(r) = (1 - 2M/r)^{1/2}$. 积分上式得

$$\begin{aligned}\Delta\tau &= - \int_{r=2M}^0 \frac{dr}{\sqrt{E^2 - 1 + 2M/r}} \\ &= \frac{M}{(E^2 - 1)^{3/2}} \left\{ 2E(E^2 - 1)^{1/2} - \ln \left[2E(E^2 - 1)^{1/2} + 2E^2 - 1 \right] \right\}.\end{aligned}$$

因此如果知道能量值 E , 就可知固有时的流逝 $\Delta\tau$. 作为估算, 可设 E 取允许的最小值 1 (对应落入事件视界时的坍缩速率最小). 于是有

$$\begin{aligned}\Delta\tau &= \lim_{E \rightarrow 1} \frac{M}{(E^2 - 1)^{3/2}} \left\{ 2E(E^2 - 1)^{1/2} - \ln \left[2E(E^2 - 1)^{1/2} + 2E^2 - 1 \right] \right\} \\ &= \frac{4M}{3}.\end{aligned}$$

如果取 $M = 3M_\odot$, 则 $\Delta\tau = 4M_\odot$. 恢复国际单位制, 我们有

$$\Delta\tau = \frac{4GM_\odot}{c^2} / c = \frac{4 \times 6.67 \times 10^{-11} \times 1.99 \times 10^{30}}{(3 \times 10^8)^3} = 1.97 \times 10^{-5} \text{ s}.$$

此即 §9.4.6 小节第一段末的结论!

第 10 章 “宇宙论” 习题

~1. 试验证度规 (10-1-12) 的曲率张量 ${}^{(3)}R_{abc}{}^d$ 满足 ${}^{(3)}R_{ab}{}^{cd} = 2\bar{R}^{-2}\delta_a^{[c}\delta_b^{d]}$.

证 由 3 维球面线元

$$dl^2 = \bar{R}^2[d\psi^2 + \sin^2\psi(d\theta^2 + \sin^2\theta d\varphi^2)]$$

知度规为

$$g_{11} \equiv g_{\psi\psi} = \bar{R}^2, \quad g_{22} \equiv g_{\theta\theta} = (\bar{R} \sin \psi)^2, \quad g_{33} \equiv g_{\varphi\varphi} = (\bar{R} \sin \psi \sin \theta)^2;$$

以及

$$g^{11} = \bar{R}^{-2}, \quad g^{22} = (\bar{R} \sin \psi)^{-2}, \quad g^{33} = (\bar{R} \sin \psi \sin \theta)^{-2}.$$

于是,

$$g_{22,1} = \bar{R}^2 \sin 2\psi, \quad g_{33,1} = \bar{R}^2 \sin 2\psi \sin^2 \theta, \quad g_{33,2} = \bar{R}^2 \sin^2 \psi \sin 2\theta.$$

代入式 (3-4-19) 得非零克氏符 (Mathematica):

$$\begin{aligned}\Gamma_{22}^1 &= -\sin \psi \cos \psi, & \Gamma_{33}^1 &= -\sin \psi \cos \psi \sin^2 \theta, \\ \Gamma_{12}^2 &= \Gamma_{21}^2 = \cot \psi, & \Gamma_{33}^2 &= -\sin \theta \cos \theta, \\ \Gamma_{13}^3 &= \Gamma_{31}^3 = \cot \psi, & \Gamma_{23}^3 &= \Gamma_{32}^3 = \cot \theta.\end{aligned}$$

代入式 (3-4-20') 得非零黎曼张量 (Mathematica):

$$\begin{aligned}
 R_{121}^2 &= 1, \\
 R_{122}^1 &= -\sin^2 \psi, \\
 R_{131}^3 &= 1, \\
 R_{133}^1 &= -\sin^2 \psi \sin^2 \theta, \\
 R_{211}^2 &= -1, \\
 R_{212}^1 &= \sin^2 \psi, \\
 R_{232}^3 &= \sin^2 \psi, \\
 R_{233}^2 &= -\sin^2 \psi \sin^2 \theta, \\
 R_{311}^3 &= -1, \\
 R_{313}^1 &= \sin^2 \psi \sin^2 \theta, \\
 R_{322}^3 &= -\sin^2 \psi, \\
 R_{323}^2 &= \sin^2 \psi \sin^2 \theta,
 \end{aligned}$$

其对称形式为:

$$\begin{aligned}
 R_{1212} &= -R_{1221} = -R_{2112} = R_{2121} = \bar{R}^2 \sin^2 \psi, \\
 R_{1313} &= -R_{1331} = -R_{3113} = R_{3131} = \bar{R}^2 \sin^2 \psi \sin^2 \theta, \\
 R_{2323} &= -R_{2332} = -R_{3223} = R_{3232} = \bar{R}^2 \sin^4 \psi \sin^2 \theta.
 \end{aligned}$$

于是有

$$\begin{aligned}
 R_{12}^{12} &= g^{11} R_{121}^2 = \bar{R}^{-2} = \bar{R}^{-2} (\delta_1^1 \delta_2^2 - \delta_1^2 \delta_2^1), \\
 R_{12}^{21} &= g^{22} R_{122}^1 = -\bar{R}^{-2} = \bar{R}^{-2} (\delta_1^2 \delta_2^1 - \delta_1^1 \delta_2^2), \\
 R_{13}^{13} &= g^{11} R_{131}^3 = \bar{R}^{-2} = \bar{R}^{-2} (\delta_1^1 \delta_3^3 - \delta_1^3 \delta_3^1), \\
 R_{13}^{31} &= g^{33} R_{133}^1 = -\bar{R}^{-2} = \bar{R}^{-2} (\delta_1^3 \delta_3^1 - \delta_1^1 \delta_3^3), \\
 R_{21}^{12} &= g^{11} R_{211}^2 = -\bar{R}^{-2} = \bar{R}^{-2} (\delta_2^1 \delta_1^2 - \delta_2^2 \delta_1^1), \\
 R_{21}^{21} &= g^{22} R_{212}^1 = \bar{R}^{-2} = \bar{R}^{-2} (\delta_2^2 \delta_1^1 - \delta_2^1 \delta_1^2), \\
 R_{23}^{23} &= g^{22} R_{232}^3 = \bar{R}^{-2} = \bar{R}^{-2} (\delta_2^2 \delta_3^3 - \delta_2^3 \delta_3^2), \\
 R_{23}^{32} &= g^{33} R_{233}^2 = -\bar{R}^{-2} = \bar{R}^{-2} (\delta_2^3 \delta_3^2 - \delta_2^2 \delta_3^3), \\
 R_{31}^{13} &= g^{11} R_{311}^3 = -\bar{R}^{-2} = \bar{R}^{-2} (\delta_3^1 \delta_1^3 - \delta_3^3 \delta_1^1), \\
 R_{31}^{31} &= g^{33} R_{313}^1 = \bar{R}^{-2} = \bar{R}^{-2} (\delta_3^3 \delta_1^1 - \delta_3^1 \delta_1^3), \\
 R_{32}^{23} &= g^{22} R_{322}^3 = -\bar{R}^{-2} = \bar{R}^{-2} (\delta_3^2 \delta_2^3 - \delta_3^3 \delta_2^2), \\
 R_{32}^{32} &= g^{33} R_{323}^2 = \bar{R}^{-2} = \bar{R}^{-2} (\delta_3^3 \delta_2^2 - \delta_3^2 \delta_2^3).
 \end{aligned}$$

此即 $R_{ab}{}^{cd} = 2\bar{R}^{-2}\delta_a^{[c}\delta_b^{d]}$, 为常曲率 3 维空间, $K = \bar{R}^{-2} > 0$.

由 3 维双曲面线元

$$dl^2 = \bar{\xi}^2 [d\psi^2 + \sinh^2 \psi (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2)]$$

知度规为

$$g_{11} \equiv g_{\psi\psi} = \bar{\xi}^2, \quad g_{22} \equiv g_{\theta\theta} = (\bar{\xi} \sinh \psi)^2, \quad g_{33} \equiv g_{\varphi\varphi} = (\bar{\xi} \sinh \psi \sin \theta)^2;$$

以及

$$g^{11} = \bar{\xi}^{-2}, \quad g^{22} = (\bar{\xi} \sinh \psi)^{-2}, \quad g^{33} = (\bar{\xi} \sinh \psi \sin \theta)^{-2}.$$

于是,

$$g_{22,1} = \bar{\xi}^2 \sinh 2\psi, \quad g_{33,1} = \bar{\xi}^2 \sinh 2\psi \sin^2 \theta, \quad g_{33,2} = \bar{\xi}^2 \sinh^2 \psi \sin 2\theta.$$

代入式 (3-4-19) 得非零克氏符 (Mathematica):

$$\begin{aligned} \Gamma^1_{22} &= -\sinh \psi \cosh \psi, & \Gamma^1_{33} &= -\sinh \psi \cosh \psi \sin^2 \theta, \\ \Gamma^2_{12} &= \Gamma^2_{21} = \coth \psi, & \Gamma^2_{33} &= -\sin \theta \cos \theta, \\ \Gamma^3_{13} &= \Gamma^3_{31} = \coth \psi, & \Gamma^3_{23} &= \Gamma^3_{32} = \cot \theta. \end{aligned}$$

代入式 (3-4-20') 得非零黎曼张量 (Mathematica):

$$\begin{aligned} R_{121}^2 &= -1, \\ R_{122}^1 &= \sinh^2 \psi, \\ R_{131}^3 &= -1, \\ R_{133}^1 &= \sinh^2 \psi \sin^2 \theta, \\ R_{211}^2 &= 1, \\ R_{212}^1 &= -\sinh^2 \psi, \\ R_{232}^3 &= -\sinh^2 \psi, \\ R_{233}^2 &= \sinh^2 \psi \sin^2 \theta, \\ R_{311}^3 &= 1, \\ R_{313}^1 &= -\sinh^2 \psi \sin^2 \theta, \\ R_{322}^3 &= \sinh^2 \psi, \\ R_{323}^2 &= -\sinh^2 \psi \sin^2 \theta, \end{aligned}$$

其对称形式为:

$$\begin{aligned} R_{1212} &= -R_{1221} = -R_{2112} = R_{2121} = -\bar{\xi}^2 \sinh^2 \psi, \\ R_{1313} &= -R_{1331} = -R_{3113} = R_{3131} = -\bar{\xi}^2 \sinh^2 \psi \sin^2 \theta, \\ R_{2323} &= -R_{2332} = -R_{3223} = R_{3232} = -\bar{\xi}^2 \sinh^4 \psi \sin^2 \theta. \end{aligned}$$

于是有

$$\begin{aligned}
R_{12}^{12} &= g^{11} R_{121}^2 = -\bar{\xi}^{-2} = -\bar{\xi}^{-2}(\delta_1^1 \delta_2^2 - \delta_1^2 \delta_2^1), \\
R_{12}^{21} &= g^{22} R_{122}^1 = \bar{\xi}^{-2} = -\bar{\xi}^{-2}(\delta_1^2 \delta_2^1 - \delta_1^1 \delta_2^2), \\
R_{13}^{13} &= g^{11} R_{131}^3 = -\bar{\xi}^{-2} = -\bar{\xi}^{-2}(\delta_1^1 \delta_3^3 - \delta_1^3 \delta_3^1), \\
R_{13}^{31} &= g^{33} R_{133}^1 = \bar{\xi}^{-2} = -\bar{\xi}^{-2}(\delta_1^3 \delta_3^1 - \delta_1^1 \delta_3^3), \\
R_{21}^{12} &= g^{11} R_{211}^2 = \bar{\xi}^{-2} = -\bar{\xi}^{-2}(\delta_2^1 \delta_1^2 - \delta_2^2 \delta_1^1), \\
R_{21}^{21} &= g^{22} R_{212}^1 = -\bar{\xi}^{-2} = -\bar{\xi}^{-2}(\delta_2^2 \delta_1^1 - \delta_2^1 \delta_1^2), \\
R_{23}^{23} &= g^{22} R_{232}^3 = -\bar{\xi}^{-2} = -\bar{\xi}^{-2}(\delta_2^2 \delta_3^3 - \delta_2^3 \delta_3^2), \\
R_{23}^{32} &= g^{33} R_{233}^2 = \bar{\xi}^{-2} = -\bar{\xi}^{-2}(\delta_2^3 \delta_3^2 - \delta_2^2 \delta_3^3), \\
R_{31}^{13} &= g^{11} R_{311}^3 = \bar{\xi}^{-2} = -\bar{\xi}^{-2}(\delta_3^1 \delta_1^3 - \delta_3^3 \delta_1^1), \\
R_{31}^{31} &= g^{33} R_{313}^1 = -\bar{\xi}^{-2} = -\bar{\xi}^{-2}(\delta_3^3 \delta_1^1 - \delta_3^1 \delta_1^3), \\
R_{32}^{23} &= g^{22} R_{322}^3 = \bar{\xi}^{-2} = -\bar{\xi}^{-2}(\delta_3^2 \delta_2^3 - \delta_3^3 \delta_2^2), \\
R_{32}^{32} &= g^{33} R_{323}^2 = -\bar{\xi}^{-2} = -\bar{\xi}^{-2}(\delta_3^3 \delta_2^2 - \delta_3^2 \delta_2^3).
\end{aligned}$$

此即 $R_{ab}{}^{cd} = -2\bar{\xi}^{-2}\delta_a^{[c}\delta_b^{d]}$, 也为常曲率 3 维空间, $K = -\bar{\xi}^{-2} < 0$.

2. 试证各向同性观者的世界线是测地线. 提示: 利用式 (10-2-5) 后的克氏符表达式及式 (5-7-2) 几乎一望而知.

证 各向同性观者的世界线与时间坐标线重合, 其切矢 (4 速) 为 $Z^a = (\partial/\partial t)^a$. 根据 §3.3 定义 1, 对测地线应满足 $Z^b \nabla_b Z^a = 0$. 而根据式 (5-7-2):

$$\left(\frac{\partial}{\partial x^\nu}\right)^b \nabla_b \left(\frac{\partial}{\partial x^\mu}\right)^a = \Gamma^\sigma{}_{\mu\nu} \left(\frac{\partial}{\partial x^\sigma}\right)^a,$$

我们有

$$Z^b \nabla_b Z^a = \left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^b \nabla_b \left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^a = \Gamma^\sigma{}_{00} \left(\frac{\partial}{\partial x^\sigma}\right)^a = 0,$$

最后一步是因为由式 (10-2-5) 后的克氏符知 $\Gamma^\sigma{}_{00} = 0$. 因此各向同性观者的世界线是测地线.

3. 试用如下步骤导出宇宙学红移公式 (10-2-8):

(a) 证明沿任一类光测地线 $\eta(\beta)$ (β 为仿射参数) 有 $d\omega/d\beta = -K^a K^b \nabla_a Z_b$, 其中

$$K^a \equiv (\partial/\partial\beta)^a, \quad Z^a \equiv (\partial/\partial t)^a, \quad \omega \equiv -g_{ab} Z^a K^b.$$

(b) 证明 $\nabla_a Z_b = (\dot{a}/a)h_{ab}$, 其中 h_{ab} 是由 g_{ab} 在均匀面上的诱导度规, $\dot{a} \equiv da/dt$.

提示: 先证明 $\nabla_a Z_b$ 是空间张量场, 即 $Z^a \nabla_a Z_b = 0 = Z^b \nabla_a Z_b$, 再证明待证等式两边作用于 $(\partial/\partial x^i)^a (\partial/\partial x^j)^b$ ($i, j = 1, 2, 3$) 得相同结果.

(c) 利用 (a)、(b) 的结果推出 $d\omega/\omega = -da/a$, 从而得式 (10-2-8).

解 (a) 因 ω 为标量函数,

$$\begin{aligned}\frac{d\omega}{d\beta} &= K^c \nabla_c \omega = -K^c \nabla_c (g_{ab} Z^a K^b) = -K^c \nabla_c (Z_b K^b) \\ &= -K^c K^b \nabla_c Z_b - K^c Z_b \nabla_c K^b = -K^a K^b \nabla_a Z_b,\end{aligned}$$

最后一步利用了类光测地线的性质 $K^c \nabla_c K^b = 0$.

(b) 利用上一题的结果知道各向同性观者的世界线为测地线, 故它的切矢满足 $Z^a \nabla_a Z^c = 0$ (见上题的证明). 以适配度规 g_{bc} 作用得 $g_{bc} Z^a \nabla_a Z^c = Z^a \nabla_a Z_b = 0$. 另一方面, 由 4 速 Z^a 的归一性 $Z_a Z^a = -1$ 自然有 $0 = \nabla_a (Z_b Z^b) = Z^b \nabla_a Z_b + Z_b \nabla_a Z^b = 2Z^b \nabla_a Z_b$ (用到了度规与微分算符的适配性). 既然 $Z^a \nabla_a Z_b = 0 = Z^b \nabla_a Z_b$, 可知张量 $\nabla_a Z_b$ 与 Z^a 正交, 是空间张量, 即它的分量只有空间指标.

利用关系式

$$\nabla_a Z_b = \partial_a Z_b - \Gamma^c_{ab} Z_c,$$

故得

$$\begin{aligned}\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)^a \left(\frac{\partial}{\partial x^j}\right)^b \nabla_a Z_b &= \left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)^a \left(\frac{\partial}{\partial x^j}\right)^b \partial_a Z_b - \left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)^a \left(\frac{\partial}{\partial x^j}\right)^b \Gamma^c_{ab} Z_c \\ &= \partial_i Z_j - \Gamma^{\sigma}_{ij} Z_{\sigma}.\end{aligned}$$

由于 $Z_{\sigma} = \left(\frac{\partial}{\partial x^{\sigma}}\right)^a Z_a = \left(\frac{\partial}{\partial x^{\sigma}}\right)^a [-(dt)_a] = -\delta^0_{\sigma}$, 故 $Z_j = 0$, 得

$$\begin{aligned}\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)^a \left(\frac{\partial}{\partial x^j}\right)^b \nabla_a Z_b &= \Gamma^{\sigma}_{ij} \delta^0_{\sigma} = \Gamma^0_{ij} \\ &= a\dot{a}(1 - kr^2)^{-1} \delta^1_i \delta^1_j + a\dot{a}r^2 \delta^2_i \delta^2_j + a\dot{a}r^2 \sin^2 \theta \delta^3_i \delta^3_j \\ &= a\dot{a}[a^{-2} g_{11} \delta^1_i \delta^1_j + a^{-2} g_{22} \delta^2_i \delta^2_j + a^{-2} g_{33} \delta^3_i \delta^3_j] \\ &= a^{-1} \dot{a} g_{ij} [\delta^1_i \delta^1_j + \delta^2_i \delta^2_j + \delta^3_i \delta^3_j] \\ &= a^{-1} \dot{a} h_{ij} [\delta^1_i \delta^1_j + \delta^2_i \delta^2_j + \delta^3_i \delta^3_j] \\ &= a^{-1} \dot{a} h_{ab} \left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)^a \left(\frac{\partial}{\partial x^j}\right)^b,\end{aligned}$$

故有 $\nabla_a Z_b = a^{-1} \dot{a} h_{ab}$.

(c) 结合 (a) 和 (b) 的结果, 我们有 (设 K^a 沿径向类光测地线)

$$\begin{aligned}\frac{d\omega}{d\beta} &= -K^a K^b \nabla_a Z_b = -K^a K^b (a^{-1} \dot{a} h_{ab}) \\ &= -a^{-1} \dot{a} h_{ab} \left[\left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^a \frac{dt}{d\beta} + \left(\frac{\partial}{\partial r}\right)^a \frac{dr}{d\beta} \right] \left[\left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^b \frac{dt}{d\beta} + \left(\frac{\partial}{\partial r}\right)^b \frac{dr}{d\beta} \right] \\ &= -a^{-1} \dot{a} \left[h_{00} \left(\frac{dt}{d\beta}\right)^2 + h_{11} \left(\frac{dr}{d\beta}\right)^2 \right] \quad (h_{00} = 0) \\ &= -a^{-1} \dot{a} h_{11} \left(\frac{dr}{d\beta}\right)^2 = -a^{-1} \dot{a} g_{11} \left(\frac{dr}{d\beta}\right)^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= -\frac{a\dot{a}}{1-kr^2}\left(\frac{dr}{d\beta}\right)^2 \\
&\stackrel{(10-2-7)}{=} -\frac{\dot{a}}{a}\left(\frac{dt}{d\beta}\right)^2 = -\frac{1}{a}\frac{da}{dt}\frac{dt}{d\beta}\omega = -\frac{\omega}{a}\frac{da}{d\beta},
\end{aligned}$$

即有 $d\omega/\omega = -da/a$, 从而得 $\omega = \omega_0 a^{-1}$.

4. 宇宙当今年龄是宇宙从 $a = 0$ 演化至 $a_0 \equiv a(t_0)$ 所需的时间. 给定任一 a 值都可谈及宇宙的尺度因子演化至该值所需的时间, 称为该 a 值相应的宇宙年龄, 因此年龄 t 可看作 a 的函数.

(a) 从式 (10-2-29a)–(10-2-29c) 和 (10-2-25) 出发证明 $\Lambda = 0$ 的物质宇宙的年龄函数由以下三式给出:

对 $\Omega_0 = 1$,

$$t = \frac{2}{3}H_0^{-1}\left(\frac{a}{a_0}\right)^{3/2},$$

对 $\Omega_0 > 1$,

$$t = H_0^{-1}\left\{\frac{\Omega_0}{2(\Omega_0 - 1)^{3/2}}\cos^{-1}\left[1 - 2(1 - \Omega_0^{-1})\frac{a}{a_0}\right] - \frac{1}{\Omega_0 - 1}\left[\Omega_0\frac{a}{a_0} - (\Omega_0 - 1)\left(\frac{a}{a_0}\right)^2\right]^{1/2}\right\},$$

对 $\Omega_0 < 1$,

$$t = H_0^{-1}\left\{\frac{-\Omega_0}{2(1 - \Omega_0)^{3/2}}\cosh^{-1}\left[1 - 2(1 - \Omega_0^{-1})\frac{a}{a_0}\right] + \frac{1}{1 - \Omega_0}\left[\Omega_0\frac{a}{a_0} + (1 - \Omega_0)\left(\frac{a}{a_0}\right)^2\right]^{1/2}\right\}.$$

(b) 由以上三式导出 $\Omega_0 = 1$, $\Omega_0 > 1$ 和 $\Omega_0 < 1$ 三种情况下当今宇宙年龄 t_0 的表达式.

解 (a) 引入哈勃参数 $H(t) = \dot{a}(t)/a(t)$ 和密度参数 $\Omega(t)$, 式 (10-3-8) 和 (10-3-12) 给出

$$H^2 = \frac{8\pi\rho}{3} - \frac{k}{a^2}, \quad \Omega = \frac{8\pi\rho}{3H^2}.$$

由此可解出 ρ 和 a : 当 $k = 0$ 时, $\Omega = 1$,

$$\rho = \frac{3H^2}{8\pi};$$

当 $k = \pm 1$ 时, $\Omega > 1$,

$$\rho = \frac{3H^2\Omega}{8\pi}, \quad a = \frac{1}{|\Omega - 1|^{1/2}|H|}.$$

另外由式 (10-2-25) 知对物质 (尘埃) 宇宙 $8\pi\rho a^3/3 = A$ 为常数, 于是对 $k = 0$ ($\Omega = 1$):

$$A = \frac{8\pi}{3}\frac{3H^2}{8\pi}a^3 = H^2a^3 = H_0^2a_0^3;$$

对 $k = \pm 1$ ($\Omega \gtrless 1$):

$$\begin{aligned} A &= \frac{8\pi}{3} \frac{3H^2\Omega}{8\pi} \frac{1}{|\Omega - 1|^{3/2}|H|^3} = \frac{\Omega}{|\Omega - 1|^{3/2}|H|} = \frac{\Omega_0}{|\Omega_0 - 1|^{3/2}|H_0|} \\ &= \frac{\Omega_0 a_0}{|\Omega_0 - 1|}, \end{aligned}$$

最后一步利用了 $a_0 = \frac{1}{|\Omega_0 - 1|^{1/2}|H_0|}$. 注意到当今是膨胀宇宙, 故 $H_0 > 0$, $|H_0| = H_0$.

把以上关系代入物质宇宙的解, 式 (10-2-29a)–(10-2-29c). 对 $k = 0$ ($\Omega_0 = 1$), 式 (10-2-29b) 给出:

$$\begin{aligned} t &= \left(\frac{4}{9A}\right)^{1/2} a^{3/2} = \frac{2}{3A^{1/2}} a^{3/2} = \frac{2}{3(H_0^2 a_0^3)^{1/2}} a^{3/2} \\ &= \frac{2}{3} H_0^{-1} \left(\frac{a}{a_0}\right)^{3/2}. \end{aligned}$$

对 $k = +1$ ($\Omega_0 > 1$), 式 (10-2-29a) 第一式给出:

$$\begin{aligned} \hat{t} &= \arccos\left(1 - \frac{2a}{A}\right) = \arccos\left[1 - \frac{2a}{\Omega_0 a_0 / (\Omega_0 - 1)}\right] \\ &= \arccos\left[1 - 2(1 - \Omega_0^{-1}) \frac{a}{a_0}\right], \end{aligned}$$

有

$$\begin{aligned} \sin \hat{t} &= (1 - \cos^2 \hat{t})^{1/2} = \left\{1 - \left[1 - 2(1 - \Omega_0^{-1}) \frac{a}{a_0}\right]^2\right\}^{1/2} \\ &= \left\{4(1 - \Omega_0^{-1}) \frac{a}{a_0} - 4(1 - \Omega_0^{-1})^2 \left(\frac{a}{a_0}\right)^2\right\}^{1/2} \\ &= \frac{2(\Omega_0 - 1)^{1/2}}{\Omega_0} \left[\Omega_0 \frac{a}{a_0} - (\Omega_0 - 1) \left(\frac{a}{a_0}\right)^2\right]^{1/2}, \end{aligned}$$

代入第二式得

$$\begin{aligned} t &= \frac{\Omega_0}{2(\Omega_0 - 1)^{3/2} H_0} \left\{ \arccos\left[1 - 2(1 - \Omega_0^{-1}) \frac{a}{a_0}\right] \right. \\ &\quad \left. - \frac{2(\Omega_0 - 1)^{1/2}}{\Omega_0} \left[\Omega_0 \frac{a}{a_0} - (\Omega_0 - 1) \left(\frac{a}{a_0}\right)^2\right]^{1/2} \right\} \\ &= H_0^{-1} \left\{ \frac{\Omega_0}{2(\Omega_0 - 1)^{3/2}} \arccos\left[1 - 2(1 - \Omega_0^{-1}) \frac{a}{a_0}\right] \right. \\ &\quad \left. - \frac{1}{\Omega_0 - 1} \left[\Omega_0 \frac{a}{a_0} - (\Omega_0 - 1) \left(\frac{a}{a_0}\right)^2\right]^{1/2} \right\}. \end{aligned}$$

对 $k = -1$ ($\Omega_0 < 1$), 式 (10-2-29c) 第一式给出:

$$\begin{aligned} \hat{t} &= \operatorname{arccosh}\left(1 + \frac{2a}{A}\right) = \operatorname{arccosh}\left[1 + \frac{2a}{\Omega_0 a_0 / (1 - \Omega_0)}\right] \\ &= \operatorname{arccosh}\left[1 - 2(1 - \Omega_0^{-1}) \frac{a}{a_0}\right], \end{aligned}$$

有

$$\begin{aligned}\sinh \hat{t} &= (\cosh^2 \hat{t} - 1)^{1/2} = \left\{ \left[1 - 2(1 - \Omega_0^{-1}) \frac{a}{a_0} \right]^2 - 1 \right\}^{1/2} \\ &= \left\{ -4(1 - \Omega_0^{-1}) \frac{a}{a_0} + 4(1 - \Omega_0^{-1})^2 \left(\frac{a}{a_0} \right)^2 \right\}^{1/2} \\ &= \frac{2(1 - \Omega_0)^{1/2}}{\Omega_0} \left[\Omega_0 \frac{a}{a_0} + (1 - \Omega_0) \left(\frac{a}{a_0} \right)^2 \right]^{1/2},\end{aligned}$$

代入第二式得

$$\begin{aligned}t &= \frac{\Omega_0}{2(1 - \Omega_0)^{3/2} H_0} \left\{ -\operatorname{arccosh} \left[1 - 2(1 - \Omega_0^{-1}) \frac{a}{a_0} \right] \right. \\ &\quad \left. + \frac{2(1 - \Omega_0)^{1/2}}{\Omega_0} \left[\Omega_0 \frac{a}{a_0} + (1 - \Omega_0) \left(\frac{a}{a_0} \right)^2 \right]^{1/2} \right\} \\ &= H_0^{-1} \left\{ -\frac{\Omega_0}{2(1 - \Omega_0)^{3/2}} \operatorname{arccosh} \left[1 - 2(1 - \Omega_0^{-1}) \frac{a}{a_0} \right] \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{1 - \Omega_0} \left[\Omega_0 \frac{a}{a_0} + (1 - \Omega_0) \left(\frac{a}{a_0} \right)^2 \right]^{1/2} \right\} \\ &= H_0^{-1} \left\{ \frac{\Omega_0}{2(\Omega_0 - 1)^{3/2}} \operatorname{arccosh} \left[1 - 2(1 - \Omega_0^{-1}) \frac{a}{a_0} \right] \right. \\ &\quad \left. - \frac{1}{\Omega_0 - 1} \left[\Omega_0 \frac{a}{a_0} - (\Omega_0 - 1) \left(\frac{a}{a_0} \right)^2 \right]^{1/2} \right\},\end{aligned}$$

可见只须把前一种情形的 \arccos 换成 $\operatorname{arccosh}$, 其他不变.

(b) 对于当今宇宙年龄, 取上式中 $a = a_0$, 故得:

若 $\Omega_0 = 1$,

$$t_0 = \frac{2}{3} H_0^{-1};$$

若 $\Omega_0 > 1$,

$$\begin{aligned}t_0 &= H_0^{-1} \left\{ \frac{\Omega_0}{2(\Omega_0 - 1)^{3/2}} \arccos \left[1 - 2(1 - \Omega_0^{-1}) \right] - \frac{1}{\Omega_0 - 1} \left[\Omega_0 - (\Omega_0 - 1) \right]^{1/2} \right\} \\ &= H_0^{-1} \left[\frac{\Omega_0}{2(\Omega_0 - 1)^{3/2}} \arccos(2\Omega_0^{-1} - 1) - \frac{1}{\Omega_0 - 1} \right];\end{aligned}$$

若 $\Omega_0 < 1$,

$$\begin{aligned}t_0 &= H_0^{-1} \left\{ -\frac{\Omega_0}{2(1 - \Omega_0)^{3/2}} \operatorname{arccosh} \left[1 - 2(1 - \Omega_0^{-1}) \right] + \frac{1}{1 - \Omega_0} \left[\Omega_0 + (1 - \Omega_0) \right]^{1/2} \right\} \\ &= H_0^{-1} \left[-\frac{\Omega_0}{2(1 - \Omega_0)^{3/2}} \operatorname{arccosh}(2\Omega_0^{-1} - 1) + \frac{1}{1 - \Omega_0} \right].\end{aligned}$$

可以证明: 对于 $\Omega_0 \gtrless 1$ 情形, 如果取极限 $\Omega_0 \rightarrow 1$, 它们都回到 $t_0 = \frac{2}{3} H_0^{-1}$. 因此如果把 t_0 表示成

$$t_0 = H_0^{-1} f(\Omega_0),$$

其中

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2(x-1)^{3/2}} \arccos(2x^{-1} - 1) - \frac{1}{x-1}, & x < 1, \\ \frac{2}{3}, & x = 1, \\ \frac{x}{2(x-1)^{3/2}} \operatorname{arccosh}(2x^{-1} - 1) - \frac{1}{x-1}, & x > 1. \end{cases}$$

$f(x)$ 为单调递减函数, $f(0) = 1$ 而 $f(2) = \frac{\pi}{2} - 1 = 0.5708$.

5. 试证含 Λ 项的爱因斯坦方程即使无物质场 ($T_{ab} = 0$) 也不允许平直度规解.
提示: 从含 Λ 项的爱因斯坦方程出发求得 R 与 T 的关系, 以此消去方程中的 R , 便发现 $T_{ab} = 0$ 时 R_{ab} 不能为零.

证 含 Λ 项的爱因斯坦方程为

$$G_{ab} + \Lambda g_{ab} = R_{ab} - \frac{1}{2} R g_{ab} + \Lambda g_{ab} = 8\pi T_{ab}.$$

两边作用 (求迹) g^{ab} 得:

$$R - \frac{1}{2} R \delta^a_a + \Lambda \delta^a_a = 8\pi T^a_a = 8\pi T,$$

其中 $T \equiv T^a_a$ 为物质场能动张量的迹. 因 4 维时空的 $\delta^a_a = 4$, 故有

$$4\Lambda - R = 8\pi T,$$

即 $R = 4\Lambda - 8\pi T$. 代回爱因斯坦方程得:

$$R_{ab} - \frac{1}{2} (4\Lambda - 8\pi T) g_{ab} + \Lambda g_{ab} = R_{ab} - \Lambda g_{ab} + 4\pi T g_{ab} = 8\pi T_{ab},$$

于是知里奇张量满足

$$R_{ab} = \Lambda g_{ab} + 8\pi T_{ab} - 4\pi T g_{ab}.$$

可见即使无物质场 ($T_{ab} = 0, T = 0$), $R_{ab} = \Lambda g_{ab} \neq 0$, 时空也非平直.

6. 试证 $k = -1$ 和 $k = +1$ 的 RW 度规也是 (局部) 共形平直的.

提示: 用式 (10-4-2) 定义 \hat{t} , 把式 (10-1-23a) 和 (10-1-23c) 的线元改用坐标 $\hat{t}, \psi, \theta, \varphi$ 表出, 再分别对 $k = -1$ 和 $k = +1$ 的情况做如下坐标变换 $(\hat{t}, \psi) \mapsto (\tilde{t}, \tilde{r})$:

对 $k = -1$, 令

$$\tilde{t} = e^{\hat{t}} \cosh \psi, \quad \tilde{r} = e^{\hat{t}} \sinh \psi,$$

对 $k = +1$, 令

$$\tilde{t} = \tan \frac{1}{2}(\hat{t} + \psi) + \tan \frac{1}{2}(\hat{t} - \psi), \quad \tilde{r} = \tan \frac{1}{2}(\hat{t} + \psi) - \tan \frac{1}{2}(\hat{t} - \psi),$$

则线元分别取如下的明显共形平直形式:

对 $k = -1$,

$$ds^2 = a^2(t(\hat{t}))e^{-2\hat{t}}[-d\hat{t}^2 + d\hat{r}^2 + \hat{r}^2(d\theta^2 + \sin^2\theta d\varphi^2)] ,$$

对 $k = +1$,

$$ds^2 = \frac{a^2(t(\hat{t}))}{4}(\cos\hat{t} + \cos\psi)^2[-d\hat{t}^2 + d\hat{r}^2 + \hat{r}^2(d\theta^2 + \sin^2\theta d\varphi^2)] .$$

证 引入新坐标

$$\hat{t}(t) \equiv \int_0^t dt'/a(t') ,$$

有 $d\hat{t} = dt/a(t)$ 或 $a(\hat{t})d\hat{t} = dt$, 故 $a^2(\hat{t})d\hat{t}^2 = dt^2$. 于是线元 (10-1-23a) 和 (10-1-23c) 分别为

$$\begin{aligned} ds^2 &= a^2(\hat{t})[-d\hat{t}^2 + d\psi^2 + \sin^2\psi(d\theta^2 + \sin^2\theta d\varphi^2)] , & [\text{对 } k = +1] , \\ ds^2 &= a^2(\hat{t})[-d\hat{t}^2 + d\psi^2 + \sinh^2\psi(d\theta^2 + \sin^2\theta d\varphi^2)] , & [\text{对 } k = -1] . \end{aligned}$$

对 $k = +1$, 令

$$\tilde{t} = \tan\frac{1}{2}(\hat{t} + \psi) + \tan\frac{1}{2}(\hat{t} - \psi) , \quad \tilde{r} = \tan\frac{1}{2}(\hat{t} + \psi) - \tan\frac{1}{2}(\hat{t} - \psi) ,$$

其逆变换为

$$\hat{t} = \arctan\frac{1}{2}(\tilde{t} + \tilde{r}) + \arctan\frac{1}{2}(\tilde{t} - \tilde{r}) , \quad \psi = \arctan\frac{1}{2}(\tilde{t} + \tilde{r}) - \arctan\frac{1}{2}(\tilde{t} - \tilde{r}) .$$

于是

$$\begin{aligned} d\hat{t} &= \frac{(d\tilde{t} + d\tilde{r})/2}{1 + [\frac{1}{2}(\tilde{t} + \tilde{r})]^2} + \frac{(d\tilde{t} - d\tilde{r})/2}{1 + [\frac{1}{2}(\tilde{t} - \tilde{r})]^2} \\ &= \frac{(d\tilde{t} + d\tilde{r})/2}{1 + \tan^2\frac{1}{2}(\hat{t} + \psi)} + \frac{(d\tilde{t} - d\tilde{r})/2}{1 + \tan^2\frac{1}{2}(\hat{t} - \psi)} \\ &= \frac{\cos^2\frac{1}{2}(\hat{t} + \psi)}{2}(d\tilde{t} + d\tilde{r}) + \frac{\cos^2\frac{1}{2}(\hat{t} - \psi)}{2}(d\tilde{t} - d\tilde{r}) , \\ d\psi &= \frac{(d\tilde{t} + d\tilde{r})/2}{1 + [\frac{1}{2}(\tilde{t} + \tilde{r})]^2} - \frac{(d\tilde{t} - d\tilde{r})/2}{1 + [\frac{1}{2}(\tilde{t} - \tilde{r})]^2} \\ &= \frac{(d\tilde{t} + d\tilde{r})/2}{1 + \tan^2\frac{1}{2}(\hat{t} + \psi)} - \frac{(d\tilde{t} - d\tilde{r})/2}{1 + \tan^2\frac{1}{2}(\hat{t} - \psi)} \\ &= \frac{\cos^2\frac{1}{2}(\hat{t} + \psi)}{2}(d\tilde{t} + d\tilde{r}) - \frac{\cos^2\frac{1}{2}(\hat{t} - \psi)}{2}(d\tilde{t} - d\tilde{r}) , \end{aligned}$$

得

$$\begin{aligned} -d\hat{t}^2 + d\psi^2 &= -(d\hat{t} + d\psi)(d\hat{t} - d\psi) \\ &= -\cos^2[(\hat{t} + \psi)/2](d\tilde{t} + d\tilde{r})\cos^2[(\hat{t} - \psi)/2](d\tilde{t} - d\tilde{r}) \\ &= \{\cos[(\hat{t} + \psi)/2]\cos[(\hat{t} - \psi)/2]\}^2(-d\tilde{t}^2 + d\tilde{r}^2) \\ &= \frac{1}{4}(\cos\hat{t} + \cos\psi)^2(-d\tilde{t}^2 + d\tilde{r}^2) . \end{aligned}$$

另一方面, 因 $\sin^2 \psi = \frac{\tan^2 \psi}{1 + \tan^2 \psi}$, 而

$$\begin{aligned} \tan \psi &= \tan \left[\arctan \frac{1}{2}(\tilde{t} + \tilde{r}) - \arctan \frac{1}{2}(\tilde{t} - \tilde{r}) \right] \\ &= \frac{\frac{1}{2}(\tilde{t} + \tilde{r}) - \frac{1}{2}(\tilde{t} - \tilde{r})}{1 + \frac{1}{4}(\tilde{t} + \tilde{r})(\tilde{t} - \tilde{r})} = \frac{\tilde{r}}{1 + \frac{1}{4}(\tilde{t} + \tilde{r})(\tilde{t} - \tilde{r})}, \end{aligned}$$

得

$$\sin^2 \psi = \frac{\tilde{r}^2}{\tilde{r}^2 + [1 + \frac{1}{4}(\tilde{t} + \tilde{r})(\tilde{t} - \tilde{r})]^2},$$

其中分母

$$\begin{aligned} &\tilde{r}^2 + \left[1 + \frac{1}{4}(\tilde{t} + \tilde{r})(\tilde{t} - \tilde{r})\right]^2 \\ &= \left[\tan \frac{1}{2}(\hat{t} + \psi) - \tan \frac{1}{2}(\hat{t} - \psi)\right]^2 + \left[1 + \tan \frac{1}{2}(\hat{t} + \psi) \tan \frac{1}{2}(\hat{t} - \psi)\right]^2 \\ &= \frac{4}{(\cos \hat{t} + \cos \psi)^2}. \end{aligned}$$

因此有

$$\sin^2 \psi = \frac{1}{4}(\cos \hat{t} + \cos \psi)^2 \tilde{r}^2.$$

将以上结果代回 $k = +1$ 的线元表达式:

$$\begin{aligned} ds^2 &= a^2 \left[\frac{1}{4}(\cos \hat{t} + \cos \psi)^2 (-d\tilde{t}^2 + d\tilde{r}^2) + \frac{1}{4}(\cos \hat{t} + \cos \psi)^2 \tilde{r}^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2) \right] \\ &= \frac{a^2}{4}(\cos \hat{t} + \cos \psi)^2 [-d\tilde{t}^2 + d\tilde{r}^2 + \tilde{r}^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2)]. \end{aligned}$$

对 $k = -1$, 令

$$\tilde{t} = e^{\hat{t}} \cosh \psi, \quad \tilde{r} = e^{\hat{t}} \sinh \psi,$$

其逆变换为

$$\hat{t} = \frac{1}{2} \ln(\tilde{t}^2 - \tilde{r}^2), \quad \psi = \operatorname{arctanh}(\tilde{r}/\tilde{t}).$$

于是

$$\begin{aligned} d\hat{t} &= \frac{\tilde{t}d\tilde{t} - \tilde{r}d\tilde{r}}{\tilde{t}^2 - \tilde{r}^2} = e^{-2\hat{t}}(\tilde{t}d\tilde{t} - \tilde{r}d\tilde{r}), \\ d\psi &= \frac{1}{1 - (\tilde{r}/\tilde{t})^2} \frac{\tilde{t}d\tilde{r} - \tilde{r}d\tilde{t}}{\tilde{t}^2} = \frac{\tilde{t}d\tilde{r} - \tilde{r}d\tilde{t}}{\tilde{t}^2 - \tilde{r}^2} = e^{-2\hat{t}}(\tilde{t}d\tilde{r} - \tilde{r}d\tilde{t}), \end{aligned}$$

得

$$\begin{aligned} -d\hat{t}^2 + d\psi^2 &= -e^{-4\hat{t}}(\tilde{t}d\tilde{t} - \tilde{r}d\tilde{r})^2 + e^{-4\hat{t}}(\tilde{t}d\tilde{r} - \tilde{r}d\tilde{t})^2 \\ &= e^{-4\hat{t}}(\tilde{t}^2 - \tilde{r}^2)(-d\tilde{t}^2 + d\tilde{r}^2) \\ &= e^{-2\hat{t}}(-d\tilde{t}^2 + d\tilde{r}^2) \end{aligned}$$

另一方面, 因 $\sinh^2 \psi = \frac{\tanh^2 \psi}{1 - \tanh^2 \psi}$, 而 $\tanh \psi = \tilde{r}/\tilde{t}$, 得

$$\sinh^2 \psi = \frac{\tilde{r}^2}{\tilde{t}^2 - \tilde{r}^2} = e^{-2\hat{t}} \tilde{r}^2.$$

将以上结果代回 $k = -1$ 的线元表达式:

$$\begin{aligned} ds^2 &= a^2 [e^{-2\hat{t}} (-d\tilde{t}^2 + d\tilde{r}^2) + e^{-2\hat{t}} \tilde{r}^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2)] \\ &= a^2 e^{-2\hat{t}} [-d\tilde{t}^2 + d\tilde{r}^2 + \tilde{r}^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2)]. \end{aligned}$$

综上所述, 对 $k = +1$ 和 $k = -1$, RW 度规也是 (局部) 共形平直的, 共形联系的正定函数分别为 $\frac{a^2}{4}(\cos \hat{t} + \cos \psi)^2$ 和 $a^2 e^{-2\hat{t}}$.

- ~7. 设 p 为各向同性观者 G 世界线上的一点, 试证 G 在 t_p 时刻的视界距离满足式 (10-4-5). 提示: 利用式 (10-1-28) 和 (10-2-7).

证 等时面上两点的距离由式 (10-4-5) 给出:

$$D_{AB}(t) = a(t) \int_{r_A}^{r_B} \frac{dr}{\sqrt{1 - kr^2}}.$$

取 A 为各向同性观者 G 世界线上的一点 p , B 为视界边界, 径向坐标为 r_B , 则

$$D_H(t_p) = a(t_p) \int_0^{r_B} \frac{dr}{\sqrt{1 - kr^2}}.$$

另一方面, 任一径向类光测地线的参数式 $\{t(\beta), r(\beta)\}$ 满足方程 (10-2-7):

$$\left(\frac{dt}{d\beta}\right)^2 = \frac{a^2}{1 - kr^2} \left(\frac{dr}{d\beta}\right)^2,$$

即对内向类光测地线有关系:

$$\frac{dr}{dt} = -\frac{\sqrt{1 - kr^2}}{a(t)}.$$

由视界距离的定义 (参见图 10-16) 知类光测地线从 $\{0, r_B\}$ 传到 $\{t_p, 0\}$, 因此,

$$\begin{aligned} D_H(t_p) &= a(t_p) \int_{t_p}^0 \frac{1}{\sqrt{1 - kr^2}} \left[-\frac{\sqrt{1 - kr^2}}{a(t)} \right] dt \\ &= a(t_p) \int_0^{t_p} \frac{dt}{a(t)}. \end{aligned}$$

此即式 (10-4-5).

- *8. (a) 设 $\eta(\beta)$ 是径向 ($d\theta/d\beta = d\varphi/d\beta = 0$) 类光测地线, $p_1 = (t_1, \psi_1, \theta, \varphi)$ 和 $p_2 = (t_2, \psi_2, \theta, \varphi)$ 是 η 上任意两点, 试证对 $k = 1, 0, -1$ 三种情况都有

$$\psi_2 - \psi_1 = \int_{t_1}^{t_2} dt/a(t) .$$

(b) 对 $k = 1$ 的宇宙, 从大爆炸奇点发出的任一径向光线在膨胀着的 3 球面上沿大圆弧前进. 试证: (b1) 对物质宇宙, 该光线在 3 球面膨胀至最大时刚走完半个大圆, 在 3 球面又缩为一点 (大挤压) 时刚走完一个大圆. 因此, 在球面膨胀至最大时任一各向同性观者只要向各个方向看去, 总能看到任一各向同性粒子发来的光, 表明他的粒子视界从膨胀至最大时开始消失 [参见 Wald (1984) P.106]. (b2) 对辐射宇宙, 该光线在 3 球面又缩为一点 (大挤压) 时刚刚走完半个大圆. 因此, 任一各向同性观者的任一时刻都存在粒子视界.

证 (a) 考虑到类光测地线满足的条件式 (10-2-7), 它的外向形式为:

$$\frac{dr}{dt} = \frac{\sqrt{1 - kr^2}}{a(t)} .$$

再利用关系式 (10-1-24), 对 $k = +1$,

$$\psi_2 - \psi_1 = \arcsin r_2 - \arcsin r_1 = \int_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{\sqrt{1 - r^2}} = \int_{t_1}^{t_2} \frac{dt}{a(t)} ;$$

对 $k = 0$,

$$\psi_2 - \psi_1 = r_2 - r_1 = \int_{r_1}^{r_2} dr = \int_{t_1}^{t_2} \frac{dt}{a(t)} ;$$

对 $k = -1$,

$$\psi_2 - \psi_1 = \operatorname{arcsinh} r_2 - \operatorname{arcsinh} r_1 = \int_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{\sqrt{1 + r^2}} = \int_{t_1}^{t_2} \frac{dt}{a(t)} .$$

因此, 综合有

$$\psi_2 - \psi_1 = \int_{t_1}^{t_2} \frac{dt}{a(t)} .$$

(b1) 对 $k = 1$ 的物质宇宙, 尺度因子的解为式 (10-2-29a):

$$a = A(1 - \cos \hat{t})/2 , \quad t = A(\hat{t} - \sin \hat{t})/2 .$$

由此可知当 3 球面膨胀至最大时 $\hat{t} = \pi$, $t = A\pi/2$. 从坐标 $(0, 0, \theta, \varphi)$ 出发的光子这时走到 $(A\pi/2, \psi, \theta, \varphi)$, 其中 ψ 坐标根据 (a) 的结果为

$$\psi = \int_0^{A\pi/2} \frac{dt}{a(t)} = \int_0^\pi d\hat{t} = \pi ,$$

正好为 3 球面的半个大圆弧. 其后当 3 球面收缩 (大挤压) 到一点时 $\hat{t} = 2\pi$, $t = A\pi$, 这时光子的 ψ 坐标从 π 缩为零, 到大挤压的一点时它的坐标为 $(A\pi, 0, \theta, \varphi)$, 刚好走完 3 球面的一个大圆弧.

另外从 3 球面的体积公式 (10-1-29) 可以知道, 当 $\psi < \pi$ 时, 与之对应的 3 球面的体积占全体积的

$$\frac{\int_0^\psi \sin^2 \psi' d\psi'}{\int_0^\pi \sin^2 \psi' d\psi'} = \frac{1}{\pi}(\psi - \sin \psi \cos \psi) .$$

于是不难想象在宇宙膨胀至最大之前, 即当 $\hat{t} < \pi$ ($t < A\pi/2$) 时, 由 $\psi = \hat{t}$ 知, 粒子视界占全空间的体积随时间的变化关系为

$$\eta(t) = \frac{1}{\pi}(\hat{t} - \sin \hat{t} \cos \hat{t}) , \quad t = A(\hat{t} - \sin \hat{t})/2 .$$

它从 0 开始增长到 1, 当宇宙开始收缩, 粒子视界仍是全空间. 而且容易算得, 当 t (即 \hat{t}) 很小时,

$$\begin{aligned} \hat{t} &= \left(\frac{12}{A}\right)^{1/3} t^{1/3} + \frac{1}{5A}t + O(t^{5/2}) , \\ \eta(t) &= \frac{8}{A\pi}t - \frac{31104^{1/3}}{5A^{5/3}\pi}t^{5/3} + O(t^{7/3}) , \end{aligned}$$

粒子视界初始随时间线性增长. 当 t 接近 $A\pi/2$ (即 \hat{t} 接近 π) 时, 令 $\bar{t} \equiv \pi - \hat{t}$, $\bar{t} \equiv \frac{A\pi}{2} - t$, 则以上的关系变为

$$\eta(\bar{t}) = 1 - \frac{1}{\pi}(\bar{t} - \sin \bar{t} \cos \bar{t}) , \quad \bar{t} = A(\bar{t} + \sin \bar{t})/2 .$$

容易算得

$$\begin{aligned} \bar{t} &= \frac{1}{A}\bar{t} + \frac{1}{12A^3}\bar{t}^3 + O(\bar{t}^5) , \\ \eta(\bar{t}) &= 1 - \frac{2}{3A^3\pi}\bar{t}^3 - \frac{1}{30A^5\pi}\bar{t}^5 + O(\bar{t}^7) . \end{aligned}$$

因此当宇宙膨胀至最大前, $\eta(t)$ 以以下方式趋于饱和:

$$\eta(t) = 1 - \frac{2}{3A^3\pi}\left(\frac{A\pi}{2} - t\right)^3 - \frac{1}{30A^5\pi}\left(\frac{A\pi}{2} - t\right)^5 + \dots .$$

(b2) 对 $k = 1$ 的辐射宇宙, 尺度因子的解为式 (10-2-24a):

$$a = \sqrt{2Bt - t^2} .$$

由此可知当 3 球面膨胀至最大时 $t = B$. 从坐标 $(0, 0, \theta, \varphi)$ 发出的光子这时走到 $(B, \psi, \theta, \varphi)$, 其中 ψ 坐标根据 (a) 的结果为

$$\psi = \int_0^B \frac{dt}{a(t)} = \int_0^B \frac{dt}{\sqrt{2Bt - t^2}} = \frac{\pi}{2} ,$$

正好为 3 球面的 $1/4$ 个大圆弧. 其后当 3 球面收缩 (大挤压) 到一点时 $t = 2B$, 这时光子的 ψ 坐标从 $\pi/2$ 增至 π , 到大挤压的一点时它的坐标为 $(2B, \pi, \theta, \varphi)$, 刚好走完 3 球面的半个大圆弧.

类似地也可求出辐射宇宙从大爆炸到大挤压的整个历史中粒子视界占整个空间的比例函数 $\eta(t)$ 的演化. 因

$$\psi(t) = \int_0^t \frac{dt'}{\sqrt{2Bt' - t'^2}} = 2 \arctan \sqrt{\frac{t}{2B - t}},$$

故得

$$\begin{aligned} \eta(t) &= \frac{1}{\pi}(\psi - \sin \psi \cos \psi) \\ &= \frac{1}{\pi} \left[2 \arctan \sqrt{\frac{t}{2B - t}} - \frac{(B - t)\sqrt{2Bt - t^2}}{B^2} \right]. \end{aligned}$$

它在大爆炸 ($t = 0$)、最大宇宙 ($t = B$) 和大挤压 ($t = 2B$) 附近的行为分别为:

$$\begin{aligned} \eta(t) &= \frac{4\sqrt{2}}{3B^{3/2}\pi} t^{3/2} - \frac{\sqrt{2}}{5B^{5/2}\pi} t^{5/2} + O(t^{7/2}), \\ \eta(t) &= \frac{1}{2} + \frac{2}{B\pi}(t - B) - \frac{1}{3B^3\pi}(t - B)^3 + O((t - B)^5), \\ \eta(t) &= 1 - \frac{4\sqrt{2}}{3B^{3/2}\pi}(2B - t)^{3/2} - \frac{\sqrt{2}}{5B^{5/2}\pi}(2B - t)^{5/2} + O((2B - t)^{7/2}). \end{aligned}$$

显然大爆炸和大挤压两点是对称的, 演化的对称中心就是最大宇宙, 因为成立关系

$$\eta(t) + \eta(2B - t) = 1.$$

{ (Dis)claimer: Since I thank no one for helping me in solving these problems, all errors are definitely my own. — 639 }