LABORATORIO DE VIROLOGÍA

TOMA DE MUESTRAS PARA ESTUDIOS VIROLÓGICOS

ORINA

TOMA DE LA MUESTRA

Lactantes: higienizar la zona genital con agua y jabón y colocar una bolsa colectora (3 a 15 ml).

Niños mayores y adultos: recoger el chorro medio de la primera micción en un recipiente estéril de boca ancha.

CONDICIONES PARA SU CONSERVACIÓN

Etiquetar el contenedor.

Refrigerar a 4 °C hasta su entrega al laboratorio.

Entregar dentro de las 6 horas.

SANGRE

TOMA DE LA MUESTRA

Desinfectar la piel con etanol al 70% y dejar secar 1 minuto.

Adultos: 5-10 ml. Niños: 1-3 ml.

Muestras pareadas: la primera en etapa aguda (primeros 7 días) y la segunda en convalecencia (15 a 20 días después).

No se aceptan muestras lipémicas, hemolizadas, contaminadas ni menores a 0,5 ml.

CONDICIONES PARA SU CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura ambiente hasta su entrega al laboratorio.

HISOPADO DE VESÍCULAS EN PIEL / MUCOSAS

TOMA DE LA MUESTRA

Vesícula intacta: punzar con aguja fina y recoger el fluido con un hisopo estéril, rotándolo.

Vesícula con costra: evitar la toma en este período (poca carga viral). Solo si es imprescindible, levantar el borde de la costra y rotar el hisopo por debajo, sin retirarla.

CONDICIONES PARA SU CONSERVACIÓN

Etiquetar el contenedor.

Enviar lo antes posible.

Refrigerar a 4 °C hasta su entrega al laboratorio.

LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO

TOMA DE LA MUESTRA

Toma a cargo de personal médico entrenado, con estricta asepsia.

Recuperar aproximadamente 1-2 ml y verterlos en un tubo estéril.

Tomar la muestra dentro de los primeros 5 días del inicio de los síntomas.

CONDICIONES PARA SU CONSERVACIÓN

Enviar rápidamente, con refrigerantes.

Refrigerar a 4 °C. Entregar dentro de las 8 horas.

LÍQUIDO PLEURAL / PERICÁRDICO

TOMA DE LA MUESTRA

Con estricta asepsia, recuperar aproximadamente 2 ml y verterlos en un tubo de plástico estéril con tapa a rosca.

CONDICIONES PARA SU CONSERVACIÓN

Etiquetar el contenedor.

Refrigerar a 4 °C hasta su entrega al laboratorio.

Entregar dentro de las 6 horas.

MATERIA FECAL

TOMA DE LA MUESTRA

Muestra reciente (menos de 24 h).

Semisólida: cantidad similar a un garbanzo (aprox. 1 g). Líquida: 1-2 ml.

Recoger con un hisopo de Dacrón seco y estéril.

CONDICIONES PARA SU CONSERVACIÓN

Refrigerar a 4 °C desde la recolección hasta su entrega al laboratorio.

Transportar con refrigerantes congelados.

MÉDULA ÓSEA

TOMA DE LA MUESTRA

Toma a cargo del hematólogo, en quirófano.

Recuperar aproximadamente 0,5 a 3 ml en un tubo estéril con EDTA y mezclar por inversión.

NUNCA USAR TUBOS CON HEPARINA: inhibe la PCR.

Rotular el tubo indicando que contiene médula ósea (MO).

CONDICIONES PARA SU CONSERVACIÓN

Etiquetar el contenedor.

Refrigerar a 4 °C hasta su entrega al laboratorio.

Entregar dentro de las 6 horas.

BIOPSIAS

TOMA DE LA MUESTRA

Colocar el tejido en un tubo de plástico seco o con solución fisiológica. No usar formol.

Virosis cutáneas, hígado o riñón: fragmento de aprox. 2 mm.

Encefalitis (*post mortem*): inmediatamente después del fallecimiento, aprox. 1 cm^3 de corteza cerebral y 5 mm de médula espinal, cerebro y cerebelo.

CONDICIONES PARA SU CONSERVACIÓN

Refrigerar a 4 °C hasta su entrega al laboratorio.

HISOPADO FARÍNGEO

TOMA DE LA MUESTRA

Frotar con un hisopo de Dacrón estéril las áreas hiperémicas y las membranas de las lesiones.

Evitar tocar la lengua, la úvula y los carrillos.

CONDICIONES PARA SU CONSERVACIÓN

Usar medio de transporte viral o, si no hay, agregar 1 ml de solución fisiológica.

Enviar inmediatamente.

Refrigerar a 4 °C hasta su entrega al laboratorio.

HISOPADO NASOFARÍNGEO

TOMA DE LA MUESTRA

Introducir un hisopo de Dacrón estéril al menos 1 cm en la fosa nasal.

CONDICIONES PARA SU CONSERVACIÓN

Etiquetar el contenedor.

Enviar lo antes posible.

Refrigerar a 4 °C hasta su entrega al laboratorio.

ASPIRADO NASOFARÍNGEO

TOMA DE LA MUESTRA

Aspirar las secreciones con una sonda nasogástrica conectada a una fuente de succión (bomba de vacío o jeringa de 20 ml).

Descargar el contenido en un tubo cónico con 2 o 3 ml de solución fisiológica.

CONDICIONES PARA SU CONSERVACIÓN

Etiquetar el contenedor.

Enviar lo antes posible.

Refrigerar a 4 °C hasta su entrega al laboratorio.