

Medium 266 8 Add to List Share

Return the total number of **bad pairs** in `nums`.

```
Input: nums = [4,1,3,3]
Output: 5
Explanation: The pair (0, 1) is a bad pair since  $1 - 0 \neq 1 - 4$ .
The pair (0, 2) is a bad pair since  $2 - 0 \neq 3 - 4$ ,  $2 \neq -1$ .
The pair (0, 3) is a bad pair since  $3 - 0 \neq 3 - 4$ ,  $3 \neq -1$ .
The pair (1, 2) is a bad pair since  $2 - 1 \neq 3 - 1$ ,  $1 \neq 2$ .
The pair (2, 3) is a bad pair since  $3 - 2 \neq 3 - 3$ ,  $1 \neq 0$ .
There are a total of 5 bad pairs, so we return 5.
```

Input: nums = [1,2,3,4,5]
Output: 0
Explanation: There are no bad pairs.

- $1 \leq \text{nums.length} \leq 10^5$
- $1 \leq \text{nums}[i] \leq 10^9$

Seen this question in a real interview before?	Yes	No

Similar Questions

Show Hint 1

Show Hint 2

Show Hint 3

```
1 class Solution {
2     public long countBadPairs(int[] nums) {
3
4     }
5 }
```