

# 과탐 물리학1 · 역학: 운동·힘·에너지 · 심화 · 문제편

과탐 · 물리학1 · 역학: 운동·힘·에너지 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제


[심화] 1 마찰이 없는 수평면 위에 질량  $2m$ 인 물체 A와 질량  $m$ 인 물체 B가 정지해 있다. A와 B 사이에는 용수철 상수  $k$ 인 가벼운 용수철이 압축된 채로 실에 묶여 있다. 실을 끊자 용수철이 A와 B를 서로 반대 방향으로 밀어내고, 용수철이 자연 길이가 되는 순간 A와 B는 각각 속력  $v_A, v_B$ 로 분리되었다. 이후 B는 오른쪽으로 나아가다가 수평면과 이어진 마찰 구간(동마찰계수  $\mu$ , 길이  $L$ )을 통과한 뒤 정지하였다. 용수철이 처음에 저장한 탄성 퍼텐셜 에너지가  $E$ 일 때, 옳은 것만을 고른 것은? (중력가속도는  $g$ )



- ㄱ.  $v_A : v_B = 1 : 2$ 이다.  
ㄴ. 분리 직후 B의 운동에너지는  $\frac{2E}{3}$ 이다.  
ㄷ. 마찰 구간을 지난 후 정지하려면  $L = \frac{2E}{3\mu mg}$ 이어야 한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ


[심화] 2 다음은 수평면과 경사면이 이어진 곡면(마찰 없음)에서 물체를 놓아 운동을 관찰한 실험이다. 물체를 높이  $h$ 에서 가만히 놓으면 경사면을 내려온 뒤 수평 구간을 지나 반대쪽 경사면을 올라간다. 반대쪽 경사면에는 길이  $d$ 인 마찰 구간(동마찰계수  $\mu$ )이 있고, 물체는 이 마찰 구간을 지나 최고점  $H$ 에 도달한 뒤 정지하지 않고 다시 미끄러져 내려온다. 경사면의 기울기 각은 양쪽 모두  $\theta$ 이며  $\tan \theta > \mu$ 이다.



물체가 마찰 구간을 처음 올라갈 때 잃은 역학적 에너지를  $W_1$ , 최고점에서 내려와 마찰 구간을 다시 통과할 때 잃은 역학적 에너지를  $W_2$ 라 하자. 물체가 최고점에서 내려온 후 처음 출발한 경사면에서 도달하는 최고 높이  $h'$ 를  $h, \mu, d, \theta$ 로 나타낸 것으로 옳은 것은?

- ①  $h - 2\mu d \cos \theta$  ②  $h - \mu d \cos \theta$  ③  $h - 2\mu d \sin \theta$  ④  $h - 2\mu d \tan \theta$  ⑤  $h - 4\mu d \cos \theta$


[심화] 3 그림과 같이 실로 연결된 물체 A(질량  $3m$ )와 B(질량  $m$ )가 도르래를 통해 걸려 있다. A는 수평면(동마찰계수  $\mu$ ) 위에 있고 B는 연직으로 매달려 있다. 처음 정지 상태에서 놓았더니 계가 가속도  $a$ 로 움직였다.



이때  $a = \frac{g}{8}$ 이었다. 실이 팽팽한 상태를 유지한다고 할 때, 동마찰계수  $\mu$ 의 값과, B가 거리  $\ell$ 만큼 내려오는 동안 실이 A에 한 일을 옳게 짝지은 것은? (중력가속도  $g$ , 도르래와 실의 질량·마찰 무시)

- ①  $\mu = \frac{5}{24}, W = \frac{27}{32}mg\ell$  ②  $\mu = \frac{5}{24}, W = \frac{21}{32}mg\ell$  ③  $\mu = \frac{7}{24}, W = \frac{27}{32}mg\ell$  ④  $\mu = \frac{7}{24}, W = \frac{21}{32}mg\ell$  ⑤  $\mu = \frac{5}{24}, W = \frac{25}{32}mg\ell$

[심화] 4 직선 위에서 운동하는 물체의 속도-시간 그래프가 다음과 같다.  $t = 0$ 일 때 물체의 위치는 원점이다.




$0 \leq t \leq 6$  s 동안에 대한 설명으로 옳은 것만을 고른 것은?

- ㄱ. 물체가 운동 방향을 바꾸는 시각은  $t = 2$  s이다.
- ㄴ.  $t = 0$ 부터  $t = 6$  s까지 물체의 변위는 0이다.
- ㄷ.  $t = 0$ 부터  $t = 6$  s까지 이동 거리는 12 m이다.

- ① ㄱ   ② ㄷ   ③ ㄱ, ㄴ   ④ ㄴ, ㄷ   ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ


[심화] 5 그림과 같이 질량  $m$ 인 물체 A와 질량  $2m$ 인 물체 B가 실로 연결되어 마찰이 없는 수평면 위에 놓여 있다. A에 오른쪽으로 크기  $F$ 인 힘을 가하는 동시에 B에 왼쪽으로 크기  $\frac{F}{2}$ 인 힘을 가하였다.



계 전체가 오른쪽으로 등가속도 운동을 한다. 실이 물체를 당기는 장력의 크기  $T$ 는? (실과 물체는 함께 운동한다)

- ①  $\frac{F}{6}$    ②  $\frac{F}{3}$    ③  $\frac{F}{2}$    ④  $\frac{2F}{3}$    ⑤  $\frac{5F}{6}$

[심화] 6 정지 상태에서 출발한 물체 P가 직선 위를 운동한다. P의 가속도-시간 그래프가 다음과 같다.




$0 \leq t \leq 6$  s에서 P에 대한 설명으로 옳은 것만을 고른 것은? (단위: SI)

- ㄱ.  $t = 2$  s에서 P의 속력은 4 m/s이다.
- ㄴ. P의 속력이 최대인 시각은  $t = 4$  s이다.
- ㄷ.  $t = 6$  s에서 P의 속력은 2 m/s이다.

① ㄱ   ② ㄴ   ③ ㄱ, ㄴ   ④ ㄱ, ㄷ   ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 7 그림과 같이 질량  $M$ 인 나무토막이 마찰이 없는 수평면 위에 정지해 있고, 그 위에 질량  $m$ 인 물체가 놓여 있다. 나무토막과 물체 사이의 동마찰계수는  $\mu$ 이다. 물체에 수평 방향으로 일정한 힘  $F$ 를 가하자 물체는 나무토막에 대해 미끄러지면서 나무토막도 함께 오른쪽으로 가속되었다.



물체  $m$ 의 가속도  $a_m$ 과 나무토막  $M$ 의 가속도  $a_M$ 에 대한 설명으로 옳은 것만을 고른 것은? (중력가속도  $g$ )

- ㄱ.  $a_M = \frac{\mu mg}{M}$ 이다.
- ㄴ.  $a_m = \frac{F - \mu mg}{m}$ 이다.
- ㄷ. 물체가 나무토막에 대해 미끄러지려면  $F > \mu mg \left(1 + \frac{m}{M}\right)$ 이어야 한다.

① ㄱ   ② ㄷ   ③ ㄱ, ㄴ   ④ ㄴ, ㄷ   ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 8 그림과 같이 수평면에서 물체 A(질량  $2m$ , 속력  $3v$ )가 오른쪽으로, 물체 B(질량  $m$ , 속력  $v$ )가 왼쪽으로 운동하여 정면충돌한다. 충돌 후 A와 B는 한 덩어리가 되지 않고, A는 처음 운동 방향으로 속력  $v$ 로 계속 운동하였다.



충돌 후 B의 속도(오른쪽을 양의 방향)와, 이 충돌에서 손실된 운동에너지에 대한 설명으로 옳은 것만을 고른 것은?

- ㄱ. 충돌 후 B의 속도는  $+3v$ 이다.
- ㄴ. 충돌 전 계의 총 운동에너지는  $\frac{19}{2}mv^2$ 이다.
- ㄷ. 충돌로 손실된 운동에너지는 0이다.

① ㄱ   ② ㄷ   ③ ㄱ, ㄴ   ④ ㄴ, ㄷ   ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**이 자료가 도움이 됐다면** — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기  
→ [neoulai.com](https://neoulai.com)

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.