

수학 기하 · 이차곡선 · 개념요약

수학 · 기하 · 이차곡선 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

0. 이차곡선, 왜 배우나요?

이차곡선은 모두 "거리 조건"으로 정의됩니다. 정의만 정확히 잡으면 문제의 절반은 풀립니다. 공식 암기보다 정의(거리)로 되돌아가는 습관이 핵심입니다.

- 포물선: 한 점(초점)과 한 직선(준선)에서 **같은 거리**
- 타원: 두 초점까지 거리의 **합이 일정**
- 쌍곡선: 두 초점까지 거리의 **차가 일정**

두문자 암기 → 「포=같은, 타=합, 쌍=차」

1. 포물선 (Parabola)

정의: 초점 F 와 준선 l 까지의 거리가 같은 점의 자취.
즉 곡선 위 점 P 에 대해 $\overline{PF} = (P\text{에서 준선까지 거리})$

기본형	초점	준선	축
$y^2 = 4px$	$(p, 0)$	$x = -p$	x 축
$x^2 = 4py$	$(0, p)$	$y = -p$	y 축

유도 직관: $y^2 = 4px$ 위의 점 $P(x, y)$ 에서
 $\overline{PF} = \sqrt{(x - p)^2 + y^2}$, 준선까지 거리 $= x + p$.
두 값을 같다 놓고 제곱하면 $y^2 = 4px$ 가 튀어나옵니다. 곧 방정식 자체가 정의의 결과입니다.

핵심 성질(빈출): 초점을 지나는 포물선의 반사·초점거리 문제에서, 곡선 위 점의 초점거리를 항상 준선까지 거리로 바꾸는 것이 1순위 전략입니다.

⚠ 자주 틀리는 함정

- $y^2 = 4px$ 에서 $4p$ 가 **통째로 계수**입니다. $y^2 = 8x$ 면 $4p = 8 \Rightarrow p = 2$ (초점 $(2, 0)$). $p = 8$ 아님!
- p 의 부호가 곡선이 열리는 방향을 결정. $p > 0$ 이면 오른쪽/위로 열립니다.

2. 타원 (Ellipse)


정의: 두 초점 F, F' 에서의 거리의 합이 일정한 점의 자취.
 $\overline{PF} + \overline{PF'} = 2a$ (일정, 장축 길이와 같음)

$$\text{가로로 긴 타원 } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \ (a > b)$$

$$\text{초점 } (\pm c, 0), \ c^2 = a^2 - b^2$$

장축 길이 $2a$, 단축 길이 $2b$, 꼭짓점 $(\pm a, 0), (0, \pm b)$

$c^2 = a^2 - b^2$ **직관**: 단축 끝점 $(0, b)$ 에서 두 초점까지 거리는 대칭이므로 각각 a . 직각삼각형에서 $a^2 = b^2 + c^2 \rightarrow c^2 = a^2 - b^2$. (그림 하나로 외우세요)



⚠ 함정 · 경계

- **세로로 긴 타원** ($a < b$, 즉 y 항 분모가 큰 경우): 초점이 **y 축 위** $(0, \pm c)$, $c^2 = b^2 - a^2$. 어느 게 큰 지부터 확인!
- 정의값은 $2a$ (**장축**)이지 a 가 아닙니다. "거리의 합"을 물으면 장축 길이를 답하세요.

3. 쌍곡선 (Hyperbola)

정의: 두 초점 F, F' 에서의 거리의 **차의 절댓값**이 일정한 점의 자취.

$$|\overline{PF} - \overline{PF'}| = 2a$$

형태	초점	c 관계	점근선
$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$	$(\pm c, 0)$	$c^2 = a^2 + b^2$	$y = \pm \frac{b}{a}x$
$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$	$(0, \pm c)$	$c^2 = a^2 + b^2$	$y = \pm \frac{b}{a}x$

부호 비교로 외우기 → 타원은 $c^2 = a^2 - b^2$ (**빼기**), 쌍곡선은 $c^2 = a^2 + b^2$ (**더하기**). 초점이 더 멀리 있는 쌍곡선이 "더한다"고 기억!

점근선 직관: 방정식 우변 1을 0으로 바꾸면 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0 \rightarrow y = \pm \frac{b}{a}x$. 곡선이 멀어질수록 이 직선에 붙습니다.

⚠ 함정

- 우변이 -1 이면 **세로로 벌어지는**(초점이 y 축) 쌍곡선. 점근선 식은 그대로 $\pm \frac{b}{a}x$ 지만 초점 위치가 다릅니다.

- 정의는 **절댓값**. 한쪽 가지만 생각해 부호를 놓치면 오답.
- 점근선 기울기는 $\pm \frac{b}{a}$ 이지 $\pm \frac{a}{b}$ 가 아닙니다(x^2 이 양일 때). 분모·분자 헷갈림 주의.

4. 세 곡선 한눈 비교표

	포물선	타원	쌍곡선
정의	초점=준선 거리	거리 합 $2a$	거리 차 $2a$
대표식	$y^2 = 4px$	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$
초점상수	$(p, 0)$	$c^2 = a^2 - b^2$	$c^2 = a^2 + b^2$
점근선	없음	없음	$y = \pm \frac{b}{a}x$

5. 빈출 유형별 접근 전략

1. **초점거리 계산형**: 곡선 위 점의 초점거리는 → **포물선은 준선거리로, 타원은 합=2a, 쌍곡선은 차=2a**로 즉시 치환. (한 초점거리를 알면 나머지가 결정됨)
2. **삼각형 둘레·넓이형**: $\overline{PF}, \overline{PF'}, \overline{FF'} = 2c$ 세 변을 정의로 표현 → 코사인법칙·헤론 연결.
3. **도형 결합(원·직선)**: 좌표보다 **정의(거리)로 세우면** 식이 훨씬 간단해지는 경우가 많습니다.
4. **계수 판별**: $Ax^2 + By^2 = C$ 에서 A, B 부호가 같으면 타원, 다르면 쌍곡선. 하나만 있으면 포물선.

6. 마지막 점검 (두문자 총정리)

- 정의: 포=같음 / 타=합 / 쌍=차
- 상수: 타는 빼기($a^2 - b^2$), 쌍은 더하기($a^2 + b^2$)
- 포물선 계수: $4p$ 통째로!
- 문제 막히면 → 무조건 "정의(거리)로 되돌아가기"

© SKY 멘토 × AI 협업 출제

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.