

사탐 세계지리 · 해설편

사탐 · 세계지리 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

해설편

[기본] 1 정답 ③

정답근거: (가)는 연중 고온 다습·스콜 발생 → 열대 우림(Af). (나)는 건기·우기 뚜렷·초원 발달 → 사바나(Aw). 따라서 ③이 옳다.

오답분석: ① 계절 차는 사바나(나)가 더 큼. ② 열대 우림이 사바나보다 저위도(적도 부근)에 분포. ④ 사바나는 열대 기후. ⑤ 두 기후 모두 최한월 기온이 높음.

연관개념: 적도 수렴대(ITCZ)의 남북 이동이 사바나 건·우기를 결정.

메타인지: '스콜=열대 우림, 건우기=사바나' 핵심 키워드로 구분하라.

[기본] 2 정답 ②

정답근거: A는 연중 고온·다우 → 열대 우림. B는 여름 고온이나 여름 강수 적고 겨울 강수 → 지중해성. C는 연교차 작고 강수 고름 → 서안 해양성. 따라서 ②.

오답분석: ①③④⑤ 각 지역 특성과 유형 연결이 어긋난다.

연관개념: 지중해성은 여름 아열대 고압대 영향으로 건조, 겨울 편서풍으로 습윤.

메타인지: 강수의 '계절 분포'와 '연교차' 두 축으로 판별.

[기본] 3 정답 ④

정답근거: 건조 기후는 연 강수량이 증발량보다 **적은** 지역이다. ④가 옳지 않다.

오답분석: ①②③⑤ 모두 건조 기후 분포·특성으로 옳다. 한류 연안(예: 나미브·아타카마)에도 사막 발달.

연관개념: 사막 형성 요인 — 아열대 고압대, 대륙 내부, 한류, 비 그늘.

메타인지: '증발량 > 강수량'이 건조 기후 정의임을 확실히.

[심화] 4 정답 ①

정답근거: A(사하라)는 사막 기후로 연 강수량이 매우 적다 → ①. B(콩고분지)는 적도 부근 열대 우림, C(지중해 연안)는 지중해성.

오답분석: ② B는 열대 우림. ③ C는 지중해성. ④ A(사막)는 강수 거의 없어 최난월 강수량 적음. ⑤ B(적도)는 연교차 작고, A(사막)는 연교차 큼 → 반대.

연관개념: 위도별 기압대 배열과 대륙 위치가 기후를 결정.

메타인지: 지도상 위도(적도·회귀선)로 후보 기후를 먼저 좁혀라.

[심화] 5 정답 ②

정답근거: (가) 가장 오래되고 평탄 → 안정육괴. (나) 최근·화산·협준 → 신기 조산대. (다) 침식으로 완만·애플래치아 → 고기 조산대. 따라서 ②.

오답분석: 나머지는 형성 시기·특징 연결이 어긋남.

연관개념: 신기 조산대(알프스-히말라야, 환태평양)는 판 경계와 일치.

메타인지: '형성 시기 = 협준함의 정도(오래될수록 완만)'로 기억.

[심화] 6 정답 ④

정답근거: (가)는 최한월 22°C , 매월 60mm 이상 → 열대 우림(ㄱ 참). (나)는 최한월 -25°C , 타이가 → 냉대, -3°C 미만(ㄴ 참). (나)가 더 고위도(ㄷ 참). 따라서 ㄱ, ㄴ, ㄷ → ④.

오답분석: ㄷ 연교차는 (나)(냉대, 연교차 큼)가 (가)(열대)보다 크므로 틀림.

연관개념: 냉대 기후 지표 — 최한월 -3°C 미만, 최난월 10°C 이상.

메타인지: 연교차는 고위도·대륙성일수록 커진다.

[킬러] 7 정답 ②

정답근거: P는 여름 건조·겨울 다우 → 지중해성. Q는 여름 집중 강수·연교차 큼 → 온대 겨울 건조(계절풍). R는 연교차 작고 강수 고름 → 서안 해양성으로 편서풍·난류 영향(ㄴ 성격). 따라서 '편서풍과 난류 영향'은 R의 특징이지만 선지 ②는 Q를 지목 → 재검토.

정답 재확정: 선지 재검토 결과, ④가 정답이다. P(지중해성)는 여름 고온 건조하여 올리브·포도 등 수목 농업 발달 → ④ 옳음.

오답분석: ① P는 겨울 다우형 지중해성. ② 편서풍·난류는 R(서안 해양성). ③ 연교차 작은 것은 R이며 서안 해양성. ⑤ Q는 계절 차 크고 R는 작으므로 'Q가 R보다 작다'는 틀림.

연관개념: 지중해성=여름 건조 수목 농업, 서안 해양성=연중 고른 강수 혼합 농업.

메타인지: 강수의 계절 집중과 연교차를 표에서 교차 확인해 유형을 확정하라. (본 문항의 정답은 ④)

