

사탐 세계지리 · 문제편

사탐 · 세계지리 · SKY 멘토 × AI(openai) 협업 출제 · v-auto

SKY 멘토 × AI 협업 출제 | 세계지리 문제편

난이도는 기본·심화·킬러로 구성하였다. 각 문항은 수능형 사고 과정을 반영하되 지문과 자료는 새롭게 창작하였다.

문항 1 [기본] 기후 그래프 판독

다음은 어느 지역의 월별 기후 특징이다.

- 연평균 기온은 약 17°C이며, 최난월은 7 월이다.
- 6~8 월 강수량은 매우 적고, 11~2 월 강수량이 많다.
- 주요 농산물로 올리브, 포도, 감귤류가 알려져 있다.

이 지역의 기후로 가장 적절한 것은?

1. 열대 우림 기후
 2. 사바나 기후
 3. 지중해성 기후
 4. 서안 해양성 기후
 5. 냉대 습윤 기후
-

문항 2 [기본] 플랜테이션 농업

어느 농업 방식은 주로 열대 및 아열대 지역에서 발달하였다. 과거 식민 지배의 영향으로 형성된 경우가

많으며, 대규모 농장에서 단일 상품 작물을 재배하여 국제 시장에 수출한다. 대표 작물로 카카오, 고무, 바나나, 커피 등이 있다.

위 농업 방식에 대한 설명으로 옳은 것은?

- 1. 주로 자급을 목적으로 하며 생산물의 시장 판매 비중이 낮다.
- 2. 기후보다 시장과의 접근성이 절대적으로 중요한 낙농업이다.
- 3. 선진국 자본과 현지 노동력이 결합한 형태로 발달한 경우가 많다.
- 4. 건조 지역에서 관개 시설을 이용해 밀을 대량 생산하는 방식이다.
- 5. 북서부 유럽의 냉량 습윤한 지역에서 혼합 농업과 함께 발달하였다.

문항 3 [심화] 도시화 특성 비교

다음 표는 세 국가 A~C의 도시화 관련 지표를 나타낸 것이다.

국가	도시화율	최근 20년 도시 인구 증가율	특징
A	82%	낮음	교외 주거지 확대, 도심 재개발 진행
B	46%	매우 높음	수도권 과밀, 비공식 주거지 증가
C	91%	중간	관광·금융 기능 집중, 외국인 노동자 비중 높음

A~C에 대한 추론으로 가장 적절한 것은?

- 1. A는 B보다 도시화의 초기 단계에 있을 가능성이 크다.
- 2. B는 급속한 이촌 향도와 자연 증가가 도시 문제를 심화시킬 수 있다.
- 3. C는 도시화율이 낮아 농촌 인구 비중이 가장 높다.
- 4. A는 도시화율이 높으므로 교외화 현상이 나타날 수 없다.

5. B는 도시 인구 증가율이 높으므로 반드시 선진국형 도시 체계를 가진다.

문항 4 [심화] 에너지 자원과 지역 특성

다음은 세 에너지 자원 갑~병의 특징이다.

- 갑: 산업 혁명기에 사용량이 크게 증가하였고, 오늘날에도 중국·인도 등에서 발전용으로 많이 소비된다.
- 을: 수송용 연료와 석유 화학 공업의 원료로 중요하며, 서남아시아의 특정 지역에 매장량이 집중되어 있다.
- 병: 연소 시 대기 오염 물질 배출이 상대적으로 적고, 액화 기술 발달로 국제 교역이 확대되었다.

갑~병에 해당하는 자원의 조합으로 옳은 것은?

1. 갑 석탄, 을 석유, 병 천연가스
 2. 갑 석유, 을 석탄, 병 우라늄
 3. 갑 천연가스, 을 석유, 병 석탄
 4. 갑 우라늄, 을 천연가스, 병 석유
 5. 갑 석탄, 을 우라늄, 병 석유
-

문항 5 [심화] 지역 분쟁과 자원

어느 지역은 여러 민족과 종교가 만나는 곳이며, 전략적 해상 교통로와 에너지 자원으로 인해 국제적 관심이 크다. 특히 원유와 천연가스의 수송로가 지나는 해협 주변에서는 주변국 간 긴장이 반복되기도 한다.

위 설명과 가장 관련이 깊은 지역으로 적절한 것은?

1. 발트해 연안

2. 페르시아만 주변
3. 오대호 연안
4. 라플란드 지역
5. 뉴질랜드 남섬

문항 6 [킬러] 기후·농업·위치 종합 추론

다음은 세 지역 A~C의 특징이다.

지역	기후 및 환경	대표적 인간 활동
A	연중 기온이 높고 월별 강수량 차이가 작으며, 상록 활엽수가 밀집	카카오·고무 재배, 열대림 벌채 문제
B	여름은 건조하고 겨울에 강수가 집중, 석회암 구릉과 해안 관광지 분포	올리브·포도 재배, 관광 산업 발달
C	강수량이 적고 기온의 일교차가 크며, 외래 하천 주변에 농경지 분포	관개 농업, 유목, 오아시스 취락

A~C에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. A는 적도 부근의 콩고 분지나 인도네시아 일부에서 나타날 수 있다.
- ㄴ. B는 중위도 대륙 서안에서 나타나며, 여름철 아열대 고압대의 영향을 받는다.
- ㄷ. C는 증발량보다 강수량이 많아 벼농사가 보편적으로 발달한다.
- ㄹ. A와 C는 모두 연중 강수량이 풍부하여 하천 유량 변동이 작다.

1. ㄱ, ㄴ
2. ㄱ, ㄷ
3. ㄴ, ㄹ
4. ㄱ, ㄴ, ㄷ
5. ㄴ, ㄷ, ㄹ

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 공동 출제 · 2026-07-05

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적
제공·무단 상업적 재배포 금지.