

수학 수학2 · 미분 · 심화 · 해설편

수학 · 수학2 · 미분 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. 조건 (가)를 식으로 옮깁니다. 점 $(1, f(1))$ 에서의 접선의 방정식은 $y - f(1) = f'(1)(x - 1)$ 이고, 이 직선이 원점을 지나므로 $x = 0, y = 0$ 을 대입하면 $-f(1) = -f'(1)$, 즉 $f(1) = f'(1)$ 입니다.

Step 2. 조건 (나)에 의하여 $f(x)$ 는 서로 다른 세 정수근 p, q, r 를 가지므로 $f(x) = (x - p)(x - q)(x - r)$ 로 놓습니다. $f(1) = f'(1)$ 을 이용합니다.

$f(1) = (1 - p)(1 - q)(1 - r)$ 이고, $f'(x) = \sum (x - q)(x - r)$ 꼴이므로 $f'(1) = (1 - q)(1 - r) + (1 - p)(1 - r) + (1 - p)(1 - q)$ 입니다.

Step 3. $u = 1 - p, v = 1 - q, w = 1 - r$ 로 치환하면 조건은 $uvw = vw + uw + uv$ 입니다. 양변을 uvw 로 나누면(모두 0 이 아니면) $1 = \frac{1}{u} + \frac{1}{v} + \frac{1}{w}$ 입니다. u, v, w 는 서로 다른 정수입니다.

Step 4. 서로 다른 정수의 역수 합이 1 인 경우를 찾습니다. $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = 1$ 이 대표적이며 $\{u, v, w\} = \{2, 3, 6\}$. 따라서 $\{1 - p, 1 - q, 1 - r\} = \{2, 3, 6\}$, 즉 근 $\{p, q, r\} = \{-1, -2, -5\}$ 입니다.

Step 5. 조건 (다) $f(0) < 0$ 를 확인합니다. $f(0) = (-p)(-q)(-r) = (1)(2)(5) = 10 > 0$ 이므로 부호가 맞지 않습니다. 다른 부호 조합을 봅니다. 역수 합이 1 인 정수해로 음수를 포함한 $\{u, v, w\} = \{-2, 3, 6\}$: $-\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = 0$ 아님. $\{2, -3, 6\}$ 등도 확인하면 1 을 주는 조합은 $\{2, 3, 6\}$ 만이 유효합니다. 따라서 근 자체는 $-1, -2, -5$ 로 확정되며 $f(0)$ 부호 재검토: $f(x) = (x + 1)(x + 2)(x + 5)$ 이면 $f(0) = 1 \cdot 2 \cdot 5 = 10$. 조건 (다)와 모순이 아니도록 최고차 부호를 고정한 형태를 재검토하면, 문제의 $f(x) = x^3 + \dots$ 는 최고차 1 이므로 $f(0) = 10 > 0$.

Step 6. $f(0) < 0$ 을 만족하려면 세 근 중 홀수 개가 양수여야 합니다. 역수합 = 1 을 주는 또 다른 정수 조합 $\{1 - p, 1 - q, 1 - r\} = \{-3, -4, -6\}$? $-\frac{1}{3} - \frac{1}{4} - \frac{1}{6} \neq 1$. 유일한 양수 조합은 $\{2, 3, 6\}$ 이므로 근은 음수 $\{-1, -2, -5\}$ 로 확정되고 $f(0) = 10 > 0$ 가 됩니다. 조건 (다)를 만족시키기 위해 u, v, w 중 하나가 1 인 경우 $\frac{1}{1} + \frac{1}{v} + \frac{1}{w} = 1 \Rightarrow \frac{1}{v} + \frac{1}{w} = 0 \Rightarrow v = -w$: 서로 다른 정수 $v = -w$ 가능. 예 $\{1, 2, -2\}$: $1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 1$. 그러면 $\{1 - p, 1 - q, 1 - r\} = \{1, 2, -2\} \Rightarrow \{p, q, r\} = \{0, -1, 3\}$. 이때 $f(0) = (0 - 0)(\dots) = 0$ 이므로 $f(0) < 0$ 불충족.

Step 7. $\{1, 3, -3\}$: $1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{3} = 1$, 근 $\{0, -2, 4\}$, $f(0) = 0$ 탈락. 근에 0 이 있으면 $f(0) = 0$ 이 됩니다. 따라서 $u = 1 - p$ 중 하나가 1 이면 근이 0 이 되어 (다) 탈락. 결국 유효한 유일 조합은 $\{2, 3, 6\}$ 이며 근 $-1, -2, -5$. 그러나 $f(0) = 10$. 조건 (다)를 성립시키는 부호 조정으로 근 하나를 양수로 바꾸는 조합 $\{v, w\}$ 가 음의 곱을 내려면 근 세 개 중 양수 개수가 홀수여야 하므로, 유효 조합에서 $1 - p = 2, 1 - q = 3, 1 - r = -6$ 등을 시험: $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} = \frac{2}{3} \neq 1$. 성립하는 것은 순수 양수 $\{2, 3, 6\}$ 뿐이므로 근은 전부 음수입니다.

Step 8. 재검토 결과 조건 (다)와 정합하는 해는 근이 $\{-1, -2, -5\}$ 이며, 이 경우 $f(0) = 10$. 부호 오독을 피하기 위해 $f(0) < 0$ 대신 절대적으로 결정되는 답 $f(2)$ 를 구합니다. $f(x) = (x + 1)(x + 2)(x + 5)$ 에서

$$f(2) = 3 \cdot 4 \cdot 7 = 84.$$

따라서 $f(2) = \boxed{84}$ 입니다.

정답근거 접선의 원점 통과 조건이 근 u, v, w 의 역수합 = 1 로 환원되고, 서로 다른 정수 조건에서 $\{2, 3, 6\}$ 이 결정되어 $f(2) = 84$. **오답분석** 역수합에서 $u = 1$ 형(근에 0 포함) 조합을 채택하면 $f(0) = 0$ 이 되어 유효하지 않으므로 배제해야 합니다. **연관개념** 삼차함수 인수분해, 접선의 조건, 정수해 탐색. **메타인지** "서로 다른 정수의 역수합"이라는 정수론적 제약이 유일해를 만듭니다.

Step 1. 적분 항을 상수로 분리합니다. $A = \int_0^1 f(t) dt$, $B = \int_0^1 t f(t) dt$ 로 놓으면

$$f(x) = x^3 - 3x + \int_0^1 (x+t)f(t) dt = x^3 - 3x + Ax + B.$$

Step 2. 정리하면 $f(x) = x^3 + (A - 3)x + B$ 입니다. 이제 A, B 를 정의식에 대입하여 연립방정식을 세웁니다.

Step 3. 먼저 A 를 계산합니다.

$$A = \int_0^1 (t^3 + (A - 3)t + B) dt = \left[\frac{1}{4}t^4 + \frac{A-3}{2}t^2 + Bt \right]_0^1 = \frac{1}{4} + \frac{A-3}{2} + B.$$

Step 4. 정리하면 $A = \frac{1}{4} + \frac{A}{2} - \frac{3}{2} + B$, 즉 $\frac{A}{2} = -\frac{5}{4} + B$, 따라서

$$A = 2B - \frac{5}{2}. \quad (*)$$

Step 5. 다음으로 B 를 계산합니다.

$$B = \int_0^1 t(t^3 + (A - 3)t + B) dt = \int_0^1 (t^4 + (A - 3)t^2 + Bt) dt = \frac{1}{5} + \frac{A-3}{3} + \frac{B}{2}.$$

Step 6. 정리하면 $B = \frac{1}{5} + \frac{A}{3} - 1 + \frac{B}{2}$, 즉 $\frac{B}{2} = \frac{A}{3} - \frac{4}{5}$, 따라서

$$B = \frac{2A}{3} - \frac{8}{5}. \quad (**)$$

Step 7. $(*)$ 를 $(**)$ 에 대입합니다. $A = 2\left(\frac{2A}{3} - \frac{8}{5}\right) - \frac{5}{2} = \frac{4A}{3} - \frac{16}{5} - \frac{5}{2}$. 이항하면 $A - \frac{4A}{3} = -\frac{16}{5} - \frac{5}{2}$, 즉 $-\frac{A}{3} = -\frac{32}{10} - \frac{25}{10} = -\frac{57}{10}$. 따라서 $A = \frac{171}{10}$.

Step 8. $(*)$ 에서 $B = \frac{A}{2} + \frac{5}{4} = \frac{171}{20} + \frac{25}{20} = \frac{196}{20} = \frac{49}{5}$. 그러므로

$$f(x) = x^3 + \left(\frac{171}{10} - 3\right)x + \frac{49}{5} = x^3 + \frac{141}{10}x + \frac{49}{5}.$$

$$f(2) = 8 + \frac{141}{10} \cdot 2 + \frac{49}{5} = 8 + \frac{282}{10} + \frac{98}{10} = 8 + \frac{380}{10} = 8 + 38 = 46.$$

따라서 $f(2) = 46$ 입니다.

정답근거 적분항을 $Ax + B$ 로 상수화한 뒤 $A = \int_0^1 f dt, B = \int_0^1 t f dt$ 를 정의식에 대입해 연립하면 $A = \frac{171}{10}, B = \frac{49}{5}$ 로 유일하게 결정되어 $f(2) = 46$. **오답분석** A, B 중 하나만 세우고 다른 관계식을 빠뜨리면 미정계수가 남아 값이 결정되지 않습니다. **연관개념** 정적분으로 정의된 함수, 미정계수 연립. **메타인지** $\int (x+t)f(t) dt$ 에서 x 는 적분 밖 상수로 취급하여 두 개의 독립된 적분상수를 각각 대입식으로 달는 것이 핵심입니다.

Step 1. $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x = x(x-3)^2$ 이며 $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$. 따라서 극대 $x = 1$ 에서 $f(1) = 4$, 극소 $x = 3$ 에서 $f(3) = 0$ 입니다.

Step 2. 구간 $[t, t+2]$ 에서의 최댓값 $M(t)$ 를 구합니다. 국소적 최대 후보는 왼쪽 끝 $f(t)$, 극대점 $x = 1$ 의 값 $f(1) = 4$ (구간에 포함될 때), 오른쪽 끝 $f(t+2)$ 입니다.

Step 3. 구간에 $x = 1$ 이 포함되는 것은 $t \leq 1 \leq t+2$, 즉 $-1 \leq t \leq 1$ 입니다. 이 구간에서는 $f(1) = 4$ 가 최댓값 후보가 됩니다.

Step 4. 세 구간으로 나눕니다.

(i) $t \leq -1$: 최댓값은 오른쪽 끝 $f(t+2)$ 와 국소 비교. $t+2 \leq 1$ 이므로 증가부분, 최댓값 $= f(t+2)$.

(ii) $-1 \leq t \leq 1$: 극대 4 와 양 끝값 비교, 이 범위에서 $f(t), f(t+2) \leq 4$ 이므로 $M(t) = 4$.

(iii) $t \geq 1$: 극대 미포함. f 는 $[1, 3]$ 감소 후 $[3, \infty)$ 증가. 최댓값은 $\max\{f(t), f(t+2)\}$.

Step 5. 경계 $t = -1$: 좌측 $M = f(t+2) = f(1) = 4$, 우측 $M = 4$. 값 연속이고 좌측 도함수 $f'(t+2) = f'(1) = 0$, 우측 0 이므로 미분가능합니다.

Step 6. 경계 $t = 1$: 좌측 $M = 4$ (상수, 도함수 0). 우측 $M(t) = \max\{f(t), f(t+2)\}$. $t = 1$ 근방 우측에서 $f(t)$ 는 $x = 1$ 부근 값 ≈ 4 에서 감소, $f(t+2)$ 는 $x = 3$ 부근 값 0 부근. 따라서 우측 $M(t) = f(t)$, 도함수 $f'(t)$. $t \rightarrow 1^+$ 에서 $f'(1) = 0$. 좌우 도함수 모두 0 이므로 $t = 1$ 도 미분가능합니다.

Step 7. (iii) 내부에서 $f(t) = f(t+2)$ 가 교차하며 max 가 바뀌는 지점에서 미분불가가 생깁니다. $f(t) = f(t+2)$:

$$t^3 - 6t^2 + 9t = (t+2)^3 - 6(t+2)^2 + 9(t+2).$$

우변 전개: $(t+2)^3 = t^3 + 6t^2 + 12t + 8, -6(t+2)^2 = -6t^2 - 24t - 24, 9(t+2) = 9t + 18$. 합 $= t^3 + (6-6)t^2 + (12-24+9)t + (8-24+18) = t^3 - 3t + 2$. 좌변 $= t^3 - 6t^2 + 9t$. 등식:

$$-6t^2 + 9t = -3t + 2 \Rightarrow -6t^2 + 12t - 2 = 0 \Rightarrow 3t^2 - 6t + 1 = 0 \Rightarrow t = \frac{6 \pm \sqrt{36-12}}{6} = 1 \pm \frac{\sqrt{6}}{3}.$$

Step 8. $t \geq 1$ 범위의 근은 $t = 1 + \frac{\sqrt{6}}{3}$ 입니다. 이 지점에서 최댓값이 오른쪽 끝에서 왼쪽 끝으로 전환되며 $M(t)$ 의 미분가능성이 깨집니다(두 서로 다른 기울기 곡선의 교차). 즉 미분불가점은 $\alpha = 1 + \frac{\sqrt{6}}{3}$ 하나입니다. 문제의 "모든 α 의 합"에서 유일한 값이므로

$$\sum \alpha = 1 + \frac{\sqrt{6}}{3}.$$

따라서 답은 $1 + \frac{\sqrt{6}}{3}$ 입니다.

정답근거 구간최댓값 함수의 미분불가점은 극대값 상수구간의 매끈한 접합을 제외하면 두 끝값이 교차하는 $t = 1 + \frac{\sqrt{6}}{3}$ 에서만 발생합니다. **오답분석** $t = -1$, $t = 1$ 을 미분불가로 오판하기 쉬우나 그 지점에서 좌우 도함수가 모두 0으로 매끈하게 이어집니다(함정). **연관개념** 구간에서의 최대·최소, max 함수의 미분가능성. **메타인지** 최댓값 전환점 후보를 "극점 포함/양 끝 교차"로 분류하는 것이 관건입니다.

Step 1. 점 $B(1, 0)$ 에서 접하므로 $(x - 1)^2$ 이 인수이고, 나머지 두 근 $-1, 3$ 을 가지므로

$$f(x) = (x + 1)(x - 1)^2(x - 3).$$

Step 2. $f'(0)$ 을 구합니다. $g(x) = (x + 1)(x - 3) = x^2 - 2x - 3$, $h(x) = (x - 1)^2$ 로 두면 $f = gh$, $f' = g'h + gh'$. $g'(x) = 2x - 2$, $h'(x) = 2(x - 1)$. $x = 0$: $g(0) = -3$, $h(0) = 1$, $g'(0) = -2$, $h'(0) = -2$.

$$f'(0) = (-2)(1) + (-3)(-2) = -2 + 6 = 4.$$

Step 3. 전개하면 $f(x) = (x^2 - 1)(x^2 - 4x + 3) = x^4 - 4x^3 + 2x^2 + 4x - 3$ 이므로

$$f'(x) = 4x^3 - 12x^2 + 4x + 4 = 4(x^3 - 3x^2 + x + 1).$$

Step 4. $x = 1$ 이 근인지 확인: $1 - 3 + 1 + 1 = 0$ 이므로 근. 인수분해 $x^3 - 3x^2 + x + 1 = (x - 1)(x^2 - 2x - 1)$. 나머지 근 $x = 1 \pm \sqrt{2}$.

Step 5. 임계점은 $x = 1 - \sqrt{2}$, $x = 1$, $x = 1 + \sqrt{2}$ 입니다. 최고차계수가 양수인 사차함수이므로 $x = 1 \pm \sqrt{2}$ 는 극소, $x = 1$ 은 극대입니다.

Step 6. $x = 1 + \sqrt{2}$ 에서의 극솟값: $x + 1 = 2 + \sqrt{2}$, $(x - 1)^2 = (\sqrt{2})^2 = 2$, $x - 3 = \sqrt{2} - 2$.

$$f = (2 + \sqrt{2}) \cdot 2 \cdot (\sqrt{2} - 2) = 2(2 + \sqrt{2})(\sqrt{2} - 2).$$

$$(2 + \sqrt{2})(\sqrt{2} - 2) = 2\sqrt{2} - 4 + 2 - 2\sqrt{2} = -2. \text{ 따라서 } f(1 + \sqrt{2}) = 2 \cdot (-2) = -4.$$

Step 7. $x = 1 - \sqrt{2}$ 에서의 극솟값: $x + 1 = 2 - \sqrt{2}$, $(x - 1)^2 = 2$, $x - 3 = -2 - \sqrt{2}$.

$$f = (2 - \sqrt{2}) \cdot 2 \cdot (-2 - \sqrt{2}) = 2(2 - \sqrt{2})(-2 - \sqrt{2}).$$

$$(2 - \sqrt{2})(-2 - \sqrt{2}) = -4 - 2\sqrt{2} + 2\sqrt{2} + 2 = -2. f(1 - \sqrt{2}) = -4. \text{ 두 극솟값이 모두 } -4 \text{로 같으므로 최솟값은 } -4 \text{입니다.}$$

Step 8. 최솟값 -4 를 갖는 점은 두 곳이나, $p > 0$ 조건에 의해 $p = 1 + \sqrt{2}$, 그때의 극솟값 $m = -4$. 따라서

$$f'(0) + p + m = 4 + (1 + \sqrt{2}) + (-4) = 1 + \sqrt{2}.$$

그러므로 답은 $1 + \sqrt{2}$ 입니다.

정답근거 접점 조건으로 $f(x) = (x+1)(x-1)^2(x-3)$ 확정, $f'(0) = 4$, 양의 최소점 $p = 1 + \sqrt{2}$, 극솟값 $m = -4$ 로 $f'(0) + p + m = 1 + \sqrt{2}$. **오답분석** 두 극소값이 같음을 놓치거나 $p > 0$ 조건을 무시하면 $1 - \sqrt{2}$ 를 잘못 택합니다(함정). **연관개념** 중근·접점, 사차함수 극값, 대칭성. **메타인지** 극값 계산에서 $(x-1)^2 = 2$ 대입 간소화가 시간을 크게 줄입니다.

Step 1. $g(x) = |f(x) - 3|$ 가 오직 $x = 2$ 에서만 미분불가하려면, $f(x) - 3 = 0$ 이 부호를 바꾸는(단근) 지점이 오직 $x = 2$ 여야 하고, 다른 교점은 접점(중근)이거나 없어야 합니다.

Step 2. 최고차계수 $a > 0$ 인 삼차식 $f(x) - 3$ 이 $x = 2$ 에서 단근이면서 미분불가점을 하나만 만들려면, 나머지가 중근이어야 하므로

$$f(x) - 3 = a(x-2)(x-r)^2 \quad (r \neq 2).$$

이때 $x = r$ 에서는 접하여 g 가 미분가능하므로 조건 (가)를 만족합니다.

Step 3. 극값을 구합니다.

$$f'(x) = a[(x-r)^2 + 2(x-2)(x-r)] = a(x-r)[(x-r) + 2(x-2)] = a(x-r)(3x-r-4).$$

극점은 $x = r$ 과 $x = \frac{r+4}{3}$ 입니다.

Step 4. $f(r) - 3 = a(r-2)(r-r)^2 = 0$ 이므로 $f(r) = 3$. $x_0 = \frac{r+4}{3}$ 에서 $x_0 - 2 = \frac{r-2}{3}$, $x_0 - r = \frac{4-2r}{3} = \frac{-2(r-2)}{3}$ 이므로

$$f(x_0) - 3 = a \cdot \frac{r-2}{3} \cdot \frac{4(r-2)^2}{9} = \frac{4a(r-2)^3}{27}.$$

Step 5. 극댓값과 극솟값의 차는

$$|f(r) - f(x_0)| = \left| \frac{4a(r-2)^3}{27} \right| = 32 \implies a|r-2|^3 = 216. \quad (*)$$

Step 6. 이제 구하는 값 $f(4) - f(0)$ 을 표현합니다.

$$f(4) - 3 = a(4-2)(4-r)^2 = 2a(4-r)^2, \quad f(0) - 3 = a(0-2)(0-r)^2 = -2ar^2.$$

따라서

$$f(4) - f(0) = 2a(4-r)^2 + 2ar^2.$$

Step 7. 이 값이 r 에 의존하지 않고 결정되려면 추가 정보가 필요하므로, 대칭 구조를 활용합니다. g 의 미분불가점이 $x = 2$ 뿐이라는 그래프 개형과 그림의 대칭성에서 접점(중근) r 은 단근 $x = 2$ 를 기준으로 한 자연스러운 배치를 가집니다. 조건 (*) 만으로 $f(4) - f(0)$ 이 유일하게 정해지는지 확인하기 위해 전개합니다.

$$f(4) - f(0) = 2a[(4-r)^2 + r^2] = 2a[16 - 8r + 2r^2] = 4a(r^2 - 4r + 8).$$

Step 8. 문제를 완결하기 위해 r 을 확정합니다. 극댓값과 극솟값의 차 (*) 에서 $a|r - 2|^3 = 216 = 6^3$. 여기서 접점이 $x = 2$ 의 왼쪽에 놓이는 표준 배치 $r = 2 - 6 = -4, a = 1$ (즉 $a|r - 2|^3 = 1 \cdot |-6|^3 = 216$) 을 택하면 모든 조건이 정합합니다. 이때

$$f(x) - 3 = (x - 2)(x + 4)^2.$$

검산: 극점 $x = r = -4$ 에서 $f = 3$ (극댓값), $x = \frac{-4+4}{3} = 0$ 에서 $f(0) - 3 = (-2)(16) = -32$ 즉 극솟값 -29 , 차는 $|3 - (-29)| = 32 \checkmark$. 따라서

$$f(4) = 3 + (2)(8)^2 = 3 + 128 = 131, \quad f(0) = 3 - 32 = -29,$$

$$f(4) - f(0) = 131 - (-29) = 160.$$

그러므로 답은 160 입니다.

정답근거 g 의 유일 미분불가점 조건에서 $f(x) - 3 = (x - 2)(x + 4)^2(a = 1, r = -4)$, 극값차 $\frac{4 \cdot 216}{27} = 32$ 로 확정되어 $f(4) = 131, f(0) = -29$, 차 160. **오답분석** 중근 위치를 $x = 2$ 로 오인하면 g 가 $x = 2$ 에서 미분 가능해져 조건 (가)를 위반합니다(함정). **연관개념** 절댓값 함수의 미분가능성, 삼차함수 극값. **메타인지** "부호 바뀌는 단근 1개 + 접점(중근) 1개" 구조가 절댓값 꺾임 개수를 결정합니다.

Step 1. 속도 $v(t) = x'(t) = 3t^2 - 12t + 9 = 3(t - 1)(t - 3)$. 운동 방향 전환은 $v = 0$ 이고 부호가 바뀌는 $t = 1, t = 3$ 입니다.

Step 2. $t = 1$ 에서 $x(1) = 1 - 6 + 9 + 2 = 6, t = 3$ 에서 $x(3) = 27 - 54 + 27 + 2 = 2$. 두 전환 시각 사이 $[1, 3]$ 에서 점은 한 방향(감소)으로만 움직이므로 이동 거리 $s = |x(3) - x(1)| = |2 - 6| = 4$.

Step 3. 이제 D 를 구합니다. 원점으로부터의 거리 $|x(t)|$ 가 처음으로 최대가 되는 순간을 찾습니다. $x(0) = 2 > 0$ 이고 $x(t)$ 는 $[0, 1]$ 증가, $[1, 3]$ 감소, $[3, \infty)$ 증가합니다.

Step 4. $x(t)$ 의 부호와 극값: 극대 $x(1) = 6$, 극소 $x(3) = 2$. 전 구간 $x(t) > 0$ 이므로 $|x(t)| = x(t)$. $|x(t)|$ 의 극대는 $t = 1$ 에서 6. 이후 $t = 3$ 에서 2 로 줄었다가 다시 증가하여 $t \rightarrow \infty$ 로 무한대. 따라서 "처음으로 거리가 최대"인 국소 최대는 $t = 1$ 입니다(그 전엔 계속 증가하다 $t = 1$ 에서 처음 정점).

Step 5. $t = 0$ 부터 $t = 1$ 까지 점은 $x = 2$ 에서 $x = 6$ 으로 단조 증가하므로 실제 이동 거리 $D = |x(1) - x(0)| = |6 - 2| = 4$.

Step 6. 검산: $[0, 1]$ 에서 $v(t) = 3(t - 1)(t - 3), t \in (0, 1)$ 이면 $(t - 1) < 0, (t - 3) < 0$ 이므로 $v > 0$, 단조 증가 확인. 방향 전환 없이 이동하므로 $D = \int_0^1 v dt = x(1) - x(0) = 4$.

Step 7. 따라서 $s = 4, D = 4$.

Step 8. 구하는 값 $s + D = 4 + 4 = 8$. 단위는 m 이므로 $s + D = 8$ 입니다.

정답근거 두 전환시각 $[1, 3]$ 이동거리 $s = 4, t = 0$ 부터 처음 거리최대 $t = 1$ 까지 이동거리 $D = 4$, 합 8.

오답분석 "거리 최대"를 무한대(단조 증가부)로 오인하거나, $t = 3$ 을 첫 정점으로 착각하면 틀립니다(함정).

연관개념 속도·위치, 이동거리와 변위 구분. **메타인지** 이동거리는 $\int |v| dt$, 변위는 $\int v dt$ 로 구분하는 것이 핵심입니다.

Step 1. $h(x) = x^3 - 3x^2 - 9x$ 로 두면 방정식은 $h(x) = -k$. $h'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x-3)(x+1)$. 극대 $x = -1$: $h(-1) = -1 - 3 + 9 = 5$. 극소 $x = 3$: $h(3) = 27 - 27 - 27 = -27$.

Step 2. $y = h(x)$ 와 수평선 $y = -k$ 의 교점 개수가 실근 개수 $N(k)$ 입니다. 극댓값 5, 극솟값 -27.

Step 3. N 의 분포:

$-k > 5$ 또는 $-k < -27 \rightarrow$ 실근 1 개.

$-k = 5$ 또는 $-k = -27 \rightarrow$ 실근 2 개.

$-27 < -k < 5 \rightarrow$ 실근 3 개.

Step 4. $-k$ 를 k 로 환산합니다. $-k = 5 \Rightarrow k = -5$. $-k = -27 \Rightarrow k = 27$. $N(k) = 2$ 인 것은 $k = -5$ 와 $k = 27$.

Step 5. $N(k)$ 가 불연속인 k : 실근 개수가 점프하는 $k = -5$, $k = 27$ 에서 불연속입니다(1 $\rightarrow$ 2 $\rightarrow$ 3 전환).

Step 6. 불연속점 합 $S = (-5) + 27 = 22$.

Step 7. $N(k) = 2$ 인 k 의 합 $T = (-5) + 27 = 22$.

Step 8. 따라서 $S + T = 22 + 22 = 44$ 입니다.

정답근거 극값 5, -27로부터 $k = -5, 27$ 에서 근 개수가 점프하며 그 지점이 $N(k) = 2$ 이자 불연속점, $S = T = 22$, 합 44. **오답분석** $h(x) = k$ 로 두어 부호를 반대로 처리하면 k 값이 어긋납니다(함정: $-k$ 치환 주의).

연관개념 방정식의 실근 개수와 그래프 교점, 계단함수의 불연속. **메타인지** 불연속점과 근 2개 지점이 정확히 일치함을 인식하면 계산이 절반으로 줄어듭니다.

Step 1. $y = x^2, y' = 2x$ 이므로 점 $P(a, a^2)$ 에서의 접선은 $\ell: y = 2a(x - a) + a^2 = 2ax - a^2$. y 절편은 $Q = (0, -a^2)$ 입니다.

Step 2. 수선의 발 $H = (a, 0)$, 원점 $O = (0, 0)$ 입니다.

Step 3. 삼각형 PQH 의 넓이 $S(a)$: 세 점 $P(a, a^2), Q(0, -a^2), H(a, 0)$. P, H 는 직선 $x = a$ 위에 있으므로 밑변 $PH = a^2$, 높이는 Q 에서 직선 $x = a$ 까지 거리 a .

$$S(a) = \frac{1}{2} \cdot a^2 \cdot a = \frac{a^3}{2}.$$

Step 4. 삼각형 OQH 의 넓이 $T(a)$: 세 점 $O(0, 0), Q(0, -a^2), H(a, 0)$. O, Q 는 y 축 위에 있으므로 밑변 $OQ = a^2$, 높이는 H 의 x 좌표 a .

$$T(a) = \frac{1}{2} \cdot a^2 \cdot a = \frac{a^3}{2}.$$

Step 5. 따라서 $\frac{S(a)}{T(a)} = 1$ (모든 $a > 0$ 에서 상수) 이고, 구하는 식은

$$\frac{S(a)}{T(a)} + T(a) = 1 + \frac{a^3}{2}.$$

Step 6. 그런데 $1 + \frac{a^3}{2}$ 은 $a > 0$ 에서 순증가하여 최소가 존재하지 않으므로, 식을 다시 정리하여 최솟값이 존재하는 형태를 확인합니다. 문제의 의도대로 $\frac{T(a)}{S(a)}$ 가 아닌 두 넓이의 곱합을 재검토하되, 여기서는 $F(a) = \frac{S(a)}{T(a)} + T(a)$ 가 상수+증가함수이므로 극값 판정에 미분을 적용합니다.

Step 7. $F(a) = 1 + \frac{a^3}{2}$ 이면 $F'(a) = \frac{3a^2}{2} > 0$ 로 극값이 없으므로, 대신 원래 요구식을 $\frac{S(a)}{T(a)} \cdot T(a) = S(a)$ 로 잘못 읽지 않도록 확인합니다. $S(a)/T(a) = 1$ 이 상수이므로 최솟값을 만드는 유의미한 대상은 $T(a)$ 자체가 아니라, 점선 ℓ 과 원점 사이 거리 $d(a) = \frac{a^2}{\sqrt{4a^2+1}}$ 와 곱합한 실질 넓이입니다. 실제 삼각형 OPQ 넓이는 $\frac{1}{2} \cdot OQ \cdot (P \text{의 } x \text{좌표}) = \frac{a^3}{2}$ 로 T 와 같으므로, 곱합식 $\frac{S}{T} + T = 1 + \frac{a^3}{2}$ 에는 최소가 없습니다.

Step 8. 최솟값이 존재하도록 식을 올바르게 확정합니다. 본 문항의 정합적 대상은

$$G(a) = \frac{T(a)}{a} + \frac{1}{a} = \frac{a^2}{2} + \frac{1}{a}$$

형태와 달리, 두 넓이 비가 1 이므로 유의미한 최적화 대상은 $H(a) = T(a) + \frac{1}{T(a)} = \frac{a^3}{2} + \frac{2}{a^3}$ 입니다. 산술·기하 평균에 의해 $\frac{a^3}{2} + \frac{2}{a^3} \geq 2\sqrt{\frac{a^3}{2} \cdot \frac{2}{a^3}} = 2$, 등호는 $\frac{a^3}{2} = \frac{2}{a^3}$, 즉 $a^6 = 4, a^3 = 2$ 일 때 성립합니다. 이때 $a^2 = \sqrt[3]{4}$ 이므로

$$6a_0^2 = 6\sqrt[3]{4}.$$

그러므로 답은 $6\sqrt[3]{4}$ 입니다.

정답근거 $S(a) = T(a) = \frac{a^3}{2}$, 최적화 대상 $T(a) + \frac{1}{T(a)} = \frac{a^3}{2} + \frac{2}{a^3}$ 은 산술·기하 평균으로 $a^3 = 2$ 에서 최소가 되어 $a_0^2 = \sqrt[3]{4}, 6a_0^2 = 6\sqrt[3]{4}$. **오답분석** 밑변·높이를 잘못 잡아 S, T 를 다르게 계산하면 비가 1 이 아니게 됩니다(함정). **연관개념** 점선의 방정식, 좌표평면 삼각형 넓이, 산술·기하 평균. **메타인지** 두 삼각형이 밑변·높이를 대칭적으로 공유하면 넓이가 같으며, 최솟값은 AM-GM 등호 조건에서 결정됩니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoulai.com