

수학 수학2 · 함수의 극한과 연속 · 개념요약

수학 · 수학2 · 함수의 극한과 연속 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 함수의 극한, 도대체 무슨 뜻일까요?

함수의 극한은 " x 가 어떤 값 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 는 어디로 가는가?"를 묻는 개념입니다. 여기서 핵심은 $x = a$ 일 때의 값이 아니라, $x = a$ 근처에서의 경향이라는 점입니다.

기호의 의미

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

는 " x 가 a 에 한없이 가까워질 때 $f(x)$ 가 L 에 한없이 가까워진다"는 뜻입니다.

★ $x = a$ 에서 함수값 $f(a)$ 가 존재하든 안 하든 극한과는 무관합니다. 이것이 초보자가 가장 헷갈리는 부분이
예요.

예를 들어 $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ 은 $x = 1$ 에서 정의되지 않지만(분모 0), $x \neq 1$ 에서는 $f(x) = x + 1$ 이므로
 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$ 입니다. 함수값은 없어도 극한은 존재하지요.

2. 좌극한·우극한, 극한 존재의 열쇠

x 가 a 보다 작은 쪽에서 접근하면 좌극한, 큰 쪽에서 접근하면 우극한입니다.

구분	기호	접근 방향
좌극한	$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$	x 가 a 보다 작은 값에서 접근
우극한	$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$	x 가 a 보다 큰 값에서 접근

극한 존재 조건 (초핵심!)

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$$

좌극한과 우극한이 둘 다 존재하고 서로 같아야 극한이 존재합니다. 하나라도 어긋나면 극한은 존재하지 않습니
다.

좌·우극한이 갈리는 대표 주자는 절댓값·가우스 함수·조각으로 정의된 함수입니다. 예를 들어 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$ 는 좌극한
-1, 우극한 1로 달라서 극한이 없습니다.

3. 극한의 성질(사칙연산)

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \beta$ (둘 다 실수로 수렴)일 때만 아래가 성립합니다.

연산	결과
----	----

상수배	$\lim_{x \rightarrow a} k f(x) = k \alpha$
합·차	$\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) \pm g(x)\} = \alpha \pm \beta$
곱	$\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = \alpha \beta$
몫	$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\alpha}{\beta} (\beta \neq 0)$

⚠ **함정 주의:** 이 성질은 **각 극한이 수렴할 때만** 쓸 수 있습니다. $\infty - \infty, \frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, 0 \times \infty$ 같은 **부정형**은 성질을 바로 적용하면 안 되고, 반드시 식을 변형해야 합니다.

4. 부정형(꼴) 극한 계산 전략

꼴	전략	예
$\frac{0}{0}$ (다항)	인수분해 후 약분	$\frac{x^2 - 1}{x - 1} \rightarrow x + 1$
$\frac{0}{0}$ (무리식)	유리화(켈레 곱)	$\frac{\sqrt{x+1} - 1}{x}$
$\frac{\infty}{\infty}$	최고차항으로 분모·분자 나누기	다항식/다항식
$\infty - \infty$ (무리식)	유리화로 곱꼴 만들기	$\sqrt{x^2 + x} - x$

$\frac{\infty}{\infty}$ **유형 3계명** (분모·분자가 다항식일 때)

- ① 분자 차수 > 분모 차수 → 극한 발산($\pm \infty$)
- ② 분자 차수 = 분모 차수 → **최고차항 계수의 비**
- ③ 분자 차수 < 분모 차수 → 극한 0

5. 미정계수 결정 — 수능 단골 유형

핵심 원리 (반드시 암기)

$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ 에서

▶ (분모) → 0인데 극한값이 **존재**(유한)하면 → (분자) → 0

즉 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 이고 극한이 수렴하면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 입니다.

왜요? 만약 분자가 0이 아닌 값으로 가면 (0이 아닌 수) ÷ (0) 꼴이 되어 극한이 발산해 버립니다. 극한이 존재한다는 전제와 모순이지요.

예: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + ax + b}{x - 1} = 3$ 이라면, 분모가 0으로 가므로 분자도 0, 즉 $1 + a + b = 0$. 이후 인수분해해 나머지 조건으로 a, b 를 확정합니다.

6. 함수의 연속 — "끊김 없이 이어짐"

$x = a$ 에서 연속일 조건 (세 가지 모두 성립)

- ① $f(a)$ 가 정의되어 있다.
- ② $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 가 존재한다.
- ③ $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ (극한값과 함수값이 일치).

두문자 「정·존·같」 (정의·존재·같다)으로 외우세요!

★ 세 조건은 사실상 "③이 성립한다"는 한 문장으로 압축됩니다.

하나라도 어긋나면 **불연속**입니다. 구멍(정의 안 됨)·점프(좌우극한 다름)·함숫값 튜(값만 다름)이 대표적 불연속 형태예요.

7. 연속함수의 성질과 구간

두 함수 f, g 가 $x = a$ 에서 연속이면 $f \pm g, kf, fg$ 도 연속, $\frac{f}{g}$ 는 $g(a) \neq 0$ 일 때 연속입니다.

기억할 사실: 다항함수는 모든 실수에서 연속입니다. 유리함수·무리함수·절댓값함수는 **정의된 구간에서** 연속입니다.

8. 두 정리 — 사잇값·최대최소

최대·최소 정리

f 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이면, 그 구간에서 **최댓값과 최솟값**을 반드시 갖습니다.

※ '닫힌구간'과 '연속' 둘 중 하나만 빠져도 보장 안 됨.

사잇값 정리 (IVT)

f 가 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a) \neq f(b)$ 이면, $f(a)$ 와 $f(b)$ 사이의 임의의 값 k 에 대해 $f(c) = k$ 인 c 가 **열린 구간 (a, b) 에 적어도 하나** 존재합니다.

실전 활용(방정식 근의 존재): f 가 연속이고 $f(a)f(b) < 0$ 이면(부호가 다르면) (a, b) 에 방정식 $f(x) = 0$ 의 실근이 적어도 하나 존재합니다.

9. 자주 틀리는 함정 총정리

함정	바로잡기
극한 = 함수값?	극한과 $f(a)$ 는 별개. 다를 수 있음
좌·우극한 확인 생략	절댓값·가우스·조각함수는 반드시 좌우 분리
부정형에 성질 바로 적용	$\frac{0}{0}, \infty - \infty$ 등은 변형 먼저
사잇값 정리에서 근 '개수' 단정	'적어도 하나'만 보장, 정확한 개수 아님

최대최소 정리 조건 무시	열린구간·불연속이면 보장 안 됨
---------------	-------------------

10. 한눈 요약표

개념	핵심
극한 존재	좌극한 = 우극한
$\frac{0}{0}$ 극한	인수분해·유리화
$\frac{\infty}{\infty}$ 극한	최고차항 비교(차수·계수)
미정계수	분모 → 0·수렴이면 분자 → 0
연속 조건	정·존·같
사잇값 정리	연속+부호 다름 → 근 존재

© SKY 멘토 × AI 협업 출제

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야(NEOYA)는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoya.kr

너야(NEOYA) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.